Paradoks Banacha–Tarskiego

1 października 2026

Streszczenie

Dowodzimy, że domkniętą kulę w $\mathbb{R}^3$ można podzielić na skończenie wiele rozłącznych zbiorów, a następnie za pomocą samych obrotów i przesunięć złożyć z nich dwie rozłączne kule, każdą przystającą do wyjściowej. Zaczynamy od definicji grupy wolnej i jej konstrukcji ze słów. Osobno dowodzimy poprawności redukcji słów, paradoksalnego rozkładu grupy wolnej, istnienia wolnej podgrupy obrotów oraz wszystkich przejść od grupy do sfery i od sfery do pełnej kuli. Nie pomijamy ani słowa pustego, ani punktów na osiach obrotów, ani środka kuli. Wskazujemy miejsce użycia aksjomatu wyboru i wyjaśniamy, dlaczego nie powstaje sprzeczność z addytywnością objętości.

Spis treści

1 Cel, założenia i plan dowodu **2**

1.1 Co dokładnie zostanie udowodnione? . . . 3

1.2 Siedem etapów . . . 3

2 Grupa wolna: definicja, konstrukcja i przykłady **3**

2.1 Podstawowe pojęcia z teorii grup . . . 3

2.2 Definicja grupy wolnej . . . 4

2.3 Litery, słowa i redukcja . . . 4

2.4 Dlaczego wynik redukcji jest jednoznaczny? . . . 4

2.5 Mnożenie słów zredukowanych . . . 5

2.6 Przykłady i kontrprzykłady . . . 6

3 Skończone rozkłady i dwie kopie zbioru **7**

3.1 Działanie grupy i dozwolone ruchy . . . 7

3.2 Dwie kopie oznaczone etykietami . . . 7

3.3 Przesunięcie wzdłuż nieskończonego łańcucha . . . 8

4 Paradoksalny rozkład grupy wolnej **8**

4.1 Podział według pierwszej litery . . . 8

4.2 Włączenie słowa pustego bez dodatkowej kopii . . . 9

5 Dwa konkretne obroty generujące grupę wolną **9**

5.1 Grupa obrotów i punkty stałe jej elementów . . . 9

5.2 Wybór generatorów . . . 10

5.3 Rachunek modulo 3 i usunięcie pierwiastków 10
5.4 Cztery wektory i jedna tabela 11

6 Od grupy do sfery bez punktów wyjątkowych 12
6.1 Orbity, stabilizatory i działanie swobodne 12
6.2 Przeliczalny zbiór wyjątkowy 12
6.3 Wybór reprezentantów: dokładne miejsce aksjomatu wyboru 13
6.4 Cztery kawałki na wszystkich orbitach jednocześnie 13

7 Przywrócenie wszystkich punktów sfery 13
7.1 Wybór kąta poza zbiorem przeliczalnym 13
7.2 Obrót rozdzielający przeliczalny zbiór 14

8 Od sfery do pełnej kuli 15
8.1 Przedłużenie kawałków wzdłuż promieni 15
8.2 Wchłonięcie środka za pomocą obrotu 16
8.3 Złożenie wszystkich etapów 16
8.4 Kula o innym środku i promieniu 17

9 Dlaczego nie przeczy to objętości? 17
9.1 Miara jest określona tylko na pewnych zbiorach 17
9.2 Co jest, a co nie jest konstruktywne? 18

10 Kontrola dowodu i najczęstsze pułapki 18
10.1 Łańcuch zależności 18
10.2 Dziesięć miejsc wymagających szczególnej uwagi 18
10.3 Krótkie zadania kontrolne z rozwiązaniami 19

Uwagi bibliograficzne 19

1 Cel, założenia i plan dowodu

Słowo *paradoks* oznacza tutaj twierdzenie sprzeczne z intuicją, a nie sprzeczność logiczną. Pracujemy w zwykłej teorii mnogości ZFC, czyli z aksjomatem wyboru. Kawałkiem nazywamy dowolny podzbiór kuli: nie musi być bryłą, nie musi być spójny ani mierzalny w sensie Lebesgue'a.

Zakładamy znajomość zbiorów, funkcji, liczb rzeczywistych oraz elementarnego rachunku macierzy i wektorów. Przypominamy potrzebne pojęcia grupowe; nie zakładamy znajomości grup wolnych, teorii działań grup ani teorii rozkładów paradoksalnych. Nie konstruujemy liczb rzeczywistych ani nie wyprowadzamy podstaw algebry liniowej z aksjomatów. Teoria miary pojawia się dopiero w komentarzu po dowodzie i nie jest narzędziem samej konstrukcji.

1.1 Co dokładnie zostanie udowodnione?

Przez $\|x\|$ oznaczamy długość euklidesową wektora $x \in \mathbb{R}^3$. Niech

$$B^3 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| \leq 1\}, \qquad S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| = 1\}.$$

To odpowiednio kula domknięta i jej brzeg, czyli sfera. Kula zawiera również punkty wnętrza; nie wolno jej utożsamiać ze sferą.

Twierdzenie 1.1 (Banach–Tarski: podwojenie kuli)**.** *Istnieje skończona rodzina parami rozłącznych zbiorów $P_1, \ldots, P_N \subset B^3$ oraz ruchy sztywne $f_i(x) = Q_i x + v_i$, gdzie $Q_i \in \mathrm{SO}(3)$, takie że*

$$B^3 = \bigsqcup_{i=1}^{N} P_i, \qquad \bigsqcup_{i=1}^{N} f_i(P_i) = (B^3 + (-3,0,0)) \sqcup (B^3 + (3,0,0)).$$

W obu zapisach unie są rozłączne. Każdy kawałek jest użyty dokładnie raz; nie rozciągamy go, nie pomniejszamy i nie tworzymy jego dodatkowej kopii. Konstrukcja podana niżej używa co najwyżej 64 kawałków; nie jest to twierdzenie o najmniejszej możliwej liczbie kawałków.

Grupę SO(3), czyli grupę obrotów zachowujących orientację i punkt 0, zdefiniujemy macierzowo w podsekcji 5.1. Dodanie v_i pozwala przesuwać kawałki. Odległość między środkami dwóch kul docelowych wynosi $6 > 2$, więc rzeczywiście są one rozłączne.

1.2 Siedem etapów

1. Zbudujemy grupę wolną F_2 z liter a, a^{-1}, b, b^{-1}.
2. Podzielimy F_2 na cztery zbiory, z których dwa odtworzą pierwszą kopię F_2, a pozostałe dwa drugą.
3. Pokażemy dwa konkretne obroty, które nie spełniają żadnej nietrywialnej relacji. Dzięki temu otrzymamy monomorfizm $F_2 \to \mathrm{SO}(3)$.
4. Usuniemy ze sfery przeliczalny zbiór punktów stałych D. Na pozostałym zbiorze X przeniesiemy rozkład grupy na każdą orbitę.
5. Wykażemy, że dodanie D nie przeszkadza: sfera i X są równoważne przez rozkład na dwa kawałki.
6. Przedłużymy rozkład sfery wzdłuż promieni, otrzymując rozkład kuli bez środka, a następnie osobno wchłoniemy środek.
7. Umieścimy dwie formalne kopie w dwóch różnych miejscach przestrzeni. Sprawdzimy skończoność, rozłączność i pokrycie.

Najtrudniejszy krok algebraiczny, czyli dowód, że wskazane obroty są wolnymi generatorami, przeprowadzimy rachunkiem macierzowym modulo 3. Nie odwołujemy się do twierdzenia o istnieniu „odpowiednich obrotów”.

2 Grupa wolna: definicja, konstrukcja i przykłady

2.1 Podstawowe pojęcia z teorii grup

Definicja 2.1 (Grupa)**.** Grupa to zbiór G z działaniem $(g,h) \mapsto gh$, które jest łączne, ma element neutralny e i dla każdego $g \in G$ ma element odwrotny g^{-1}. Oznacza to $(gh)k = g(hk)$, $eg = ge = g$, $gg^{-1} = g^{-1}g = e$. Grupa jest *przemienna*, gdy dodatkowo $gh = hg$ dla wszystkich g, h. W tym skrypcie przemienności na ogół nie zakładamy.

Przykład 2.2. $\mathbb{Z}$ z dodawaniem jest grupą: elementem neutralnym jest 0, a odwrotnością n jest $-n$. Bijekcje danego zbioru tworzą grupę ze składaniem funkcji. W tym drugim przykładzie kolejność może mieć znaczenie. Dla funkcji przyjmujemy $(fg)(x) = f(g(x))$: najpierw działa czynnik z prawej strony.

Definicja 2.3 (Homomorfizm, podgrupa, generatory)**.** Homomorfizm $\varphi : G \to H$ spełnia $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$. Jeżeli jest różnowartościowy, nazywamy go *monomorfizmem*. Podgrupa $K \leq G$ to podzbiór zawierający e i zamknięty na iloczyny i odwrotności. Mówimy, że a, b generują G, gdy każdy element G jest skończonym iloczynem elementów a, a^{-1}, b, b^{-1}; dopuszczamy iloczyn pusty, równy e. Piszemy wtedy $\langle a, b\rangle = G$.

Homomorfizm zachowuje element neutralny i odwrotności. Na przykład $\varphi(e) = \varphi(e)^2$; pomnożenie przez $\varphi(e)^{-1}$ daje $\varphi(e) = e_H$. Następnie $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(e) = e_H$.

2.2 Definicja grupy wolnej

Definicja 2.4 (Grupa wolna na dwóch generatorach)**.** Elementy a, b grupy F są *wolnymi generatorami*, jeżeli generują F i spełniają następującą własność: dla każdej grupy H i dowolnych elementów $u, v \in H$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm $\varphi : F \to H$ taki, że $\varphi(a) = u$ oraz $\varphi(b) = v$. Taką grupę oznaczamy $F(a, b)$ lub F_2. Własność tę nazywamy *własnością uniwersalną*.

Znaczenie definicji jest następujące: obrazy a i b można wybrać zupełnie dowolnie, bez konieczności sprawdzania dodatkowych relacji. Gdybyśmy narzucili $a^2 = e$, to obraz u musiałby spełniać $u^2 = e_H$; gdybyśmy narzucili $ab = ba$, to obrazy musiałyby komutować. Grupa wolna nie narzuca żadnych relacji poza wynikającymi z aksjomatów grupy.

Nie wymagamy przy tym, aby u, v generowały całą grupę H. Ponieważ a, b generują F, obraz homomorfizmu jest dokładnie podgrupą $\langle u, v\rangle \leq H$. Homomorfizm φ jest więc surjektywny wtedy i tylko wtedy, gdy $H = \langle u, v\rangle$.

Równoważnie można ograniczyć własność uniwersalną do grup generowanych przez dwa wyróżnione elementy. Istotnie, dla dowolnych $u, v \in H$ stosujemy ją do $K = \langle u, v\rangle$, otrzymując homomorfizm $\widetilde{\varphi} : F \to K$, a następnie składamy go z inkluzją $K \hookrightarrow H$. Jednoznaczność wynika z faktu, że homomorfizm z F jest całkowicie wyznaczony przez obrazy generatorów a, b.

Ta intuicja nie zastępuje konstrukcji. Teraz zbudujemy grupę, sprawdzimy wszystkie aksjomaty i udowodnimy powyższą własność.

2.3 Litery, słowa i redukcja

Bierzemy cztery formalne symbole $\mathcal{A} = \{a, \bar{a}, b, \bar{b}\}$. Na razie kreska nie oznacza obliczonej odwrotności: ustalamy tylko parowanie liter $a \leftrightarrow \bar{a}$ oraz $b \leftrightarrow \bar{b}$. Dla litery s oznaczamy przypisaną jej literę odwrotną przez s^{-1}. Później $\bar{a}$ rzeczywiście będzie odwrotnością elementu a.

Definicja 2.5 (Słowo zredukowane)**.** Słowem jest skończony ciąg liter $s_1 \cdots s_n$ z $\mathcal{A}$. Słowo puste oznaczamy e; jego długość wynosi zero. Słowo jest *zredukowane*, jeśli nie zawiera sąsiedniej pary liter ss^{-1}. Redukcja elementarna usuwa taką parę.

Przykład 2.6. Słowo $a\bar{a}b\bar{b}ba$ redukuje się następująco: $a\bar{a}b\bar{b}ba \longrightarrow b\bar{b}ba \longrightarrow ba$. Słowo $ab\bar{a}\bar{b}$ jest już zredukowane. Nie wolno skrócić liter a i $\bar{a}$, ponieważ nie sąsiadują. W grupie wolnej nie wolno przestawić liter, aby ułatwić sobie skracanie.

2.4 Dlaczego wynik redukcji jest jednoznaczny?

To istotny punkt: bez jednoznaczności nie mielibyśmy dobrze określonego działania. Nie wystarcza powiedzieć „skracamy, ile się da”.

Definicja 2.7 (Algorytm stosu)**.** Czytamy słowo od lewej do prawej, przechowując pomocnicze słowo r, początkowo puste. Po przeczytaniu litery s:

- jeśli ostatnią literą r jest s^{-1}, usuwamy ją;
- w przeciwnym razie dopisujemy s na końcu r.

Wynik po przeczytaniu całego słowa w oznaczamy $\mathrm{red}(w)$. Pomocnicze słowo jest zredukowane po każdym kroku.

Lemat 2.8 (Odczytanie pary odwrotnej niczego nie zmienia)**.** *Jeśli przed odczytaniem liter s, s^{-1} na stosie jest słowo zredukowane r, to po odczytaniu obu liter na stosie znów jest r.*

Dowód. Rozważamy dwa przypadki. Jeśli r nie kończy się literą s^{-1}, pierwsza operacja dopisuje s, a druga natychmiast usuwa dopisane s. Wynik to r. Jeśli $r = us^{-1}$, pierwsza operacja pozostawia u. Ponieważ r było zredukowane, u nie kończy się literą s. Druga operacja dopisuje zatem s^{-1}, a nie kasuje końca u. Ponownie otrzymujemy $us^{-1} = r$. Działa to również dla pustego u. □

Twierdzenie 2.9 (Jednoznaczność redukcji)**.** *Każde słowo w można przez kolejne redukcje elementarne sprowadzić do dokładnie jednego słowa zredukowanego, którym jest* $\mathrm{red}(w)$.

Dowód. Istnienie. Każde usunięcie pary zmniejsza długość o 2, więc ciąg usunięć musi się skończyć. Wynik końcowy jest zredukowany. Algorytm stosu również można zrealizować przez takie usunięcia: redukujemy przeczytany prefiks, dopisujemy następną literę i ewentualnie usuwamy jedną końcową parę. Indukcja po długości prefiksu uzasadnia, że końcowy stos jest osiągalnym zredukowanym wynikiem.

Niezależność od wyboru par. Słowa $pss^{-1}q$ i pq mają ten sam wynik algorytmu stosu. Po prefiksie p stos jest ten sam; dwie dodatkowe litery nie zmieniają go na mocy lematu 2.8; następnie czytamy ten sam sufiks q.

Zatem każde usunięcie pary zachowuje $\mathrm{red}(w)$. Jeżeli pewien ciąg usunięć kończy się słowem zredukowanym z, to $\mathrm{red}(w) = \mathrm{red}(z) = z$. Ostatnia równość zachodzi, ponieważ algorytm stosu nie skraca słowa, w którym nie ma odwrotnych sąsiadów. Każdy wynik końcowy jest więc taki sam. □

Wniosek 2.10. *Dla dowolnych słów u, v mamy* $\mathrm{red}(\mathrm{red}(u)v) = \mathrm{red}(uv)$ *oraz* $\mathrm{red}(u\,\mathrm{red}(v)) = \mathrm{red}(uv)$.

Dowód. Redukcje prowadzące od u do $\mathrm{red}(u)$ można wykonać wewnątrz początkowego fragmentu uv. Analogicznie redukcje v można wykonać wewnątrz końcowego fragmentu. Twierdzenie 2.9 mówi, że ostateczny wynik od tego nie zależy. □

2.5 Mnożenie słów zredukowanych

Niech F_2 będzie zbiorem wszystkich słów zredukowanych. Definiujemy $u \cdot v = \mathrm{red}(uv)$, gdzie uv po prawej oznacza złączenie słów.

Stwierdzenie 2.11. *Tak zdefiniowane mnożenie czyni F_2 grupą. Elementem neutralnym jest słowo puste e, a odwrotnością $s_1 \cdots s_n$ jest $s_n^{-1} \cdots s_1^{-1}$.*

Dowód. Zamkniętość wynika z tego, że red daje słowo zredukowane. Łączność nie jest dodatkowym założeniem: z wniosku 2.10 otrzymujemy $(u \cdot v) \cdot w = \mathrm{red}(\mathrm{red}(uv)w) = \mathrm{red}(uvw)$ oraz $u \cdot (v \cdot w) = \mathrm{red}(u\,\mathrm{red}(vw)) = \mathrm{red}(uvw)$. Doklejenie słowa pustego nic nie zmienia, zatem jest ono neutralne.

Słowo $s_n^{-1} \cdots s_1^{-1}$ jest zredukowane: sąsiednia para odwrotna w nim odpowiadałaby sąsiedniej parze odwrotnej w pierwotnym słowie. W iloczynie $(s_1 \cdots s_n)(s_n^{-1} \cdots s_1^{-1})$ kasujemy kolejno pary od środka na zewnątrz i otrzymujemy e. Tak samo dzieje się w odwrotnej kolejności iloczynu. □

Twierdzenie 2.12 (Własność uniwersalna konstrukcji)**.** *Zbudowana grupa F_2 jest grupą wolną na a, b w sensie definicji 2.4.*

Dowód. Weźmy dowolną grupę H i $u, v \in H$. Zastąpmy litery $a, \bar{a}, b, \bar{b}$ odpowiednio elementami u, u^{-1}, v, v^{-1}, a słowo puste elementem e_H. Dla dowolnego słowa w niech $V(w)$ oznacza iloczyn przypisanych mu elementów H w tej samej kolejności. Każda usuwana para ss^{-1} ma iloczyn e_H, więc $V(\mathrm{red}(w)) = V(w)$. Ograniczenie V do słów zredukowanych oznaczmy przez φ. Dla zredukowanych słów w, z mamy $\varphi(\mathrm{red}(wz)) = V(\mathrm{red}(wz)) = V(wz) = V(w)V(z) = \varphi(w)\varphi(z)$. To homomorfizm o żądanych obrazach a, b. Jednoznaczność wynika z tego, że homomorfizm musi zachowywać iloczyny i odwrotności: jego wartość na każdym słowie jest wymuszona przez obrazy liter. □

Uwaga 2.13 (Jednoznaczność grupy wolnej). Jeśli dwie grupy spełniają własność uniwersalną dla dwóch wskazanych generatorów, otrzymujemy homomorfizmy w obie strony zachowujące generatory. Ich złożenia też zachowują generatory, tak samo jak odwzorowanie identycznościowe. Z jednoznaczności we własności uniwersalnej złożenia są identycznościami. Grupy są więc izomorficzne.

2.6 Przykłady i kontrprzykłady

Przykład 2.14 (Jeden generator)**.** Przy alfabecie $\{a, \bar{a}\}$ każde niepuste słowo zredukowane składa się wyłącznie z a albo wyłącznie z $\bar{a}$: zmiana rodzaju litery tworzyłaby parę odwrotną. Dostajemy elementy a^n, $n \in \mathbb{Z}$, i regułę $a^m a^n = a^{m+n}$. Grupa wolna na jednym generatorze jest więc izomorficzna z $(\mathbb{Z}, +)$. Jest przemienna. Wolność nie oznacza automatycznie nieprzemienności.

Przykład 2.15 (Dwa generatory)**.** W F_2 słowa ab i ba są różnymi słowami zredukowanymi, więc $ab \neq ba$. W szczególności $aba^{-1}b^{-1} \neq e$. Jest to przykład komutatora. Niezerowa długość zredukowanego słowa jest tutaj pełnym dowodem, że nie otrzymaliśmy elementu neutralnego. Na przykład $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, a nie $a^{-1}b^{-1}$. Iloczyn $ab \cdot b^{-1}a^{-1}$ redukuje się do e.

Przykład 2.16 (Grupa $\mathbb{Z}^2$ nie jest wolna na swoich dwóch standardowych generatorach)**.** Dla $u = (1, 0)$ i $v = (0, 1)$ zachodzi $u + v = v + u$. Zastąpienie a przez u, a b przez v daje homomorfizm $F_2 \to \mathbb{Z}^2$, ale komutator przechodzi na $(0, 0)$. Homomorfizm nie jest różnowartościowy. W $\mathbb{Z}^2$ pamiętamy sumy wykładników, lecz tracimy kolejność liter; w F_2 ta kolejność ma znaczenie.

Przykład 2.17 (Nieprzemienność nie wystarcza)**.** Permutacje (12) i (23) zbioru $\{1, 2, 3\}$ nie komutują, ale $(12)^2 = e$. Nie mogą być wolnymi generatorami. Podobnie wybranie dwóch niekomutujących obrotów w przestrzeni nie dowodzi jeszcze, że generują F_2: trzeba wykluczyć wszystkie niepuste słowa zredukowane, nie tylko jeden komutator.

Stwierdzenie 2.18 (Przeliczalność)**.** *Grupa F_2 jest przeliczalnie nieskończona. Słów zredukowanych o długości $n \geq 1$ jest dokładnie $4 \cdot 3^{n-1}$.*

Dowód. Pierwszą literę wybieramy na cztery sposoby. Każda następna może być dowolna poza odwrotnością poprzedniej, więc mamy trzy możliwości. Możemy wypisać słowa według długości, a w ramach jednej długości według ustalonego porządku liter. To daje wyliczenie wszystkich elementów. Jest ich nieskończenie wiele, bo $e, a, a^2, \ldots$ są różne. □

3 Skończone rozkłady i dwie kopie zbioru

3.1 Działanie grupy i dozwolone ruchy

Definicja 3.1 (Działanie grupy)**.** Grupa G działa na zbiorze Y, jeśli każdej parze $(g, x) \in G \times Y$ przyporządkowano $gx \in Y$ tak, że $ex = x$ i $(gh)x = g(hx)$. Każde przekształcenie $x \mapsto gx$ jest bijekcją, z odwrotnością $x \mapsto g^{-1}x$. Dla $C \subseteq Y$ piszemy $gC = \{gx : x \in C\}$.

Przykłady to działanie grupy na sobie przez mnożenie z lewej, działanie obrotów na sferze oraz działanie ruchów sztywnych na $\mathbb{R}^3$.

Definicja 3.2 (Równoważność przez skończony rozkład)**.** Niech $E, F \subseteq Y$, gdzie G działa na Y. Piszemy $E \equiv_G F$, jeżeli istnieją skończona partycja $E = E_1 \sqcup \cdots \sqcup E_k$ oraz $g_1, \ldots, g_k \in G$ takie, że $F = g_1E_1 \sqcup \cdots \sqcup g_kE_k$. Słowo *partycja* oznacza, że części są parami rozłączne i pokrywają cały zbiór. Puste części można usuwać. Gdy grupa ruchów jest ustalona, opuszczamy indeks G.

Istnienie takiego rozkładu jest równoważne istnieniu bijekcji $f : E \to F$, która na każdej ze skończenie wielu części E_i ma postać $f(x) = g_ix$. Rozłączność obrazów daje różnowartościowość, a pokrycie F — surjektywność.

Przykład (dwie części). Niech grupa $(\mathbb{Z}, +)$ działa na $\mathbb{Z}$ przez przesunięcia. Zbiór $E = \{0, 1\}$ jest równoważny zbiorowi $F = \{0, 3\}$: część $\{0\}$ pozostawiamy na miejscu, a część $\{1\}$ przesuwamy o 2. Obrazy $\{0\}$ i $\{3\}$ są rozłączne i pokrywają F. Ten przykład pokazuje, że na różnych częściach mogą działać różne elementy grupy.

Lemat 3.3 (Składanie rozkładów)**.** *Relacja $\equiv_G$ jest zwrotna, symetryczna i przechodnia. Złożenie rozkładów na odpowiednio p i q części wymaga co najwyżej pq części.*

Dowód. Zwrotność daje jedna część i ruch e. Dla symetrii bierzemy części g_iE_i zbioru docelowego i ruchy g_i^{-1}. Przejdźmy do przechodniości. Niech $f : E \to F$ działa jako g_i na E_i, a $h : F \to H$ jako h_j na F_j. Dzielimy E na zbiory

$$E'_{ij} = E_i \cap g_i^{-1}(F_j). \tag{3.1}$$

Dla każdego $x \in E$ istnieje dokładnie jedno i z $x \in E_i$, a następnie dokładnie jedno j z $g_ix \in F_j$. Zatem zbiory E'_{ij} tworzą partycję. Na E'_{ij} złożenie $h \circ f$ jest pojedynczym ruchem h_jg_i. Ponieważ złożenie bijekcji jest bijekcją, obrazy tych części są rozłączne i pokrywają H. Liczba par (i, j) wynosi pq. □

3.2 Dwie kopie oznaczone etykietami

Symbol $E \sqcup E$ oznacza sumę rozłączną dwóch kopii E. Będziemy ją przedstawiać jako $2E = E \times \{1, 2\}$. Pary $(x, 1)$ i $(x, 2)$ oznaczają dwa różne miejsca docelowe. Etykieta nie jest dodatkową współrzędną euklidesową.

W rozkładzie między kopiami oznaczonymi etykietami każda część ma jedną ustaloną etykietę źródłową i jedną docelową; przekształcenie ma postać $(x, i) \mapsto (gx, j)$. Etykiety służą jedynie do rozróżnienia kopii. Na końcu umieścimy kopie w różnych miejscach $\mathbb{R}^3$ za pomocą przesunięć.

Dowód lematu 3.3 działa bez zmian, gdy w przecięciach (3.1) uwzględniamy zgodność etykiety pośredniej. Jeżeli $E \equiv_G F$, możemy wykonać ten sam rozkład osobno w obu kopiach, otrzymując $2E \equiv_G 2F$.

Definicja 3.4 (Zbiór paradoksalny)**.** Zbiór E jest *paradoksalny* dla danego działania grupy, jeśli $E \equiv_G 2E$. Równoważnie, istnieje partycja $E = A_1 \sqcup \cdots \sqcup A_m \sqcup B_1 \sqcup \cdots \sqcup B_n$ i elementy $g_i, h_j \in G$

takie, że

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{m} g_i A_i, \qquad E = \bigsqcup_{j=1}^{n} h_j B_j.$$

Pierwsze równanie odtwarza kopię z etykietą 1, drugie kopię z etykietą 2. Źródłowe części nie są kopiowane.

Niepusty zbiór paradoksalny musi być nieskończony: dla niepustego zbioru skończonego bijekcja $E \to 2E$ wymagałaby $|E| = 2|E|$. W dalszej części zbudujemy taki rozkład dla F_2, a następnie przeniesiemy go na sferę i kulę.

Wniosek 3.5 (Przenoszenie paradoksalności)**.** *Jeśli $E \equiv_G F$ i $F \equiv_G 2F$, to $E \equiv_G 2E$.*

Dowód. Składamy trzy skończone rozkłady: $E \equiv_G F \equiv_G 2F \equiv_G 2E$. Ostatnia równoważność jest dwukrotnym zastosowaniem odwrotnego rozkładu $F \equiv_G E$. Lemat 3.3 zapewnia, że po złożeniu nadal mamy skończenie wiele części i pojedynczy dozwolony ruch na każdej. □

3.3 Przesunięcie wzdłuż nieskończonego łańcucha

Lemat 3.6 (Przesunięcie łańcucha)**.** *Niech $D \subseteq E \subseteq Y$, a $T : Y \to Y$ będzie przekształceniem wyznaczonym przez pewien element G. Załóżmy, że zbiory $D, T(D), T^2(D), \ldots$ są parami rozłączne i wszystkie zawierają się w E. Wówczas $E \equiv_G E \setminus D$ przy użyciu co najwyżej dwóch części.*

Dowód. Niech $L = \bigcup_{n=0}^{\infty} T^n(D)$. Rozłączność poziomów daje $T(L) = \bigcup_{n=1}^{\infty} T^n(D) = L \setminus D$. Dzielimy E na dwie części L i $E \setminus L$. Pierwszą przenosimy przez T, drugą pozostawiamy bez zmian. Obrazy to odpowiednio $L \setminus D$ i $E \setminus L$; są rozłączne i ich suma wynosi $E \setminus D$. □

Uwaga 3.7. Użyliśmy nieskończonej unii do zdefiniowania jednego kawałka L. Nie wykonujemy nieskończenie wielu ruchów na różnych poziomach: na całym L działa jeden i ten sam ruch T. Rozkład ma więc dwie części, mimo że jedna z nich jest nieskończoną unią.

4 Paradoksalny rozkład grupy wolnej

4.1 Podział według pierwszej litery

Dla $s \in \mathcal{A}$ niech $W(s)$ oznacza zbiór niepustych słów zredukowanych zaczynających się literą s. Zatem

$$F_2 = \{e\} \sqcup W(a) \sqcup W(\bar{a}) \sqcup W(b) \sqcup W(\bar{b}). \tag{4.1}$$

Każde słowo niepuste ma dokładnie jedną pierwszą literę, więc zbiory po prawej stronie są parami rozłączne i pokrywają F_2.

Lemat 4.1 (Kasowanie pierwszej litery)**.** *Mamy $aW(\bar{a}) = F_2 \setminus W(a)$ oraz $bW(\bar{b}) = F_2 \setminus W(b)$.*

Dowód. Sprawdzimy obie inkluzje pierwszej równości. Słowo z $W(\bar{a})$ ma postać $\bar{a}u$, gdzie u jest puste albo nie zaczyna się literą a; w przeciwnym razie nie byłoby zredukowane. Mnożenie przez a z lewej kasuje parę $a\bar{a}$ i daje właśnie u. Wynik nie należy do $W(a)$.

Odwrotnie, jeśli $u \notin W(a)$, to $u = e$ albo jego pierwsza litera nie jest a. Słowo $\bar{a}u$ jest wtedy zredukowane i należy do $W(\bar{a})$, a $a(\bar{a}u) = u$. Dotyczy to także $u = e$: jego poprzednikiem jest słowo $\bar{a}$. Drugą równość dowodzimy tak samo, zastępując a przez b. □

Już teraz mamy dwa równania $F_2 = W(a) \sqcup aW(\bar{a})$ oraz $F_2 = W(b) \sqcup bW(\bar{b})$. Nie jest to jeszcze pełny rozkład paradoksalny, ponieważ cztery źródłowe zbiory $W(s)$ nie zawierają e. Nie wolno zgubić tego jednego elementu.

4.2 Włączenie słowa pustego bez dodatkowej kopii

Połóżmy $P = \{a^n : n = 0, 1, 2, \ldots\}$, gdzie $a^0 = e$. Zauważmy dokładnie, że

$$aP = P \setminus \{e\} = P \cap W(a). \tag{4.2}$$

Pierwsza równość wynika z $a \cdot a^n = a^{n+1}$ i z tego, że potęgi $a^0, a^1, \ldots$ są parami różne. Druga mówi, że spośród tych potęg tylko a^0 nie zaczyna się literą a.

Twierdzenie 4.2 (Cztery kawałki grupy)**.** *Zbiory*

$$A_1 = W(a) \setminus P, \quad A_2 = W(\bar{a}) \cup P, \qquad B_1 = W(b), \quad B_2 = W(\bar{b}) \tag{4.3}$$

tworzą partycję F_2 i spełniają

$$F_2 = A_1 \sqcup aA_2, \qquad F_2 = B_1 \sqcup bB_2. \tag{4.4}$$

W szczególności F_2 jest zbiorem paradoksalnym względem działania na sobie przez mnożenie z lewej.

Dowód. Partycja źródła. W partycji (4.1) wydzielamy dodatnie potęgi a ze zbioru $W(a)$ i razem z e dołączamy je do $W(\bar{a})$, tworząc $A_2 = W(\bar{a}) \cup P$. Pozostała część $W(a)$ to A_1. Nic nie zmieniamy w $W(b)$ i $W(\bar{b})$. Zbiory pozostają rozłączne, a teraz pokrywają także e.

Pierwsza kopia. Korzystając z lematu 4.1 i (4.2), otrzymujemy $aA_2 = aW(\bar{a}) \sqcup aP = (F_2 \setminus W(a)) \sqcup (P \setminus \{e\})$. Pierwszy składnik nie zawiera słów zaczynających się od a, a drugi składa się właśnie z dodatnich potęg a. Ich unia jest rozłączna. Zbiór $A_1 = W(a) \setminus P$ jest rozłączny z obydwoma składnikami i uzupełnia je do całego F_2.

Druga kopia. Lemat 4.1 od razu daje $B_1 \sqcup bB_2 = W(b) \sqcup (F_2 \setminus W(b)) = F_2$. W obu kopiach sprawdziliśmy zarówno pokrycie, jak i rozłączność. □

kawałek źródłowy	ruch	etykieta celu
A_1	e	1
A_2	a	1
B_1	e	2
B_2	b	2

Przykład 4.3 (Sprawdzenie kilku punktów)**.** e, a, a^2 należą do A_2 i po ruchu a trafiają odpowiednio do a, a^2, a^3 w pierwszej kopii. Element $\bar{a} \in A_2$ trafia do e w pierwszej kopii. Słowo $ab \in A_1$ pozostaje ab w tej samej kopii. Element $\bar{b} \in B_2$ trafia do e w drugiej kopii. Dwie kopie e w zbiorze docelowym mają różnych poprzedników i różne etykiety.

5 Dwa konkretne obroty generujące grupę wolną

5.1 Grupa obrotów i punkty stałe jej elementów

Definicja 5.1. Macierz $Q \in M_3(\mathbb{R})$ jest ortogonalna, jeżeli $Q^TQ = I$. Definiujemy $\mathrm{SO}(3) = \{Q \in M_3(\mathbb{R}) : Q^TQ = I,\ \det Q = 1\}$. Macierze te zachowują długości i orientację. Działają na $\mathbb{R}^3$ przez $x \mapsto Qx$ oraz, przez ograniczenie, na S^2.

Rzeczywiście $\|Qx\|^2 = x^TQ^TQx = \|x\|^2$. Iloczyn dwóch takich macierzy i odwrotność $Q^{-1} = Q^T$ również spełniają warunki definicji. Mamy więc grupę.

Lemat 5.2 (Oś nietrywialnego obrotu)**.** *Jeśli $Q \in \mathrm{SO}(3)$ i $Q \neq I$, to zbiór wektorów ustalanych przez Q jest prostą przez 0. W szczególności Q ma dokładnie dwa punkty stałe na S^2.*

Dowód. Najpierw wykażemy istnienie niezerowego wektora stałego. Mamy

$$\det(Q-I) = \det Q \det(I-Q^{-1}) = \det(I-Q^T) = \det(I-Q) = -\det(Q-I).$$

Ostatni znak minus wynika z nieparzystego wymiaru 3. Zatem $\det(Q-I)=0$, więc układ $(Q-I)x=0$ ma rozwiązanie $x\neq 0$.

Gdyby Q ustalało dwa liniowo niezależne wektory, ustalałoby całą rozpiętą przez nie płaszczyznę. Wybierzmy w niej ortonormalną bazę u, v i jednostkowy wektor w prostopadły do tej płaszczyzny. Ortogonalność implikuje $Qw \perp u, v$ i $\|Qw\| = 1$, zatem $Qw = \pm w$. W bazie u, v, w wyznacznik wynosi odpowiednio 1 albo -1. Warunek $\det Q = 1$ wymusza $Qw = w$, a wtedy $Q = I$. To sprzeczność. Przestrzeń punktów stałych ma więc wymiar dokładnie jeden. Prosta przez 0 przecina sferę w dwóch punktach antypodycznych. □

5.2 Wybór generatorów

Rozważmy

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2\sqrt{2} \\ 0 & 2\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2\sqrt{2} & 0 \\ 2\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \tag{5.1}$$

W obu macierzach blok 2×2 ma postać $\left(\begin{smallmatrix} c & -s \\ s & c \end{smallmatrix}\right)$, gdzie $c = 1/3$, $s = 2\sqrt{2}/3$ i $c^2 + s^2 = 1$. Jego kolumny są ortonormalne i wyznacznik wynosi 1. Wobec tego $A, B \in \mathrm{SO}(3)$. Macierz A obraca wokół osi x, a B wokół osi z, o kąt o cosinusie $1/3$.

Z własności uniwersalnej istnieje homomorfizm $\rho : F_2 \to \mathrm{SO}(3)$, $\rho(a) = A$, $\rho(b) = B$. Musimy udowodnić, że jest *różnowartościowy*. To znacznie mocniejsze niż $AB \neq BA$.

5.3 Rachunek modulo 3 i usunięcie pierwiastków

Dla liczb całkowitych $m \equiv n \pmod 3$ oznacza, że $m - n$ jest podzielne przez 3. Występują tylko trzy reszty, które wygodnie zapisujemy jako $0, 1, -1$. Mamy $2 \equiv -1$. Redukcja modulo 3 zachowuje sumy i iloczyny. Dotyczy to również iloczynów macierzy całkowitych, ponieważ ich wpisy powstają przez sumowanie iloczynów wpisów. Reszty tworzą ciało $\mathbb{F}_3$; potrzebujemy jedynie tego, że iloczyn dowolnej liczby czynników 1 i -1 nie jest zerem. Nie będziemy dzielić przez 3 po redukcji modulo 3.

Dla litery $s \in \{a, \bar a, b, \bar b\}$ oznaczmy przez R_s odpowiednio A, A^{-1}, B, B^{-1}. Macierze $3R_s$ mają wpisy z pierwiastkiem $\sqrt{2}$. Aby dostać macierze całkowite, wprowadzamy pomocniczo $D_0 = \mathrm{diag}(1, \sqrt{2}, 1)$ oraz $N_s = 3D_0^{-1} R_s D_0$. Bezpośrednie mnożenie daje

$$N_a = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \qquad N_{\bar a} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \tag{5.2}$$

$$N_b = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad N_{\bar b} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \tag{5.3}$$

Na przykład wpis $(2,3)$ w $D_0^{-1}(3A)D_0$ wynosi $(1/\sqrt{2})(-2\sqrt{2}) \cdot 1 = -2$, a wpis $(3,2)$ wynosi $1 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4$. Macierze odwrotnych obrotów otrzymujemy z $A^{-1} = A^T$, $B^{-1} = B^T$, co wyjaśnia zmianę znaków.

Uwaga 5.3 (Rola pomocniczej zmiany bazy). Macierz D_0 nie jest obrotem i służy wyłącznie do obliczeń. Sprawdzamy za jej pomocą relacje między obrotami A, B. W konstrukcji kawałki sfery i kuli przemieszczamy jedynie obrotami i przesunięciami.

5.4 Cztery wektory i jedna tabela

W rachunku modulo 3 przyjmijmy wektory kolumnowe

$$w_a = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \quad w_{\bar a} = \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}, \quad w_b = \begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}, \quad w_{\bar b} = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}.$$

Iloczyn uv^T oznacza macierz, której wpis (i,j) to $u_i v_j$. Z (5.2)–(5.3) otrzymujemy

$$\overline{N_s} = w_s w_s^T, \tag{5.4}$$

gdzie kreska oznacza redukcję wszystkich wpisów modulo 3. Na przykład $\overline{N_a} = \left(\begin{smallmatrix}0&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{smallmatrix}\right) = w_a w_a^T$ i $\overline{N_b} = \left(\begin{smallmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\0&0&0\end{smallmatrix}\right) = w_b w_b^T$. Pozostałe dwie równości sprawdzamy identycznie.

Tabela iloczynów skalarnych $w_s^T w_t$, już modulo 3, ma postać

$s\backslash t$	a	$\bar a$	b	$\bar b$
a	-1	0	-1	1
$\bar a$	0	-1	-1	1
b	-1	-1	-1	0
$\bar b$	1	1	0	-1

(5.5)

Na przekątnej jest $1+1=2\equiv -1$. Dla pary $a,\bar a$ mamy $1-1=0$, a dla $b,\bar b$ także $1-1=0$. Przy dwóch różnych osiach tylko jedna współrzędna daje niezerowy wkład, równy 1 albo -1. Otrzymujemy ważną równoważność:

$$w_s^T w_t = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad t = s^{-1} \qquad (\text{w } \mathbb{F}_3). \tag{5.6}$$

Lemat 5.4 (Iloczyn pomocniczych macierzy słowa zredukowanego)**.** *Jeżeli $s_1\cdots s_n$ jest niepustym słowem zredukowanym, to $\overline{N_{s_1}\cdots N_{s_n}}$ nie jest macierzą zerową.*

Dowód. Dla wektorów u,v,x,y zachodzi $(uv^T)(xy^T) = u(v^Tx)y^T$. Wpis (i,j) po lewej stronie jest równy $\sum_k u_i v_k x_k y_j = u_i(\sum_k v_k x_k) y_j$, co dowodzi wzoru bez żadnej dodatkowej teorii. Stosując go kolejno do (5.4), dostajemy

$$\overline{N_{s_1}\cdots N_{s_n}} = \left(\prod_{j=1}^{n-1} w_{s_j}^T w_{s_{j+1}}\right) w_{s_1} w_{s_n}^T. \tag{5.7}$$

Dla $n=1$ iloczyn skalarnych czynników jest pusty i z definicji równy 1. Ponieważ słowo jest zredukowane, $s_{j+1}\neq s_j^{-1}$. Według (5.6) każdy czynnik skalarny jest 1 albo -1, więc ich iloczyn również jest niezerowy. Każdy z wektorów w_s ma pewną współrzędną równą 1. Macierz $w_{s_1}w_{s_n}^T$ ma zatem co najmniej jeden wpis równy 1. Pomnożenie przez niezerowy skalar nie może wyzerować tego wpisu. $\square$

Twierdzenie 5.5 (Wolna podgrupa obrotów)**.** *Homomorfizm $\rho : F_2 \to \mathrm{SO}(3)$ określony przez $\rho(a)=A$, $\rho(b)=B$ jest różnowartościowy.*

Dowód. Niech $w = s_1\cdots s_n$ będzie niepustym słowem zredukowanym. Z definicji N_s i kolejnych skróceń $D_0 D_0^{-1}$ wynika $N_{s_1}\cdots N_{s_n} = 3^n D_0^{-1}\rho(w) D_0$. Gdyby $\rho(w)=I$, prawa strona byłaby równa $3^n I$. Ponieważ $n\geq 1$, jej redukcja modulo 3 byłaby zerowa, wbrew lematowi 5.4. Zatem żadne niepuste słowo zredukowane nie przechodzi na I.

Jeśli $\rho(u)=\rho(v)$, to $\rho(v^{-1}u)=I$. Jedynym elementem mającym taki obraz jest e, więc $v^{-1}u=e$ i $u=v$. To dokładnie różnowartościowość. $\square$

Uwaga 5.6 (Czego rachunek modulo 3 nie dowodzi). Nie zanurzyliśmy nieskończonej grupy w skończonej grupie macierzy modulo 3. Macierze $\overline{N_s}$ są osobliwe. Ponadto $N_s N_{s^{-1}} = 9I$, a nie I. Badaliśmy podzielność wpisów liczników iloczynu obrotów, a nie homomorfizm grupy obrotów uzyskany przez redukcję ułamka 1/3.

6 Od grupy do sfery bez punktów wyjątkowych

Od tej chwili oznaczamy przez $G = \rho(F_2) \leq \mathrm{SO}(3)$ wolną podgrupę z twierdzenia 5.5. Dzięki różnowartościowości możemy utożsamiać elementy G z ich jedynymi słowami zredukowanymi. Litery a, b w działaniu na sferze oznaczają obroty A, B.

6.1 Orbity, stabilizatory i działanie swobodne

Definicja 6.1. Orbita punktu x to $\mathrm{Orb}(x) = Gx = \{gx : g \in G\}$. Stabilizator punktu to $\mathrm{Stab}(x) = \{g \in G : gx = x\}$. Działanie jest *swobodne*, jeśli $\mathrm{Stab}(x) = \{e\}$ dla każdego punktu rozważanego zbioru.

Relacja „należą do tej samej orbity" jest równoważnością: $x = ex$, równanie $y = gx$ daje $x = g^{-1}y$, a z $y = gx$ i $z = hy$ mamy $z = (hg)x$. Orbity są więc parami rozłączne i pokrywają zbiór, na którym działa G.

Uwaga 6.2 (Grupa wolna a działanie swobodne). Wolna grupa nie musi działać swobodnie! Nasza grupa G jest wolna, ale obrót A ustala dwa punkty osi x na sferze. Aby punkt sfery miał jednoznaczny opis przez słowo i reprezentanta orbity, trzeba usunąć wszystkie punkty ustalane przez element G różny od identyczności.

6.2 Przeliczalny zbiór wyjątkowy

Definiujemy

$$D = \bigcup_{g \in G \setminus \{e\}} \mathrm{Fix}_{S^2}(g), \qquad X = S^2 \setminus D, \tag{6.1}$$

gdzie $\mathrm{Fix}_{S^2}(g) = \{x \in S^2 : gx = x\}$.

Lemat 6.3. *Zbiór D jest co najwyżej przeliczalny i niezmienniczy względem G. Zbiór X jest niezmienniczy, a działanie G na X jest swobodne.*

Dowód. Grupa G jest przeliczalna na mocy stwierdzenia 2.18 i monomorfizmu ρ. Każdy $g \neq e$ jest nietrywialnym obrotem i ma dokładnie dwa punkty stałe na sferze, zgodnie z lematem 5.2. Przeliczalna unia zbiorów dwuelementowych jest co najwyżej przeliczalna: wyliczamy elementy grupy i dla każdego wypisujemy oba punkty osi. Można najpierw wypisać punkt, którego pierwsza niezerowa współrzędna jest dodatnia, więc ten porządek nie wymaga nowych arbitralnych wyborów.

Jeśli $gx = x$, to dla dowolnego $h \in G$ mamy $(hgh^{-1})(hx) = hx$. Sprzężony element hgh^{-1} nie jest neutralny, gdyż równość $hgh^{-1} = e$ implikowałaby $g = e$. Zatem $hD \subseteq D$. Stosując to samo do h^{-1}, dostajemy $D \subseteq hD$, więc $hD = D$. Ponieważ h jest bijekcją sfery, także $hX = X$.

Wreszcie, jeśli $x \in X$ i $gx = x$, to $g \neq e$ oznaczałoby $x \in D$, sprzecznie z definicją X. Stabilizator każdego punktu X jest więc trywialny. □

6.3 Wybór reprezentantów: dokładne miejsce aksjomatu wyboru

Definicja 6.4 (Aksjomat wyboru w potrzebnej postaci)**.** Dla każdej rodziny niepustych zbiorów istnieje funkcja, która każdemu zbiorowi z tej rodziny przyporządkowuje jeden z jego elementów.

Zastosujmy ten aksjomat do rodziny wszystkich orbit działania G na X. Wybieramy zbiór $T \subseteq X$ zawierający dokładnie po jednym punkcie z każdej orbity. To jest zasadniczy niekonstruktywny wybór w dowodzie. Nie podajemy algorytmu wyznaczającego T.

Lemat 6.5 (Jednoznaczne współrzędne orbitowe)**.** *Każdy punkt $x \in X$ ma dokładnie jedno przedstawienie $x = gt$, gdzie $g \in G$ i $t \in T$.*

Dowód. Istnienie wynika z wyboru reprezentanta orbity x. Jeśli $gt = hu$, to t i u należą do tej samej orbity, bo $t = g^{-1}hu$. Z wyboru jednego reprezentanta wynika $t = u$. Równość $gt = ht$ daje $(h^{-1}g)t = t$. Swoboda działania wymusza $h^{-1}g = e$, czyli $g = h$. □

Uwaga 6.6. To, że każda orbita jest przeliczalna, nie daje automatycznie przepisu wyboru jednego punktu z każdej orbity. Orbit może być nieprzeliczalnie wiele. Aksjomat wyboru nie jest tu skrótem dla wyliczenia wszystkich punktów sfery.

6.4 Cztery kawałki na wszystkich orbitach jednocześnie

Dla $C \subseteq G$ definiujemy $C^T = \{gt : g \in C,\ t \in T\} \subseteq X$. Z jednoznaczności w lemacie 6.5 wynika, że rozłączne podzbiory G dają rozłączne zbiory C^T. Ponadto

$$h(C^T) = (hC)^T \qquad (h \in G), \tag{6.2}$$

ponieważ $h(gt) = (hg)t$. Na wszystkich orbitach działa ten sam obrót h, niezależny od wybranego reprezentanta.

Twierdzenie 6.7 (Paradoksalność X)**.** *Zbiór $X = S^2 \setminus D$ jest paradoksalny pod działaniem obrotów. Wystarczają cztery części.*

Dowód. Przenosimy zbiory z (4.3) na orbity: $C_1 = A_1^T$, $C_2 = A_2^T$, $C_3 = B_1^T$, $C_4 = B_2^T$. Tworzą partycję X, ponieważ odpowiadające im zbiory grupowe tworzą partycję G, a każdy punkt ma jednoznaczne współrzędne gt. Z (4.4) i (6.2) otrzymujemy $X = C_1 \sqcup aC_2$ oraz $X = C_3 \sqcup bC_4$. To rozkład $X \equiv_G 2X$. Ruchy to $h_1 = I$, $h_2 = A$, $h_3 = I$, $h_4 = B$, a etykiety docelowe to odpowiednio $1, 1, 2, 2$. □

Nie mnożymy liczby kawałków przez liczbę orbit: C_1 jest jednym zbiorem zawierającym stosowne punkty wszystkich orbit, i tak samo dla C_2, C_3, C_4.

7 Przywrócenie wszystkich punktów sfery

Pozostało uzasadnić $S^2 \equiv X$. Nie wystarcza zdanie „zbiór przeliczalny jest mały”. Potrzebujemy skończonego rozkładu i obrotów przypisanych jego częściom.

7.1 Wybór kąta poza zbiorem przeliczalnym

Lemat 7.1. *Żaden niepusty otwarty przedział liczb rzeczywistych nie jest przeliczalny. W szczególności można w nim wybrać liczbę poza dowolnym podanym zbiorem co najwyżej przeliczalnym.*

Dowód. Niech $x_1, x_2, \ldots$ będzie dowolną listą punktów przedziału. Wybierzmy w nim niejednopunktowy przedział domknięty I_0. Indukcyjnie wybieramy niejednopunktowy przedział domknięty $I_n \subset I_{n-1}$ o długości co najwyżej połowy poprzedniej, taki że $x_n \notin I_n$. Możemy go umieścić po jednej stronie x_n; jeśli x_n nie należy do I_{n-1}, dowolny mniejszy podprzedział wystarczy.

Przedziały są zstępujące, domknięte i ich długości dążą do zera. Z zupełności liczb rzeczywistych ich przecięcie zawiera dokładnie jeden punkt x: jest nim wspólna granica lewych i prawych końców. Dla każdego n mamy $x \in I_n$, więc $x \neq x_n$. Lista nie obejmowała całego przedziału. □

Sfera też jest nieprzeliczalna: zawiera półokrąg parametryzowany różnowartościowo przez $\theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta, 0)$ dla $0 < \theta < \pi$. Przeliczalność zbioru trójek indeksów naturalnych wynika z wyliczania ich według sumy indeksów; dla każdej sumy jest tylko skończenie wiele trójek. Dlatego suma przeliczalnej rodziny skończonych zbiorów wykluczonych kątów jest przeliczalna.

7.2 Obrót rozdzielający przeliczalny zbiór

Lemat 7.2. *Dla dowolnego co najwyżej przeliczalnego $D \subseteq S^2$ istnieje obrót $R \in \mathrm{SO}(3)$, dla którego zbiory $D, RD, R^2D, \ldots$ są parami rozłączne.*

Dowód. Jeśli $D = \varnothing$, teza jest oczywista. Niech $D \neq \varnothing$. Wybieramy punkt $u \in S^2$ poza $D \cup (-D)$, co jest możliwe, bo ten ostatni zbiór jest przeliczalny. Żaden punkt D nie leży na osi $\mathbb{R}u$.

Niech $R_u(\theta)$ oznacza obrót wokół tej osi o kąt θ. Można go zdefiniować, wybierając ortonormalną bazę u, v, w o dodatniej orientacji i przyjmując

$$R_u(\theta)(\alpha u + \beta v + \gamma w) = \alpha u + (\beta\cos\theta - \gamma\sin\theta)v + (\beta\sin\theta + \gamma\cos\theta)w.$$

Ze wzorów dodawania kątów wynika $R_u(\theta)^n = R_u(n\theta)$.

Ustalmy $d, e \in D$ i $n \geq 1$. Ponieważ d nie leży na osi, jego składowa w płaszczyźnie $u^\perp$ jest niezerowa. Obracając tę składową wokół osi, otrzymujemy okrąg; każde położenie na nim wyznacza kąt jednoznacznie modulo 2π. Zatem albo nie istnieje obrót wokół tej osi przenoszący d na e, albo istnieje dokładnie jedna klasa kątów α modulo 2π o tej własności.

Równanie $R_u(n\theta)d = e$ sprowadza się w drugim przypadku do $n\theta \equiv \alpha \pmod{2\pi}$. W przedziale $0 < \theta < 2\pi$ ma najwyżej n rozwiązań. Dla każdej trójki (d, e, n) wykluczamy więc skończenie wiele kątów. Trójek jest co najwyżej przeliczalnie wiele. Na mocy lematu 7.1 możemy wybrać θ poza unią wszystkich wykluczonych kątów.

Dla $R = R_u(\theta)$ mamy teraz

$$R^n D \cap D = \varnothing \qquad (n \geq 1). \tag{7.1}$$

Jeśli dla $0 \leq i < j$ istniałby punkt w $R^iD \cap R^jD$, to jego obraz przez R^{-i} należałby do $D \cap R^{j-i}D$, wbrew (7.1). Dostajemy żądaną rozłączność wszystkich poziomów. □

Uwaga 7.3. Nowy obrót R nie musi należeć do G. Ponieważ D jest G-niezmienniczy, żaden element G nie mógłby przenieść niepustego D całkowicie poza D. Od tego miejsca dla równoważności całej sfery dopuszczamy pełną grupę obrotów $\mathrm{SO}(3)$.

Twierdzenie 7.4 (Pełna sfera jest paradoksalna)**.** *Sfera S^2 jest równoważna przez skończony rozkład dwóm swoim etykietowanym kopiom, przy użyciu samych obrotów wokół* 0*. Wystarcza co najwyżej* 16 *części.*

Dowód. Stosujemy lemat 7.2 do zbioru D z (6.1). Niech $L = \bigcup_{n=0}^{\infty} R^n D$. Wszystkie poziomy leżą na sferze, więc lemat 3.6 daje dwuczęściowy rozkład $S^2 \equiv X$. Twierdzenie 6.7 daje $X \equiv 2X$. Przeniesienie paradoksalności z wniosku 3.5 kończy dowód istnienia rozkładu $S^2 \equiv 2S^2$.

Poniżej podajemy dokładne części, aby samo odwołanie do przechodniości nie ukrywało konstrukcji ani oszacowania ich liczby. Niech $E_0 = L$, $E_1 = S^2 \setminus L$, $g_0 = R$, $g_1 = I$. Bijekcja $f : S^2 \to X$ ma na E_i postać g_i. Zbiory $g_0E_0 = L \setminus D$ i $g_1E_1 = S^2 \setminus L$ tworzą partycję X.

Oznaczmy przez $C_j, h_j, \ell(j)$ cztery części, ruchy i etykiety z dowodu twierdzenia 6.7. Dla $i, k \in \{0, 1\}$ i $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ połóżmy

$$H_{ijk} = \{x \in E_i : g_i x \in C_j,\ h_j g_i x \in g_k E_k\}. \tag{7.2}$$

Na tej części działa obrót

$$q_{ijk} = g_k^{-1} h_j g_i, \tag{7.3}$$

z etykietą docelową $\ell(j)$. Dla każdego x indeksy i, j, k są wyznaczone jednoznacznie, w tej kolejności. Zatem części (7.2) tworzą partycję sfery.

Sprawdźmy jeszcze obrazy. Całe odwzorowanie jest złożeniem bijekcji f, czteroczęściowej bijekcji $X \to 2X$ i odwrotnej bijekcji f^{-1} w każdej kopii. Jest zatem bijekcją $S^2 \to 2S^2$. Stąd obrazy kawałków są rozłączne wewnątrz każdej etykiety i pokrywają obie sfery. Indeksów jest $2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$. Każde q_{ijk} jest złożeniem obrotów, a więc nadal jednym obrotem w SO(3). □

8 Od sfery do pełnej kuli

8.1 Przedłużenie kawałków wzdłuż promieni

Niech $B^3_* = B^3 \setminus \{0\}$. Dla $H \subseteq S^2$ definiujemy jego stożek promieniowy w kuli bez środka:

$$\widehat{H} = \{rx : x \in H,\ 0 < r \leq 1\}.$$

Każdy $y \in B^3_*$ ma dokładnie jedno przedstawienie $y = rx$ z $0 < r \leq 1$, $x \in S^2$: mianowicie $r = \|y\|$, $x = y/\|y\|$. Dlatego partycja sfery daje partycję B^3_* przez odpowiednie stożki.

Lemat 8.1 (Obroty komutują z przedłużeniem promieniowym)**.** *Dla $Q \in \mathrm{SO}(3)$ i $H \subseteq S^2$ mamy $Q\widehat{H} = \widehat{QH}$.*

Dowód. Liniowość macierzy daje $Q(rx) = rQx$, a ortogonalność daje $\|Qx\| = 1$. To dowodzi jednej inkluzji. Jeśli ry należy do $\widehat{QH}$, to $y = Qx$ dla pewnego $x \in H$, więc $ry = Q(rx) \in Q\widehat{H}$. Mamy także drugą inkluzję. □

Wniosek 8.2. *$B^3_* \equiv 2B^3_*$ za pomocą co najwyżej 16 kawałków i obrotów.*

Dowód. Bierzemy stożki nad częściami H_{ijk} z (7.2) i stosujemy te same obroty q_{ijk}. Jednoznaczność kierunku i promienia zapewnia rozłączność części wyjściowych, a lemat 8.1 przenosi rozłączność i pokrycie obrazów z każdej sfery na całą kulę bez środka. Nie zmieniamy promienia żadnego punktu podczas tego etapu. □

Uwaga 8.3 (Dlaczego nie dopisać po prostu środka?). Wszystkie obroty wokół 0 ustalają 0. Z jednego takiego punktu nie otrzymamy dwóch punktów oznaczonych różnymi etykietami przez dopisanie go do dwóch części — przestałyby być rozłączne. Środek wymaga osobnego argumentu i ruchu wokół osi nieprzechodzącej przez 0.

8.2 Wchłonięcie środka za pomocą obrotu

W płaszczyźnie $z = 0$ weźmy okrąg

$$\Gamma = \{(1/4, 0, 0) + (1/4)(\cos t, \sin t, 0) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Ma środek $c = (1/4, 0, 0)$ i promień $1/4$. Punkt 0 należy do Γ (dla $t = \pi$). Każdy punkt okręgu ma normę nie większą niż $\|c\| + 1/4 = 1/2$, więc cały okrąg leży wewnątrz B^3.

Niech U będzie obrotem wokół osi z o kąt $\alpha = 2\pi\sqrt{2}$. Określmy ruch sztywny

$$T_0(x) = c + U(x - c) = Ux + (c - Uc). \tag{8.1}$$

Jest to obrót wokół prostej $c + \mathbb{R}(0, 0, 1)$; zachowuje okrąg Γ.

Lemat 8.4. *Punkty $0, T_0(0), T_0^2(0), \ldots$ są parami różne. W konsekwencji $B^3 \equiv B^3_*$ za pomocą dwóch części i ruchów sztywnych zachowujących orientację.*

Dowód. Gdyby $T_0^m(0) = T_0^n(0)$ dla $m > n$, to $T_0^{m-n}(0) = 0$. Punkt 0 leży na okręgu o dodatnim promieniu, więc wraca na swoje miejsce dokładnie wtedy, gdy kąt obrotu jest całkowitą wielokrotnością 2π. Dostajemy $(m - n)\alpha = 2\pi k$, a więc $(m - n)\sqrt{2} = k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$. To sprzeczność z niewymiernością $\sqrt{2}$.

Dla kompletności: gdyby $\sqrt{2} = p/q$ w postaci nieskracalnej, to $p^2 = 2q^2$, więc p byłoby parzyste. Zapis $p = 2r$ dawałby $q^2 = 2r^2$, więc także q byłoby parzyste, wbrew nieskracalności.

Niech $M = \{T_0^n(0) : n \geq 0\}$. Wszystkie te punkty leżą na $\Gamma \subset B^3$. Stosujemy lemat 3.6 dla $D = \{0\}$, $E = B^3$, $T = T_0$. Częściami są M i $B^3 \setminus M$, a ruchami T_0 i identyczność. Ich obrazy to $M \setminus \{0\}$ oraz $B^3 \setminus M$, czyli partycja B^3_*. □

Uwaga 8.5. Nie twierdzimy, że $T_0(B^3) = B^3$. Nie jest to potrzebne. Obracamy wyłącznie kawałek M, który leży na zachowywanym okręgu. Reszta kuli nie jest poruszana. Dowolny ruch nie musi zachowywać całej kuli, tylko poprawnie przenosić przypisany mu kawałek.

8.3 Złożenie wszystkich etapów

Dowód twierdzenia 1.1. Lemat 8.4 i wniosek 8.2 dają $B^3 \equiv B^3_* \equiv 2B^3_* \equiv 2B^3$. Przechodniość została udowodniona przez jawne rozdrobnienie części w lemacie 3.3. Nie używamy więc żadnego nieskończonego składania ruchów.

Podajmy również bezpośredni wzór na końcowe części. Zanumerujmy niepuste części rozkładu sfery jako H_v, ich obroty jako q_v, a etykiety jako $\ell(v) \in \{1, 2\}$, gdzie v przebiega zbiór najwyżej 16 indeksów. Niech $\widehat{H}_v$ oznacza ich stożki promieniowe. Przyjmijmy $J_0 = M$, $J_1 = B^3 \setminus M$, $t_0 = T_0$, $t_1 = \mathrm{id}$. Bijekcja $k : B^3 \to B^3_*$ działa na J_s jako t_s. Zbiory $t_0 J_0$ i $t_1 J_1$ tworzą partycję B^3_*.

Dla $s, t \in \{0, 1\}$ i indeksu v definiujemy

$$P_{svt} = \{x \in J_s : t_s x \in \widehat{H}_v, \quad q_v t_s x \in t_t J_t\}. \tag{8.2}$$

Na tym zbiorze złożenie bijekcji k, bijekcji wyznaczonej przez paradoksalny rozkład B^3_* i odwrotnej bijekcji k^{-1} ma postać jednego ruchu

$$x \longmapsto t_t^{-1} q_v t_s x, \tag{8.3}$$

z etykietą $\ell(v)$. Dla każdego $x \in B^3$ istnieje jedyne s z $x \in J_s$, jedyne v z $t_s x \in \widehat{H}_v$ i jedyne t określające, w której części $t_t J_t$ leży $q_v t_s x$. To dowodzi, że (8.2) jest partycją całej B^3.

Ponieważ każdy etap jest bijekcją między odpowiednimi zbiorami etykietowanymi, obrazy pod ruchami (8.3) tworzą partycję dwóch formalnych kul. Liczba części jest nie większa niż $2 \cdot 16 \cdot 2 = 64$. Nie ma dodatkowego czynnika 2 za etykiety: każdy indeks v ma już jedną, określoną etykietę docelową.

Teraz umieszczamy te kopie w przestrzeni. Dla etykiety 1 dodajemy $v_1 = (-3, 0, 0)$, a dla etykiety 2 dodajemy $v_2 = (3, 0, 0)$. Ostateczny ruch dla części P_{svt} to $f_{svt}(x) = t_t^{-1} q_v t_s x + v_{\ell(v)}$. Każde t_s jest ruchem $x \mapsto Qx + v$ z $Q \in \mathrm{SO}(3)$, a każde q_v obrotem. Odwrotności i złożenia takich ruchów znów mają tę postać: jeśli $f(x) = Qx + v$, $g(x) = Rx + w$, to $g(f(x)) = RQx + (Rv + w)$ oraz $f^{-1}(x) = Q^{-1}x - Q^{-1}v$.

Zatem wszystkie f_{svt} są dozwolonymi ruchami sztywnymi. Ich obrazy wypełniają dokładnie dwie wskazane kule i są parami rozłączne: wewnątrz każdej kuli wynika to z bijekcji, a między kulami z ich rozłącznego położenia. To kończy dowód. □

8.4 Kula o innym środku i promieniu

Wniosek 8.6. *Każdą kulę domkniętą o promieniu $r > 0$ można podzielić na skończenie wiele części, a następnie za pomocą ruchów sztywnych zachowujących orientację złożyć z nich dwie rozłączne kule tego samego promienia.*

Dowód. Dla kuli o środku c użyjmy pomocniczego podobieństwa $S(x) = c + rx$ do zdefiniowania części $S(P_i)$ z dowodu dla kuli jednostkowej. Jeśli ruch jednostkowy miał postać $f_i(x) = Q_i x + v_i$, to $S f_i S^{-1}(y) = Q_i y + (c - Q_i c + r v_i)$. To nadal izometria: liniowa część wynosi Q_i, nie rQ_i. Podobieństwo służy tylko przeniesieniu opisu konstrukcji; rzeczywiste kawałki nowej kuli poruszamy powyższymi izometriami, bez skalowania. □

9 Dlaczego nie przeczy to objętości?

9.1 Miara jest określona tylko na pewnych zbiorach

Miara Lebesgue'a w $\mathbb{R}^3$ przypisuje zbiorom mierzalnym objętość $\lambda(E) \in [0, \infty]$. Do poniższego argumentu potrzebne są tylko jej standardowe własności:

- kule są mierzalne i $0 < \lambda(B^3) < \infty$;
- izometrie zachowują mierzalność i objętość;
- skończona unia rozłącznych zbiorów mierzalnych ma objętość równą sumie ich objętości.

W standardowej normalizacji $\lambda(B^3) = 4\pi/3$, ale konkretna liczba nie jest istotna. Twierdzenie o istnieniu i własnościach miary Lebesgue'a jest tu wyłącznie tłem interpretacyjnym; główny dowód w poprzednich sekcjach nie korzystał z teorii miary.

Stwierdzenie 9.1 (Co najmniej jeden kawałek jest niemierzalny)**.** *W rozkładzie z twierdzenia 1.1 co najmniej jeden kawałek jest niemierzalny w sensie Lebesgue'a.*

Dowód. Załóżmy przeciwnie, że wszystkie P_i są mierzalne. Ponieważ tworzą partycję B^3, mamy $\lambda(B^3) = \sum_{i=1}^{N} \lambda(P_i)$. Obrazy $f_i(P_i)$ też są mierzalne, mają te same objętości i tworzą partycję dwóch rozłącznych kul przystających do B^3. Zatem

$$2\lambda(B^3) = \sum_{i=1}^{N} \lambda(f_i(P_i)) = \sum_{i=1}^{N} \lambda(P_i) = \lambda(B^3).$$

Jest to niemożliwe dla dodatniej skończonej liczby $\lambda(B^3)$. Sprzeczne było założenie o mierzalności wszystkich części, a nie twierdzenie Banacha–Tarskiego. □

Uwaga 9.2. Sformułowanie „objętość wzrosła dwukrotnie podczas obracania kawałków” jest mylące. Co najmniej jednemu kawałkowi nie można przypisać objętości Lebesgue'a, więc nie można zsumować objętości wszystkich części. Nie mamy prawa zastosować addytywności miary do dowolnych podzbiorów tylko dlatego, że ich unia jest kulą.

9.2 Co jest, a co nie jest konstruktywne?

Generatory obrotów są podane jawnymi macierzami. Cztery zbiory słów są zdefiniowane jawnie. Wzory na składanie kawałków też są jawne. Jednak zbiór reprezentantów T został wybrany aksjomatem wyboru. Nie otrzymaliśmy algorytmu, który dla dowolnego punktu kuli rozstrzyga, do którego kawałka należy.

Nie twierdzimy też, że twierdzenie Banacha–Tarskiego jest równoważne pełnemu aksjomatowi wyboru ani że każdy fragment użytego wyboru jest logicznie niezbędny. Wykazaliśmy konkretnie: w ZFC istnieją zbiory i ruchy o opisanych własnościach. Taka jest treść tego dowodu.

Kula jako model ciągłego zbioru punktów nie jest fizycznym przedmiotem zbudowanym z atomów. Rozkład nie opisuje procedury możliwej do wykonania nożem ani technologii powielania materii. Kawałki nie muszą mieć wnętrza ani regularnego brzegu.

10 Kontrola dowodu i najczęstsze pułapki

10.1 Łańcuch zależności

Każda strzałka w poniższym schemacie została w tekście uzasadniona:

$$\text{słowa zredukowane} \xrightarrow{\text{tw. 2.9, stw. 2.11}} F_2 \xrightarrow{\text{tw. 4.2}} 2F_2,$$

$$F_2 \xrightarrow{\text{tw. 5.5}} G \le \mathrm{SO}(3) \xrightarrow{\text{lem. 6.3, wybór } T} X,$$

$$X \xrightarrow{\text{tw. 6.7}} 2X, \qquad S^2 \xrightarrow{\text{lem. 3.6, 7.2}} X,$$

$$S^2 \xrightarrow{\text{tw. 7.4}} 2S^2,$$

$$\text{stożki (lem. 8.1):} \qquad B^3_* \equiv 2B^3_*,$$

$$B^3 \xrightarrow{\text{lem. 8.4}} B^3_* \equiv 2B^3_* \equiv 2B^3 \xrightarrow{\text{przesunięcia}} \text{dwie rozłączne kule w } \mathbb{R}^3.$$

10.2 Dziesięć miejsc wymagających szczególnej uwagi

1. **Redukcja nie polega na przestawianiu liter.** Usuwamy tylko sąsiadujące odwrotności. Jednoznaczność wyniku została udowodniona, a nie przyjęta intuicyjnie.
2. **Słowo puste musi należeć do partycji.** Włącza je zbiór P w konstrukcji (4.3).
3. **Dwa niekomutujące obroty nie wystarczają.** Rachunek modulo 3 wyklucza wszystkie niepuste słowa zredukowane.
4. **Nie redukujemy ułamka** $1/3$ **modulo** 3**.** Redukujemy całkowite macierze liczników N_s.
5. **Grupa wolna to nie działanie swobodne.** Po usunięciu punktów ze zbioru D wszystkie pozostałe stabilizatory są równe $\{e\}$.
6. **Wybór reprezentantów nie jest automatyczny.** Wskazaliśmy użycie aksjomatu wyboru przed lematem 6.5.
7. **Przeliczalne wyjątki nie znikają same.** Wchłania je dwuczęściowy rozkład oparty na obrocie spoza G.

8. **Kawałek złożony z nieskończenie wielu poziomów to nadal jeden kawałek.** Na całej unii poziomów L działa jeden obrót R.

9. **Środek kuli wymaga osobnego ruchu.** Obroty wokół 0 nigdy go nie przemieszczą; użyliśmy obrotu wokół osi przesuniętej w (8.1).

10. **Formalne kopie nie są jeszcze dwiema kulami w przestrzeni.** Dopiero końcowe przesunięcia o v_1, v_2 realizują etykiety jako rzeczywiste rozłączne położenia.

10.3 Krótkie zadania kontrolne z rozwiązaniami

1. **Do której części należy a^5?** Należy do P, więc do A_2, a nie do A_1. Po ruchu a daje a^6 w pierwszej kopii. Źródłem e w tej kopii jest $\bar{a}$.

2. **Dlaczego z $hgt = hku$ wynika $g = k$ i $t = u$?** Najpierw skracamy działanie h, otrzymując $gt = ku$. Punkty t, u reprezentują tę samą orbitę, zatem są równe. Wtedy $(k^{-1}g)t = t$ i swoboda działania daje $k^{-1}g = e$. Bez swobody ostatni wniosek nie byłby uzasadniony.

3. **Gdzie w rachunku macierzowym wykrywa się redukcję?** Dokładnie w zerowych wpisach tabeli (5.5). Sąsiednia para ss^{-1} daje czynnik $w_s^T w_{s^{-1}} = 0$. Brak takich par gwarantuje, że wszystkie czynniki skalarne w (5.7) są niezerowe.

4. **Dlaczego nie wystarczy policzyć samej liczby punktów?** Sama bijekcja $B^3 \to 2B^3$ nie musi być realizowana skończonym rozkładem, w którym każdy kawałek przenosimy ruchem sztywnym. W twierdzeniu istotne są jednocześnie: skończona liczba kawałków, rozłączność i ograniczenie do izometrii.

5. **Czy możemy powtórzyć podwojenie?** Tak. Po pierwszym podwojeniu stosujemy ten sam rozkład do każdej kuli osobno i otrzymujemy cztery kopie, potem osiem itd. Każda ustalona liczba powtórzeń nadal daje skończony rozkład, bo mnożymy tylko skończone liczby kawałków. Nie twierdzimy, że graniczna procedura z nieskończenie wielu powtórzeń jest skończonym rozkładem w sensie definicji 3.2.

Uwagi bibliograficzne

Przedstawiony tekst jest samodzielnym opracowaniem klasycznego argumentu: grupa wolna, swobodne działanie na części sfery, wchłanianie przeliczalnych wyjątków i przedłużenie promieniowe. Nie zakłada ogólniejszej postaci twierdzenia o równoważności dowolnych ograniczonych zbiorów o niepustym wnętrzu. Udowodniona tutaj wersja to podwojenie kuli domkniętej. Szerszy kontekst i inne warianty rozkładów omawiają:

- Stefan Banach, Alfred Tarski, *Sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes*, Fundamenta Mathematicae **6** (1924), 244–277, DOI: 10.4064/fm-6-1-244-277.

- Stan Wagon, *The Banach–Tarski Paradox*, Cambridge University Press, 1985, katalog wydawcy.