# Geometria i topologia różniczkowa

## Tom I

## Podstawy

**Mapa tomów.** Tom I zaczyna się w Rozdziale 1 (podstawy geometrii, algebry i topologii). Tom II zaczyna się w Rozdziale 11 (geometria globalna i metody topologii różniczkowej). Tom III zaczyna się w Rozdziale 23 (kobordyzmy, chirurgia i niskie wymiary). Odsyłacze do pozostałych tomów prowadzą do odpowiednich plików PDF.

# Spis treści


**I Podstawy geometrii, algebry i topologii** **3**

**1 Rozmaitości różniczkowe** **4**
1.1 Rozmaitości topologiczne . . . 4
1.2 Atlasy i rozmaitości gładkie . . . 7
1.3 Rozmaitości z brzegiem . . . 11
1.4 Rozmaitości zespolone . . . 12
1.5 Odwzorowania gładkie między rozmaitościami . . . 14
1.6 Przykłady rozmaitości . . . 16
1.7 Przestrzeń styczna . . . 22
1.8 Przestrzeń kostyczna . . . 33
1.9 Wiązki wektorowe . . . 35
1.10 Funkcje przejścia i operacje na wiązkach . . . 44
1.11 Różniczka, immersje, submersje i zanurzenia . . . 47
1.12 Podrozmaitości . . . 56

**2 Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego** **61**
2.1 Pola wektorowe i derywacje globalne . . . 61
2.2 Nawias Liego: mierzenie nieprzemienności . . . 66
2.3 Krzywe całkowe i równania różniczkowe na rozmaitości . . . 67
2.4 Przepływ lokalny, maksymalny i zupełny . . . 70
2.5 Geometria przepływu: prostowanie, niezmienniki, komutowanie . . . 73
2.6 Pochodna Liego: porównywanie danych w różnych punktach . . . 74
2.7 Pola zależne od czasu i izotopie . . . 77

**3 Algebra tensorowa i zewnętrzna** **80**
3.1 Iloczyn tensorowy: definicja, istnienie i jednoznaczność . . . 80
3.2 Baza, wymiar i wiele czynników . . . 82
3.3 Tensory mieszane i operacje na nich . . . 83
3.4 Algebra tensorowa i symetryzacja . . . 86
3.5 Algebra zewnętrzna i własność uniwersalna . . . 88
3.6 Baza i wymiar potęg zewnętrznych . . . 90
3.7 Potęgi zewnętrzne i wyznacznik . . . 91
3.8 Tensory w punkcie rozmaitości . . . 94
3.9 Różniczkowanie pól tensorowych: pochodna Liego . . . 96

**4 Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory** **99**
4.1 Grassmannian jako przestrzeń podprzestrzeni . . . 99
4.2 Przestrzeń styczna i wiązka tautologiczna . . . 101
4.3 Orientacja, współrzędne Plückera i odwzorowanie Gaussa . . . 102
4.4 Algebra Clifforda: iloczyn i dowód wymiaru . . . 104
4.5 Od odbić do grupy Spin . . . 106
4.6 Spinory: moduły algebry Clifforda . . . 110
4.7 Struktury spinowe i wiązki spinorów . . . 113

**5 Podstawy algebry abstrakcyjnej** **116**
5.1 Grupy, słowa i prezentacje . . . 116
5.2 Pierścienie, ideały i ilorazy . . . 122
5.3 Moduły, homomorfizmy i ilorazy . . . 122
5.4 Iloczyn tensorowy modułów . . . 126
5.5 Ranga modułu i ciało ułamków . . . 128

**6 Algebra homologiczna: kompleksy i (ko)homologie** **131**
6.1 Ciągi modułów i dokładność . . . 131
6.2 Kompleksy łańcuchowe i homologia algebraiczna . . . 132
6.3 Skąd bierze się długi ciąg dokładny homologii? . . . 134
6.4 Kohomologia algebraiczna i jej długi ciąg . . . 135
6.5 Homotopia łańcuchowa i uproszczenia kompleksów . . . 138

6.6 Ilorazy, ciągi względne i filtracje . . . 139
6.7 Suma podkompleksów i ciąg Mayera–Vietorisa . . . 141
6.8 Współczynniki, torsja i charakterystyka Eulera . . . 142
6.9 Porównywanie długich ciągów . . . 145

**7 Homotopia, nakrycia i komórkowe modele przestrzeni 146**
7.1 Homotopie, drogi i grupa podstawowa . . . 146
7.2 Nakrycia: lokalnie wiele kopii jednej przestrzeni . . . 148
7.3 Twierdzenie van Kampena i pierwsze obliczenia . . . 152
7.4 Sympleksy i triangulacje . . . 153
7.5 Grafy i drzewa . . . 155
7.6 CW-kompleksy i dołączanie komórek . . . 156

**8 Homologia przestrzeni 160**
8.1 Łańcuchy symplicjalne: orientacja i brzeg . . . 160
8.2 Łańcuchy singularne i niezmienniczość homotopijna . . . 162
8.3 Pary przestrzeni i homologia zredukowana . . . 163
8.4 Podział barycentryczny, wycinanie i sklejanie . . . 164
8.5 Od triangulacji do homologii przestrzeni . . . 167
8.6 Homologia komórkowa . . . 169
8.7 Odwzorowania dołączające i konkretne obliczenia . . . 170
8.8 Lokalna homologia i dalsza droga . . . 173

**9 Wyższe grupy homotopii i związek z homologią 174**
9.1 Od pętli do odwzorowań sfer . . . 174
9.2 Grupy względne i długi ciąg homotopii . . . 176
9.3 Homotopie na komórkach CW . . . 177
9.4 Pierwsze odwzorowanie Hurewicza: od pętli do cykli . . . 180
9.5 Twierdzenie Whiteheada . . . 181
9.6 Odwzorowanie Hurewicza i pierwszy niezerowy wymiar . . . 183
9.7 Obliczenia i ograniczenia twierdzeń . . . 187
Dalsza droga . . . 188

**10 Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rhama 189**
10.1 Czym jest forma różniczkowa? . . . 189
10.2 Iloczyn zewnętrzny, cofnięcie i różniczka . . . 190
10.3 Lokalne istnienie funkcji pierwotnej . . . 192
10.4 Podział jedności . . . 193
10.5 Orientowalność i orientacje indukowane . . . 193
10.6 Całkowanie form na rozmaitości . . . 196
10.7 Twierdzenie Stokesa . . . 197
10.8 Kohomologia de Rhama i ciąg Mayera–Vietorisa . . . 200
10.9 Dlaczego formy obliczają kohomologię przestrzeni? . . . 202
10.10Porównanie homologii, kohomologii de Rhama i homotopii . . . 206

**Indeks pojęć 210**

# Cześć I

# Podstawy geometrii, algebry i topologii

# Rozdział 1

# Rozmaitości różniczkowe

**Jak czytać skrypt.** Wystarczą podstawy algebry liniowej, rachunku różniczkowego wielu zmiennych i topologii. Każdy nowy obiekt najpierw opisujemy intuicyjnie, potem definiujemy i używamy na przykładach. W dowodach rozpisujemy kroki specyficzne dla rozmaitości; gdy potrzebne jest duże twierdzenie z analizy lub topologii (np. twierdzenie o funkcji odwrotnej albo niezmienniczość obszaru), wskazujemy je wprost.

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do teorii rozmaitości gładkich — podstawowego obiektu geometrii i topologii różniczkowej. Zaczynamy od pojęcia rozmaitości topologicznej, następnie wprowadzamy strukturę różniczkową za pomocą atlasów, i budujemy krok po kroku aparat niezbędny do uprawiania analizy na rozmaitościach: przestrzeń styczną i kostyczną, wiązki wektorowe oraz różniczkowanie odwzorowań między rozmaitościami wraz z klasyfikacją ich lokalnego zachowania (immersje, submersje, zanurzenia) i teorią podrozmaitości, na której ten rozdział się kończy. Zbudowany tu aparat stanowi fundament, na którym w kolejnych rozdziałach nadbudujemy dalszą teorię geometrii i topologii różniczkowej.

## 1.1 Rozmaitości topologiczne

Rozmaitość topologiczna to przestrzeń topologiczna, która lokalnie „wygląda" jak przestrzeń euklidesowa $\mathbb{R}^n$. Precyzujemy to poniżej.

**Definicja 1.1.1.** Przestrzeń topologiczna $M$ jest *lokalnie euklidesowa wymiaru* $n$, jeżeli każdy punkt $p \in M$ posiada otoczenie otwarte $U$ homeomorficzne z otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^n$.

**Definicja 1.1.2.** *Rozmaitością topologiczną* wymiaru $n$ nazywamy przestrzeń topologiczną $M$, która:

(i) jest przestrzenią Hausdorffa,

(ii) spełnia drugi aksjomat przeliczalności (posiada przeliczalną bazę topologii),

(iii) jest lokalnie euklidesowa wymiaru $n$.

Przyjmujemy $n \geq 0$. Jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, rozmaitości rozważamy bez brzegu. Rozmaitości z brzegiem wprowadzimy osobno w Sekcji 1.3; ta domyślna konwencja obowiązuje także po ich zdefiniowaniu. Przypomnijmy znaczenie dwóch warunków z definicji. *Hausdorffa* znaczy, że dla dowolnych różnych punktów $p, q$ można znaleźć rozłączne otwarte otoczenia $U \ni p$ i $V \ni q$. *Przeliczalna baza topologii* to rodzina $B_1, B_2, \ldots$ zbiorów otwartych taka, że każdy zbiór otwarty jest sumą pewnych $B_i$. Lokalna euklidesowość dotyczy *małego otoczenia każdego punktu*; nie twierdzi, że całą przestrzeń można opisać jedną mapą do $\mathbb{R}^n$.

Warunki (i) i (ii) mogą wydawać się techniczne, jednak są istotne i nie wynikają automatycznie z lokalnej euklidesowości — poniżej pokazujemy stosowne kontrprzykłady.

*Uwaga* 1.1.3 (Niezmienniczość wymiaru). Wymiar $n$ w powyższej definicji jest wyznaczony jednoznacznie przez $M$: jeśli niepusty zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}^n$ jest homeomorficzny ze zbiorem otwartym $V \subseteq \mathbb{R}^m$, to $n = m$. Jest to *niezmienniczość wymiaru*, będąca konsekwencją *twierdzenia Brouwera o niezmienniczości obszaru*: ciągła injekcja z otwartego podzbioru $\mathbb{R}^d$ do $\mathbb{R}^d$ ma otwarty obraz. Samo twierdzenie Brouwera przyjmujemy bez dowodu; wymaga narzędzi topologii algebraicznej. Wyprowadźmy jednak potrzebny wniosek. Gdyby $n < m$ i $h : U \to V$ było homeomorfizmem, to złożenie $V \xrightarrow{h^{-1}} U \hookrightarrow \mathbb{R}^m$, gdzie ostatnie odwzorowanie dopisuje $m - n$ zer, byłoby ciągłą injekcją. Jej obraz musiałby być otwarty w $\mathbb{R}^m$, lecz leży w podprzestrzeni $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ o pustym wnętrzu: sprzeczność. Przypadek $m < n$ wykluczamy, zamieniając role $U, V$. Wymiar jest więc jednoznaczny dla niepustej rozmaitości. Pusty zbiór dopuszczamy jako rozmaitość dowolnego ustalonego wymiaru.

**Definicja 1.1.4** (Nasycenie zbioru)**.** Niech $\sim$ będzie relacją równoważności na zbiorze $X$, a $\pi\colon X \to X/\!\sim$ rzutowaniem na zbiór klas. *Nasyceniem* zbioru $A \subseteq X$ względem tej relacji nazywamy

$$\mathrm{Sat}_\sim(A) := \pi^{-1}(\pi(A)) = \bigcup_{x \in A} [x].$$

Zbiór $A$ jest *nasycony*, jeśli $\mathrm{Sat}_\sim(A) = A$, czyli razem z każdym $x \in A$ zawiera całą jego klasę $[x]$. Równoważnie, $A = \pi^{-1}(B)$ dla pewnego $B \subseteq X/\!\sim$. Nasycenie jest najmniejszym zbiorem nasyconym zawierającym $A$.

Ta sama definicja działa dla dowolnej surjekcji $q\colon X \to Y$: nasycenie względem jej włókien to $q^{-1}(q(A))$. Dla przykładu w $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, gdzie $x \sim y$ oznacza $x - y \in \mathbb{Z}$, nasycenie $A = (0, \frac{1}{2})$ jest sumą $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (k, k + \frac{1}{2})$.

**Definicja 1.1.5** (Topologia ilorazowa)**.** Niech $X$ będzie przestrzenią topologiczną, $\sim$ relacją równoważności na $X$, a $\pi\colon X \to X/\!\sim$ rzutowaniem $x \mapsto [x]$. *Topologia ilorazowa* na zbiorze klas $X/\!\sim$ jest zadana warunkiem

$$V \subseteq X/\!\sim \text{ jest otwarty} \quad \Longleftrightarrow \quad \pi^{-1}(V) \subseteq X \text{ jest otwarty.}$$

Przeciwobraz dowolnego $V \subseteq X/\!\sim$ jest automatycznie nasycony w sensie Definicji 1.1.4. Zatem otwarte zbiory ilorazu odpowiadają dokładnie otwartym i nasyconym podzbiorom $X$. Rzutowanie $\pi$ jest ciągłe i surjektywne.

Intuicyjnie sklejone punkty stają się jednym punktem ilorazu. Dlatego przy sprawdzaniu otwartości musimy uwzględnić *wszystkie* punkty, które w ilorazie zostają utożsamione: temu służy nasycenie. Sam obraz zbioru otwartego $A \subseteq X$ nie musi być otwarty w ilorazie, ponieważ $\pi^{-1}(\pi(A))$ może zawierać dodatkowe punkty spoza $A$ i nie być zbiorem otwartym. Na przykład, jeśli w $\mathbb{R}$ skleimy tylko 0 z 1, to dla $A = (-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ nasycenie ma postać $A \cup \{1\}$, która nie jest otwarta; $\pi(A)$ też nie jest otwarty w ilorazie.

W szczególności dla dowolnego $A \subseteq X$ otrzymujemy

$$\pi(A) \text{ jest otwarty w } X/\!\sim \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Sat}_\sim(A) \text{ jest otwarty w } X.$$

To pozwala sprawdzać otwartość zbiorów po sklejeniu. Warunek z definicji rzeczywiście wyznacza topologię: przeciwobraz zachowuje sumy dowolnych rodzin oraz skończone przecięcia. Jest to najbogatsza topologia na $X/\!\sim$, dla której $\pi$ jest ciągłe. Ma też użyteczną własność: dla dowolnej przestrzeni topologicznej $Z$ odwzorowanie $g\colon X/\!\sim \to Z$ jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy $g \circ \pi\colon X \to Z$ jest ciągłe. Istotnie, dla każdego otwartego $W \subseteq Z$ zachodzi $(g \circ \pi)^{-1}(W) = \pi^{-1}(g^{-1}(W))$, więc zastosowanie definicji do $g^{-1}(W)$ daje obie implikacje. Będziemy z tej topologii korzystać przy sklejaniu przestrzeni oraz przy przestrzeniach rzutowych.

**Przykład 1.1.6** (Prosta z podwojonym początkiem)**.** Pokażemy, że warunku Hausdorffa nie można pominąć w definicji rozmaitości topologicznej. Istnieją bowiem przestrzenie, które są lokalnie euklidesowe i spełniają drugi aksjomat przeliczalności, ale nie są przestrzeniami Hausdorffa.

Rozważmy sumę rozłączną dwóch kopii prostej rzeczywistej $X = (\mathbb{R} \times \{0\}) \sqcup (\mathbb{R} \times \{1\})$. Punkty pierwszej kopii będziemy oznaczać przez $(x, 0)$, a drugiej przez $(x, 1)$.

Na $X$ wprowadzamy relację równoważności $\sim$, która utożsamia odpowiadające sobie punkty obu prostych z wyjątkiem zera. Definiujemy ją przez $(x, i) \sim (y, j) \iff x = y$ oraz $(i = j$ lub $x \neq 0)$. Innymi słowy, dla każdego $x \neq 0$ zachodzi $(x, 0) \sim (x, 1)$, natomiast punkty $(0, 0)$ oraz $(0, 1)$ nie są równoważne.

Przestrzeń ilorazową oznaczamy przez $M = X/\sim$, a przez $\pi\colon X \to M$ naturalną projekcję ilorazową. Dla $x \neq 0$ klasa równoważności ma postać $[x] = \{(x, 0), (x, 1)\}$. Ponadto $[(0, 0)] = \{(0, 0)\}$ oraz $[(0, 1)] = \{(0, 1)\}$. Oznaczmy $0_a = [(0, 0)]$ oraz $0_b = [(0, 1)]$. Są to dwa różne punkty przestrzeni $M$.

Można więc intuicyjnie myśleć o $M$ jako o zwykłej prostej rzeczywistej, w której punkt 0 został zastąpiony przez dwa różne punkty $0_a$ i $0_b$. Poza zerem obie kopie prostej zostały całkowicie sklejone.

Opiszmy dokładniej otoczenia punktów $0_a$ i $0_b$. Dla każdego otwartego przedziału $I \subseteq \mathbb{R}$ zawierającego 0 definiujemy $U_a(I) = \{0_a\} \cup \{[x] : x \in I,\ x \neq 0\}$ oraz $U_b(I) = \{0_b\} \cup \{[x] : x \in I,\ x \neq 0\}$. Oba zbiory zawierają te same punkty odpowiadające niezerowym liczbom rzeczywistym z $I$, ale różnią się punktem nad zerem: $0_a \in U_a(I)$ i $0_b \notin U_a(I)$, natomiast $0_b \in U_b(I)$ i $0_a \notin U_b(I)$.

Sprawdźmy, że zbiory te są otwarte w topologii ilorazowej. Z definicji zbiór $U \subseteq M$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy $\pi^{-1}(U)$ jest otwarty w $X$. Dla $U_a(I)$ mamy $\pi^{-1}(U_a(I)) = (I \times \{0\}) \cup ((I \setminus \{0\}) \times \{1\})$. Pierwszy składnik jest otwarty w pierwszej kopii $\mathbb{R}$, a drugi w drugiej kopii, ponieważ $I \setminus \{0\}$ jest otwarty w $\mathbb{R}$. Zatem $\pi^{-1}(U_a(I))$ jest otwarty w sumie rozłącznej $X$, a więc $U_a(I)$ jest otwarty w $M$. Analogicznie $\pi^{-1}(U_b(I)) = ((I \setminus \{0\}) \times \{0\}) \cup (I \times \{1\})$, więc $U_b(I)$ również jest otwarty.

Zauważmy teraz, że $U_a = M \setminus \{0_b\}$ oraz $U_b = M \setminus \{0_a\}$ są otwarte i każdy z tych zbiorów jest homeomorficzny z $\mathbb{R}$. Rzeczywiście, definiujemy $\varphi_a\colon U_a \to \mathbb{R}$ przez $\varphi_a(0_a) = 0$ oraz $\varphi_a([x]) = x$ dla $x \neq 0$. Ciągła funkcja $(x, i) \mapsto x$ jest stała na klasach równoważności, więc z własności ilorazu indukuje ciągłą funkcję na $M$; jej ograniczeniem jest $\varphi_a$. Odwrotność $\varphi_a^{-1}$ ma postać $x \mapsto \pi(x, 0)$ i również jest ciągła. Analogicznie, używając $x \mapsto \pi(x, 1)$, otrzymujemy homeomorfizm $\varphi_b\colon U_b \to \mathbb{R}$.

A zatem każdy punkt przestrzeni $M$ posiada otwarte otoczenie homeomorficzne z otwartym podzbiorem $\mathbb{R}$. Przestrzeń $M$ jest więc lokalnie euklidesowa wymiaru 1.

Ponadto drugi aksjomat przeliczalności jest spełniony. Możemy wziąć przeliczalną bazę przedziałów o końcach wymiernych na $\mathbb{R}$, a następnie przenieść ją przez homeomorfizmy $\varphi_a$ i $\varphi_b$ na $U_a$ i $U_b$. Suma dwóch przeliczalnych rodzin jest nadal przeliczalna, więc otrzymujemy przeliczalną bazę topologii na całym $M$.

Pozostaje sprawdzić własność Hausdorffa. Rozważmy dwa różne punkty $0_a \neq 0_b$. Niech $U$ będzie dowolnym otwartym otoczeniem $0_a$, a $V$ dowolnym otwartym otoczeniem $0_b$. Ponieważ $U$ jest otoczeniem $0_a$, istnieje $\varepsilon > 0$ takie, że $U_a((-\varepsilon, \varepsilon)) \subseteq U$. Podobnie istnieje $\delta > 0$ takie, że $U_b((-\delta, \delta)) \subseteq V$.

Wybierzmy $x \neq 0$ takie, że $|x| < \min\{\varepsilon, \delta\}$. Wtedy $[x] \in U_a((-\varepsilon, \varepsilon))$ oraz $[x] \in U_b((-\delta, \delta))$, a więc $[x] \in U \cap V$. Zatem $U \cap V \neq \varnothing$.

Nie istnieją więc rozłączne otoczenia punktów $0_a$ i $0_b$. Przestrzeń $M$ nie jest Hausdorffa.

Podsumowując, $M$ jest lokalnie euklidesowa wymiaru 1 i spełnia drugi aksjomat przeliczalności, ale nie jest przestrzenią Hausdorffa. Pokazuje to, że warunek Hausdorffa w definicji rozmaitości

topologicznej nie wynika z pozostałych założeń i musi być wymagany osobno.

*Uwaga* 1.1.7. Symetrycznie, istnieją przestrzenie Hausdorffa i lokalnie euklidesowe, które nie spełniają drugiego aksjomatu przeliczalności. Prostym przykładem jest suma rozłączna nieprzeliczalnie wielu kopii $\mathbb{R}$: każda kopia jest otwarta, co daje lokalną euklidesowość, a różne kopie rozdzielają punkty. Gdyby istniała przeliczalna baza, w każdej kopii można byłoby wybrać niepusty element bazy zawarty w tej kopii. Różne kopie wymagałyby różnych elementów, co jest niemożliwe. Klasycznym spójnym przykładem jest tzw. *długa prosta* (ang. *long line*), skonstruowana przy użyciu pierwszej nieprzeliczalnej liczby porządkowej. Nie przytaczamy tu tej konstrukcji; wspominamy o niej jedynie, aby podkreślić, że oba warunki (i) oraz (ii) są od siebie niezależne i żadnego z nich nie można pominąć.

**Fakt 1.1.8.** *Każda rozmaitość topologiczna jest przestrzenią parazwartą i metryzowalną.*

*Dowód.* Każdy punkt ma otoczenie, którego domknięcie jest zwarte: w mapie wybieramy kulę domkniętą zawartą w jej obrazie i przenosimy ją do $M$. Jej obraz jest zwarty, a więc domknięty w przestrzeni Hausdorffa $M$. Korzystamy teraz z trzech standardowych twierdzeń topologii ogólnej: lokalnie zwarta przestrzeń Hausdorffa jest regularna; regularna przestrzeń Hausdorffa z przeliczalną bazą jest metryzowalna (twierdzenie Urysohna); każda przestrzeń metryczna jest parazwarta. To daje obie tezy. □

Parazwartość oznacza, że każde pokrycie otwarte ma lokalnie skończone otwarte pokrycie wpisane. Na rozmaitości gładkiej pozwala ona, w połączeniu z lokalnymi funkcjami odcinającymi, konstruować gładkie rozkłady jedności. Sama lokalna funkcja odcinająca z Sekcji 1.7 nie wymaga jeszcze tego globalnego narzędzia.


## 1.2 Atlasy i rozmaitości gładkie

Struktura rozmaitości topologicznej pozwala mówić o ciągłości, ale nie wystarcza, by mówić o różniczkowalności — pojęcie to nie jest niezmiennicze względem dowolnych homeomorfizmów. Aby zdefiniować rozmaitość *gładką*, musimy wyposażyć $M$ w dodatkową strukturę: atlas map, których wzajemne przejścia są dyfeomorfizmami.

**Definicja 1.2.1.** Niech $M$ będzie rozmaitością topologiczną wymiaru $n$. *Mapą* na $M$ nazywamy parę $(U, \varphi)$, gdzie $U \subseteq M$ jest zbiorem otwartym, a $\varphi\colon U \to \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ jest homeomorfizmem na otwarty podzbiór $\mathbb{R}^n$.

**Ustalenie terminologii.** W całym skrypcie *mapa* oznacza angielskie *chart*, czyli lokalny układ współrzędnych $(U, \varphi)$. Angielskie *map* tłumaczymy jako *odwzorowanie*. Sama funkcja współrzędnych $\varphi$ jest więc odwzorowaniem wchodzącym w skład mapy.

*Uwaga* 1.2.2. Mapa jest lokalnym opisem rozmaitości: jej dziedziną jest otwarty zbiór $U \subset M$, a obrazem otwarty zbiór $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$. Dzięki temu lokalne rachunki na $M$ możemy wykonywać w zwykłych współrzędnych euklidesowych.





Rysunek 1.1: Mapa $(U, \varphi)$ przenosi otwarty fragment $U \subset M$ na obszar $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$; punktowi $p$ przyporządkowuje współrzędne $\varphi(p)$.

**Definicja 1.2.3.** Dwie mapy $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ na $M$ są *zgodne* ($C^\infty$-zgodne), jeżeli albo $U \cap V = \emptyset$, albo odwzorowania przejścia

$$\psi \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U \cap V) \to \psi(U \cap V), \qquad \varphi \circ \psi^{-1} \colon \psi(U \cap V) \to \varphi(U \cap V)$$

są klasy $C^\infty$ (są to wtedy automatycznie odwzorowania wzajemnie odwrotne między otwartymi podzbiorami $\mathbb{R}^n$, a więc dyfeomorfizmy).

Na Rysunku 1.2 pokazano dwie zgodne mapy i współrzędne punktu leżącego w ich części wspólnej. Odwzorowanie przejścia działa *między obrazami tej części wspólnej*, a nie między całymi $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ i $\varphi_\beta(U_\beta)$, jeśli dziedziny map się różnią.




Rysunek 1.2: Dwie nakładające się mapy. Przerywane obszary oznaczają obrazy części wspólnej. Punkt $p$ ma dwa zapisy współrzędnych, a przejście $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ prowadzi z $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ do $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$. W atlasie pozostałe mapy pokrywają ewentualną resztę $M$.

**Definicja 1.2.4.** *Atlasem* (gładkim, $C^\infty$) na rozmaitości topologicznej $M$ nazywamy rodzinę map $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ taką, że:

(i) $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = M$,

(ii) mapy $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ oraz $(U_\beta, \varphi_\beta)$ są zgodne dla wszystkich $\alpha, \beta \in I$.

Chcemy teraz porównywać różne atlasy na tej samej przestrzeni topologicznej $M$ — dwa atlasy powinny wyznaczać tę samą strukturę gładką dokładnie wtedy, gdy razem tworzą (większy) atlas.

**Definicja 1.2.5.** Dwa atlasy $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ na $M$ są *równoważne*, $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$, jeżeli ich suma $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ jest atlasem, tzn. każda mapa z $\mathcal{A}_1$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}_2$.

Poniższy lemat techniczny jest kluczowym narzędziem rachunkowym tego paragrafu; wykorzystamy go dwukrotnie: do dowodu, że $\sim$ jest relacją równoważności, oraz do dowodu istnienia i jednoznaczności atlasu maksymalnego.

**Lemat 1.2.6.** *Niech $(U,\varphi)$, $(W,\eta)$, $(V,\psi)$ będą mapami na $M$ takimi, że $(U,\varphi)$ jest zgodna z $(W,\eta)$, a $(W,\eta)$ jest zgodna z $(V,\psi)$. Wówczas dla dowolnego punktu $p \in U\cap V\cap W$, odwzorowania $\psi\circ\varphi^{-1}$ i $\varphi\circ\psi^{-1}$ są klasy $C^\infty$ w (odpowiednich) otoczeniach punktów $\varphi(p)$ i $\psi(p)$.*

*Dowód.* Na otoczeniu $\varphi(U\cap V\cap W)$ punktu $\varphi(p)$ mamy równość $\psi\circ\varphi^{-1} = (\psi\circ\eta^{-1})\circ(\eta\circ\varphi^{-1})$; odwzorowanie $\eta\circ\varphi^{-1}$ jest gładkie na $\varphi(U\cap W)$ (zgodność $(U,\varphi)$ z $(W,\eta)$), a $\psi\circ\eta^{-1}$ jest gładkie na $\eta(W\cap V)$ (zgodność $(W,\eta)$ z $(V,\psi)$); złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie, więc $\psi\circ\varphi^{-1}$ jest gładkie w otoczeniu $\varphi(p)$. Analogicznie, na otoczeniu $\psi(p)$: $\varphi\circ\psi^{-1} = (\varphi\circ\eta^{-1})\circ(\eta\circ\psi^{-1})$ jest złożeniem odwzorowań gładkich ($\varphi\circ\eta^{-1}$ i $\eta\circ\psi^{-1}$ gładkie, z tych samych dwóch założeń zgodności), a więc gładkie. □

**Stwierdzenie 1.2.7.** *Równoważność atlasów jest relacją równoważności na zbiorze wszystkich atlasów na $M$.*

*Dowód.* Zwrotność i symetria są oczywiste z definicji. Sprawdzimy przechodniość. Niech $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$ i $\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{A}_3$; pokażemy, że $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_3$, czyli że dowolna mapa $(U,\varphi)\in\mathcal{A}_1$ jest zgodna z dowolną mapą $(V,\psi)\in\mathcal{A}_3$. Jeśli $U\cap V=\emptyset$, zgodność jest trywialna. W przeciwnym razie ustalmy $p\in U\cap V$. Ponieważ $\mathcal{A}_2$ jest atlasem pokrywającym $M$, istnieje mapa $(W,\eta)\in\mathcal{A}_2$ z $p\in W$. Z założenia $\mathcal{A}_1\sim\mathcal{A}_2$, mapa $(U,\varphi)$ jest zgodna z $(W,\eta)$; z założenia $\mathcal{A}_2\sim\mathcal{A}_3$, mapa $(W,\eta)$ jest zgodna z $(V,\psi)$. Na mocy Lematu 1.2.6 (zastosowanego w punkcie $p\in U\cap V\cap W$), odwzorowania $\psi\circ\varphi^{-1}$ i $\varphi\circ\psi^{-1}$ są gładkie w otoczeniach odpowiednio $\varphi(p)$ i $\psi(p)$. Ponieważ punkt $p\in U\cap V$ był dowolny, oba te odwzorowania są gładkie na całych swoich dziedzinach $\varphi(U\cap V)$, $\psi(U\cap V)$ (gładkość jest własnością lokalną). Zatem $(U,\varphi)$ i $(V,\psi)$ są zgodne, co dowodzi $\mathcal{A}_1\sim\mathcal{A}_3$. □

W praktyce nie chcemy jednak utożsamiać struktury gładkiej z pojedynczym atlasem — dwa równoważne atlasy powinny wyznaczać *tę samą* strukturę. Wygodnie jest wybrać kanonicznego reprezentanta każdej klasy równoważności: atlas maksymalny.

**Definicja 1.2.8.** Atlas $\mathcal{A}$ na $M$ jest *maksymalny*, jeśli nie jest właściwym podzbiorem żadnego innego atlasu na $M$, tzn. jeśli mapa $(U,\varphi)$ jest zgodna z każdą mapą należącą do $\mathcal{A}$, to $(U,\varphi)\in\mathcal{A}$.

**Twierdzenie 1.2.9.** *Każdy atlas $\mathcal{A}$ na $M$ jest zawarty w dokładnie jednym atlasie maksymalnym $\mathcal{A}^+$, zadanym wzorem*

$$\mathcal{A}^+ = \{(U,\varphi) \text{ – mapa na } M : (U,\varphi) \text{ jest zgodna z każdą mapą z } \mathcal{A}\}.$$

*Ponadto dwa atlasy $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+$.*

*Dowód. Krok 1: $\mathcal{A}^+$ jest atlasem.* Ponieważ $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{A}^+$ (każda mapa z $\mathcal{A}$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$, gdyż $\mathcal{A}$ jest atlasem), zbiory dziedzin map z $\mathcal{A}^+$ pokrywają $M$. Pozostaje sprawdzić, że dowolne dwie mapy $(U,\varphi),(V,\psi)\in\mathcal{A}^+$ są ze sobą zgodne. Ustalmy $p\in U\cap V$ (dla $U\cap V=\emptyset$ zgodność jest trywialna); ponieważ $\mathcal{A}$ pokrywa $M$, istnieje $(W,\eta)\in\mathcal{A}$ z $p\in W$. Mapa $(U,\varphi)$ jest zgodna z $(W,\eta)$ (bo $(U,\varphi)\in\mathcal{A}^+$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$), a $(W,\eta)$ jest zgodna z $(V,\psi)$ (analogicznie, bo $(V,\psi)\in\mathcal{A}^+$). Na mocy Lematu 1.2.6, odwzorowania $\psi\circ\varphi^{-1}$, $\varphi\circ\psi^{-1}$ są gładkie w otoczeniach $\varphi(p)$, $\psi(p)$; wobec dowolności $p\in U\cap V$, są gładkie na całych dziedzinach $\varphi(U\cap V)$, $\psi(U\cap V)$. Zatem $\mathcal{A}^+$ jest atlasem.

*Krok 2: $\mathcal{A}^+$ jest maksymalny.* Niech mapa $(U,\varphi)$ będzie zgodna z każdą mapą należącą do $\mathcal{A}^+$. Ponieważ $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{A}^+$, mapa $(U,\varphi)$ jest w szczególności zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$, a więc z definicji $\mathcal{A}^+$ mamy $(U,\varphi)\in\mathcal{A}^+$.

*Krok 3: jednoznaczność.* Niech $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}$ będzie atlasem maksymalnym. Ponieważ $\mathcal{B}$ jest atlasem i $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, każda mapa z $\mathcal{B}$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$ (obie należą do atlasu $\mathcal{B}$) — więc $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}^+$ z definicji $\mathcal{A}^+$.

Odwrotnie, niech $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$; pokażemy $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$, co — wobec dowolności $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$ — da $\mathcal{A}^+ \subseteq \mathcal{B}$, a wraz z poprzednią inkluzją: $\mathcal{B} = \mathcal{A}^+$. Z maksymalności $\mathcal{B}$ wystarczy pokazać, że $(U, \varphi)$ jest zgodna z każdą mapą $(V, \psi) \in \mathcal{B}$. Ustalmy taką mapę i punkt $p \in U \cap V$ (dla $U \cap V = \emptyset$ zgodność jest trywialna). Ponieważ $\mathcal{A}$ pokrywa $M$, istnieje $(W, \eta) \in \mathcal{A}$ z $p \in W$. Mapa $(U, \varphi)$ jest zgodna z $(W, \eta)$ (bo $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$), a $(W, \eta) \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ jest zgodna z $(V, \psi) \in \mathcal{B}$ (bo obie należą do atlasu $\mathcal{B}$). Na mocy Lematu 1.2.6, $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ są zgodne w otoczeniu $p$; wobec dowolności $p \in U \cap V$ — zgodne na całych dziedzinach. Zatem $(U, \varphi)$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{B}$, więc — z maksymalności $\mathcal{B}$ — $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$.

*Krok 4:* $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2 \iff \mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+$. ($\Leftarrow$) Jeśli $\mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+ =: \mathcal{B}$, to $\mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{B}$ i $\mathcal{A}_2 \subseteq \mathcal{B}$, a skoro $\mathcal{B}$ jest atlasem, każda mapa z $\mathcal{A}_1$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{B}$, w szczególności z każdą mapą z $\mathcal{A}_2$ — czyli $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$.

($\Rightarrow$) Załóżmy $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$. Pokażemy $\mathcal{A}_1^+ \subseteq \mathcal{A}_2^+$ (inkluzja odwrotna analogicznie, skąd równość). Niech $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1^+$. Ustalmy dowolną mapę $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$ i (dla $U \cap V \neq \emptyset$, inaczej trywialnie) punkt $p \in U \cap V$. Ponieważ $\mathcal{A}_1$ pokrywa $M$, istnieje $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ z $p \in W$. Mapa $(U, \varphi)$ jest zgodna z $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ (bo $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1^+$), a $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ jest zgodna z $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$ (bo $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$). Na mocy Lematu 1.2.6, $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ są zgodne w otoczeniu $p$; wobec dowolności $p \in U \cap V$ — na całych dziedzinach. Zatem $(U, \varphi)$ jest zgodna z $(V, \psi)$; wobec dowolności $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$, mamy $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_2^+$. □

Powyższe twierdzenie pozwala oddzielić topologię przestrzeni od wyboru współrzędnych, w których będziemy różniczkować.

**Definicja 1.2.10** (Struktura różniczkowa)**.** *Strukturą różniczkową* klasy $C^\infty$ na rozmaitości topologicznej $M$ nazywamy klasę równoważności atlasów gładkich na $M$. Równoważnie, na mocy Twierdzenia 1.2.9, jest nią jedyny atlas maksymalny $\mathcal{A} = \mathcal{A}_0^+$ zawierający dowolny atlas $\mathcal{A}_0$ z tej klasy. Mapy należące do $\mathcal{A}$ nazywamy *dopuszczalnymi*.

**Definicja 1.2.11** (Rozmaitość gładka)**.** *Rozmaitością gładką* (klasy $C^\infty$) wymiaru $n$ nazywamy parę $(M, \mathcal{A})$, gdzie $M$ jest rozmaitością topologiczną wymiaru $n$, a $\mathcal{A}$ jest strukturą różniczkową zapisaną jako atlas maksymalny.

W praktyce wystarczy podać mały atlas $\mathcal{A}_0$: wyznacza on jednoznacznie strukturę $\mathcal{A}_0^+$. Topologia określa, które mapy współrzędnych są homeomorfizmami; struktura różniczkowa określa dodatkowo, które przejścia między nimi są gładkie.

**Przykład 1.2.12** (Różne struktury na tej samej przestrzeni)**.** Na topologicznej prostej $\mathbb{R}$ atlas $\mathcal{A}_{\text{std}}$ z mapą $\mathrm{id}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ i atlas $\mathcal{A}_h$ z mapą $h\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = x^3$, są osobno atlasami gładkimi. Nie są równoważne: w jednym kierunku przejście jest dane przez $h^{-1}(u) = \sqrt[3]{u}$, które nie jest różniczkowalne w zerze. Definiują zatem różne struktury na *ustalonym* zbiorze topologicznym $\mathbb{R}$, choć otrzymane rozmaitości są dyfeomorficzne (w sensie definicji 1.5.3): dyfeomorfizm $h\colon (\mathbb{R}, \mathcal{A}_h^+) \to (\mathbb{R}, \mathcal{A}_{\text{std}}^+)$ ma w odpowiednich mapach współrzędnych postać identyczności.

*Uwaga* 1.2.13 (Intuicja: mapa, atlas i rozmaitość). Najprostszym sposobem zrozumienia pojęć *mapy*, *atlasu* i *rozmaitości* jest analogia z powierzchnią Ziemi.

Powierzchnia Ziemi jest obiektem zakrzywionym i nie możemy przedstawić jej w całości na jednej płaskiej kartce bez zniekształceń. Możemy jednak wybrać niewielki fragment powierzchni, na przykład okolice Krakowa, i przedstawić go na płaskiej mapie. Matematycznie dokładnie taką rolę pełni *mapa* rozmaitości.

Jeżeli $M$ jest rozmaitością, to mapa jest parą $(U, \varphi)$, gdzie $U \subset M$ jest otwartym fragmentem rozmaitości, a $\varphi\colon U \longrightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ jest homeomorfizmem. Oznacza to, że punkty znajdujące się

w $U$ możemy opisać za pomocą zwykłych współrzędnych $(x^1, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n$. Można więc myśleć o $\varphi$ jako o sposobie "rozłożenia" niewielkiego fragmentu rozmaitości na płaskiej przestrzeni $\mathbb{R}^n$.

Jedna mapa zazwyczaj nie wystarcza do opisania całej przestrzeni. Podobnie jedna mapa geograficzna przedstawiająca okolice Krakowa nie opisuje całej powierzchni Ziemi. Potrzebujemy wielu map $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, których dziedziny pokrywają całą przestrzeń:

$$M = \bigcup_\alpha U_\alpha.$$

Taki zbiór map nazywamy *atlasem*.

Jeżeli dwa obszary $U_\alpha$ i $U_\beta$ nachodzą na siebie, to ten sam punkt rozmaitości może mieć dwa różne opisy współrzędnościowe. Przejście pomiędzy nimi opisuje odwzorowanie $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$, zwane odwzorowaniem przejścia. Można je porównać do przeliczania współrzędnych tego samego miejsca pomiędzy dwiema zachodzącymi na siebie mapami geograficznymi.

*Rozmaitość* jest zatem przestrzenią, która globalnie może być skomplikowana lub zakrzywiona, ale w dostatecznie małym otoczeniu każdego punktu wygląda jak zwykła przestrzeń euklidesowa $\mathbb{R}^n$.

W skrócie:

| | | |
|---|---|---|
| mapa | $\longleftrightarrow$ | lokalny układ współrzędnych, |
| atlas | $\longleftrightarrow$ | zbiór map opisujących całą przestrzeń, |
| rozmaitość | $\longleftrightarrow$ | przestrzeń lokalnie wyglądająca jak $\mathbb{R}^n$. |

Przykładowo sfera $S^2$ nie jest płaską częścią $\mathbb{R}^2$, ale każdy jej dostatecznie mały fragment można opisać za pomocą dwóch współrzędnych. Dlatego $S^2$ jest dwuwymiarową rozmaitością.

Od tej pory, mówiąc o rozmaitości $M$, będziemy mieli na myśli rozmaitość gładką — parę $(M, \mathcal{A})$ — pomijając $\mathcal{A}$ w oznaczeniach, gdy nie prowadzi to do nieporozumień.

## 1.3 Rozmaitości z brzegiem

Wnętrze dysku wygląda lokalnie jak otwarty zbiór w $\mathbb{R}^n$, ale punkt na jego brzegu ma tylko jedną stronę. Modelem takiego otoczenia jest półprzestrzeń $\mathbb{H}^n = \{(x^1, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}$, $n \geq 1$. Otwartość podzbioru $\mathbb{H}^n$ rozumiemy w topologii względnej.

**Definicja 1.3.1** (Rozmaitość gładka z brzegiem)**.** *Rozmaitość gładka z brzegiem* wymiaru $n \geq 1$ to przestrzeń Hausdorffa spełniająca drugi aksjomat przeliczalności, wyposażona w atlas homeomorfizmów $\varphi_\alpha : U_\alpha \to V_\alpha$ na zbiory $V_\alpha$ otwarte w $\mathbb{H}^n$. Na częściach wspólnych odwzorowania przejścia i ich odwrotności mają być gładkie: w otoczeniu każdego punktu rozumie się przez to istnienie gładkiego przedłużenia na otwarty zbiór w $\mathbb{R}^n$. Maksymalny atlas zgodny z tym atlasem wyznacza strukturę gładką, tak jak w Twierdzeniu 1.2.9. *Brzegiem rozmaitości* nazywamy zbiór

$$\partial M = \{p \in M : \varphi_\alpha(p)^n = 0 \text{ w pewnej mapie } (U_\alpha, \varphi_\alpha)\}.$$

Pozostałe punkty tworzą wnętrze $M^\circ = M \setminus \partial M$. Dla wymiaru 0 przyjmujemy $\partial M = \varnothing$.

Warunek „w pewnej mapie" jest poprawny dzięki następującemu faktowi; jednocześnie pokazuje, że brzeg nie zależy od wyboru współrzędnych.

**Stwierdzenie 1.3.2** (Niezależność brzegu od mapy)**.** *Dla $n \geq 1$, jeśli $p$ ma ostatnią współrzędną równą 0 w jednej mapie półprzestrzennej, to ma ją równą 0 w każdej mapie półprzestrzennej, której dziedzina zawiera $p$. Zbiór $\partial M$ jest zamknięty w $M$ i z map ograniczonych do $\partial M$ otrzymuje strukturę gładkiej rozmaitości wymiaru $n-1$ bez brzegu.*

*Dowód.* Przypuśćmy, że $\varphi(p)$ leży na płaszczyźnie $x^n = 0$, a $\psi(p)$ jest punktem wnętrza $\mathbb{H}^n$. Ograniczmy mapy do wspólnego dostatecznie małego otoczenia $p$. Wtedy $\psi$ odwzorowuje je na zbiór otwarty w $\mathbb{R}^n$, a $\varphi \circ \psi^{-1}$ jest ciągłą injekcją tego zbioru do $\mathbb{R}^n$. Twierdzenie Brouwera o niezmienniczości obszaru orzeka, że obraz takiej injekcji jest otwarty w $\mathbb{R}^n$. Obraz leży jednak w $\mathbb{H}^n$ i zawiera punkt $\varphi(p)$ na jego płaszczyźnie brzegowej, więc nie może być otwarty w $\mathbb{R}^n$. Sprzeczność dowodzi pierwszej tezy. Dokładne sformułowanie użytego wyniku zewnętrznego podaje A. Hatcher, *Algebraic Topology*, twierdzenie 2B.3.

W każdej mapie punkty z $x^n > 0$ tworzą zbiór otwarty. Zatem $M^\circ$ jest otwarty, a $\partial M$ zamknięty. Ograniczenie mapy $\varphi$ do $U \cap \partial M$ przyjmuje wartości w otwartym podzbiorze $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$. Przejścia między tymi ograniczeniami są gładkie, bo są ograniczeniami gładkich przedłużeń przejść na $\mathbb{R}^n$; to samo dotyczy odwrotności. Są to więc mapy gładkiej rozmaitości wymiaru $n-1$. Każda z nich ma obraz otwarty w całej $\mathbb{R}^{n-1}$, czyli $\partial M$ nie ma własnego brzegu. □

W punkcie brzegu definiujemy $T_pM$ przez wektory współrzędnych w półprzestrzennej mapie, równoważnie przez derywacje gładkich kiełków funkcji w $p$. Pełną konstrukcję i niezależność od przedłużeń podamy po wprowadzeniu przestrzeni stycznej, w Stwierdzeniu 1.7.12. Ten model ma $n$ niezależnych kierunków: $T_pM \cong \mathbb{R}^n$, natomiast $T_p\partial M \cong \{v \in \mathbb{R}^n : v^n = 0\}$ ma wymiar $n-1$. Wektor o ujemnej ostatniej współrzędnej należy do $T_pM$, choć nie jest prędkością krzywej biegnącej od $p$ do wnętrza przy dodatnim czasie. Przykładowo $T_0[0,1] \cong \mathbb{R}$, podczas gdy $T_0\partial[0,1] = 0$. Model przez krzywe określone na otwartym przedziale, omówiony w Sekcji 1.7, dotyczy punktów wnętrza: w punkcie brzegu dwustronna krzywa w $M$ nie reprezentuje kierunku poprzecznego do brzegu.

**Przykład 1.3.3** (Kula, okrąg i brzeg otaczającej przestrzeni)**.** Domknięta kula $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq 1\}$ ma brzeg rozmaitościowy $S^{n-1}$. Rzeczywiście, przy $|p| = 1$ funkcja $\rho(x) = 1 - |x|^2$ ma niezerową różniczkę $\mathrm{d}\rho_p(v) = -2\langle p, v\rangle$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej pozwala użyć $\rho$ jako ostatniej lokalnej współrzędnej, zatem $D^n$ odpowiada warunkowi $\rho \geq 0$. Z kolei brzeg okręgu $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ jako rozmaitości (w sensie Definicji 1.3.1) jest pusty: $\partial S^1 = \varnothing$. Jego brzeg topologiczny jako *podzbioru* $\mathbb{R}^2$ jest natomiast całym $S^1$: okrąg ma puste wnętrze w $\mathbb{R}^2$ i jest domknięty. Te dwa znaczenia słowa „brzeg” trzeba odróżniać.

Produkt dwóch rozmaitości z brzegiem może mieć *naroża*. W kwadracie $[0,1]^2$ przy wierzchołku naturalny model pochodzący z zanurzenia to $[0,\infty)^2$, z dwiema ścianami brzegowymi. W rachunku uchwytów spotkamy taki model na $\partial D^k \times \partial D^{n-k}$; naroże można zaokrąglić w małym otoczeniu, zachowując części odległe od niego. To operacja na gładkiej geometrii brzegu, a nie zmiana tego, które punkty są brzegowe topologicznie. Kołnierze i takie zaokrąglanie pojawią się w Sekcji 20.5 i przy uchwytach w Sekcji 22.2.

## 1.4 Rozmaitości zespolone

Analogicznie do konstrukcji z poprzedniego paragrafu, możemy modelować rozmaitość lokalnie nie na $\mathbb{R}^n$, lecz na $\mathbb{C}^n$, żądając przy tym, by odwzorowania przejścia między mapami były holomorficzne, a nie tylko gładkie.

**Definicja 1.4.1.** *Rozmaitością zespoloną* wymiaru (zespolonego) $n$ nazywamy przestrzeń Hausdorffa $M$ spełniającą drugi aksjomat przeliczalności, wyposażoną w atlas $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ map $\varphi_\alpha \colon U_\alpha \to \varphi_\alpha(U_\alpha) \subseteq \mathbb{C}^n$ (homeomorfizmów na zbiory otwarte w $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$), takich że odwzorowania przejścia

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \colon \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

są *holomorficzne* (jako odwzorowania między otwartymi podzbiorami $\mathbb{C}^n$), wraz z maksymalnym takim atlasem (konstrukcja atlasu maksymalnego przebiega dosłownie tak samo, jak w Sekcji 1.2,

z „gładki" zastąpionym przez „holomorficzny" — złożenie odwzorowań holomorficznych jest holomorficzne, więc Lemat 1.2.6 i Twierdzenie 1.2.9 przenoszą się bez zmian).

*Uwaga* 1.4.2. Utożsamiając $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ (przez część rzeczywistą i urojoną każdej współrzędnej) oraz przypominając, że każde odwzorowanie holomorficzne jest w szczególności odwzorowaniem gładkim (klasy $C^\infty$) w sensie rzeczywistym (ze wzoru całkowego Cauchy'ego na małym polidysku wynika lokalne rozwinięcie w szereg potęgowy, który można różniczkować wyraz po wyrazie), widzimy, że *każda rozmaitość zespolona wymiaru n jest w naturalny sposób rzeczywistą rozmaitością gładką wymiaru* $2n$. Implikacja odwrotna jest fałszywa: nie każda parzystowymiarowa rozmaitość gładka dopuszcza strukturę zespoloną (a nawet jeśli dopuszcza, struktura taka zwykle nie jest jednoznaczna).

**Przykład 1.4.3** (Zespolona przestrzeń rzutowa)**.** Niech $\mathbb{C}_* := \mathbb{C}\setminus\{0\}$ oznacza zbiór niezerowych liczb zespolonych. Zespolonym odpowiednikiem $\mathbb{RP}^n$ z Przykładu 1.6.5 jest przestrzeń ilorazowa $\mathbb{CP}^n := (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})/\!\sim$, gdzie

$$z \sim w \iff \exists\, \lambda \in \mathbb{C}_* \quad \text{takie, że} \quad z = \lambda w.$$

Przestrzeń $\mathbb{CP}^n$ wyposażamy w topologię ilorazową. Punkty zapisujemy w postaci $[z^0 : z^1 : \cdots : z^n]$, przy czym

$$[z^0 : \cdots : z^n] = [\lambda z^0 : \cdots : \lambda z^n] \qquad \text{dla każdego } \lambda \in \mathbb{C}_*.$$

Dla $i = 0, \ldots, n$ definiujemy $U_i = \{[z^0 : \cdots : z^n] \in \mathbb{CP}^n : z^i \neq 0\}$. Zbiory $U_i$ są otwarte i pokrywają całą przestrzeń $\mathbb{CP}^n$. Na każdym z nich definiujemy mapę $\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{C}^n$ wzorem

$$\varphi_i([z^0 : \cdots : z^n]) = \left(\frac{z^0}{z^i}, \ldots, \frac{z^{i-1}}{z^i}, \frac{z^{i+1}}{z^i}, \ldots, \frac{z^n}{z^i}\right).$$

Jej odwrotność jest dana jawnie przez

$$\varphi_i^{-1}(w^0, \ldots, w^{i-1}, w^{i+1}, \ldots, w^n) = [w^0 : \cdots : w^{i-1} : 1 : w^{i+1} : \cdots : w^n].$$

Sprawdźmy także ciągłość, której nie daje sama bijektywność. Niech $\pi\colon \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{CP}^n$ będzie rzutowaniem ilorazowym. Przeciwobraz $\pi^{-1}(U_i) = \{z : z^i \neq 0\}$ jest otwarty, zatem $U_i$ jest otwarty. Ograniczenie $\pi\colon \pi^{-1}(U_i) \to U_i$ także jest odwzorowaniem ilorazowym: otwarty w $\pi^{-1}(U_i)$ przeciwobraz podzbioru $U_i$ jest otwarty w całej dziedzinie $\pi$, więc sam podzbiór jest otwarty w ilorazie. Składowe $\varphi_i \circ \pi$ są ciągłymi ilorazami współrzędnych; z własności topologii ilorazowej wynika ciągłość $\varphi_i$. Podany wzór na $\varphi_i^{-1}$ jest złożeniem ciągłego wstawienia współrzędnej 1 z $\pi$. Każda $\varphi_i$ jest więc homeomorfizmem pomiędzy $U_i$ a $\mathbb{C}^n$.

Na przecięciu $U_i \cap U_j$ ten sam punkt przestrzeni $\mathbb{CP}^n$ posiada dwa różne opisy współrzędnościowe. Przejście pomiędzy nimi jest opisane przez odwzorowanie $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$. Jego składowe są ilorazami wielomianów zespolonych, przy czym mianowniki nie znikają na dziedzinie odwzorowania. Odwzorowania przejścia są zatem holomorficzne. Aksjomat Hausdorffa i istnienie przeliczalnej bazy topologii sprawdzimy w dowodzie twierdzenia 1.6.8. Łącznie daje to strukturę rozmaitości zespolonej wymiaru $n$ na $\mathbb{CP}^n$, a więc również rzeczywistej rozmaitości gładkiej wymiaru $2n$.

Rozważmy teraz szczególny przypadek $n = 1$. Otrzymujemy *sferę Riemanna* $\mathbb{CP}^1$. Mamy wówczas dwa zbiory $U_0 = \{[z^0 : z^1] : z^0 \neq 0\}$, $U_1 = \{[z^0 : z^1] : z^1 \neq 0\}$, oraz mapy

$$\varphi_0 : U_0 \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \varphi_0([z^0 : z^1]) = \frac{z^1}{z^0},$$

i

$$\varphi_1 : U_1 \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \varphi_1([z^0 : z^1]) = \frac{z^0}{z^1}.$$

Każda z tych map identyfikuje odpowiedni fragment $\mathbb{CP}^1$ z kopią płaszczyzny zespolonej $\mathbb{C}$.

Na przecięciu $U_0 \cap U_1 = \{[z^0 : z^1] : z^0 \neq 0,\ z^1 \neq 0\}$ ten sam punkt ma w pierwszej mapie współrzędną $w = \varphi_0([z^0 : z^1]) = \frac{z^1}{z^0}$, natomiast w drugiej mapie współrzędną $v = \varphi_1([z^0 : z^1]) = \frac{z^0}{z^1}$. Stąd $v = \frac{1}{w}$. Odwzorowanie przejścia ma więc postać $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}(w) = \frac{1}{w},\ w \in \mathbb{C}_*$.

Możemy zatem patrzeć na $\mathbb{CP}^1$ jako na przestrzeń otrzymaną z dwóch rozłącznych kopii płaszczyzny zespolonej, $\mathbb{C}_0 \sqcup \mathbb{C}_1$, przez utożsamienie punktów należących do ich niezerowych części zgodnie z regułą $w \in \mathbb{C}_0 \setminus \{0\} \quad \sim \quad \frac{1}{w} \in \mathbb{C}_1 \setminus \{0\}$. W tym właśnie sensie mówi się, że dwie kopie $\mathbb{C}$ są *sklejone za pomocą odwzorowania przejścia* $w \longmapsto \frac{1}{w}$. Nie sklejamy więc całych płaszczyzn punkt po punkcie, lecz utożsamiamy jedynie te punkty obu kopii $\mathbb{C}$, które odpowiadają temu samemu punktowi przestrzeni $\mathbb{CP}^1$ na części wspólnej $U_0 \cap U_1$.

Punkt $0 \in \mathbb{C}_0$ odpowiada punktowi $[1 : 0] \in \mathbb{CP}^1$, natomiast punkt $0 \in \mathbb{C}_1$ odpowiada punktowi $[0 : 1] \in \mathbb{CP}^1$. W szczególności, patrząc wyłącznie przez mapę $\varphi_0$, punkt $[0 : 1]$ można interpretować jako dodatkowy punkt w nieskończoności. Dlatego często zapisuje się $\mathbb{CP}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

Przestrzeń $\mathbb{CP}^1$ jest dyfeomorficzna ze sferą $S^2$. Trzeba jednak uważać na wybór zespolonych współrzędnych stereograficznych. Zwykłe rzeczywiste rzuty stereograficzne z Przykładu 1.6.4, po utożsamieniu $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$, prowadzą do odwzorowania przejścia $w \longmapsto \frac{w}{|w|^2} = \frac{1}{\overline{w}}$, które nie jest holomorficzne.

Aby otrzymać strukturę zespoloną zgodną ze strukturą na $\mathbb{CP}^1$, wybieramy na $S^2$ współrzędne

$$\zeta_N(x) = \frac{x^1 + ix^2}{1 - x^3}, \qquad \zeta_S(x) = \frac{x^1 - ix^2}{1 + x^3}.$$

Wtedy na części wspólnej zachodzi $\zeta_S \circ \zeta_N^{-1}(w) = \frac{1}{w}$.

Jawny dyfeomorfizm $H : \mathbb{CP}^1 \longrightarrow S^2$ jest dany wzorem

$$H([z^0 : z^1]) = \frac{(2\,\mathrm{Re}(\overline{z^0}z^1), 2\,\mathrm{Im}(\overline{z^0}z^1), |z^1|^2 - |z^0|^2)}{|z^0|^2 + |z^1|^2}.$$

Skalowanie obu współrzędnych przez $\lambda \neq 0$ mnoży licznik i mianownik przez $|\lambda|^2$, dlatego wzór jest dobrze określony na klasach równoważności.

Ponadto

$$4|z^0|^2|z^1|^2 + \left(|z^1|^2 - |z^0|^2\right)^2 = \left(|z^0|^2 + |z^1|^2\right)^2,$$


co pokazuje, że obraz odwzorowania $H$ leży na sferze $S^2$.

W wybranych współrzędnych mamy $\zeta_N \circ H = \varphi_0,\ \zeta_S \circ H = \varphi_1$. Pierwsza z tych równości daje bijekcję $U_0 \longrightarrow S^2 \setminus \{N\}$, natomiast pozostały punkt $[0 : 1]$ przechodzi na biegun północny $N$. W lokalnych współrzędnych odwzorowanie $H$ oraz jego odwrotność są tożsamościami, co pokazuje, że $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$ jako rozmaitości gładkie.


## 1.5 Odwzorowania gładkie między rozmaitościami

**Definicja 1.5.1.** Niech $M$, $N$ będą rozmaitościami gładkimi wymiarów odpowiednio $m$, $n$. Odwzorowanie $F\colon M \to N$ jest *gładkie* (klasy $C^\infty$) w punkcie $p \in M$, jeżeli dla pewnej (równoważnie: każdej) mapy dopuszczalnej $(U, \varphi)$ wokół $p$ i mapy dopuszczalnej $(V, \psi)$ wokół $F(p)$ z $F(U) \subseteq V$, odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U) \to \psi(V)$ jest gładkie (klasy $C^\infty$) w pewnym otwartym otoczeniu $\varphi(p)$. Odwzorowanie $F$ jest gładkie, jeśli jest gładkie w każdym punkcie $p \in M$. Zbiór wszystkich gładkich funkcji $M \to \mathbb{R}$ oznaczamy $C^\infty(M)$.

*Uwaga* 1.5.2. Definicja gładkości nie zależy od wyboru map. Niech $(U, \varphi)$ oraz $(V, \psi)$ będą mapami wokół odpowiednio $p$ i $F(p)$, dla których odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ jest gładkie. Jeśli




Rysunek 1.3: Schematyczna interpretacja $\mathbb{CP}^1$ jako sfery Riemanna: dwie mapy zespolone pokrywają sferę; w mapie południowej odwrócono znak drugiej współrzędnej rzeczywistej. Przejście $1/w$ jest określone dla $w \neq 0$.




Rysunek 1.4: Odwzorowanie $F\colon M \to N$ oraz jego lokalny zapis współrzędnościowy. Po wybraniu map $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ gładkość $F$ bada się poprzez zwykłe odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ między otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych.

$(U', \varphi')$, $(V', \psi')$ są innymi mapami dopuszczalnymi wokół $p$ i $F(p)$, to chcemy porównać oba opisy współrzędnościowe funkcji $F$.

Najpierw zauważmy, że na odpowiednio małym otoczeniu punktu $p$ mamy $F = \psi^{-1} \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi$. Ponieważ $\varphi$ i $\psi^{-1}$ są homeomorfizmami, a odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ jest gładkie, a więc w szczególności ciągłe, otrzymujemy, że $F$ jest ciągłe w pewnym otoczeniu punktu $p$.

Ponieważ $p \in U \cap U'$ oraz $F(p) \in V \cap V'$, a $V \cap V'$ jest zbiorem otwartym, wybierzmy otwarte otoczenie $O$ punktu $p$, na którym $F$ jest ciągłe. Wówczas $(F|_O)^{-1}(V \cap V') = O \cap F^{-1}(V \cap V')$ jest otwartym otoczeniem $p$ w $M$. Możemy więc zmniejszyć dziedzinę do otwartego otoczenia $W \subseteq O \cap U \cap U' \cap F^{-1}(V \cap V')$. Na $W$ jednocześnie obowiązują oba układy współrzędnych, a obraz $F(W)$ jest zawarty w $V \cap V'$. Wszystkie poniższe złożenia są zatem dobrze określone.

Na odpowiadającej zbiorowi $W$ dziedzinie mamy

$$\psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1} = (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ (\varphi')^{-1}).$$

Odwzorowania

$$\varphi \circ (\varphi')^{-1} \qquad \text{oraz} \qquad \psi' \circ \psi^{-1}$$

są odwzorowaniami przejścia, a więc są gładkie z definicji zgodności map. Co więcej, są one dyfeomorfizmami pomiędzy odpowiednimi otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych.

Zatem złożenie z nimi nie zmienia gładkości. W konsekwencji $\psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1}$ jest gładkie wtedy i tylko wtedy, gdy gładkie jest $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$. Definicja gładkości odwzorowania $F$ nie zależy więc od wyboru map w dziedzinie i przeciwdziedzinie.

**Definicja 1.5.3.** Odwzorowanie gładkie $F\colon M \to N$ jest *dyfeomorfizmem*, jeśli jest bijekcją, a $F^{-1}\colon N \to M$ jest również gładkie. Rozmaitości $M$, $N$ nazywamy *dyfeomorficznymi*, jeśli istnieje między nimi dyfeomorfizm.

**Stwierdzenie 1.5.4.** *Złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie: jeśli $F\colon M \to N$ i $G\colon N \to P$ są gładkie, to $G \circ F\colon M \to P$ jest gładkie.*

*Dowód.* Ustalmy $p \in M$ i mapy dopuszczalne $(U, \varphi)$ wokół $p$, $(V, \psi)$ wokół $F(p)$, $(W, \eta)$ wokół $G(F(p))$, z $F(U) \subseteq V$, $G(V) \subseteq W$ (istnienie takich map — po ewentualnym zmniejszeniu $V$, a następnie $U$ — wynika z ciągłości $F$ i $G$, którą zapewnia gładkość). Wówczas na $\varphi(U)$

$$\eta \circ (G \circ F) \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ G \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}),$$

czyli złożenie dwóch odwzorowań gładkich (między otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych) — a takie złożenie jest gładkie na mocy zwykłego twierdzenia analizy wielu zmiennych o różniczkowaniu złożenia. □

## 1.6 Przykłady rozmaitości

**Stwierdzenie 1.6.1.** *Jeśli $M$ jest rozmaitością gładką wymiaru $n$ i $\Omega \subseteq M$ jest zbiorem otwartym, to $\Omega$ z topologią i strukturą gładką odziedziczoną po $M$ (mapy $(U \cap \Omega, \varphi|_{U\cap\Omega})$ dla map dopuszczalnych $(U, \varphi)$ na $M$) jest rozmaitością gładką wymiaru $n$.*

*Dowód.* Warunki Hausdorffa i drugiej przeliczalności dziedziczą się automatycznie na podprzestrzenie. Rodzina $\{(U \cap \Omega, \varphi|_{U\cap\Omega})\}$, gdzie $(U, \varphi)$ przebiega atlas maksymalny na $M$, pokrywa $\Omega$ (bo mapy pokrywają $M \supseteq \Omega$) i składa się z homeomorfizmów na zbiory otwarte $\varphi(U \cap \Omega) \subseteq \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ (obraz zbioru otwartego $U \cap \Omega$ przez homeomorfizm $\varphi$ jest otwarty w $\varphi(U)$, a więc i w $\mathbb{R}^n$). Zgodność map $(U \cap \Omega, \varphi|_{U\cap\Omega})$ i $(U' \cap \Omega, \varphi'|_{U'\cap\Omega})$ wynika natychmiast ze zgodności $(U, \varphi)$ i $(U', \varphi')$, gdyż odwzorowania przejścia dla map obciętych są obcięciami odwzorowań przejścia dla map oryginalnych do (otwartego) podzbioru dziedziny. □

**Przykład 1.6.2.** Zbiór $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ macierzy odwracalnych $n \times n$ o wyrazach rzeczywistych jest otwartym podzbiorem przestrzeni $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ wszystkich macierzy $n \times n$ (bo $\det\colon M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ jest funkcją ciągłą, a $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}\setminus\{0\})$ jest przeciwobrazem zbioru otwartego). Na mocy Stwierdzenia 1.6.1, $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ jest rozmaitością gładką wymiaru $n^2$.

**Stwierdzenie 1.6.3** (Rozmaitość produktowa)**.** *Jeśli $M$, $N$ są rozmaitościami gładkimi wymiarów odpowiednio $m$, $n$, to $M \times N$ (z topologią produktową) jest rozmaitością gładką wymiaru $m + n$, z atlasem złożonym z map $(U \times V, \varphi \times \psi)$, gdzie $(U, \varphi)$ jest mapą na $M$, a $(V, \psi)$ mapą na $N$, i $(\varphi \times \psi)(p, q) := (\varphi(p), \psi(q)) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{m+n}$.*

*Dowód.* Hausdorffowość i druga przeliczalność produktu dwóch przestrzeni o tych własnościach są standardowymi faktami z topologii ogólnej. Mapy $\varphi \times \psi$ są homeomorfizmami na zbiory otwarte jako produkty homeomorfizmów na zbiory otwarte, a ich dziedziny pokrywają $M \times N$. Jeśli $(U_1 \times V_1, \varphi_1 \times \psi_1)$ i $(U_2 \times V_2, \varphi_2 \times \psi_2)$ są dwiema takimi mapami, ich odwzorowanie przejścia to

$$(\varphi_2 \times \psi_2) \circ (\varphi_1 \times \psi_1)^{-1} = (\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}) \times (\psi_2 \circ \psi_1^{-1}),$$

które jest gładkie jako produkt dwóch odwzorowań gładkich. Zatem otrzymana rodzina map jest atlasem. □

**Przykład 1.6.4** (Sfera $S^n$ przez rzuty stereograficzne)**.** Niech $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}$ z topologią podprzestrzeni $\mathbb{R}^{n+1}$. Oznaczmy przez $N = (0, \dots, 0, 1)$ i $S = (0, \dots, 0, -1)$ bieguny północny i południowy. Definiujemy rzut stereograficzny z bieguna północnego,

$$\varphi_N \colon S^n \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^n, \qquad \varphi_N(x^1, \dots, x^{n+1}) = \frac{1}{1 - x^{n+1}}(x^1, \dots, x^n),$$

tzn. $\varphi_N(x)$ to punkt przecięcia prostej przechodzącej przez $N$ i $x$ z hiperpłaszczyzną $\{x^{n+1} = 0\} \cong \mathbb{R}^n$. Odwzorowanie odwrotne wyraża się wzorem


$$\varphi_N^{-1}(u) = \frac{1}{\|u\|^2 + 1}(2u,\ \|u\|^2 - 1) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R},$$

co sprawdzamy bezpośrednim rachunkiem: punkt $y = \varphi_N^{-1}(u)$ leży na prostej $t \mapsto (tu, 1 - t)$ (parametryzacja prostej przez $N = (0, 1)$ w kierunku $(u, 0) - N = (u, -1)$) i spełnia $\|y\| = 1$; rozwiązując $t^2\|u\|^2 + (1 - t)^2 = 1$, tzn. $t(t(\|u\|^2 + 1) - 2) = 0$, względem $t \neq 0$, otrzymujemy $t = 2/(\|u\|^2 + 1)$, skąd powyższy wzór. Analogicznie definiujemy $\varphi_S \colon S^n \setminus \{S\} \to \mathbb{R}^n$, rzut z bieguna południowego, wzorem $\varphi_S(x) = \frac{1}{1+x^{n+1}}(x^1, \dots, x^n)$.

Zbiory $S^n \setminus \{N\}$ i $S^n \setminus \{S\}$ pokrywają $S^n$, więc pozostaje sprawdzić gładkość odwzorowania przejścia na $\varphi_N(S^n \setminus \{N, S\}) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Podstawiając $\varphi_N^{-1}(u)$ do wzoru na $\varphi_S$, i licząc osobno mianownik $1 + \frac{\|u\|^2-1}{\|u\|^2+1} = \frac{2\|u\|^2}{\|u\|^2+1}$, otrzymujemy

$$(\varphi_S \circ \varphi_N^{-1})(u) = \frac{2u/(\|u\|^2 + 1)}{2\|u\|^2/(\|u\|^2 + 1)} = \frac{u}{\|u\|^2},$$

czyli inwersja względem sfery jednostkowej. Odwzorowanie $u \mapsto u/\|u\|^2$ jest gładkie na $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, a jest ono swoją własną odwrotnością (dla $w = u/\|u\|^2$ mamy $\|w\|^2 = 1/\|u\|^2$, więc $w/\|w\|^2 = (u/\|u\|^2) \cdot \|u\|^2 = u$), więc obie mapy są zgodne. Zatem $\{(S^n \setminus \{N\}, \varphi_N), (S^n \setminus \{S\}, \varphi_S)\}$ jest atlasem na $S^n$, nadającym jej strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru $n$.




Rysunek 1.5: Rzut stereograficzny na płaszczyznę równikową, zgodny ze wzorem w tekście. Pokazano przekrój płaszczyzną zawierającą oś biegunową i punkt $x$. Punkty $N, x, \varphi_N(x)$ leżą na jednej prostej; punkt przecięcia z $\{x^{n+1} = 0\}$ ma współrzędne $\varphi_N(x) = (x^1, \dots, x^n)/(1 - x^{n+1})$.

**Przykład 1.6.5** (Rzeczywista przestrzeń rzutowa)**.** Niech $\mathbb{R}_* := \mathbb{R} \setminus \{0\}$ oznacza zbiór niezerowych liczb rzeczywistych. Niech $\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})/\!\sim$, gdzie

$$x \sim y \iff \exists\, \lambda \in \mathbb{R}_* \quad \text{takie, że} \quad x = \lambda y.$$

Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ wyposażamy w topologię ilorazową względem rzutowania

$$\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \qquad \pi(x) = [x].$$

Punkty przestrzeni rzutowej zapisujemy w postaci $[x^0 : \cdots : x^n]$.

Dla $i = 0, \ldots, n$ definiujemy $U_i = \{[x^0 : \cdots : x^n] \in \mathbb{RP}^n : x^i \neq 0\}$. Najpierw należy sprawdzić, że definicja ta nie zależy od wyboru reprezentanta klasy $[x]$. Jeżeli $x \sim y$, to istnieje $\lambda \neq 0$ takie, że $y = \lambda x$, a więc $y^i = \lambda x^i$. Ponieważ $\lambda \neq 0$, mamy $x^i \neq 0 \iff y^i \neq 0$. Warunek $x^i \neq 0$ zależy zatem wyłącznie od klasy $[x]$, więc zbiór $U_i$ jest dobrze określony.

Zauważmy następnie, że $\pi^{-1}(U_i) = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} : x^i \neq 0\}$. Jest to zbiór otwarty w $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, ponieważ jest przeciwobrazem otwartego zbioru $\mathbb{R}_*$ przez ciągłą funkcję współrzędnościową $x \longmapsto x^i$. Z definicji topologii ilorazowej zbiór $A \subseteq \mathbb{RP}^n$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy $\pi^{-1}(A)$ jest otwarty w $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Stąd każdy $U_i$ jest otwarty.

Ponieważ każdy niezerowy wektor $x = (x^0, \ldots, x^n)$ ma przynajmniej jedną niezerową współrzędną, zbiory $U_i$ pokrywają całą przestrzeń:

$$\mathbb{RP}^n = \bigcup_{i=0}^{n} U_i.$$

Na $U_i$ definiujemy odwzorowanie $\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n$ wzorem

$$\varphi_i([x^0 : \cdots : x^n]) = \left(\frac{x^0}{x^i}, \ldots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \ldots, \frac{x^n}{x^i}\right),$$

czyli po znormalizowaniu reprezentanta tak, aby jego $i$-ta współrzędna była równa 1, pomijamy tę współrzędną.

Także tutaj należy sprawdzić niezależność od wyboru reprezentanta. Jeżeli $y = \lambda x$ dla pewnego $\lambda \neq 0$, to dla każdego $j \neq i$ mamy $\frac{y^j}{y^i} = \frac{\lambda x^j}{\lambda x^i} = \frac{x^j}{x^i}$. Wartość $\varphi_i([x])$ zależy więc wyłącznie od klasy $[x]$.

Odwzorowanie odwrotne jest dane jawnie przez wstawienie 1 na $i$-te miejsce:

$$\varphi_i^{-1}(u^0, \ldots, u^{i-1}, u^{i+1}, \ldots, u^n) = [u^0 : \cdots : u^{i-1} : 1 : u^{i+1} : \cdots : u^n].$$

W szczególności $\varphi_i$ jest bijekcją.

Odwrotność $\varphi_i^{-1}$ jest ciągła, ponieważ jest złożeniem ciągłego odwzorowania

$$(u^0, \ldots, u^{i-1}, u^{i+1}, \ldots, u^n) \longmapsto (u^0, \ldots, u^{i-1}, 1, u^{i+1}, \ldots, u^n)$$

z ciągłym rzutowaniem ilorazowym $\pi$.

Aby wykazać ciągłość $\varphi_i$, zauważmy, że na zbiorze $\pi^{-1}(U_i) = \{x^i \neq 0\}$ mamy

$$\varphi_i \circ \pi(x) = \left(\frac{x^0}{x^i}, \ldots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \ldots, \frac{x^n}{x^i}\right),$$

a więc $\varphi_i \circ \pi$ jest ciągłe. Ponieważ obcięcie $\pi|_{\pi^{-1}(U_i)} : \pi^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i$ jest odwzorowaniem ilorazowym, wynika stąd ciągłość $\varphi_i$. Otrzymujemy zatem homeomorfizm $\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n$.

Pozostaje sprawdzić zgodność map. Dla $i \neq j$ na przecięciu $U_i \cap U_j$ odwzorowanie przejścia $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ jest określone tam, gdzie współrzędna odpowiadająca ilorazowi $x^j/x^i$ jest niezerowa. Każda jego składowa jest albo odwrotnością tej współrzędnej, albo ilorazem jednej ze współrzędnych przez nią. Są to zatem funkcje wymierne o nieznikającym na dziedzinie mianowniku, a więc funkcje gładkie.

W konsekwencji $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=0}^n$ jest atlasem gładkim. Po sprawdzeniu aksjomatów topologicznych w twierdzeniu poniżej otrzymujemy, że $\mathbb{RP}^n$ jest rozmaitością gładką wymiaru $n$.

**Przykład 1.6.6** (Dwie mapy $\mathbb{RP}^2$ krok po kroku)**.** Na $U_0$ każda klasa ma jednoznacznego reprezentanta $[1:u:v]$, natomiast na $U_1$ ma reprezentanta $[a:1:b]$. Ich część wspólna $U_0 \cap U_1$, zapisana we współrzędnych mapy $\varphi_0$, odpowiada warunkowi $u \neq 0$. Aby przejść od współrzędnych zadanych przez $\varphi_0$ do współrzędnych zadanych przez $\varphi_1$, dzielimy trzy współrzędne jednorodne przez $u$: $[1:u:v] = [1/u:1:v/u]$. Stąd odwzorowanie zmiany współrzędnych ma postać $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}(u,v) = \left(\frac{1}{u}, \frac{v}{u}\right)$. Oznacza to, że jeżeli punkt $p \in U_0 \cap U_1$ ma w pierwszej mapie współrzędne $\varphi_0(p) = (u,v)$, to w drugiej mapie jego współrzędne wynoszą $\varphi_1(p) = (a,b) = \left(\frac{1}{u}, \frac{v}{u}\right)$.

Dziedziną odwzorowania przejścia jest $\{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u \neq 0\}$, a jego macierz Jacobiego wynosi

$$D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u,v) = \begin{pmatrix} -u^{-2} & 0 \\ -vu^{-2} & u^{-1} \end{pmatrix}.$$

Ponieważ $\det D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u,v) = -u^{-3} \neq 0$, a odwrotne przejście ma postać $(a,b) \longmapsto \left(\frac{1}{a}, \frac{b}{a}\right)$, odwzorowanie przejścia jest dyfeomorfizmem.

Zmianę współrzędnych wektora stycznego w tych mapach obliczymy w przykładzie 1.7.11, po zdefiniowaniu przestrzeni stycznej.

*Uwaga* 1.6.7 (Geometryczna interpretacja $\mathbb{RP}^1$ i $\mathbb{RP}^2$). Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ można interpretować jako zbiór prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych w $\mathbb{R}^{n+1}$. Rzeczywiście, punkt $[x^0 : \cdots : x^n] \in \mathbb{RP}^n$ odpowiada prostej $\ell_x = \{\lambda x : \lambda \in \mathbb{R}\}$. Zmiana reprezentanta $x$ na $\mu x$, gdzie $\mu \neq 0$, nie zmienia tej prostej. Współrzędne jednorodne opisują więc nie konkretny punkt $\mathbb{R}^{n+1}$, lecz kierunek prostej przechodzącej przez 0.

Każda taka prosta przecina sferę jednostkową $S^n$ w dokładnie dwóch punktach antypodalnych $x$ i $-x$. Stąd $\mathbb{RP}^n \cong S^n/\{x \sim -x\}$. Jest to także identyfikacja topologii. Oznaczmy pierwotne rzutowanie przez $\pi$ i jego ograniczenie do sfery przez $q$. Normalizacja $\nu(x) = x/\|x\|$ jest ciągła i $\pi = q \circ \nu$. Jeśli $q^{-1}(A)$ jest otwarty w sferze, to $\pi^{-1}(A) = \nu^{-1}(q^{-1}(A))$ jest otwarty, zatem $A$ jest otwarty w pierwotnej topologii ilorazowej. Odwrotna implikacja wynika z ciągłości $q$. Stąd $q$ jest odwzorowaniem ilorazowym, co uzasadnia powyższy homeomorfizm.

Dla $n = 1$ otrzymujemy $\mathbb{RP}^1 \cong S^1/\{z \sim -z\}$. Po utożsamieniu $S^1$ z okręgiem jednostkowym w $\mathbb{C}$ rozważmy odwzorowanie $F : S^1 \to S^1$, $F(z) = z^2$. Ponieważ $F(z) = F(-z)$, odwzorowanie to jest stałe na parach antypodalnych i wyznacza odwzorowanie $\widetilde{F} : \mathbb{RP}^1 \to S^1$, $\widetilde{F}([z]) = z^2$. Jest ono bijekcją, ponieważ $z^2 = w^2 \iff z = \pm w$, a każdy punkt okręgu posiada dwa przeciwne pierwiastki kwadratowe. Ciągłość $\widetilde{F}$ wynika z ciągłości $F = \widetilde{F} \circ q$ i własności ilorazu. Ponieważ $\mathbb{RP}^1 = q(S^1)$ jest zwarta, a $S^1$ jest przestrzenią Hausdorffa, $\widetilde{F}$ jest homeomorfizmem.


Jest to również dyfeomorfizm. Jeśli $z = e^{i\theta}$, to w $\mathbb{RP}^1$ kąty $\theta$ i $\theta + \pi$ opisują ten sam punkt, natomiast $\widetilde{F}([e^{i\theta}]) = e^{2i\theta}$. Sprawdźmy zgodność współrzędnych kątowych z podanym wcześniej atlasem. Dla $[\cos\theta : \sin\theta]$, na małym przedziale z $\cos\theta \neq 0$, współrzędną afiniczną jest $\tan\theta$, o pochodnej $1/\cos^2\theta$. Gdy $\sin\theta \neq 0$, druga mapa daje $\cot\theta$, o pochodnej $-1/\sin^2\theta$. Pochodne nie znikają, więc przejścia i ich lokalne odwrotności są gładkie. Kąt jest zatem zgodną lokalną współrzędną. W lokalnych współrzędnych kątowych odwzorowanie ma więc postać $\theta \longmapsto 2\theta$, a jego lokalna odwrotność $\alpha \longmapsto \frac{\alpha}{2}$. Oba odwzorowania są gładkie, zatem $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ jako rozmaitości gładkie.

Dla $n = 2$ otrzymujemy $\mathbb{RP}^2 \cong S^2/\{x \sim -x\}$. Możemy ograniczyć się do domkniętej półsfery północnej. Każda para antypodalna spoza równika ma dokładnie jeden punkt w jej wnętrzu; na równiku oba punkty pary należą do półsfery. Ponieważ domknięta półsfera jest homeomorficzna z dyskiem $D^2$, otrzymujemy model $\mathbb{RP}^2 \cong D^2/\{x \sim -x \text{ dla } x \in \partial D^2\}$. Oznacza to, że punkty wewnętrzne dysku pozostają różne, natomiast każdy punkt brzegu utożsamiamy z punktem antypodalnym. Rzutowanie półsfery na $\mathbb{RP}^2$ jest ciągłą surjekcją i ma dokładnie te włókna. Wyznacza zatem ciągłą bijekcję z opisanego ilorazu dysku. Jej dziedzina jest zwarta, a $\mathbb{RP}^2$ jest przestrzenią Hausdorffa na mocy twierdzenia 1.6.8; jest więc homeomorfizmem.

Model ten daje również intuicję, dlaczego $\mathbb{RP}^2$ nie jest orientowalna. Wyobraźmy sobie małą strzałkę lub niewielką figurę asymetryczną przesuwaną po dysku. Gdy dochodzimy do brzegu, przechodzimy przez niego dzięki utożsamieniu z punktem leżącym po przeciwnej stronie okręgu. Po takim przejściu kierunek wzdłuż brzegu pozostaje zgodny, natomiast kierunek wskazujący do wnętrza dysku zostaje odwrócony.

Lokalnie można to zapisać schematycznie jako $(s,t) \longmapsto (s,-t)$, gdzie $s$ oznacza kierunek wzdłuż brzegu, a $t$ kierunek poprzeczny. Jedna z dwóch lokalnych współrzędnych zmienia więc zwrot. Po przejściu wzdłuż odpowiedniej zamkniętej drogi wracamy do punktu początkowego z odwróconą lokalną orientacją. Nie można zatem wybrać orientacji w sposób zgodny na całej przestrzeni.

Jest to geometryczna intuicja nieorientowalności $\mathbb{RP}^2$; formalny dowód podamy po wprowadzeniu pojęcia orientacji rozmaitości.




Rysunek 1.6: Dwa użyteczne modele przestrzeni rzutowych. Po lewej, $\mathbb{RP}^1$ otrzymujemy z okręgu $S^1$ przez utożsamienie par antypodalnych punktów. Po prawej, $\mathbb{RP}^2$ otrzymujemy z dysku $D^2$ przez utożsamienie antypodalnych punktów jego brzegu. Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku utożsamiamy punkty na całym okręgu, natomiast w drugim utożsamienie zachodzi tylko na brzegu dysku.

**Twierdzenie 1.6.8** (Przestrzenie rzutowe jako zwarte rozmaitości)**.** *Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ jest zwartą rozmaitością gładką wymiaru $n$, a $\mathbb{CP}^n$ jest zwartą rozmaitością zespoloną wymiaru $n$ (a więc zwartą rozmaitością rzeczywistą wymiaru $2n$).*

*Dowód.* Zaczniemy od zwartości. Niech

$$\pi_{\mathbb{R}} : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \qquad \pi_{\mathbb{R}}(x) = [x],$$

będzie rzutowaniem ilorazowym. Ograniczając je do sfery jednostkowej, otrzymujemy ciągłe odwzorowanie $q_{\mathbb{R}} : S^n \longrightarrow \mathbb{RP}^n$, $q_{\mathbb{R}}(x) = [x]$. Jest ono surjektywne. Istotnie, jeśli $[x] \in \mathbb{RP}^n$, to $x \neq 0$ i możemy znormalizować reprezentanta: $\widehat{x} := \frac{x}{\|x\|} \in S^n$. Ponieważ $\widehat{x}$ jest niezerową wielokrotnością $x$, mamy $[\widehat{x}] = [x]$. Każdy punkt $\mathbb{RP}^n$ należy więc do obrazu $q_{\mathbb{R}}$.

Sfera $S^n$ jest zwarta, a ciągły obraz przestrzeni zwartej jest zwarty. Ponieważ $q_{\mathbb{R}}(S^n) = \mathbb{RP}^n$, otrzymujemy, że $\mathbb{RP}^n$ jest zwarta.

Dokładnie ten sam argument działa w przypadku zespolonym. Niech

$$\pi_{\mathbb{C}} : \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{CP}^n, \qquad \pi_{\mathbb{C}}(z) = [z].$$

Po utożsamieniu $\mathbb{C}^{n+1} \cong \mathbb{R}^{2n+2}$ sfera jednostkowa ma postać $S^{2n+1} = \{z \in \mathbb{C}^{n+1} : \|z\| = 1\}$. Ograniczenie $q_{\mathbb{C}} : S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{CP}^n$, $q_{\mathbb{C}}(z) = [z]$, jest ciągłe i surjektywne, ponieważ dla każdego $[z] \in \mathbb{CP}^n$ wektor $\widehat{z} := \frac{z}{\|z\|}$ należy do $S^{2n+1}$ i reprezentuje tę samą klasę: $[\widehat{z}] = [z]$. Ponieważ $S^{2n+1}$ jest zwarta, jej ciągły obraz $q_{\mathbb{C}}(S^{2n+1}) = \mathbb{CP}^n$ jest zwarty. Zatem również $\mathbb{CP}^n$ jest zwarta.

Sprawdźmy teraz aksjomat Hausdorffa bez powoływania się na ogólne twierdzenie o ilorazach. Dla jednostkowych reprezentantów $x, y \in S^n$ dwóch klas rzeczywistych połóżmy $d_{\mathbb{R}}([x],[y]) = \min\{\|x-y\|, \|x+y\|\}$. Dla jednostkowych reprezentantów $z, w \in S^{2n+1}$ połóżmy $d_{\mathbb{C}}([z],[w]) = \min_{|\lambda|=1} \|z-\lambda w\|$. Oba wzory nie zależą od wyboru jednostkowych reprezentantów: w przypadku rzeczywistym zmiana $x$ na $-x$ jedynie zamienia miejscami dwie liczby występujące w minimum, natomiast w przypadku zespolonym zmiana reprezentanta przez czynnik o module 1 jedynie zmienia parametryzację zbioru, po którym bierzemy minimum. Minima istnieją dzięki zwartości grup $\{\pm 1\}$ i $S^1$.

Nierówność trójkąta sprawdzimy jednocześnie dla obu przypadków, pisząc $G = \{\pm 1\}$ lub $G = S^1$. Dla jednostkowych $x, y, z$ wybierzmy $\lambda, \mu \in G$ realizujące minima dla par $(x, y)$ i $(y, z)$. Ponieważ mnożenie przez $\lambda$ zachowuje normę,

$$\begin{aligned} d([x],[z]) &\leq \|x - \lambda\mu z\| \\ &\leq \|x - \lambda y\| + \|\lambda y - \lambda\mu z\| \\ &= d([x],[y]) + d([y],[z]). \end{aligned}$$

Symetria wynika z zastąpienia $\lambda$ przez $\lambda^{-1}$. Ponadto osiągane minimum jest równe zeru wtedy i tylko wtedy, gdy reprezentanty należą do tej samej orbity, czyli reprezentują ten sam punkt przestrzeni rzutowej. Otrzymujemy więc metryki na zbiorach klas.

Pozostaje sprawdzić, że topologie wyznaczone przez te metryki są topologiami ilorazowymi. Rzutowania

$$q_{\mathbb{R}} : S^n \to (\mathbb{RP}^n, d_{\mathbb{R}}), \qquad q_{\mathbb{C}} : S^{2n+1} \to (\mathbb{CP}^n, d_{\mathbb{C}})$$

są ciągłe, ponieważ odległość klas nie przekracza odległości ich wybranych reprezentantów. Aby przejść od sfer do pierwotnych ilorazów, używamy ciągłej normalizacji $\nu(v) = v/\|v\|$. Rzutowania $\pi_{\mathbb{R}}$ i $\pi_{\mathbb{C}}$ do przestrzeni klas z metryką są ciągłe, bo mają postać $q_{\mathbb{R}} \circ \nu$ i $q_{\mathbb{C}} \circ \nu$. Z definicji topologii ilorazowej wynika więc ciągłość identyczności z pierwotnego ilorazu do przestrzeni metrycznej. Z drugiej strony mamy już wykazaną zwartość $\mathbb{RP}^n$ i $\mathbb{CP}^n$ w ich topologiach ilorazowych. Identyczność z przestrzeni rzutowej wyposażonej w topologię ilorazową do tego samego zbioru klas wyposażonego w powyższą metrykę jest więc ciągłą bijekcją ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa. Jest zatem homeomorfizmem. W szczególności pierwotna topologia ilorazowa jest Hausdorffa.

Każda z przestrzeni rzutowych ma skończony atlas $U_0, \ldots, U_n$, którego obrazy są równe odpowiednio $\mathbb{R}^n$ lub $\mathbb{C}^n$. Wybierzmy w $\mathbb{R}^n$ oraz $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ przeliczalną bazę, na przykład złożoną z kul o wymiernych środkach i wymiernych promieniach. Przeciwobrazy tych baz przez skończenie wiele map atlasu tworzą przeliczalną bazę przestrzeni rzutowej.

Odwzorowania przejścia są ilorazami współrzędnych przez współrzędną niezerową, a więc są gładkie w przypadku rzeczywistym i holomorficzne w przypadku zespolonym. Otrzymujemy zatem strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru $n$ na $\mathbb{RP}^n$ oraz strukturę rozmaitości zespolonej wymiaru $n$ na $\mathbb{CP}^n$. Ponieważ $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$, $\mathbb{CP}^n$ ma jako rozmaitość rzeczywista wymiar $2n$. □

*Uwaga* 1.6.9. Zwartość można zobaczyć bardzo bezpośrednio: każde $\mathbb{RP}^n$ jest ilorazem sfery $S^n$ przez relację $x \sim -x$, a $\mathbb{CP}^n$ jest ilorazem sfery jednostkowej $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$ przez działanie grupy $S^1$, $z \sim e^{i\theta} z$. W przypadku zespolonym otrzymujemy w ten sposób słynną fibrację Hopfa $S^1 \longrightarrow S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{CP}^n$. Pełny opis tej konstrukcji wykracza poza zakres tego rozdziału, ale pokazuje, że przestrzenie rzutowe są naturalnie związane zarówno z ilorazami, jak i z teorią wiązek.

**Przykład 1.6.10** (Torus $T^n$)**.** Niech $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ z topologią ilorazową względem rzutowania kanonicznego $\pi\colon \mathbb{R}^n \to T^n$, $\pi(x) = x + \mathbb{Z}^n$. Pokażemy najpierw, że $\pi$ jest odwzorowaniem otwartym: dla zbioru otwartego $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $\pi^{-1}(\pi(\Omega)) = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}^n}(\Omega + k)$ jest sumą zbiorów otwartych, a więc otwarty; z definicji topologii ilorazowej oznacza to, że $\pi(\Omega)$ jest otwarty w $T^n$.

Sprawdźmy pozostałe warunki topologiczne. Jeśli $[x] \neq [y]$, to $\delta = \inf_{k\in\mathbb{Z}^n} \|x-y-k\| > 0$: w dowolnym ograniczonym zbiorze jest tylko skończenie wiele punktów kraty, a $x-y \notin \mathbb{Z}^n$. Otwarte otoczenia $\pi(B(x,\delta/3))$ i $\pi(B(y,\delta/3))$ są rozłączne. W przeciwnym razie istniałyby $u, v$ w tych kulach z $u-v=k\in\mathbb{Z}^n$, skąd $\|x-y-k\|<2\delta/3$, sprzeczność. Torus jest więc Hausdorffa. Obrazy przeliczalnej bazy kul w $\mathbb{R}^n$ stanowią bazę ilorazu: dla otwartego $O\subset T^n$ i $[x]\in O$ wybieramy kulę bazową $B$ z $x\in B\subset \pi^{-1}(O)$; wtedy $[x]\in\pi(B)\subset O$. To daje drugi aksjomat przeliczalności.

Niech $B(x,1/2)\subseteq\mathbb{R}^n$ będzie kulą otwartą o promieniu $1/2$. Dla $k\in\mathbb{Z}^n\setminus\{0\}$, zbiory $B(x,1/2)$ i $B(x+k,1/2)$ są rozłączne: gdyby $y$ należał do obu, to $\|y-x\|<1/2$ i $\|y-x-k\|<1/2$, skąd z nierówności trójkąta $\|k\|\le\|y-x\|+\|y-x-k\|<1$; ale $\|k\|\ge 1$ dla $k\in\mathbb{Z}^n\setminus\{0\}$ — sprzeczność. Zatem $\pi|_{B(x,1/2)}$ jest różnowartościowe, a więc — jako odwzorowanie ciągłe, otwarte i różnowartościowe na obraz — homeomorfizmem $B(x,1/2)\to\pi(B(x,1/2))$. Kładziemy $\varphi_x := (\pi|_{B(x,1/2)})^{-1}$; zbiory $\pi(B(x,1/2))$ dla $x\in\mathbb{R}^n$ pokrywają $T^n$.

Odwzorowania przejścia między takimi mapami są (lokalnie) postaci $y\mapsto y+k$ dla pewnego ustalonego $k\in\mathbb{Z}^n$ (bo dwa punkty z tym samym obrazem przy $\pi$ różnią się dokładnie o wektor z $\mathbb{Z}^n$, a $k$ jest lokalnie stałe z ciągłości) — a translacja jest odwzorowaniem gładkim z gładką odwrotną. Zatem otrzymana rodzina map jest atlasem, i $T^n$ jest rozmaitością gładką wymiaru $n$.

## 1.7 Przestrzeń styczna

W porównaniu trzech poniższych modeli zakładamy, że $M$ nie ma brzegu. Dla punktów brzegu przestrzeń styczną definiujemy przez derywacje lub współrzędne przedłużane poza półprzestrzeń, jak w Sekcji 1.3; model dwustronnych krzywych nie działa tam dosłownie.

Chcemy nadać sens pojęciu „wektora stycznego" do rozmaitości $M$ w punkcie $p$ — uogólnieniu intuicji wektora stycznego do powierzchni w $\mathbb{R}^3$, niezależnemu od zanurzenia $M$ w jakąkolwiek przestrzeń otaczającą. Istnieje kilka naturalnych, a priori różnych, sposobów sformalizowania tej intuicji; w tej sekcji podajemy trzy z nich i dowodzimy, że są one kanonicznie równoważne.

### Trzy definicje przestrzeni stycznej

Niech $M$ będzie rozmaitością gładką wymiaru $n$, $p\in M$.

**Definicja A (poprzez krzywe).** Niech $\Gamma_p$ oznacza zbiór gładkich krzywych $\gamma\colon(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$ (dla pewnego $\varepsilon>0$, zależnego od $\gamma$) z $\gamma(0)=p$. Mówimy, że $\gamma_1,\gamma_2\in\Gamma_p$ są *styczne w* $p$, $\gamma_1\sim\gamma_2$, jeśli dla pewnej (równoważnie: każdej) mapy dopuszczalnej $(U,\varphi)$ wokół $p$,


$$(\varphi\circ\gamma_1)'(0) = (\varphi\circ\gamma_2)'(0) \quad \text{w } \mathbb{R}^n.$$

**Fakt 1.7.1.** *Powyższy warunek nie zależy od wyboru mapy* $(U,\varphi)$.

*Dowód.* Jeśli $(V,\psi)$ jest inną mapą wokół $p$, to na wspólnej dziedzinie $\psi\circ\gamma_i = (\psi\circ\varphi^{-1})\circ(\varphi\circ\gamma_i)$ blisko $t=0$, więc z reguły łańcucha

$$(\psi\circ\gamma_i)'(0) = D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))\cdot(\varphi\circ\gamma_i)'(0), \qquad i=1,2.$$

Ponieważ $D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))$ jest tym samym przekształceniem liniowym dla $i=1$ i $i=2$, równość $(\varphi\circ\gamma_1)'(0)=(\varphi\circ\gamma_2)'(0)$ implikuje $(\psi\circ\gamma_1)'(0)=(\psi\circ\gamma_2)'(0)$, i na odwrót (bo $D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))$ jest odwracalne, jako różniczka dyfeomorfizmu). □




$$v = (\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0)$$

Rysunek 1.7: Dwie krzywe w $M$ przechodzą przez $p$ i mają ten sam kierunek styczny. W mapie $\varphi$ ich obrazy mają wspólną pochodną $v$ w $t = 0$.

Relacja $\sim$ jest relacją równoważności na $\Gamma_p$ (natychmiast z definicji, poprzez odpowiednie własności równości w $\mathbb{R}^n$). Definiujemy $T_p^A M := \Gamma_p/\!\sim$.

Aby wyposażyć $T_p^A M$ w strukturę przestrzeni wektorowej, ustalmy mapę $(U, \varphi)$ wokół $p$ i zdefiniujmy

$$\Theta_\varphi : T_p^A M \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad \Theta_\varphi([\gamma]) := (\varphi \circ \gamma)'(0).$$

Odwzorowanie to jest dobrze określone i bijektywne. Różnowartościowość wynika bezpośrednio z definicji relacji równoważności, natomiast surjektywność z faktu, że dla dowolnego $v \in \mathbb{R}^n$ krzywa $\gamma(t) = \varphi^{-1}(\varphi(p) + tv)$, określona dla dostatecznie małych $|t|$, spełnia $\gamma(0) = p$, $(\varphi \circ \gamma)'(0) = v$.

Za pomocą bijekcji $\Theta_\varphi$ przenosimy strukturę przestrzeni wektorowej z $\mathbb{R}^n$ na $T_p^A M$, definiując

$$[\gamma] + [\eta] := \Theta_\varphi^{-1}(\Theta_\varphi([\gamma]) + \Theta_\varphi([\eta]))$$

oraz

$$a[\gamma] := \Theta_\varphi^{-1}(a\,\Theta_\varphi([\gamma])), \qquad a \in \mathbb{R}.$$

W szczególności mnożenie przez skalar można reprezentować przez reparametryzację krzywej: $a[\gamma] = [t \mapsto \gamma(at)]$, ponieważ $(\varphi \circ \gamma(at))'_{t=0} = a(\varphi \circ \gamma)'(0)$. W ten sposób $\Theta_\varphi$ jest, z definicji, izomorfizmem liniowym $T_p^A M \cong \mathbb{R}^n$.

**Fakt 1.7.2.** *Struktura liniowa na $T_p^A M$ nie zależy od wyboru mapy $\varphi$.*

*Dowód.* Niech $(V, \psi)$ będzie inną mapą wokół $p$, $L := D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Z rachunku w poprzednim Fakcie, dla dowolnej krzywej $\gamma \in \Gamma_p$, $\Theta_\psi([\gamma]) = L(\Theta_\varphi([\gamma]))$, czyli $\Theta_\psi = L \circ \Theta_\varphi$. Ponieważ $L$ jest izomorfizmem *liniowym* (jako różniczka dyfeomorfizmu w punkcie), struktury liniowe przeniesione na $T_p^A M$ przez $\Theta_\varphi$ i przez $\Theta_\psi = L \circ \Theta_\varphi$ pokrywają się: liniowość $L$ gwarantuje, że dla dowolnych $[\gamma_1], [\gamma_2] \in T_p^A M$, $a, b \in \mathbb{R}$, kombinacja $a[\gamma_1] + b[\gamma_2]$ wyznaczona przez $\Theta_\varphi$ pokrywa się z kombinacją wyznaczoną przez $\Theta_\psi$. To kluczowa obserwacja: liniowość różniczki odwzorowania przejścia gwarantuje, że mimo iż $\Theta_\varphi \neq \Theta_\psi$, wyznaczona przez nie struktura wektorowa na $T_p^A M$ jest jedna i ta sama. □

**Definicja B (klasyczna, poprzez pary mapa-wektor).** Rozważmy zbiór trójek $(U, \varphi, v)$, gdzie $(U, \varphi)$ jest mapą dopuszczalną wokół $p$, a $v \in \mathbb{R}^n$. Mówimy, że $(U, \varphi, v) \sim (V, \psi, w)$, jeśli $w = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, v$.

**Fakt 1.7.3.** *Powyższa relacja jest relacją równoważności.*

*Dowód.* Zwrotność: dla $\psi = \varphi$, $D(\mathrm{id}) = \mathrm{id}$, więc $v = v$. Symetria: jeśli $w = D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))v$, to stosując regułę łańcucha do $\varphi \circ \psi^{-1} = (\psi \circ \varphi^{-1})^{-1}$ w punkcie $\psi(p)$, $D(\varphi\psi^{-1})(\psi(p)) = \left[D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))\right]^{-1}$, skąd $v = D(\varphi\psi^{-1})(\psi(p))w$. Przechodniość: jeśli $w = D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))v$ i

$u = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p))w$, to z reguły łańcucha zastosowanej do $\eta \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1})$ w punkcie $\varphi(p)$,

$$D(\eta\varphi^{-1})(\varphi(p)) = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p)) \cdot D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p)),$$

a więc $D(\eta\varphi^{-1})(\varphi(p))v = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p))w = u$, czyli $(U, \varphi, v) \sim (W, \eta, u)$. □

Definiujemy $T_p^B M$ jako zbiór klas równoważności $[U, \varphi, v]$. Strukturę przestrzeni wektorowej wprowadzamy wzorem $a[U, \varphi, v] + b[U, \varphi, v'] := [U, \varphi, av + bv']$. Definicja ta jest dobrze określona, to znaczy wynik nie zależy od wyboru reprezentantów klas. Istotnie, jeżeli przejdziemy do innej mapy $(V, \psi)$ zawierającej punkt $p$, to wektory $v, v' \in \mathbb{R}^n$ przechodzą odpowiednio w

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, v \qquad \text{oraz} \qquad D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, v'.$$

Z liniowości różniczki otrzymujemy

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(av + bv') = a\, D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))v + b\, D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))v',$$

a więc oba wybory reprezentantów prowadzą do tej samej klasy równoważności.

Ustalmy teraz mapę $(U, \varphi)$ wokół punktu $p$. Definiujemy odwzorowanie

$$\Phi_\varphi \colon T_p^A M \longrightarrow T_p^B M, \qquad \Phi_\varphi([\gamma]) = [U, \varphi, (\varphi \circ \gamma)'(0)].$$

Odwzorowanie to jest dobrze określone, ponieważ jeżeli $[\gamma] = [\eta]$ w $T_p^A M$, to z definicji relacji równoważności krzywych mamy $(\varphi \circ \gamma)'(0) = (\varphi \circ \eta)'(0)$, a zatem

$$[U, \varphi, (\varphi \circ \gamma)'(0)] = [U, \varphi, (\varphi \circ \eta)'(0)].$$

Żeby sprawdzić bijektywność, rozważmy odwzorowanie

$$j_\varphi \colon \mathbb{R}^n \longrightarrow T_p^B M, \qquad j_\varphi(v) = [U, \varphi, v].$$

Jest ono liniowe na mocy definicji działań. Jest też różnowartościowe: jeżeli $[U, \varphi, v] = [U, \varphi, w]$, to relacja równoważności w tej samej mapie daje $v = w$. Jest na, gdyż dla dowolnej klasy $[V, \psi, w]$ element $v = D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p))w$ spełnia $[V, \psi, w] = [U, \varphi, v]$. Ponieważ $\Theta_\varphi$ jest liniową bijekcją, mamy $\Phi_\varphi = j_\varphi \circ \Theta_\varphi$, a więc $\Phi_\varphi$ również jest liniową bijekcją. Zmiana mapy nie zmienia tego odwzorowania: dla $(V, \psi)$ reguła łańcucha i definicja relacji równoważności dają $j_\psi \circ \Theta_\psi = j_\varphi \circ \Theta_\varphi$. Otrzymujemy zatem kanoniczne utożsamienie $T_p^A M \cong T_p^B M$. Od tej chwili obie te przestrzenie będziemy oznaczać wspólnym symbolem $T_p^{\mathrm{geom}} M$.

**Definicja C (algebraiczna, poprzez derywacje).** Niech $C^\infty(M)$ oznacza przestrzeń funkcji gładkich $M \to \mathbb{R}$. *Derywacją w punkcie* $p$ nazywamy funkcjonał liniowy $v \colon C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ spełniający regułę Leibniza: $v(fg) = f(p)\, v(g) + g(p)\, v(f)$, $f, g \in C^\infty(M)$. Zbiór wszystkich derywacji w $p$ oznaczamy $T_p^C M$ — jest to podprzestrzeń liniowa przestrzeni funkcjonałów liniowych na $C^\infty(M)$ (suma i wielokrotność derywacji spełnia regułę Leibniza — sprawdzenie bezpośrednie).

W dalszej części skonstruujemy kanoniczny izomorfizm $T_p^{\mathrm{geom}} M \to T_p^C M$. Utożsamimy w ten sposób wszystkie trzy definicje i otrzymamy bazę przestrzeni stycznej złożoną z pochodnych cząstkowych.

## Lemat Hadamarda

Poniższy lemat analityczny jest podstawowym narzędziem technicznym tej sekcji.

**Lemat 1.7.4** (Lemat Hadamarda)**.** *Niech $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie zbiorem otwartym, gwiaździstym względem 0 (tzn. $tx \in \Omega$ dla wszystkich $x \in \Omega$, $t \in [0,1]$), i niech $f \in C^\infty(\Omega)$. Wówczas istnieją funkcje $g_1, \ldots, g_n \in C^\infty(\Omega)$ takie, że*

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^{n} x^i g_i(x), \qquad x \in \Omega,$$

*oraz $g_i(0) = \dfrac{\partial f}{\partial x^i}(0)$ dla każdego $i$.*

*Dowód.* Dla ustalonego $x \in \Omega$, funkcja $t \mapsto f(tx)$ jest dobrze określona i gładka na $[0,1]$ (bo $\Omega$ jest gwiaździsty względem 0), więc z twierdzenia podstawowego rachunku różniczkowego,

$$f(x) - f(0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(tx)\, dt = \int_0^1 \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)\, x^i\, dt = \sum_{i=1}^{n} x^i \underbrace{\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)\, dt}_{=:g_i(x)}.$$

Funkcje $g_i(x) := \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)\, dt$ są gładkie na $\Omega$ (różniczkowanie pod znakiem całki, dopuszczalne, gdyż funkcja podcałkowa zależy gładko od $(t,x)$), oraz $g_i(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(0)\, dt = \frac{\partial f}{\partial x^i}(0)$, co kończy dowód. □

## Od krzywych do derywacji

Zdefiniujmy odwzorowanie $\Phi\colon T_p^A M \to T_p^C M$ wzorem $\Phi([\gamma])(f) := (f \circ \gamma)'(0),\ f \in C^\infty(M)$.

**Fakt 1.7.5.** *$\Phi$ jest dobrze określone (niezależne od wyboru reprezentanta $\gamma$), a $\Phi([\gamma])$ jest derywacją w $p$ dla każdego $[\gamma] \in T_p^A M$.*

*Dowód.* Niezależność od reprezentanta: jeśli $\gamma_1 \sim \gamma_2$, to pisząc $f \circ \gamma_i = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma_i)$ dla mapy $(U, \varphi)$ wokół $p$,

$$(f \circ \gamma_i)'(0) = D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \cdot (\varphi \circ \gamma_i)'(0),$$

a prawa strona zależy od $\gamma_i$ jedynie poprzez $(\varphi \circ \gamma_i)'(0)$, które z założenia $\gamma_1 \sim \gamma_2$ jest tym samym wektorem dla $i = 1, 2$. Liniowość $\Phi([\gamma])$ względem $f$ wynika z liniowości pochodnej $(\cdot)'(0)$ oraz liniowości $D(f \circ \varphi^{-1})$ względem $f$. Reguła Leibniza: $\big((fg) \circ \gamma\big)'(0) = \big((f \circ \gamma)(g \circ \gamma)\big)'(0) = (f \circ \gamma)'(0)\, g(p) + f(p)\, (g \circ \gamma)'(0) = \Phi([\gamma])(f)\, g(p) + f(p)\, \Phi([\gamma])(g)$, na mocy zwykłej reguły Leibniza dla pochodnej iloczynu funkcji jednej zmiennej $t \mapsto f(\gamma(t))g(\gamma(t))$. □

Odwzorowanie $\Phi\colon T_p^A M \to T_p^C M$ jest liniowe względem struktury wektorowej na $T_p^A M$ zdefiniowanej za pomocą izomorfizmu $\Theta_\varphi\colon T_p^A M \to \mathbb{R}^n$. Istotnie, jeśli $v = \Theta_\varphi([\gamma]),\ w = \Theta_\varphi([\eta])$, to dla $a, b \in \mathbb{R}$ mamy $\Theta_\varphi(a[\gamma] + b[\eta]) = av + bw$. Dla dowolnego $f \in C^\infty(M)$ otrzymujemy zatem

$$\begin{aligned}
\Phi(a[\gamma] + b[\eta])(f) &= D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(av + bw) \\
&= a\, D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(v) + b\, D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(w) \\
&= a\, \Phi([\gamma])(f) + b\, \Phi([\eta])(f).
\end{aligned}$$

Stąd $\Phi$ jest odwzorowaniem liniowym.

Pokażemy teraz, że $\Phi$ jest izomorfizmem. Kluczowym krokiem będzie zastosowanie Lematu Hadamarda, które wyjaśni również, dlaczego pochodne cząstkowe


$$\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p, \ldots, \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p$$

tworzą bazę $T_p^C M$.


Będziemy używać gładkiej *funkcji odcinającej* $\mu\colon \mathbb{R}^n \to [0,1]$ (ang. *bump function*), równej 1 na $\overline{B(0,1)}$ i 0 poza $B(0,2)$. Zbudujmy ją jawnie. Niech $h(t) = e^{-1/t}$ dla $t > 0$, a $h(t) = 0$ dla $t \le 0$. Wszystkie pochodne $h$ po prawej stronie zera są sumami wyrazów postaci $t^{-m}e^{-1/t}$, które dążą do zera przy $t \downarrow 0$; po lewej stronie wszystkie pochodne wynoszą zero. Funkcja $h$ jest więc gładka także w zerze. Kładziemy

$$\theta(t) := \frac{h(t)}{h(t) + h(1-t)}, \qquad \mu(x) := \theta\left(\frac{4 - \|x\|^2}{3}\right).$$

Mianownik $\theta$ nigdzie nie znika: dla $t \le 0$ dodatni jest $h(1-t)$, dla $t \ge 1$ dodatni jest $h(t)$, a pomiędzy nimi dodatnie są oba. Mamy $\theta(t) = 0$ dla $t \le 0$ i $\theta(t) = 1$ dla $t \ge 1$. Jeśli $\|x\| \le 1$, argument $\theta$ jest co najmniej 1; jeśli $\|x\| \ge 2$, jest nie większy od zera. Cała konstrukcja jest gładka, bo $\|x\|^2$ jest wielomianem współrzędnych.




Rysunek 1.8: Wybór mapy $(U, \varphi)$ wokół punktu $p$: $U \subseteq W$, $\varphi(p) = 0$ oraz $\overline{B(0,2)} \subseteq \varphi(U)$.




Rysunek 1.9: Jednowymiarowy przekrój funkcji odcinającej $\mu$. Funkcja jest równa 1 dla $|t| \le 1$, płynnie maleje dla $1 < |t| < 2$ i znika dla $|t| \ge 2$.

**Lemat 1.7.6** (Lokalność derywacji)**.** *Niech $v \in T_p^C M$ będzie derywacją w $p$. Jeśli $h \in C^\infty(M)$ znika na pewnym otoczeniu punktu $p$, to $v(h) = 0$. W szczególności, jeśli $f, g \in C^\infty(M)$ pokrywają się na pewnym otoczeniu $p$, to $v(f) = v(g)$; wartość $v(f)$ zależy więc jedynie od zachowania $f$ w dowolnie małym otoczeniu $p$.*

*Dowód.* Z reguły Leibniza zastosowanej do $f = g = \mathbf{1}$ (funkcji stałej równej 1), $v(\mathbf{1}) = v(\mathbf{1}\cdot\mathbf{1}) = 2v(\mathbf{1})$, skąd $v(\mathbf{1}) = 0$; z liniowości, $v(c) = 0$ dla każdej funkcji stałej $c$.

Niech $h \equiv 0$ na otoczeniu otwartym $W \ni p$. Wybierzmy mapę $(U, \varphi)$ wokół $p$ z $U \subseteq W$, $\varphi(p) = 0$, oraz (po przeskalowaniu) $\overline{B(0,2)} \subseteq \varphi(U)$. Zdefiniujmy $\tilde\mu\colon M \to \mathbb{R}$: $\tilde\mu(q) := \mu(\varphi(q))$ dla $q \in U$, oraz $\tilde\mu(q) := 0$ dla $q \notin U$. Nośnik jest zawarty w zwartym zbiorze $K = \varphi^{-1}(\overline{B(0,2)}) \subset U$. Ponieważ $M$ jest Hausdorffa, $K$ jest domknięty w $M$. Na otwartym pokryciu $U, M \setminus K$ obie gładkie definicje pokrywają się, więc $\tilde\mu \in C^\infty(M)$, równa 1 na otoczeniu $p$ i znikająca poza $U \subseteq W$. Wówczas $\tilde\mu \cdot h \equiv 0$ na całym $M$, więc $v(\tilde\mu h) = 0$. Z reguły Leibniza, $0 = v(\tilde\mu h) = \tilde\mu(p)v(h) + h(p)v(\tilde\mu) = v(h)$ (bo $\tilde\mu(p) = 1$, $h(p) = 0$). Zatem $v(h) = 0$. Ostatnia część lematu wynika z zastosowania powyższego do $h := f - g$. □

**Twierdzenie 1.7.7.** *Niech $(U,\varphi)$ będzie mapą dopuszczalną wokół $p$, $\varphi=(x^1,\dots,x^n)$, gdzie $x^i=\pi_i\circ\varphi\colon U\to\mathbb{R}$ są funkcjami współrzędnymi, czyli dla każdego $q\in U$ zachodzi $\varphi(q)=(x^1(q),\dots,x^n(q))$, oraz załóżmy, że $\varphi(p)=0$. Wówczas:*

*(a) Odwzorowanie $\Phi\colon T_p^AM\to T_p^CM$ jest izomorfizmem liniowym.*

*(b) Elementy $\frac{\partial}{\partial x^1}\big|_p,\dots,\frac{\partial}{\partial x^n}\big|_p\in T_p^CM$, zdefiniowane przez $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p(f):=\frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p))$, stanowią bazę $T_p^CM$. W szczególności $\dim T_pM=n$.*

*Dowód. (a), injektywność.* Załóżmy $\Phi([\gamma])=0$, tzn. $(f\circ\gamma)'(0)=0$ dla wszystkich $f\in C^\infty(M)$. Wybierzmy funkcję odcinającą $\tilde\mu$ o zwartym nośniku zawartym w $U$, równą 1 blisko $p$, jak w dowodzie Lematu 1.7.6. Dla $i=1,\dots,n$ niech $\tilde x^i:=\tilde\mu\,x^i=\tilde\mu\,\varphi^i$ na $U$ (rozszerzone przez 0 poza $U$) — funkcja gładka na $M$, pokrywająca się z $\varphi^i$ na otoczeniu $p$. Z założenia, $0=\Phi([\gamma])(\tilde x^i)=(\tilde x^i\circ\gamma)'(0)$; blisko $t=0$, $\gamma(t)\in U$ i tam $\tilde x^i\circ\gamma=\varphi^i\circ\gamma$, więc $(\varphi^i\circ\gamma)'(0)=0$ dla każdego $i$, czyli $(\varphi\circ\gamma)'(0)=0\in\mathbb{R}^n$. Oznacza to $\gamma\sim\gamma_{\text{stała}}$ (gdzie $\gamma_{\text{stała}}(t)\equiv p$), czyli $[\gamma]=0$ w $T_p^AM$. Zatem $\ker\Phi=\{0\}$.

*(a), surjektywność — Lemat Hadamarda.* Niech $v\in T_p^CM$. Bez straty ogólności $\varphi(U)$ jest kulą (gwiaździstą względem 0). Niech $\tilde f:=f\circ\varphi^{-1}\in C^\infty(\varphi(U))$; z Lematu 1.7.4 istnieją $g_1,\dots,g_n$ z

$$\tilde f(x)=\tilde f(0)+\sum_i x^i g_i(x),\qquad g_i(0)=\frac{\partial\tilde f}{\partial x^i}(0)=\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p(f).$$

Podstawiając $x=\varphi(q)$: $f(q)=f(p)+\sum_i\varphi^i(q)\,g_i(\varphi(q))$ dla $q$ blisko $p$. Niech $\widetilde{\varphi^i}$, $\tilde g_i$ oznaczają (jak wyżej) rozszerzenia $\varphi^i$ oraz $g_i\circ\varphi$ do funkcji gładkich na $M$, pokrywające się z oryginałami na otoczeniu $p$. Funkcja $F:=f(p)\cdot\mathbf{1}+\sum_i\widetilde{\varphi^i}\,\tilde g_i$ pokrywa się z $f$ na otoczeniu $p$, więc $v(f)=v(F)$ (Lemat 1.7.6). Z liniowości $v$, reguły Leibniza (korzystając z $\widetilde{\varphi^i}(p)=0$, $v(\mathbf{1})=0$):


$$v(f)=v(F)=\sum_i\Big(\widetilde{\varphi^i}(p)\,v(\tilde g_i)+\tilde g_i(p)\,v(\widetilde{\varphi^i})\Big)=\sum_i g_i(0)\,v(\widetilde{\varphi^i})=\sum_{i=1}^n v(\widetilde{\varphi^i})\cdot\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p(f).$$

Kładąc $c_i:=v(\widetilde{\varphi^i})\in\mathbb{R}$, mamy $v=\sum_i c_i\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ jako funkcjonały. Niech $\gamma(t):=\varphi^{-1}(t\cdot(c_1,\dots,c_n))$; wtedy $\Phi([\gamma])(f)=(f\circ\gamma)'(0)=D(f\circ\varphi^{-1})(0)\cdot(c_1,\dots,c_n)=\sum_i c_i\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p(f)=v(f)$ dla każdego $f$, czyli $\Phi([\gamma])=v$. To dowodzi surjektywności, a wraz z liniowością i injektywnością — części (a).

*(b).* Powyższy rachunek pokazał, że każdy $v\in T_p^CM$ jest kombinacją liniową $\sum_i c_i\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ — więc baza ta rozpina $T_p^CM$. Niezależność liniowa: załóżmy $\sum_i c_i\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p=0$. Stosując obie strony do $\widetilde{\varphi^j}$ i korzystając z $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p(\widetilde{\varphi^j})=\frac{\partial x^j}{\partial x^i}(0)=\delta_i^j$, otrzymujemy $0=\sum_i c_i\delta_i^j=c_j$ dla każdego $j$. Zatem $\{\partial/\partial x^i|_p\}$ jest bazą $T_p^CM$; w szczególności $\dim T_p^CM=n$. □

**Wniosek 1.7.8.** *Definicje A, B i C przestrzeni stycznej są kanonicznie izomorficzne. Piszemy odtąd po prostu $T_pM$ i mówimy o* przestrzeni stycznej do $M$ w punkcie $p$ *— jest to $n$-wymiarowa przestrzeń wektorowa. W mapie $(U,\varphi)$, gdzie $\varphi=(x^1,\dots,x^n)$, jej* bazą współrzędnościową *są wektory*

$$\frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_p,\ \dots,\ \frac{\partial}{\partial x^n}\Big|_p.$$




Rysunek 1.10: Przestrzeń styczna: zielony równoległobok przedstawia afiniczną płaszczyznę $p + T_pM$ przy zanurzonej powierzchni $M$. Czerwona krzywa $\gamma$ leży na $M$, a wektor $v = \gamma'(0)$ leży w płaszczyźnie stycznej. Siatka powierzchni odchyla się od tej płaszczyzny poza punktem $p$.

### Zmiana współrzędnych wektora stycznego

**Fakt 1.7.9.** *Niech $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ będą mapami wokół $p \in M$, a $[\gamma] \in T_pM$, gdzie $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$, $\gamma(0) = p$. Współrzędne wektora $[\gamma]$ w mapie $\varphi$ są dane przez $[\gamma]_\varphi := (\varphi \circ \gamma)'(0) \in \mathbb{R}^n$, a w mapie $\psi$ przez $[\gamma]_\psi := (\psi \circ \gamma)'(0)$. Wtedy*

$$\boxed{[\gamma]_\psi = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\,[\gamma]_\varphi.}$$

*Dowód.* Ponieważ $\psi \circ \gamma = (\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma)$, z reguły łańcuchowej otrzymujemy

$$(\psi \circ \gamma)'(0) = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\,(\varphi \circ \gamma)'(0),$$

czyli dokładnie

$$[\gamma]_\psi = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\,[\gamma]_\varphi.$$

□

Jak pokaże następna sekcja, jedną z najbardziej użytecznych definicji przestrzeni stycznej jest konstrukcja za pomocą derywacji. Podamy zatem regułę transformacji wektorów stycznych również w tym ujęciu.

**Fakt 1.7.10** (Transformacja derywacji współrzędnych)**.** *Niech $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ będą mapami rozmaitości $M$ wokół punktu $p \in U \cap V$, przy czym $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, $\psi = (y^1, \dots, y^n)$. Niech*

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p \right\}_{i=1}^n, \qquad \left\{ \frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_p \right\}_{j=1}^n$$

*oznaczają odpowiadające tym mapom bazy przestrzeni stycznej $T_pM$, zdefiniowane za pomocą derywacji.*

*Wówczas zachodzi* reguła transformacji derywacji współrzędnych*:*

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\, \frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_p, \qquad i = 1, \dots, n,} \tag{1.7.1}$$

*gdzie*

$$\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) := \frac{\partial (y^j \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i}\bigg|_{u=\varphi(p)},$$

*a* $u^1, \ldots, u^n$ *oznaczają standardowe współrzędne w* $\mathbb{R}^n$.

*Współczynniki te są elementami macierzy Jacobiego odwzorowania przejścia:*

$$\boxed{J_{\psi\varphi}(p) := D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) = \left[\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\right]_{j,i=1}^{n}.}$$

*Dowód.* Przypomnijmy, że dla dowolnej funkcji $f$ gładkiej w otoczeniu punktu $p$ derywacje współrzędnych są określone wzorami

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (f) = \left.\frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i}\right|_{u=\varphi(p)}$$

oraz

$$\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p (f) = \left.\frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial v^j}\right|_{v=\psi(p)},$$

gdzie $u^i$ i $v^j$ są standardowymi współrzędnymi w $\mathbb{R}^n$.

Rozważmy odwzorowanie przejścia

$$F := \psi \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V).$$

Ponieważ $\psi = (y^1, \ldots, y^n)$, jego funkcje współrzędne mają postać $F^j = y^j \circ \varphi^{-1},\ j = 1, \ldots, n$. W szczególności, przy oznaczeniach $u := \varphi(p),\ v := \psi(p) = F(u)$, otrzymujemy

$$DF(u) = \left[\frac{\partial F^j}{\partial u^i}(u)\right]_{j,i=1}^{n} = \left[\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\right]_{j,i=1}^{n} = J_{\psi\varphi}(p).$$

Zauważmy teraz, że w otoczeniu punktu $u$ możemy wstawić identyczność $\psi^{-1} \circ \psi$ i zapisać

$$f \circ \varphi^{-1} = f \circ \psi^{-1} \circ \psi \circ \varphi^{-1} = (f \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1}) = (f \circ \psi^{-1}) \circ F.$$

Stosując regułę łańcuchową, otrzymujemy

$$\boxed{D(f \circ \varphi^{-1})(u) = D(f \circ \psi^{-1})(v)\, DF(u).}$$

Rozpiszmy tę równość w postaci macierzowej:

$$\underbrace{\left(\frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^1}(u) \quad \cdots \quad \frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^n}(u)\right)}_{1\times n}$$

$$= \underbrace{\left(\frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial v^1}(v) \quad \cdots \quad \frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial v^n}(v)\right)}_{1\times n} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial y^1}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial y^1}{\partial x^n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y^n}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial y^n}{\partial x^n} \end{pmatrix}_p}_{n\times n}.$$

Korzystając z definicji derywacji współrzędnych, możemy tę samą równość zapisać krócej:

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p (f) \quad \cdots \quad \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p (f)\right) = \left(\left.\frac{\partial}{\partial y^1}\right|_p (f) \quad \cdots \quad \left.\frac{\partial}{\partial y^n}\right|_p (f)\right) J_{\psi\varphi}(p).$$

Porównując $i$-te współrzędne obu stron, dostajemy

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (f) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p (f).$$

Ponieważ równość ta zachodzi dla każdej funkcji $f$ gładkiej w otoczeniu $p$, obie strony wyznaczają tę samą derywację w punkcie $p$. Otrzymujemy zatem wzór (1.7.1). □

Zauważmy, że macierz Jacobiego $J_{\psi\varphi}(p) = D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))$ jest dokładnie macierzą współczynników występujących w regule transformacji derywacji (1.7.1). W zapisie macierzowym reguła ta przyjmuje postać

$$\boxed{\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p \quad \cdots \quad \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p\right) = \left(\left.\frac{\partial}{\partial y^1}\right|_p \quad \cdots \quad \left.\frac{\partial}{\partial y^n}\right|_p\right) J_{\psi\varphi}(p).}$$

W szczególności, jeżeli wektor styczny $X \in T_pM$ ma w obu bazach przedstawienia

$$X = \sum_{i=1}^{n} X^i_\varphi \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \sum_{j=1}^{n} X^j_\psi \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p,$$

to jego kolumny współrzędnych spełniają

$$\boxed{\begin{pmatrix} X^1_\psi \\ \vdots \\ X^n_\psi \end{pmatrix} = D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p)) \begin{pmatrix} X^1_\varphi \\ \vdots \\ X^n_\varphi \end{pmatrix}.}$$

Zatem różniczka odwzorowania przejścia $\psi\circ\varphi^{-1}$ opisuje zarówno transformację baz przestrzeni stycznej, jak i transformację współrzędnych wektorów stycznych.

**Przykład 1.7.11** (Zmiana współrzędnych wektora stycznego na $\mathbb{RP}^2$)**.** Wróćmy do map z przykładu 1.6.6: punkt $[1 : u : v]$, gdzie $u \neq 0$, ma w drugiej mapie współrzędne $(a, b) = (1/u, v/u)$. Zastosujemy do tego przejścia właśnie udowodnioną regułę zmiany współrzędnych wektora stycznego.

Odwzorowanie $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}$ opisuje zmianę *współrzędnych punktów* rozmaitości. Jego różniczka opisuje natomiast odpowiadającą jej zmianę *współrzędnych wektorów stycznych*.

Niech $p \in U_0 \cap U_1$ oraz $\varphi_0(p) = (u, v)$. Mapy $\varphi_0$ i $\varphi_1$ wyznaczają dwie bazy przestrzeni stycznej $T_p\mathbb{RP}^2$:

$$\left\{\left.\frac{\partial}{\partial u}\right|_p, \left.\frac{\partial}{\partial v}\right|_p\right\}, \qquad \left\{\left.\frac{\partial}{\partial a}\right|_p, \left.\frac{\partial}{\partial b}\right|_p\right\}.$$

Jeżeli wektor $X \in T_p\mathbb{RP}^2$ ma w bazie indukowanej przez $\varphi_0$ współrzędne

$$X = \dot{u} \left.\frac{\partial}{\partial u}\right|_p + \dot{v} \left.\frac{\partial}{\partial v}\right|_p,$$

to jego współrzędne w bazie indukowanej przez $\varphi_1$ otrzymujemy, stosując różniczkę odwzorowania przejścia:

$$\begin{pmatrix} \dot{a} \\ \dot{b} \end{pmatrix} = D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u, v) \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix}.$$

A zatem

$$\dot{a} = -\frac{\dot{u}}{u^2}, \qquad \dot{b} = -\frac{v\dot{u}}{u^2} + \frac{\dot{v}}{u}.$$

Ten sam wektor styczny możemy więc zapisać jako

$$X = \dot{u}\,\frac{\partial}{\partial u}\Big|_p + \dot{v}\,\frac{\partial}{\partial v}\Big|_p = \dot{a}\,\frac{\partial}{\partial a}\Big|_p + \dot{b}\,\frac{\partial}{\partial b}\Big|_p .$$

Innymi słowy, odwzorowanie przejścia $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}$ zmienia współrzędne punktu na rozmaitości, natomiast jego różniczka $d(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})_{\varphi_0(p)}$ zmienia reprezentację współrzędnościową tego samego wektora $X \in T_p\mathbb{RP}^2$ względem baz przestrzeni stycznej indukowanych przez obie mapy.

### Przestrzeń styczna w punkcie brzegu

Niech teraz $p \in \partial M$. *Kiełek* funkcji gładkiej w $p$ to jej klasa względem równości w pewnym otoczeniu punktu $p$ otwartym w $M$; funkcje są tu gładkie w sensie przedłużalności z półprzestrzeni. Ich algebra to $C^\infty_p(M)$. Definiujemy $T_pM$ jako przestrzeń $\mathbb{R}$-liniowych derywacji $D : C^\infty_p(M) \to \mathbb{R}$ spełniających $D(fg) = f(p)D(g) + g(p)D(f)$. Wartość kiełka w $p$ jest dobrze określona. To lokalna wersja Definicji C, która nie wymaga krzywej przechodzącej przez $p$ w obu kierunkach czasu.

Użycie kiełków jest tutaj istotne. Gładkie przedłużenie funkcji $f$ poza brzeg, do otoczenia $\varphi(p)$ w $\mathbb{R}^n$, nie jest jednoznaczne i stanowi jedynie pomocnicze narzędzie służące do zdefiniowania gładkości. Przestrzeń styczna powinna natomiast zależeć wyłącznie od lokalnego zachowania funkcji na samej rozmaitości $M$, a nie od arbitralnego wyboru jej wartości poza $M$.

Dokładniej, dwa różne gładkie przedłużenia $\widetilde{f}_1, \widetilde{f}_2$ mogą być różnymi funkcjami na otoczeniu $\varphi(p)$ w $\mathbb{R}^n$, mimo że ich ograniczenia do $\mathbb{H}^n$ wyznaczają tę samą funkcję na $M$. Nie chcemy więc traktować samych przedłużeń jako obiektów, na których działa derywacja. Obiektem właściwym jest kiełek funkcji na $M$, natomiast przedłużenie wybieramy dopiero wtedy, gdy chcemy wykonać rachunek we współrzędnych.

Co więcej, derywacja w punkcie $p$ jest obiektem lokalnym: jej wartość na funkcji zależy jedynie od zachowania tej funkcji w dowolnie małym otoczeniu $p$. Dlatego naturalną dziedziną derywacji jest algebra kiełków $C^\infty_p(M)$.

**Stwierdzenie 1.7.12** (Pełny wymiar przestrzeni stycznej przy brzegu)**.** *W mapie półprzestrzennej $\varphi$ z $\varphi(p) = 0$ każda taka derywacja ma jednoznaczną postać*

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i \widetilde{f}(0), \qquad v \in \mathbb{R}^n,$$

*gdzie $\widetilde{f}$ jest dowolnym gładkim przedłużeniem $f\circ\varphi^{-1}$ na otoczenie zera w $\mathbb{R}^n$. Wzór nie zależy od wyboru przedłużenia. Przy zmianie mapy współrzędne $v$ zmieniają się przez odwracalną macierz Jacobiego przejścia. W szczególności $\dim T_pM = n$, a inkluzja brzegu identyfikuje $T_p\partial M$ z podprzestrzenią $v^n = 0$.*

*Dowód.* Najpierw sprawdźmy, że prawa strona wzoru nie zależy od wyboru przedłużenia $\widetilde{f}$. Jeżeli $\widetilde{f}_1$ i $\widetilde{f}_2$ są dwoma gładkimi przedłużeniami reprezentującymi ten sam kiełek funkcji $f \circ \varphi^{-1}$, to ich różnica znika na pewnej małej półkuli $B_\varepsilon(0) \cap \mathbb{H}^n$. Na jej części wewnętrznej, gdzie $x^n > 0$, znikają więc wszystkie pierwsze pochodne tej różnicy, a przez ciągłość znikają one również w punkcie 0. W konsekwencji

$$\partial_i \widetilde{f}_1(0) = \partial_i \widetilde{f}_2(0), \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Zatem dla każdego $v \in \mathbb{R}^n$ wzór

$$D_v(f) := \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i \widetilde{f}(0)$$

jest dobrze określony na kiełkach. Jest on liniowy i spełnia regułę Leibniza, a więc definiuje derywację w punkcie $p$.

Pokażmy teraz odwrotnie, że każda derywacja $D$ ma taką postać. Najpierw $D(1) = D(1 \cdot 1) = 2D(1)$, zatem $D(1) = 0$, a przez liniowość $D$ znika na wszystkich funkcjach stałych.

Wybierzmy gładkie przedłużenie $\widetilde{f}$ funkcji $f \circ \varphi^{-1}$ na małą kulę wokół zera. Lemat Hadamarda daje

$$\widetilde{f}(x) = \widetilde{f}(0) + \sum_{i=1}^{n} x^i g_i(x), \qquad g_i(0) = \partial_i \widetilde{f}(0).$$

Po ograniczeniu do półkuli otrzymujemy równość funkcji reprezentujących kiełki w 0, a więc

$$[f \circ \varphi^{-1}]_0 = \widetilde{f}(0)[1]_0 + \sum_{i=1}^{n} [x^i]_0 [g_i]_0.$$

Niech również $x^i = \pi_i \circ \varphi$ oznacza $i$-tą funkcję współrzędną na $U$. Stosując derywację $D$ do powyższej równości kiełków oraz korzystając z $D(1) = 0$ i $x^i(p) = 0$, otrzymujemy

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} D(x^i)\, g_i(0).$$

Ponieważ $g_i(0) = \partial_i \widetilde{f}(0)$, mamy

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} D(x^i)\, \partial_i \widetilde{f}(0).$$

Definiując $v^i := D(x^i),\ i = 1, \ldots, n$, otrzymujemy żądaną postać

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i \widetilde{f}(0).$$

Współczynniki $v^i$ są jednoznaczne. Istotnie, stosując powyższy wzór do funkcji współrzędnej $x^j$, otrzymujemy

$$D(x^j) = \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i x^j(0) = \sum_{i=1}^{n} v^i \delta_i^j = v^j.$$

Rozważmy dwie mapy półprzestrzenne $\varphi$ i $\psi$. Odwzorowania przejścia $\varphi \circ \psi^{-1}$ oraz $\psi \circ \varphi^{-1}$ są wzajemnie odwrotne. Na punktach odpowiadających wnętrzu $M$ mamy zatem $(\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}) = \mathrm{id}$ oraz

$$(\varphi \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1}) = \mathrm{id}\,.$$

Stosując regułę łańcuchową do gładkich przedłużeń odwzorowań przejścia, otrzymujemy na punktach wnętrza

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(q))\, D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(q)) = I.$$

Przechodząc z $q \in \operatorname{int} M$ do $p \in \partial M$ i korzystając z ciągłości różniczek, otrzymujemy

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p)) = I.$$

Analogicznie iloczyn w odwrotnej kolejności jest równy $I$. Zatem macierze Jacobiego odwzorowań przejścia w punkcie brzegowym są wzajemnie odwrotne.

Wreszcie ograniczenie mapy $\varphi$ do brzegu ma współrzędne $(x^1, \ldots, x^{n-1})$. Różniczka inkluzji $\partial M \hookrightarrow M$ dodaje zerową ostatnią współrzędną, a zatem identyfikuje $T_p \partial M$ z podprzestrzenią $\{v \in \mathbb{R}^n : v^n = 0\} \subset T_p M$. □

Można też użyć derywacji funkcji globalnych: lokalność dowodzimy jak wcześniej, a każdy kiełek ma globalnego reprezentanta po pomnożeniu przez funkcję odcinającą równą 1 blisko $p$, o nośniku zawartym w dziedzinie reprezentanta, i przedłużeniu przez zero. Taką funkcję otrzymujemy przez ograniczenie euklidesowej funkcji odcinającej do półprzestrzeni.

Natomiast model przestrzeni stycznej za pomocą dwustronnych krzywych nie daje przy brzegu całej przestrzeni $T_pM$. Istotnie, niech

$$\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M, \qquad \gamma(0) = p \in \partial M,$$

i wybierzmy mapę półprzestrzenną $\varphi$ taką, że $\varphi(p) = 0$ oraz $\varphi(U) \subset \mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}$. Ponieważ $\gamma(t) \in M$, dla dostatecznie małych $t$ mamy $(x^n \circ \gamma)(t) \geq 0$, $(x^n \circ \gamma)(0) = 0$. Funkcja $x^n \circ \gamma$ ma więc w $t = 0$ minimum lokalne, a zatem $(x^n \circ \gamma)'(0) = 0$. W konsekwencji prędkość krzywej w mapie ma postać $(\varphi \circ \gamma)'(0) = (v^1, \ldots, v^{n-1}, 0)$, czyli należy do podprzestrzeni odpowiadającej $T_p\partial M$.

Odwrotnie, każdy wektor $v = (v^1, \ldots, v^{n-1}, 0) \in T_p\partial M$ jest realizowany przez dwustronną krzywą $\gamma(t) = \varphi^{-1}(tv^1, \ldots, tv^{n-1}, 0)$ dla dostatecznie małych $|t|$. Dwustronne krzywe przechodzące przez punkt brzegowy opisują więc dokładnie $T_p\partial M$, a nie pełną przestrzeń $T_pM \simeq \mathbb{R}^n$. W szczególności nie mogą realizować wektorów o niezerowej składowej normalnej $v^n$. To wyjaśnia, dlaczego w punkcie brzegu model dwustronnych krzywych nie może służyć jako definicja pełnej przestrzeni stycznej.

## 1.8 Przestrzeń kostyczna

**Definicja 1.8.1.** *Przestrzenią kostyczną* do $M$ w punkcie $p$ nazywamy przestrzeń dualną $T_p^*M := (T_pM)^*$, tzn. przestrzeń funkcjonałów liniowych $T_pM \to \mathbb{R}$. Jej elementy nazywamy *kowektorami* w $p$.

Dla $f \in C^\infty(M)$ definiujemy *różniczkę* $f$ w punkcie $p$, $df_p \in T_p^*M$, wzorem $df_p(v) := v(f)$, $v \in T_pM$ (korzystając z utożsamienia $T_pM = T_p^CM$ — wektor styczny $v$ jest derywacją, a $v(f) \in \mathbb{R}$ jest dobrze określoną liczbą). Odwzorowanie $df_p$ jest liniowe względem $v$ (z definicji przestrzeni wektorowej derywacji), a więc istotnie $df_p \in T_p^*M$.

Niech $(U, \varphi)$, gdzie $\varphi = (x^1, \ldots, x^n)$, będzie mapą wokół $p$. Rozpatrzmy różniczki funkcji współrzędnościowych, $dx_p^i \in T_p^*M$ (traktując lokalnie zdefiniowaną funkcję $x^i = \varphi^i$ jako element $C^\infty$ w otoczeniu $p$; z Lematu 1.7.6 o lokalności derywacji, wartość $v(x^i)$ obliczamy na dowolnej funkcji gładkiej na $M$, która zgadza się z $x^i$ blisko $p$; funkcję taką otrzymujemy przez odcięcie wewnątrz $U$ i przedłużenie przez zero).

**Fakt 1.8.2.** $dx_p^i\Big(\dfrac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p\Big) = \delta_j^i$.

*Dowód.* Z definicji, $dx_p^i(\partial/\partial x^j|_p) = \frac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p(x^i) = \frac{\partial(x^i \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p))$. Ale $x^i \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U) \to \mathbb{R}$ to rzutowanie na $i$-tą współrzędną, $y \mapsto y^i$, którego pochodna cząstkowa po $j$-tej zmiennej wynosi $\delta_j^i$ w każdym punkcie. □

Przypomnijmy ogólny fakt z algebry liniowej.

**Fakt 1.8.3** (Baza dualna)**.** *Jeśli $e_1, \ldots, e_n$ jest bazą przestrzeni wektorowej $V$ (wymiaru $n$), a $e^1, \ldots, e^n \in V^*$ są funkcjonałami spełniającymi $e^i(e_j) = \delta_j^i$, to $e^1, \ldots, e^n$ jest bazą $V^*$ („bazą dualną" do $e_1, \ldots, e_n$).*

*Dowód.* Rozpinanie: dla dowolnego $\omega \in V^*$, kładziemy $c_i := \omega(e_i)$ i sprawdzamy, że $\omega = \sum_i c_i e^i$ — obie strony, jako funkcjonały liniowe, pokrywają się na bazie $e_1, \ldots, e_n$: $\left(\sum_i c_i e^i\right)(e_j) = \sum_i c_i \delta^i_j = c_j = \omega(e_j)$; funkcjonały liniowe pokrywające się na bazie są równe. Niezależność liniowa: jeśli $\sum_i c_i e^i = 0$, to podstawiając $e_j$ dla każdego $j$: $0 = \sum_i c_i \delta^i_j = c_j$. Zatem układ $e^1, \ldots, e^n$ rozpina $V^*$ i jest liniowo niezależny, czyli jest bazą (w szczególności $\dim V^* = \dim V = n$). □

Łącząc Fakt 1.8.2 z Faktem 1.8.3 (dla $V = T_pM$, $e_i = \partial/\partial x^i|_p$, $e^i = dx^i_p$), otrzymujemy odpowiedź na pytanie postawione we wstępie: *kowektory $dx^1_p, \ldots, dx^n_p$ stanowią bazę $T^*_pM$ dokładnie dlatego, że są bazą dualną do bazy $\{\partial/\partial x^i|_p\}$ przestrzeni stycznej* — żaden dodatkowy argument nie jest potrzebny, wystarczy ogólny fakt algebry liniowej o istnieniu i jednoznaczności bazy dualnej.

**Stwierdzenie 1.8.4.** *Dla $f \in C^\infty(M)$,*

$$df_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}\Big|_p \, dx^i_p.$$

*Dowód.* Obie strony są elementami $T^*_pM$; wystarczy sprawdzić, że działają tak samo na każdym wektorze bazy $\partial/\partial x^j|_p$. Lewa strona: $df_p(\partial/\partial x^j|_p) = \frac{\partial}{\partial x^j}\big|_p(f)$ z definicji $df_p$. Prawa strona, na mocy Faktu 1.8.2: $\sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}\big|_p \, dx^i_p(\partial/\partial x^j|_p) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}\Big|_p \delta^i_j = \frac{\partial f}{\partial x^j}\Big|_p$. Obie strony są równe. □

### Transformacja kowektorów przy zmianie mapy

Niech $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ będą mapami wokół $p \in U \cap V$, gdzie $\varphi = (x^1, \ldots, x^n)$ oraz $\psi = (y^1, \ldots, y^n)$. Bazy $\{dx^i_p\}$ i $\{dy^j_p\}$ przestrzeni $T^*_pM$ są dualne do odpowiednich baz $T_pM$. Reguła (1.7.1) mówi, jak zmienia się baza wektorów stycznych. Aby znaleźć zmianę bazy dualnej, obliczamy wartość $dy^j_p$ na każdym wektorze bazy $x$:

$$dy^j_p\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p\right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial y^k}{\partial x^i}(p) dy^j_p\left(\frac{\partial}{\partial y^k}\Big|_p\right) = \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p).$$

Ponieważ $\{dx^i_p\}$ jest bazą dualną do bazy $x$, dostajemy

$$\boxed{dy^j_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\, dx^i_p, \qquad dx^i_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p)\, dy^j_p.} \tag{1.8.1}$$

Druga równość wynika z pierwszej po zamianie ról map; macierze Jacobiego obu zmian są wzajemnie odwrotne.

Jeśli ten sam kowektor zapisujemy jako $\omega = \sum_i \xi_i \, dx^i_p = \sum_j \eta_j \, dy^j_p$, to po podstawieniu drugiej równości z (1.8.1) i zebraniu wyrazów przy $dy^j_p$ otrzymujemy

$$\boxed{\eta_j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p)\, \xi_i, \qquad \eta = J_{\psi\varphi}(p)^{-\mathsf{T}} \xi.} \tag{1.8.2}$$

Macierz działająca na współczynniki kowektora jest zatem odwrotną transpozycją macierzy działającej na współczynniki wektora stycznego. Dzięki temu wartość $\omega(v)$ nie zależy od użytej mapy.

Na przykład w $\mathbb{R}^2$ weźmy $y^1 = x^1 + x^2$, $y^2 = x^2$. Wówczas $x^1 = y^1 - y^2$, więc $dx^1 = dy^1 - dy^2$; kowektor o współczynnikach $(1, 0)$ w mapie $x$ ma współczynniki $(1, -1)$ w mapie $y$.

## 1.9 Wiązki wektorowe


Motywacją do wprowadzenia pojęcia wiązki wektorowej jest chęć badania przestrzeni wektorowych zależnych od punktu rozmaitości. Klasycznym przykładem jest rozmaitość $M$, dla której każdemu punktowi $p \in M$ przypisana jest przestrzeń styczna $T_pM$. Ponieważ przestrzenie te zmieniają się wraz z punktem, wygodnie jest traktować je jako jeden geometryczny obiekt. Wiązka wektorowa formalizuje tę ideę: nad każdym punktem przestrzeni bazowej umieszczone jest włókno będące przestrzenią wektorową, a lokalnie wiązka rzędu $k$ wygląda jak iloczyn kartezjański $U \times \mathbb{R}^k$. Globalnie jednak może mieć nietrywialną strukturę topologiczną, co pozwala opisywać zjawiska niedostrzegalne z lokalnego punktu widzenia.

**Definicja 1.9.1** (Wiązka wektorowa)**.** *Wiązką wektorową* rzędu $k$ nad rozmaitością gładką $M$ wymiaru $n$ nazywamy rozmaitość gładką $E$ wymiaru $n+k$ wraz z odwzorowaniem gładkim $\pi\colon E \to M$, zwanym *rzutowaniem*, takim że:

(i) dla każdego $p \in M$ włókno $E_p := \pi^{-1}(p)$ jest wyposażone w strukturę $k$-wymiarowej rzeczywistej przestrzeni wektorowej;

(ii) dla każdego $p \in M$ istnieje otwarte otoczenie $U \subseteq M$ punktu $p$ oraz dyfeomorfizm $\Psi\colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$ spełniający $\mathrm{pr}_1 \circ \Psi = \pi|_{\pi^{-1}(U)}$, taki że dla każdego $q \in U$ ograniczenie $\Psi|_{E_q}\colon E_q \to \{q\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$ jest izomorfizmem liniowym.

Odwzorowanie $\Psi$ nazywamy *lokalną trywializacją* wiązki. Rozmaitość $M$ nazywamy *bazą* wiązki, natomiast $E$ jej *przestrzenią całkowitą*.





Rysunek 1.11: Lokalny obraz wiązki $\pi\colon E \to M$. Wyróżniono wektor $e$ i jego rzut $\pi(e) = p$. Włókna narysowano jako fragmenty prostych; ogólnie mają wymiar $k$.

Rysunek 1.12 przedstawia lokalną trywializację z Definicji 1.9.1: zachowuje ona punkt bazy i jest liniowa na każdym włóknie.


**Definicja 1.9.2** (Sekcja wiązki wektorowej)**.** Niech $\pi\colon E \to M$ będzie wiązką wektorową. *Sekcją* (inaczej: *przekrojem*) wiązki $E$ nazywamy gładkie odwzorowanie $s\colon M \to E$ spełniające $\pi \circ s = \mathrm{id}_M$. Zatem dla każdego $p \in M$ mamy $s(p) \in E_p$. Sekcja wybiera dokładnie jeden wektor z każdego włókna i robi to w sposób gładki.

**Przykład 1.9.3** (Sekcja zerowa)**.** Każda wiązka wektorowa posiada naturalną *sekcję zerową* $s_0\colon M \to E$, $s_0(p) = 0_p$, gdzie $0_p$ jest wektorem zerowym we włóknie $E_p$. Gładkość wynika z lokalnego zapisu $p \mapsto (p, 0)$.

**Przykład 1.9.4** (Wiązka trywialna)**.** Najprostszym przykładem jest $E = M \times \mathbb{R}^k$ z $\pi = \mathrm{pr}_1$ i $\Psi = \mathrm{id}$ — wiązka ta nosi nazwę *trywialnej*.




Rysunek 1.12: Trywializacja $\Phi\colon E|_U \to U \times \mathbb{R}^k$ jest liniowa na włóknach i zachowuje punkt bazy: $\mathrm{pr}_1 \circ \Phi = \pi$. Linie przedstawiają włókna schematycznie.




Rysunek 1.13: Sekcja $s$ wybiera dokładnie jeden wektor $s(p)$ w każdym włóknie nad $p$. Czerwona krzywa przedstawia jej obraz nad pokazanym fragmentem $U$.

**Definicja 1.9.5** (Izomorfizm wiązek wektorowych)**.** Niech $\pi_E\colon E \to M$, $\pi_F\colon F \to M$ będą wiązkami wektorowymi tego samego rzędu nad $M$. *Izomorfizmem wiązek wektorowych nad $M$* nazywamy dyfeomorfizm $\Phi\colon E \to F$ taki, że $\pi_F \circ \Phi = \pi_E$, oraz dla każdego $p \in M$ ograniczenie $\Phi_p := \Phi|_{E_p}\colon E_p \to F_p$ jest izomorfizmem liniowym.

Warunek $\pi_F \circ \Phi = \pi_E$ oznacza, że $\Phi$ zachowuje punkt bazy: dla każdego $v \in E_p$ mamy $\Phi(v) \in F_p$.

*Uwaga* 1.9.6. Każda wiązka wektorowa jest z definicji *lokalnie trywialna*: dla każdego $p \in M$ istnieje otwarte otoczenie $U \ni p$ takie, że $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{R}^k$ jako wiązki wektorowe nad $U$.

Nie każda wiązka lokalnie trywialna jest jednak globalnie trywialna. Innymi słowy, z istnienia lokalnych izomorfizmów $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{R}^k$ nie wynika istnienie jednego globalnego izomorfizmu $E \cong M \times \mathbb{R}^k$.

**Przykład 1.9.7** (Wstęga Möbiusa jako nietrywialna wiązka rzędu 1)**.** Niech $M = S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Na przestrzeni $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definiujemy relację

$$(x,t) \sim (y,s) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists k \in \mathbb{Z} \quad \text{takie, że} \quad y = x + 2\pi k, \qquad s = (-1)^k t.$$

Definiujemy przestrzeń ilorazową $E := \mathbb{R}^2/\sim$. Klasę równoważności punktu $(x,t) \in \mathbb{R}^2$ oznaczamy przez $[x,t]$.

Interpretacja tej definicji jest następująca: przesunięcie pierwszej współrzędnej o jeden pełny obrót, czyli o $2\pi$, powoduje zmianę znaku drugiej współrzędnej: $[x,t] = [x + 2\pi, -t]$. Po dwóch pełnych obrotach znak wraca do pierwotnego: $[x,t] = [x + 4\pi, t]$. Właśnie to odwrócenie znaku po jednym obejściu okręgu odpowiada skręceniu charakterystycznemu dla wstęgi Möbiusa.

Definiujemy rzutowanie $\pi\colon E \longrightarrow S^1$, $\pi([x,t]) = [x]$. Jest ono dobrze określone, ponieważ jeśli $(x,t) \sim (y,s)$, to $y = x + 2\pi k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$, a więc $[y] = [x]$ w $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} = S^1$.

*Lokalna trywialność poza punktem sklejenia.*

Niech $I \subset S^1$ będzie otwartym łukiem, który nie zawiera punktu [0]. Możemy wtedy wybrać przedział $(a,b) \subset \mathbb{R},\ b-a \leq 2\pi$, taki, że każdy punkt $p \in I$ ma dokładnie jednego reprezentanta $x \in (a,b)$.

Definiujemy

$$\Psi_I \colon \pi^{-1}(I) \longrightarrow I \times \mathbb{R}, \qquad \Psi_I([x,t]) = ([x],t), \qquad x \in (a,b).$$

Odwrotność ma postać $\Psi_I^{-1}([x],t) = [x,t],\ x \in (a,b)$. Ponieważ na otwartym przedziale długości co najwyżej $2\pi$ nie trzeba przechodzić przez punkt sklejenia, współrzędna włókna nie zmienia znaku i otrzymujemy zwykłą lokalną trywializację.

*Lokalna trywialność w otoczeniu punktu* [0].

Wybierzmy $0 < \varepsilon < \pi$ i rozważmy otwarty łuk $I_0 := \{[a] \in S^1 : -\varepsilon < a < \varepsilon\}$. Każdy punkt tego łuku ma dokładnie jednego reprezentanta $a \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Definiujemy odwrotność lokalnej trywializacji przez $\Psi_0^{-1} \colon I_0 \times \mathbb{R} \longrightarrow \pi^{-1}(I_0)$,

$$\Psi_0^{-1}([a],v) = \begin{cases} [a,v], & a \geq 0, \\ [a+2\pi,-v], & a < 0. \end{cases}$$

To jest właśnie miejsce, w którym pojawia się zmiana znaku. Jeżeli $a \geq 0$, to wybieramy reprezentanta $a$ leżącego blisko 0 z prawej strony i nic nie zmieniamy. Jeżeli natomiast $a < 0$, to aby opisać ten sam punkt okręgu za pomocą reprezentanta z przedziału bliskiego $2\pi$, musimy zastąpić $a$ przez $a + 2\pi$. Z definicji relacji równoważności mamy wtedy $[a,v] = [a+2\pi,-v]$. A zatem przejście od reprezentanta $a$ do reprezentanta $a+2\pi$ wymusza zmianę współrzędnej włókna z $v$ na $-v$. To nie jest dodatkowa konwencja, lecz bezpośrednia konsekwencja definicji relacji $(x,t) \sim (x+2\pi,-t)$.

Odpowiadająca trywializacja ma postać

$$\Psi_0([x,t]) = \begin{cases} ([x],t), & -\varepsilon < x < \varepsilon, \\ ([x-2\pi],-t), & 2\pi - \varepsilon < x < 2\pi + \varepsilon. \end{cases}$$

W drugim przypadku odejmujemy $2\pi$, aby wrócić do reprezentanta z przedziału $(-\varepsilon,\varepsilon)$, a współrzędna włókna musi zmienić znak dokładnie z tego samego powodu co wyżej.

*Funkcje przejścia.*

Wybierzmy dwa otwarte łuki $U_0, U_1 \subset S^1$, które pokrywają okrąg, przy czym $U_0$ jest małym łukiem wokół punktu [0], a $U_1 = S^1 \setminus \{[0]\}$. Na $U_1$ używamy trywializacji $\Psi_1([x,t]) = ([x],t),\ x \in (0,2\pi)$, natomiast na $U_0$ trywializacji $\Psi_0$ zdefiniowanej wyżej.

Przecięcie $U_0 \cap U_1$ ma dwie składowe spójne: jedną w pobliżu punktu [0] od strony dodatniej, oraz drugą w pobliżu tego samego punktu od strony ujemnej (czyli po identyfikacji: w pobliżu $2\pi$).

Na składowej dodatniej oba opisy używają tego samego reprezentanta $x$, więc współrzędna włókna się nie zmienia: $v \longmapsto v$. Funkcja przejścia jest tam więc równa $g = +1$.


Na składowej ujemnej jedna trywializacja używa reprezentanta bliskiego 0, a druga reprezentanta bliskiego $2\pi$. Przejście między tymi reprezentantami odbywa się przez dodanie lub odjęcie $2\pi$, a więc z definicji relacji $[x,t] = [x+2\pi,-t]$ współrzędna włókna musi zmienić znak: $v \longmapsto -v$. Funkcja przejścia jest tam zatem równa $g = -1$.

To dokładnie pokazuje, gdzie geometrycznie pojawia się skręt: lokalnie mamy produkt $I \times \mathbb{R}$, lecz przy obejściu bazy dookoła współrzędna włókna wraca z przeciwnym znakiem.


Sprawdźmy jeszcze, że otrzymane opisy zgadzają się z topologią ilorazową $E$. Niech $q : \mathbb{R}^2 \to E$ będzie odwzorowaniem ilorazowym. Jest ono otwarte: dla otwartego $A \subset \mathbb{R}^2$ przeciwobraz

$q^{-1}(q(A))$ jest sumą obrazów $A$ przez homeomorfizmy $(x,t) \mapsto (x + 2\pi k, (-1)^k t)$, $k \in \mathbb{Z}$. Jeżeli otwarty łuk $I \subset S^1$ jest obrazem przedziału $J \subset \mathbb{R}$ długości mniejszej niż $2\pi$, to $q|_{J\times\mathbb{R}} : J \times \mathbb{R} \to \pi^{-1}(I)$ jest bijekcją: każda klasa ma reprezentanta o pierwszej współrzędnej w $J$, a dwóch takich reprezentantów nie może różnić przesunięcie o niezerową wielokrotność $2\pi$. Jest to homeomorfizm, bo jest ciągły i otwarty. Przejścia między tymi współrzędnymi mają lokalnie postać $(x,t) \mapsto (x + 2\pi k, (-1)^k t)$ ze stałym $k$, więc są gładkie.

Punkty nad różnymi punktami bazy rozdzielają przeciwobrazy rozłącznych łuków w $S^1$. Dwa różne punkty tego samego włókna rozdzielają otoczenia w jednym z powyższych otwartych iloczynów. Zatem $E$ jest Hausdorffa. Przeliczalne pokrycie okręgu takimi łukami i przeliczalne bazy iloczynów $J \times \mathbb{R}$ dają drugi aksjomat przeliczalności. W konsekwencji $E$ jest gładką dwuwymiarową rozmaitością, a odwzorowanie $\pi\colon E \to S^1$ jest gładką rzeczywistą wiązką liniową rzędu 1.




(a) Prostokąt przed sklejeniem



(b) Model geometryczny w $\mathbb{R}^3$

Rysunek 1.14: Wstęga Möbiusa: (a) konstrukcja przez sklejenie boków prostokąta z odwróceniem współrzędnej włókna, (b) odpowiadająca jej klasyczna powierzchnia zanurzona w $\mathbb{R}^3$. Parametryzacja w części (b) ma postać $x = (1 + t\cos(\theta/2))\cos\theta$, $y = (1 + t\cos(\theta/2))\sin\theta$, $z = t\sin(\theta/2)$. Rysunek pokazuje tylko pas $|t| \le 0.55$; w całej wiązce wektorowej $t$ przebiega $\mathbb{R}$.

**Stwierdzenie 1.9.8** (Brak globalnej trywializacji)**.** *Wiązka $\pi\colon E \to S^1$ z Przykładu 1.9.7 nie jest izomorficzna z wiązką trywialną $S^1 \times \mathbb{R} \to S^1$. Inaczej mówiąc, nie istnieje globalna trywializacja $E \cong S^1 \times \mathbb{R}$ jako wiązek nad $S^1$.*

*Dowód.* Pokażemy najpierw, że każda ciągła sekcja wiązki $E$ musi gdzieś znikać.

Niech $s\colon S^1 \to E$ będzie ciągłą sekcją, czyli $\pi \circ s = \mathrm{id}_{S^1}$. Podnosząc ją do funkcji na $\mathbb{R}$, możemy zapisać $s([x]) = [x, f(x)]$ dla pewnej ciągłej funkcji $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ponieważ $[x] = [x + 2\pi]$ w $S^1$, musimy mieć $s([x]) = s([x + 2\pi])$. To znaczy $[x, f(x)] = [x + 2\pi, f(x + 2\pi)]$. Z definicji relacji równoważności wynika stąd $f(x + 2\pi) = -f(x)$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

Załóżmy teraz, że sekcja $s$ jest nigdzie niezerowa. Wtedy $f(x) \neq 0$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$. Jako funkcja ciągła na spójnym zbiorze $\mathbb{R}$, funkcja $f$ musi mieć stały znak. W szczególności liczby $f(0)$ i $f(2\pi)$ muszą mieć ten sam znak.

Z drugiej strony z warunku $f(2\pi) = -f(0)$ wynika, że mają znaki przeciwne, o ile tylko $f(0) \neq 0$. To sprzeczność. Zatem każda ciągła sekcja wiązki $E$ musi mieć co najmniej jedno zero.

Tymczasem wiązka trywialna $S^1 \times \mathbb{R} \to S^1$ ma globalną nigdzie niezerową sekcję, na przykład $s_1(p) = (p, 1)$.

Gdyby istniał izomorfizm wiązek $\Phi\colon S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow E$, to sekcja $\Phi \circ s_1$ byłaby globalną nigdzie niezerową sekcją wiązki $E$. Jest to niemożliwe na mocy poprzedniego argumentu.

Otrzymujemy sprzeczność. Zatem globalna trywializacja nie istnieje. □

*Uwaga* 1.9.9 (Znaczenie topologiczne). Wstęga Möbiusa jest podstawowym przykładem sytuacji, w której lokalna trywialność nie pociąga za sobą globalnej trywialności. Na każdym dostatecznie

małym łuku $I \subset S^1$ mamy izomorfizm $\pi^{-1}(I) \cong I \times \mathbb{R}$, jednak nie istnieje jeden globalny izomorfizm $E \cong S^1 \times \mathbb{R}$.

Źródłem tej przeszkody jest dokładnie zmiana znaku $t \longmapsto -t$ po jednym pełnym obejściu bazy. To ona powoduje, że lokalne układy współrzędnych na włóknach nie mogą zostać sklejone w jeden globalny wybór współrzędnej.

**Przykład 1.9.10** (Wiązka tautologiczna nad $\mathbb{RP}^1$)**.** Przykład wstęgi Möbiusa ma naturalny związek z rzeczywistą przestrzenią rzutową $\mathbb{RP}^1$.

Przypomnijmy, że $\mathbb{RP}^1$ jest przestrzenią jednowymiarowych podprzestrzeni liniowych $\mathbb{R}^2$. Jej punkty zapisujemy w postaci $[x_1 : x_2]$, $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, przy czym $[x_1 : x_2] = [\lambda x_1 : \lambda x_2]$ dla każdego $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Każdemu punktowi $[x] \in \mathbb{RP}^1$, gdzie $x = (x_1, x_2) \neq 0$, odpowiada prosta $L_{[x]} := \operatorname{span}(x) = \{tx : t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$. Definicja ta nie zależy od wyboru reprezentanta, ponieważ $\operatorname{span}(\lambda x) = \operatorname{span}(x)$ $(\lambda \neq 0)$.

Definiujemy przestrzeń całkowitą

$$\boxed{\gamma^1 := \{([x], v) \in \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}^2 : v \in \operatorname{span}(x)\}}$$

oraz rzutowanie

$$\pi_\gamma \colon \gamma^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^1, \qquad \pi_\gamma([x], v) = [x].$$

Włókno nad punktem $[x]$ ma zatem postać $\gamma^1_{[x]} = \{([x], v) : v \in \operatorname{span}(x)\}$. Po utożsamieniu włókna z jego drugą współrzędną otrzymujemy $\gamma^1_{[x]} \cong \operatorname{span}(x) \cong \mathbb{R}$. Poniższe trywializacje pokażą, że otrzymujemy rzeczywistą wiązkę liniową rzędu 1, nazywaną *wiązką tautologiczną* lub *kanoniczną wiązką liniową* nad $\mathbb{RP}^1$.

Geometrycznie konstrukcja polega na tym, że nad każdym punktem przestrzeni rzutowej umieszczamy dokładnie tę prostą w $\mathbb{R}^2$, którą dany punkt reprezentuje.

*Lokalne trywializacje.*

Rozważmy standardowe otwarte podzbiory $U_i := \{[x_1 : x_2] \in \mathbb{RP}^1 : x_i \neq 0\}$, $i = 1, 2$.

Na $U_1$ używamy współrzędnej $z = \frac{x_2}{x_1}$, $[x_1 : x_2] = [1 : z]$. Prosta odpowiadająca punktowi $[1 : z]$ jest rozpięta przez wektor $(1, z)$. Wybierzmy na niej wektor jednostkowy $u_1(z) := \frac{(1,z)}{\sqrt{1+z^2}}$.

Każdy wektor należący do tej prostej można jednoznacznie zapisać jako $v = t\,u_1(z)$, $t \in \mathbb{R}$. Ponieważ $u_1(z)$ jest jednostkowy, współczynnik ten wynosi $st = \langle v, u_1(z)\rangle$, gdzie $\langle \cdot, \cdot \rangle$ oznacza standardowy iloczyn skalarny w $\mathbb{R}^2$.

Definiujemy lokalną trywializację $\Psi_1 \colon \pi_\gamma^{-1}(U_1) \longrightarrow U_1 \times \mathbb{R}$ wzorem $\Psi_1([1 : z], v) = \big([1 : z], \langle v, u_1(z)\rangle\big)$. Jej odwrotność ma postać $\Psi_1^{-1}([1 : z], t) = \big([1 : z], t\,u_1(z)\big)$.

Analogicznie na $U_2$ używamy współrzędnej $w = \frac{x_1}{x_2}$, $[x_1 : x_2] = [w : 1]$, i wybieramy wektor jednostkowy $u_2(w) := \frac{(w,1)}{\sqrt{1+w^2}}$. Otrzymujemy drugą lokalną trywializację $\Psi_2([w : 1], v) = \big([w : 1], \langle v, u_2(w)\rangle\big)$, której odwrotność jest dana przez $\Psi_2^{-1}([w : 1], t) = \big([w : 1], t\,u_2(w)\big)$.

Sprawdźmy strukturę gładką przestrzeni całkowitej, którą na razie traktujemy jako podzbiór $\mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}^2$ z topologią podprzestrzeni. Nad $U_1$ współrzędne $(z, v_1, v_2)$ spełniają $v_2 = zv_1$. Jest to wykres gładkiej funkcji $(z, v_1) \mapsto zv_1$, a zatem gładka powierzchnia w $U_1 \times \mathbb{R}^2$. W tych współrzędnych $t = \langle v, u_1(z)\rangle = v_1\sqrt{1+z^2}$, więc $\Psi_1$ i jej odwrotność są gładkie. Analogicznie nad $U_2$ mamy wykres $v_1 = wv_2$ oraz $t = v_2\sqrt{1+w^2}$. Obszary $U_1, U_2$ pokrywają $\mathbb{RP}^1$, toteż $\gamma^1$ jest gładką dwuwymiarową podrozmaitością produktu, a $\Psi_1, \Psi_2$ są lokalnymi trywializacjami liniowymi na każdym włóknie.

*Funkcje przejścia i zmiana znaku.*

Obliczmy funkcję przejścia między trywializacjami $\Psi_1$ i $\Psi_2$.

Na przecięciu $U_1 \cap U_2$ mamy $z \neq 0$, $w = \frac{1}{z}$. Zatem $u_2(w) = \operatorname{sgn}(z)\, u_1(z)$ oraz $u_2(1/z) = \operatorname{sgn}(z)\, u_1(z)$.

Wyjaśnijmy jej znaczenie.

Jeżeli $z > 0$, to $u_2(1/z) = u_1(z)$, a więc oba lokalnie wybrane wektory jednostkowe mają ten sam zwrot.

Jeżeli natomiast $z < 0$, to $u_2(1/z) = -u_1(z)$. Oba wektory rozpinają tę samą prostą, ale mają przeciwne zwroty.

Niech teraz $v = t_1 u_1(z) = t_2 u_2(1/z)$. Z poprzedniej równości dostajemy $t_1 u_1(z) = t_2 \operatorname{sgn}(z) u_1(z)$, a zatem $t_2 = \operatorname{sgn}(z) t_1$.

Funkcja przejścia ma więc postać

$$\boxed{g_{21}([1:z]) = \begin{cases} +1, & z > 0, \\ -1, & z < 0. \end{cases}}$$

Przecięcie $U_1 \cap U_2$ ma dwie składowe spójności, odpowiadające $z > 0$ oraz $z < 0$. Na jednej z nich współrzędna włókna pozostaje niezmieniona, a na drugiej zmienia znak.

Zmiana znaku nie oznacza zmiany samego wektora $v \in \mathbb{R}^2$. Wektor ten pozostaje ten sam. Zmienia się jedynie jego współrzędna względem innego wyboru wektora jednostkowego rozpinającego tę samą prostą.

W szczególności $v = t\, u = (-t)(-u)$. Ta prosta równość algebraiczna wyjaśnia geometrycznie występowanie funkcji przejścia równej $-1$.

*Identyfikacja $\mathbb{RP}^1$ z okręgiem.*

Pokażemy teraz, że wiązka $\gamma^1$ jest izomorficzna z wstęgą Möbiusa skonstruowaną w Przykładzie 1.9.7.

Zdefiniujmy odwzorowanie $F\colon S^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^1$ wzorem $F([\theta]) = [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)]$.

Najpierw sprawdźmy, że jest ono dobrze określone. Jeżeli $[\theta] = [\varphi] \in S^1$, to $\varphi = \theta + 2\pi k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$. Wówczas

$$\cos(\varphi/2) = \cos(\theta/2 + \pi k) = (-1)^k \cos(\theta/2),$$
$$\sin(\varphi/2) = \sin(\theta/2 + \pi k) = (-1)^k \sin(\theta/2).$$

Ponieważ w przestrzeni rzutowej utożsamiamy niezerowe wielokrotności tego samego wektora, otrzymujemy $[\cos(\varphi/2) : \sin(\varphi/2)] = [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)]$.

Pokażemy, że $F$ jest dyfeomorfizmem.

Różnowartościowość wynika z faktu, że jeśli $[\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)] = [\cos(\varphi/2) : \sin(\varphi/2)]$, to odpowiadające im wektory jednostkowe różnią się co najwyżej znakiem:

$$\begin{pmatrix} \cos(\varphi/2) \\ \sin(\varphi/2) \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

Stąd $\frac{\varphi}{2} = \frac{\theta}{2} + \pi k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$, czyli $\varphi = \theta + 2\pi k$. A zatem $[\varphi] = [\theta]$.

Aby wykazać surjektywność, weźmy dowolny punkt $[x_1 : x_2] \in \mathbb{RP}^1$. Normalizując jego reprezentanta, możemy zapisać $\frac{(x_1, x_2)}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ dla pewnego $\alpha \in \mathbb{R}$. Wtedy $F([2\alpha]) = [\cos\alpha : \sin\alpha] = [x_1 : x_2]$.

Dla pełności wskażmy również gładką odwrotność. Utożsamiając $S^1$ z okręgiem jednostkowym w $\mathbb{C}$, otrzymujemy wzór

$$\boxed{F^{-1}([x_1 : x_2]) = \frac{(x_1 + ix_2)^2}{x_1^2 + x_2^2}.}$$

Wyrażenie po prawej stronie należy do $S^1$, ponieważ jego moduł wynosi 1. Nie zależy ono od reprezentanta: zastąpienie $(x_1, x_2)$ przez $(\lambda x_1, \lambda x_2)$ mnoży licznik i mianownik przez $\lambda^2$.

Jeżeli $(x_1, x_2) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, to $F^{-1}([x_1 : x_2]) = (\cos\alpha + i\sin\alpha)^2 = e^{2i\alpha}$. Widzimy więc, że jest to rzeczywiście odwrotność $F$.

Zarówno $F$, jak i $F^{-1}$ są gładkie w lokalnych współrzędnych, a zatem $S^1 \cong \mathbb{RP}^1$ jako rozmaitości gładkie.

*Jawny izomorfizm wiązek.*

Dla $\theta \in \mathbb{R}$ oznaczmy

$$u(\theta) := \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

Jest to wektor jednostkowy rozpinający prostą odpowiadającą punktowi $F([\theta])$.

Zdefiniujmy odwzorowanie $\Phi\colon E \longrightarrow \gamma^1$ wzorem

$$\Phi([\theta, t]) = \big([\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)], t\,u(\theta)\big).$$

Wartość $\Phi([\theta, t])$ rzeczywiście należy do $\gamma^1$, ponieważ $t\,u(\theta) \in \operatorname{span}(u(\theta))$.

Sprawdźmy dokładnie, że $\Phi$ jest dobrze określone na klasach równoważności.

Jeżeli $(\theta, t) \sim (\varphi, s)$, to dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$ mamy $\varphi = \theta + 2\pi k$, $s = (-1)^k t$. Jednocześnie $u(\varphi) = u(\theta + 2\pi k) = (-1)^k u(\theta)$. Stąd $s\,u(\varphi) = t\,u(\theta)$. Ponadto $[u(\varphi)] = [u(\theta)]$ w $\mathbb{RP}^1$. W konsekwencji $\Phi([\varphi, s]) = \Phi([\theta, t])$. Odwzorowanie $\Phi$ jest więc dobrze określone.

W szczególności dla jednego pełnego obrotu otrzymujemy rachunek

$$\begin{aligned} \Phi([\theta + 2\pi, -t]) &= \big([u(\theta + 2\pi)], -t\,u(\theta + 2\pi)\big) \\ &= \big([-u(\theta)], (-t)(-u(\theta))\big) \\ &= \big([u(\theta)], t\,u(\theta)\big) \\ &= \Phi([\theta, t]). \end{aligned}$$

Widzimy zatem, że zmiana znaku współrzędnej włókna w definicji wstęgi Möbiusa jest dokładnie kompensowana zmianą znaku wektora jednostkowego reprezentującego punkt przestrzeni rzutowej.

Odwzorowanie $\Phi$ zachowuje rzutowania, gdyż

$$\begin{aligned} \pi_\gamma(\Phi([\theta, t])) &= [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)] \\ &= F([\theta]) \\ &= F(\pi([\theta, t])). \end{aligned}$$

Otrzymujemy więc przemienny diagram

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\ \Phi\ } & \gamma^1 \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi_\gamma} \\ S^1 & \xrightarrow[\ F\ ]{} & \mathbb{RP}^1 \end{array}$$

Pokażemy teraz, że $\Phi$ jest bijekcją. Niech $([x], v) \in \gamma^1$. Wybierzmy jednostkowy wektor $u$ rozpinający prostą $[x]$. Możemy zapisać $u = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ dla pewnego $\alpha \in \mathbb{R}$. Ponieważ $v \in \operatorname{span}(u)$, istnieje dokładnie jedna liczba $t \in \mathbb{R}$ taka, że $v = tu$. Jest nią $t = \langle v, u\rangle$. Wówczas $\Phi([2\alpha, t]) = ([u], tu) = ([x], v)$, co dowodzi surjektywności.

Sprawdźmy również, że otrzymana klasa $[2\alpha, t] \in E$ nie zależy od wyboru wektora jednostkowego $u$.

Na tej samej prostej istnieją dokładnie dwa wektory jednostkowe: $u$ oraz $-u$. Jeżeli zastąpimy $u$ przez $-u$, to możemy zastąpić $\alpha$ przez $\alpha + \pi$, natomiast współczynnik $t$ przez $-t$: $v = tu = (-t)(-u)$. Otrzymujemy wtedy parę $(2\alpha + 2\pi, -t)$, która jest równoważna z $(2\alpha, t)$, ponieważ $(2\alpha, t) \sim (2\alpha + 2\pi, -t)$. Dodanie do $\alpha$ całkowitej wielokrotności $2\pi$ również nie zmienia klasy w $E$.

Możemy zatem zdefiniować odwrotność $\Phi^{-1}([x], v) = [2\alpha, \langle v, u\rangle]$, gdzie $u = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ jest dowolnym wektorem jednostkowym rozpinającym $[x]$.

Wykazaliśmy, że wzór ten nie zależy od dokonanych wyborów. Bezpośrednio otrzymujemy

$$\Phi^{-1} \circ \Phi = \mathrm{id}_E, \qquad \Phi \circ \Phi^{-1} = \mathrm{id}_{\gamma^1}.$$

Pozostaje uzasadnić gładkość.

Wybierzmy dostatecznie mały otwarty łuk $I \subset S^1$, na którym można gładko wybrać reprezentanta kąta $\theta$. Na $\pi^{-1}(I)$ używamy trywializacji wstęgi Möbiusa zapisującej każdy punkt jednoznacznie jako $[\theta, t]$.

Na odpowiadającym mu obszarze $F(I) \subset \mathbb{RP}^1$ wybieramy gładki wektor jednostkowy $u(F([\theta])) = u(\theta)$. Otrzymujemy wówczas trywializację wiązki tautologicznej $([x], v) \longmapsto ([x], \langle v, u([x])\rangle)$.

W tych lokalnych trywializacjach odwzorowanie $\Phi$ ma szczególnie prostą postać: $([\theta], t) \longmapsto (F([\theta]), t)$. Jest więc gładkie, ponieważ $F$ jest dyfeomorfizmem. Jego lokalna odwrotność ma postać $([x], t) \longmapsto (F^{-1}([x]), t)$ i również jest gładka.

Ponadto na każdym włóknie $\Phi$ jest izomorfizmem liniowym: $t \longmapsto t\,u(\theta)$.

Ostatecznie $\Phi$ jest izomorfizmem gładkich wiązek wektorowych nad dyfeomorfizmem baz $F$:

$$(E \xrightarrow{\pi} S^1) \cong (\gamma^1 \xrightarrow{\pi_\gamma} \mathbb{RP}^1).$$

Definicja 1.9.5 dotyczy wiązek nad tą samą bazą; tutaj utożsamiamy bazy przez $F$, a równanie $\pi_\gamma \circ \Phi = F \circ \pi$ zastępuje warunek zachowania punktu bazy.

*Geometryczna interpretacja skręcenia.*

Wyjaśnijmy jeszcze, dlaczego w tej konstrukcji naturalnie pojawia się wstęga Möbiusa, a nie wiązka trywialna.

Punkt $F([\theta]) = [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)]$ reprezentuje prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych, tworzącą z dodatnią półosią poziomą kąt $\theta/2$.

Kiedy $\theta$ przebiega przedział $[0, 2\pi]$, prosta wykonuje obrót o kąt $\pi$. Jest to pełne obejście przestrzeni $\mathbb{RP}^1$, ponieważ proste rozpięte przez $u$ i $-u$ są identyczne.

Jednak wybrany w sposób ciągły wektor jednostkowy $u(\theta) = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2))$ nie wraca do swojej początkowej wartości: $u(0) = (1, 0),\ u(2\pi) = (-1, 0) = -u(0)$.

Aby ten sam wektor $v$ we włóknie przedstawić po pełnym obejściu bazy, jego współczynnik musi więc zmienić znak: $v = t\,u(0) = (-t)\,u(2\pi)$. Otrzymujemy dokładnie identyfikację $(0, t) \sim (2\pi, -t)$ charakterystyczną dla wstęgi Möbiusa.

*Nietrywialność wiązki tautologicznej.*

Z wykazanego izomorfizmu i Stwierdzenia 1.9.8 wynika już, że $\gamma^1$ nie jest trywialna. Można to również zobaczyć bezpośrednio z jej geometrycznej konstrukcji.

Przypuśćmy, że istnieje globalna nigdzie niezerowa ciągła sekcja $s\colon \mathbb{RP}^1 \longrightarrow \gamma^1$. Dla $\theta \in [0, 2\pi]$ możemy zapisać $s(F([\theta])) = \big(F([\theta]), a(\theta)u(\theta)\big)$, gdzie $a\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}$ jest funkcją ciągłą.

Ponieważ $F([0]) = F([2\pi])$, wartości przekroju na końcach przedziału muszą być równe: $a(0)u(0) = a(2\pi)u(2\pi)$. Korzystając z równości $u(2\pi) = -u(0)$, otrzymujemy $a(0)u(0) = -a(2\pi)u(0)$, a więc $a(2\pi) = -a(0)$.

Z twierdzenia o wartości pośredniej wynika, że funkcja $a$ musi mieć zero w przedziale $[0, 2\pi]$. Istnieje zatem $\theta_0$ takie, że $a(\theta_0) = 0$, czyli $s(F([\theta_0])) = (F([\theta_0]), 0)$. Jest to sprzeczne z założeniem, że przekrój jest nigdzie niezerowy.

Tymczasem każda trywialna wiązka liniowa rzędu 1 posiada globalny nigdzie niezerowy przekrój.

W konsekwencji $\gamma^1 \ncong \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}$ jako wiązki wektorowe nad $\mathbb{RP}^1$.

Wiązka tautologiczna nad $\mathbb{RP}^1$ jest więc dokładnie tą samą nietrywialną wiązką liniową, którą geometrycznie opisuje wstęga Möbiusa.

### Wiązka styczna

Pokażemy, że zbiór $TM := \bigsqcup_{p\in M} T_pM$ można w naturalny sposób wyposażyć w strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru $2n$, tak by rzutowanie $\pi\colon TM \to M$, $\pi(v) = p$ dla $v \in T_pM$, było wiązką wektorową rzędu $n$. Punkt $p = \pi(v)$ nazywamy *podstawą*, natomiast $T_pM = \pi^{-1}(p)$ jest włóknem wiązki stycznej nad $p$.

Niech $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ będzie atlasem na $M$, $\varphi_\alpha = (x^1_\alpha, \dots, x^n_\alpha)$. Definiujemy $\tilde{U}_\alpha := \pi^{-1}(U_\alpha) \subseteq TM$ oraz

$$\tilde{\varphi}_\alpha\colon \tilde{U}_\alpha \to \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^{2n},$$

$$\tilde{\varphi}_\alpha\Big(\sum_{i=1}^n v^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i_\alpha}\right|_p\Big) := (\varphi_\alpha(p), v^1, \dots, v^n).$$

Każde $\tilde{\varphi}_\alpha$ jest bijekcją na $\varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n$ (dla ustalonego $p$, współrzędne $v^i$ względem bazy $\{\partial/\partial x^i_\alpha|_p\}$ wyznaczają bijekcję liniową $T_pM \to \mathbb{R}^n$).

Z reguły transformacji (1.7.1) wynika, że dla $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ i $v \in \mathbb{R}^n$ odwzorowanie przejścia ma postać

$$(\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1})(x, v) = \Big((\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x),\ D(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x) \cdot v\Big).$$

Najpierw określamy topologię na $TM$: zbiór $A \subset TM$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy każdy $\tilde{\varphi}_\alpha(A \cap \tilde{U}_\alpha)$ jest otwarty. Zmiany współrzędnych powyżej są homeomorfizmami, a ich dziedziny $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n$ są otwarte. Wynika stąd, że $\tilde{U}_\alpha$ są otwarte, a $\tilde{\varphi}_\alpha$ są homeomorfizmami: obraz dowolnego otwartego zbioru z jednej mapy jest otwarty także w każdej nakładającej się mapie. Rzutowanie $\pi$ jest ciągłe, bo lokalnie ma postać $(x, v) \mapsto x$. Gładkość zmiany współrzędnych wynika z reguły (1.7.1). Zatem $\{(\tilde{U}_\alpha, \tilde{\varphi}_\alpha)\}$ jest atlasem na $TM$. Punkty o różnych podstawach rozdzielają przeciwobrazy rozłącznych otoczeń w $M$; dwa różne wektory w jednym włóknie rozdzielają kule w jednej mapie $\tilde{\varphi}_\alpha$. Stąd $TM$ jest Hausdorffa. Z przeliczalności bazy $M$ wybieramy przeliczalną rodzinę dziedzin map pokrywającą $M$. Obrazy tych map w $TM$ mają przeliczalne bazy euklidesowe, których przeciwobrazy tworzą przeliczalną bazę $TM$.

Tak skonstruowana rozmaitość $TM$, wraz z rzutowaniem $\pi$ i lokalnymi trywializacjami $\Psi_\alpha = (\varphi_\alpha^{-1} \times \mathrm{id}) \circ \tilde{\varphi}_\alpha$, jest wiązką wektorową rzędu $n$ nad $M$ — *wiązką styczną*.

### Wiązka kostyczna

Definiujemy teraz *wiązkę kostyczną* $T^*M := \bigsqcup_{p\in M} T_p^*M$ oraz rzutowanie $\pi^*\colon T^*M \to M$, $\pi^*(\omega) = p$ dla $\omega \in T_p^*M$. Nad $U_\alpha$ określamy mapę

$$\tilde{\varphi}_\alpha^*\Big(\sum_i \xi_i\, dx_\alpha^i|_p\Big) := (\varphi_\alpha(p), \xi_1, \dots, \xi_n).$$

Jest ona bijekcją na $\varphi_\alpha(U_\alpha)\times\mathbb{R}^n$, ponieważ $\{dx_\alpha^i|_p\}$ jest bazą każdego włókna. Dla $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ reguła (1.8.2) daje

$$(\tilde{\varphi}_\beta^* \circ (\tilde{\varphi}_\alpha^*)^{-1})(x,\xi) = \Big(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}(x), D(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1})(x)^{-\mathsf{T}}\xi\Big).$$

Pochodna odwzorowania przejścia jest gładka i odwracalna, więc również jej odwrotna transpozycja zależy gładko od $x$. Wzory te pozwalają określić topologię i atlas na $T^*M$ tak samo jak dla $TM$; są też liniowe na każdym włóknie. Dowód, że $T^*M$ jest wiązką wektorową rzędu $n$ nad $M$, dopełnia to samo sprawdzenie: punkty o różnych podstawach rozdzielają przeciwobrazy otoczeń bazy, punkty jednego włókna rozdzielają kule współrzędnych dualnych; bazy euklidesowe w przeliczalnym pokryciu map dają drugi aksjomat przeliczalności.

**Definicja 1.9.11.** *Polem wektorowym* na $M$ nazywamy gładką sekcję wiązki stycznej, tzn. gładkie odwzorowanie $X\colon M \to TM$ z $\pi\circ X = \mathrm{id}_M$ (a więc $X(p) \in T_pM$ dla każdego $p$). *Polem kowektorowym* na $M$ nazywamy gładką sekcję wiązki kostycznej $T^*M$.

## 1.10 Funkcje przejścia i operacje na wiązkach

Lokalna trywialność pozwala opisywać wiązkę macierzami. Ta postać jest szczególnie użyteczna przy konstruowaniu wiązek normalnych podrozmaitości.

Niech $\Psi_i : E|_{U_i} \to U_i \times \mathbb{R}^r$ będą trywializacjami. Dla każdego $p \in U_i$ mają one postać $\Psi_i(e) = (p, \psi_{i,p}(e))$, $e \in E_p$, gdzie $\psi_{i,p} : E_p \to \mathbb{R}^r$ jest izomorfizmem liniowym. Na przecięciu $U_i \cap U_j$ otrzymujemy więc zmianę trywializacji daną wzorem $\Psi_j \circ \Psi_i^{-1}(p,v) = (p, g_{ji}(p)v)$, gdzie $g_{ji}(p) \in \mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$ jest macierzą izomorfizmu liniowego $\psi_{j,p}\circ\psi_{i,p}^{-1}$. W ten sposób otrzymujemy gładkie odwzorowania $g_{ji} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$, zwane *funkcjami przejścia*. Na przecięciach spełniają one

$$g_{ii} = I, \qquad g_{ij} = g_{ji}^{-1}, \qquad g_{ki} = g_{kj}g_{ji} \quad \text{na } U_i\cap U_j\cap U_k. \tag{1.10.1}$$

Ostatnia równość porównuje bezpośrednie przejście z $i$ do $k$ z przejściem przez $j$; nazywamy ją warunkiem kocyklu.

**Twierdzenie 1.10.1** (Sklejanie wiązki z funkcji przejścia)**.** *Niech $\{U_i\}$ będzie otwartym pokryciem rozmaitości $M$, a gładkie funkcje $g_{ji} : U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$ spełniają warunek (1.10.1). Wtedy istnieje wiązka wektorowa rzędu $r$ o tych funkcjach przejścia.*

*Dowód.* Na sumie rozłącznej $Z := \bigsqcup_i (U_i \times \mathbb{R}^r)$ wprowadzamy relację

$$(p,v)_i \sim (p,w)_j \quad\Longleftrightarrow\quad p \in U_i\cap U_j, \quad w = g_{ji}(p)v.$$

Jest to relacja równoważności: pierwsza i druga tożsamość w (1.10.1) dają zwrotność i symetrię, trzecia zaś przechodniość.

Niech $E := Z/\sim$ będzie zbiorem klas równoważności i określmy $\pi : E \to M$ wzorem $\pi([p,v]_i) = p$. Dla każdego $i$ definiujemy odwzorowanie

$$\Psi_i : \pi^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r, \qquad \Psi_i([p,v]_j) = (p, g_{ij}(p)v).$$

Jest ono dobrze określone: jeżeli $(p,v)_j \sim (p,w)_k$, to $w = g_{kj}(p)v$, a z warunku kocyklu wynika $g_{ik}(p)w = g_{ik}(p)g_{kj}(p)v = g_{ij}(p)v$. Ponadto $\Psi_i$ jest bijekcją, której odwrotność ma postać $\Psi_i^{-1}(p,v) = [p,v]_i$.

Nadajemy teraz $E$ topologię, przyjmując, że zbiór $A \subset E$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $i$ zbiór $\Psi_i\big(A \cap \pi^{-1}(U_i)\big)$ jest otwarty w $U_i \times \mathbb{R}^r$. Warunki te rzeczywiście określają topologię: zbiór pusty i całe $E$ są otwarte, a ponieważ każde $\Psi_i$ jest bijekcją, obrazy sum dowolnych rodzin oraz przecięć skończonych odpowiadają odpowiednio sumom i przecięciom ich obrazów.

Wykażemy, że każda $\Psi_i$ jest homeomorfizmem.

Najpierw zauważmy, że $\pi^{-1}(U_i)$ jest zbiorem otwartym w $E$. Istotnie, dla każdego $j$ mamy

$$\Psi_j\big(\pi^{-1}(U_i) \cap \pi^{-1}(U_j)\big) = (U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^r,$$

a zbiór po prawej stronie jest otwarty w $U_j \times \mathbb{R}^r$.

Niech następnie $V \subset U_i \times \mathbb{R}^r$ będzie otwarty. Zbadamy otwartość zbioru $\Psi_i^{-1}(V)$ w $E$. Dla każdego $j$ zachodzi

$$\begin{aligned}&\Psi_j\big(\Psi_i^{-1}(V) \cap \pi^{-1}(U_j)\big)\\ &\qquad = (\Psi_j \circ \Psi_i^{-1})\big(V \cap ((U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^r)\big).\end{aligned}$$

Odwzorowanie przejścia ma postać $\Psi_j \circ \Psi_i^{-1}(p,v) = (p, g_{ji}(p)v)$. Jest ono homeomorfizmem zbioru $(U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^r$ na siebie, gdyż $g_{ji}$ jest gładka, a odwrotność jest dana wzorem $(p,w) \longmapsto (p, g_{ij}(p)w)$. Wobec tego rozważany obraz jest otwarty w $(U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^r$, a więc również w $U_j \times \mathbb{R}^r$. Z definicji topologii na $E$ wynika, że $\Psi_i^{-1}(V)$ jest otwarty. Dowodzi to ciągłości $\Psi_i$.

Z drugiej strony, jeżeli $A \subset \pi^{-1}(U_i)$ jest otwarty, to jest również otwarty w $E$, ponieważ $\pi^{-1}(U_i)$ jest otwarty. Z definicji topologii otrzymujemy, że $\Psi_i(A) = \Psi_i(A \cap \pi^{-1}(U_i))$ jest otwarty w $U_i \times \mathbb{R}^r$. Zatem $\Psi_i$ jest odwzorowaniem otwartym. Ponieważ jest także ciągłą bijekcją, jest homeomorfizmem.

Skonstruujemy teraz na $E$ gładki atlas wymiaru $\dim M + r$. Niech $(W_\alpha, \varphi_\alpha)$ będzie mapą rozmaitości $M$ i oznaczmy $n := \dim M$. Na zbiorze $\pi^{-1}(U_i \cap W_\alpha)$ definiujemy

$$\widetilde{\varphi}_{i\alpha} := (\varphi_\alpha \times \mathrm{id}_{\mathbb{R}^r}) \circ \Psi_i.$$

Jest to homeomorfizm na otwarty podzbiór $\varphi_\alpha(U_i \cap W_\alpha) \times \mathbb{R}^r \subset \mathbb{R}^{n+r}$. Otrzymane odwzorowania tworzą atlas topologiczny na $E$.

Na przecięciu dziedzin dwóch takich map zmiana współrzędnych ma postać

$$\begin{aligned}&\widetilde{\varphi}_{j\beta} \circ \widetilde{\varphi}_{i\alpha}^{-1}(x,v)\\ &\qquad = \Big(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x), g_{ji}(\varphi_\alpha^{-1}(x))v\Big).\end{aligned}$$

Jest ona gładka, ponieważ zmiany współrzędnych na $M$ oraz funkcje przejścia $g_{ji}$ są gładkie. Jej odwrotność otrzymujemy przez zamianę $(i,\alpha)$ z $(j,\beta)$, zatem także jest gładka. Otrzymany atlas jest gładki.

Włókna $E_p = \pi^{-1}(\{p\})$ wyposażamy w działania liniowe przeniesione z $\mathbb{R}^r$ przez dowolną trywializację $\Psi_i$, dla której $p \in U_i$. Działania te nie zależą od wyboru trywializacji, ponieważ wszystkie funkcje przejścia $g_{ji}(p)$ są izomorfizmami liniowymi. Ponadto w lokalnych współrzędnych rzutowanie $\pi$ przyjmuje postać $(x,v) \longmapsto x$, jest więc gładkie.

Pozostaje uzasadnić, że $E$ jest przestrzenią Hausdorffa i spełnia drugi aksjomat przeliczalności.

Najpierw zauważmy, że $\pi$ jest ciągłe. Istotnie, dla każdego otwartego $O \subset M$ mamy

$$\Psi_i\big(\pi^{-1}(O) \cap \pi^{-1}(U_i)\big) = (O \cap U_i) \times \mathbb{R}^r,$$

co jest zbiorem otwartym w $U_i \times \mathbb{R}^r$. Zatem $\pi^{-1}(O)$ jest otwarty w $E$.

Niech $e_1, e_2 \in E$ będą różnymi punktami. Jeżeli $\pi(e_1) \neq \pi(e_2)$, to ponieważ $M$ jest przestrzenią Hausdorffa, istnieją rozłączne otwarte otoczenia $V_1, V_2 \subset M$ punktów $\pi(e_1)$ i $\pi(e_2)$. Wówczas $\pi^{-1}(V_1)$ i $\pi^{-1}(V_2)$ są rozłącznymi otwartymi otoczeniami punktów $e_1$ i $e_2$.

Jeżeli natomiast $\pi(e_1) = \pi(e_2) = p$, wybieramy $i$ takie, że $p \in U_i$. Ponieważ $\Psi_i$ jest bijekcją, istnieją różne $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^r$ takie, że $\Psi_i(e_1) = (p, v_1)$, $\Psi_i(e_2) = (p, v_2)$. Wybieramy rozłączne otwarte kule $B_1, B_2 \subset \mathbb{R}^r$ wokół $v_1$ i $v_2$. Wówczas $\Psi_i^{-1}(U_i \times B_1)$, $\Psi_i^{-1}(U_i \times B_2)$ są rozłącznymi otwartymi otoczeniami punktów $e_1$ i $e_2$. Stąd $E$ jest przestrzenią Hausdorffa.

Na koniec wykażemy drugi aksjomat przeliczalności. Ponieważ $M$ ma przeliczalną bazę topologii, pokrycie $\{U_i\}$ ma przeliczalne podpokrycie $\{U_{i_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$. Każda przestrzeń $U_{i_k} \times \mathbb{R}^r$ ma przeliczalną bazę $\mathcal{B}_k$. Ponieważ $\Psi_{i_k}$ jest homeomorfizmem i $\pi^{-1}(U_{i_k})$ jest otwarty w $E$, rodzina


$$\mathcal{B} := \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \left\{ \Psi_{i_k}^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}_k \right\}$$

jest przeliczalną rodziną zbiorów otwartych w $E$.

Jest ona bazą topologii na $E$. Istotnie, jeżeli $A \subset E$ jest otwarty i $e \in A$, to istnieje $k$ takie, że $\pi(e) \in U_{i_k}$. Zbiór $\Psi_{i_k}(A \cap \pi^{-1}(U_{i_k}))$ jest otwarty i zawiera $\Psi_{i_k}(e)$. Możemy więc wybrać $B \in \mathcal{B}_k$ takie, że

$$\Psi_{i_k}(e) \in B \subset \Psi_{i_k}(A \cap \pi^{-1}(U_{i_k})).$$

Wówczas $e \in \Psi_{i_k}^{-1}(B) \subset A$. Zatem $E$ spełnia drugi aksjomat przeliczalności. Wraz z opisanym wyżej atlasem daje to strukturę rozmaitości gładkiej na $E$ i żądaną wiązkę wektorową rzędu $r$. □




Rysunek 1.15: Dwie trywializacje tego samego włókna $E_p$. Wektor $e$ ma współrzędne $v_i$ i $v_j$, związane macierzą przejścia $g_{ji}(p)$.

*Uwaga* 1.10.2 (Grupa strukturalna). Wybór gładkich ram lokalnych daje funkcje o wartościach w $\mathrm{GL}(r, \mathbb{R})$; jest to naturalna grupa strukturalna wiązki rzędu $r$. Jeżeli można dobrać trywializacje tak, aby wszystkie macierze przejścia należały do podgrupy $G \subseteq \mathrm{GL}(r, \mathbb{R})$, mówimy o redukcji grupy strukturalnej do $G$. Na przykład lokalne bazy ortonormalne wiązki z gładkim iloczynem skalarnym we włóknach mają macierze przejścia w $\mathrm{O}(r)$. W modelu wstęgi Möbiusa utożsamienie końców przedziału zmienia znak współrzędnej włóknowej.

**Przykład 1.10.3** (Sekcje w zapisie lokalnym)**.** Niech $\pi : E \to M$ będzie wiązką wektorową rzędu $r$ z lokalnymi trywializacjami $\Psi_i : E|_{U_i} \to U_i \times \mathbb{R}^r$ i funkcjami przejścia $g_{ji}$.

Jeżeli $s : M \to E$ jest sekcją, to dla każdego $p \in U_i$ mamy $s(p) \in E_p$, a zatem $\Psi_i(s(p)) = (p, s_i(p))$, gdzie $s_i : U_i \to \mathbb{R}^r$ jest gładkim odwzorowaniem, zwanym *lokalnym zapisem sekcji* w trywializacji $\Psi_i$.

Na przecięciu $U_i \cap U_j$ otrzymujemy

$$\begin{aligned}(p, s_j(p)) &= \Psi_j(s(p)) \\ &= (\Psi_j \circ \Psi_i^{-1})(p, s_i(p)) \\ &= (p, g_{ji}(p)s_i(p)),\end{aligned}$$

skąd $s_j(p) = g_{ji}(p)s_i(p)$.

Odwrotnie, jeżeli rodzina gładkich odwzorowań $s_i : U_i \to \mathbb{R}^r$ spełnia powyższe warunki zgodności, to wzór $s(p) = \Psi_i^{-1}(p, s_i(p)),\ p \in U_i$, określa globalną sekcję wiązki $E$. Istotnie, na przecięciu $U_i \cap U_j$ mamy

$$\begin{aligned}\Psi_j^{-1}(p, s_j(p)) &= \Psi_j^{-1}(p, g_{ji}(p)s_i(p)) \\ &= \Psi_i^{-1}(p, s_i(p)),\end{aligned}$$

więc definicja nie zależy od wyboru indeksu. Gładkość sekcji wynika z gładkości jej lokalnych zapisów.

W szczególności, dla wiązki skonstruowanej przez sklejanie z funkcji przejścia otrzymujemy $s(p) = [p, s_i(p)]_i$.

Rozważmy teraz wstęgę Möbiusa jako wiązkę liniową nad okręgiem $S^1$. Możemy przedstawić ją jako przestrzeń ilorazową $E = ([0, 2\pi]\times\mathbb{R})/\sim$, gdzie utożsamiamy $(0, v) \sim (2\pi, -v)$. Rzutowanie na bazę jest dane wzorem $\pi([\theta, v]) = e^{i\theta}$.

Sekcję opisujemy w tych współrzędnych za pomocą funkcji $f : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}$, przypisując punktowi $e^{i\theta}$ klasę $[\theta, f(\theta)]$. Aby otrzymać dobrze określoną sekcję ciągłą, funkcja $f$ musi być ciągła i spełniać $f(2\pi) = -f(0)$. Dla sekcji gładkiej funkcja $f$ musi być gładka na domkniętym przedziale i spełniać warunki zgodności wszystkich pochodnych na utożsamianych końcach: $f^{(k)}(2\pi) = -f^{(k)}(0),\ k = 0, 1, 2, \ldots$.

Pokażemy, że każda ciągła sekcja wstęgi Möbiusa ma miejsce zerowe. Jeżeli $f(0) = 0$, to teza jest natychmiastowa. W przeciwnym razie $f(2\pi) = -f(0)$ ma znak przeciwny do $f(0)$, więc z twierdzenia o wartości pośredniej istnieje $\theta_0 \in (0, 2\pi)$ takie, że $f(\theta_0) = 0$. Oznacza to, że $s(e^{i\theta_0}) = 0_{e^{i\theta_0}}$.

W szczególności wstęga Möbiusa nie posiada globalnej sekcji nigdzie niezerowej, co stanowi kolejny dowód jej nietrywialności jako wiązki liniowej.

**Definicja 1.10.4** (Suma i wiązka dualna)**.** Dla wiązek $E, F$ nad tą samą bazą definiujemy włókna $(E \oplus F)_p = E_p \oplus F_p$ oraz $(E^*)_p = \mathrm{Hom}(E_p, \mathbb{R})$. Przy macierzach przejścia $g_{ji}$ i $h_{ji}$ odpowiednie macierze to $g_{ji} \oplus h_{ji},\ (g_{ji}^{-1})^{\mathsf{T}}$. Ostatni wzór wymusza zachowanie wartości funkcjonału: jeżeli $v_j = g_{ji}v_i$ oraz $\xi_i(v_i) = \xi_j(v_j)$, to $\xi_j = (g_{ji}^{-1})^{\mathsf{T}}\xi_i$. Obie rodziny spełniają warunek kocyklu, więc twierdzenie o sklejaniu tworzy z nich wiązki.

## 1.11 Różniczka, immersje, submersje i zanurzenia

**Definicja 1.11.1.** Niech $F\colon M \to N$ będzie odwzorowaniem gładkim, $p \in M$. *Różniczką* $F$ w punkcie $p$ nazywamy odwzorowanie liniowe $dF_p\colon T_pM \to T_{F(p)}N$ zdefiniowane (w języku derywacji) wzorem $(dF_p\, v)(g) := v(g \circ F),\ v \in T_pM,\ g \in C^\infty(N)$.

Równoważnie, jeśli $v = \gamma'(0)$ dla gładkiej krzywej $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ z $\gamma(0) = p$, to $dF_p(v) = (F \circ \gamma)'(0) \in T_{F(p)}N$. Istotnie, obie strony działają na $g \in C^\infty(N)$ jako $(g \circ F \circ \gamma)'(0) = v(g \circ F)$.

Jeśli krzywe $\gamma_1$ i $\gamma_2$ mają tę samą prędkość $v$ w $p$, to dla każdego takiego $g$ obie prędkości $(F \circ \gamma_i)'(0)$ przyjmują na $g$ tę samą wartość $v(g \circ F)$. Wektory styczne w $F(p)$ są derywacjami, więc są równe, gdy działają jednakowo na wszystkie funkcje gładkie. Stąd wzór nie zależy od wyboru krzywej reprezentującej $v$.

**Fakt 1.11.2.** *$dF_p v$ jest istotnie derywacją w $F(p)$, a $dF_p$ jest odwzorowaniem liniowym.*

*Dowód.* Liniowość względem $g$: oczywista z liniowości $v$ i liniowości $g \mapsto g \circ F$. Reguła Leibniza: $(dF_p v)(gh) = v((gh) \circ F) = v((g \circ F)(h \circ F)) = (g \circ F)(p)\, v(h \circ F) + (h \circ F)(p)\, v(g \circ F) = g(F(p))(dF_p v)(h) + h(F(p))(dF_p v)(g)$, na mocy reguły Leibniza dla $v$ zastosowanej do $g \circ F, h \circ F \in C^\infty(M)$. Zatem $dF_p v \in T_{F(p)}N$. Liniowość $dF_p$ względem $v$ jest natychmiastowa z liniowości $v \mapsto v(g \circ F)$ w $v$, dla każdego ustalonego $g$. □

W Sekcji 1.8 różniczkę funkcji $f\colon M \to \mathbb{R}$ opisaliśmy jako kowektor $df_p \in T_p^* M$. Powyższa definicja daje natomiast różniczkę odwzorowania $f$ o wartościach w $T_{f(p)}\mathbb{R}$. Poniższy dowód utożsamia te dwa opisy i wyjaśnia znany wzór na $df_p$ w mapie.

**Twierdzenie 1.11.3** (Różniczka odwzorowania we współrzędnych)**.** *Niech $F\colon M \to N$ będzie odwzorowaniem gładkim, gdzie $\dim M = m$ i $\dim N = n$. Niech $(U, \varphi)$ będzie mapą wokół $p$, o współrzędnych $(x^1, \ldots, x^m)$, a $(V, \psi)$ mapą wokół $F(p)$, o współrzędnych $(y^1, \ldots, y^n)$. Zmniejszając w razie potrzeby $U$, zakładamy, że $F(U) \subset V$, i oznaczamy*

$$\widehat{F} := \psi \circ F \circ \varphi^{-1} = (\widehat{F}^{\,1}, \ldots, \widehat{F}^{\,n}).$$

*Wówczas dla każdego $v \in T_p M$ zachodzi*

$$dF_p(v) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial \widehat{F}^{\,j}}{\partial u^i}(\varphi(p))\, dx_p^i(v)\, \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_{F(p)}.$$

*W szczególności macierzą różniczki $dF_p$ w bazach współrzędnościowych jest macierz Jacobiego*

$$[dF_p] = D\widehat{F}(\varphi(p)) = \left[\frac{\partial \widehat{F}^{\,j}}{\partial u^i}(\varphi(p))\right]_{\substack{1 \le j \le n \\ 1 \le i \le m}}.$$

Rzędem *odwzorowania $F$ w punkcie $p$ nazywamy rząd $dF_p$, równy rzędowi powyższej macierzy.*

*Dowód.* Z dualności baz współrzędnościowych mamy

$$dx_p^i\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right) = \delta_j^i.$$

Każdy wektor $v \in T_p M$ można zapisać jako

$$v = \sum_{i=1}^{m} v^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p.$$

Stosując $dx_p^j$ do obu stron, otrzymujemy $v^j = dx_p^j(v)$, a zatem

$$v = \sum_{i=1}^{m} dx_p^i(v) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p.$$

Niech $g$ będzie funkcją gładką określoną w otoczeniu $F(p)$. Można ją przedłużyć funkcją odcinającą do funkcji na $N$; wynik nie zależy od przedłużenia dzięki Lematowi 1.7.6. Dotyczy to również lokalnych funkcji współrzędnych $y^j$ użytych poniżej. Z definicji różniczki oraz powyższego rozkładu wynika

$$\begin{aligned}(dF_p(v))(g) &= v(g \circ F) \\ &= \sum_{i=1}^{m} dx_p^i(v) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (g \circ F) \\ &= \sum_{i=1}^{m} dx_p^i(v) \frac{\partial (g \circ F \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i}(\varphi(p)).\end{aligned}$$

Aby wyznaczyć współrzędne wektora $dF_p(v)$, stosujemy go do funkcji współrzędnych $y^j$. Istotnie, z dualności baz w $T_{F(p)}N$ mamy

$$w = \sum_{j=1}^{n} dy^j_{F(p)}(w)\ \frac{\partial}{\partial y^j}\Big|_{F(p)}, \qquad dy^j_{F(p)}(w) = w(y^j).$$

Podstawiając $g = y^j$ i korzystając z równości $\widehat{F}^{\,j} = y^j \circ F \circ \varphi^{-1}$, otrzymujemy

$$\begin{aligned} dy^j_{F(p)}(dF_p(v)) &= (dF_p(v))(y^j) \\ &= \sum_{i=1}^{m} dx^i_p(v) \frac{\partial \widehat{F}^{\,j}}{\partial u^i}(\varphi(p)). \end{aligned}$$

Wstawiając te współczynniki do rozkładu wektora $dF_p(v)$ w bazie współrzędnościowej, otrzymujemy żądaną postać różniczki.

W szczególności, dla $v = \partial/\partial x^i|_p$ mamy

$$dF_p\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p\right) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \widehat{F}^{\,j}}{\partial u^i}(\varphi(p))\ \frac{\partial}{\partial y^j}\Big|_{F(p)}.$$

Współczynniki przy wektorach bazy docelowej tworzą kolejne kolumny macierzy $dF_p$, czyli macierz Jacobiego $D\widehat{F}(\varphi(p))$. □

**Wniosek 1.11.4** (Różniczka funkcji we współrzędnych)**.** *Niech $f\colon M \to \mathbb{R}$ będzie funkcją gładką, a $(U, \varphi)$ mapą wokół $p$, o współrzędnych $(x^1, \dots, x^m)$. Oznaczmy*

$$\widehat{f} := f \circ \varphi^{-1}.$$

*Po standardowym utożsamieniu $T_{f(p)}\mathbb{R}$ z $\mathbb{R}$ różniczka $df_p$ jest kowektorem i ma postać*

$$df_p = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)\, dx^i_p, \qquad \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) := \frac{\partial \widehat{f}}{\partial u^i}(\varphi(p)). \tag{1.11.1}$$

*W szczególności, jeśli $v = \sum_i v^i \partial/\partial x^i|_p$, to*

$$df_p(v) = \sum_{i=1}^{m} v^i \frac{\partial f}{\partial x^i}(p).$$

*Dowód.* Niech $t\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ będzie standardową współrzędną, czyli $t(a) = a$. Każdy wektor $w \in T_{f(p)}\mathbb{R}$ ma jednoznaczną postać

$$w = a\ \frac{\partial}{\partial t}\Big|_{f(p)}, \qquad a \in \mathbb{R}.$$

Standardowy izomorfizm $T_{f(p)}\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ przyporządkowuje temu wektorowi liczbę $a$. Ponieważ

$$\frac{\partial}{\partial t}\Big|_{f(p)}(t) = 1,$$

współczynnik ten możemy odczytać jako $a = w(t)$. Zatem utożsamienie ma postać

$$T_{f(p)}\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad w \longmapsto w(t).$$

W szczególności różniczka odwzorowania $f$, która pierwotnie przyjmuje wartości w $T_{f(p)}\mathbb{R}$, po tym utożsamieniu spełnia

$$df_p(v) = (df_p(v))(t) = v(t \circ f) = v(f).$$

Pierwsza równość oznacza tutaj zastosowanie powyższego izomorfizmu, a druga wynika z definicji różniczki odwzorowania.

Ponieważ lokalną reprezentacją $f$ względem standardowej współrzędnej $t$ jest $\widehat{f} = f \circ \varphi^{-1}$, poprzednie twierdzenie daje

$$df_p(v) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial \widehat{f}}{\partial u^i}(\varphi(p))\, dx^i_p(v).$$

Ponieważ równość zachodzi dla każdego $v \in T_pM$, otrzymujemy wzór (1.11.1). □

Na przykład dla $f(u,v) = u^2 + uv$ na $\mathbb{R}^2$ mamy $\partial_u f = 2u + v$ i $\partial_v f = u$, więc

$$df_{(u,v)} = (2u+v)\, du_{(u,v)} + u\, dv_{(u,v)}.$$

W punkcie $(1,2)$ dostajemy $df_{(1,2)} = 4\, du_{(1,2)} + dv_{(1,2)}$; na wektorze $a\,\partial_u|_{(1,2)} + b\,\partial_v|_{(1,2)}$ różniczka ma wartość $4a + b$.

**Twierdzenie 1.11.5** (Reguła łańcucha)**.** *Jeśli $F\colon M \to N$ i $G\colon N \to P$ są gładkie, $p \in M$, to $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p\colon T_pM \to T_{G(F(p))}P$.*

*Dowód.* Dla $v \in T_pM$ i $h \in C^\infty(P)$, z definicji różniczki:

$$\big(d(G\circ F)_p\, v\big)(h) = v\big(h \circ (G \circ F)\big) = v\big((h \circ G) \circ F\big) = (dF_p v)(h \circ G) = \big(dG_{F(p)}(dF_p v)\big)(h),$$

gdzie w trzeciej równości zastosowaliśmy definicję $dF_p$ do $h \circ G \in C^\infty(N)$, a w czwartej — definicję $dG_{F(p)}$ do $dF_p v \in T_{F(p)}N$. Zatem $d(G \circ F)_p v = dG_{F(p)}(dF_p v)$ dla każdego $v$ — co dowodzi tezy. □

**Definicja 1.11.6.** Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie, $\dim M = m$, $\dim N = n$. Mówimy, że $F$ jest w punkcie $p$ *immersją*, jeśli $dF_p$ jest injektywne, oraz *submersją*, jeśli $dF_p$ jest surjektywne. $F$ jest immersją (submersją), jeśli jest nią w każdym punkcie $p \in M$. *Zanurzeniem* (ang. *embedding*) nazywamy immersję $F\colon M \to N$, która dodatkowo jest homeomorfizmem na obraz $F(M)$ (z topologią podprzestrzeni $N$).


Poniższy przykład pokazuje, że sama różnowartościowa immersja nie musi być zanurzeniem — warunek „homeomorfizm na obraz” jest istotnie mocniejszy.

**Przykład 1.11.7** (Krzywa ósemkowa)**.** Niech $\beta\colon (-\pi,\pi) \to \mathbb{R}^2$, $\beta(t) := (\sin 2t,\ \sin t)$.

*$\beta$ jest immersją.* $\beta'(t) = (2\cos 2t, \cos t)$. Gdyby $\beta'(t_0) = 0$, to $\cos t_0 = 0$ (więc $t_0 = \pm\pi/2$) oraz $\cos 2t_0 = 0$; ale $\cos(\pm\pi) = -1 \neq 0$ — sprzeczność. Zatem $\beta'(t) \neq 0$ dla wszystkich $t$, czyli $d\beta_t$ jest injektywne w każdym punkcie.

*$\beta$ jest różnowartościowa.* Przypuśćmy $\beta(t_1) = \beta(t_2)$, tzn. $\sin t_1 = \sin t_2 =: s$ oraz $\sin 2t_1 = \sin 2t_2$. Jeśli $s = 0$: na $(-\pi,\pi)$ równość $\sin t = 0$ zachodzi jedynie dla $t = 0$, więc $t_1 = t_2 = 0$. Jeśli $s \neq 0$: korzystając z $\sin 2t_i = 2\sin t_i \cos t_i = 2s\cos t_i$, równość $\sin 2t_1 = \sin 2t_2$ daje (dzieląc przez $2s \neq 0$) $\cos t_1 = \cos t_2$. Zatem $\sin t_1 = \sin t_2$ i $\cos t_1 = \cos t_2$ jednocześnie — co oznacza $t_1 - t_2 \in 2\pi\mathbb{Z}$; ponieważ $t_1, t_2 \in (-\pi,\pi)$, jedyna możliwość to $t_1 = t_2$. W obu przypadkach $\beta$ jest różnowartościowa.

*$\beta$ nie jest zanurzeniem.* $\lim_{t\to\pi^-} \beta(t) = (\sin 2\pi, \sin\pi) = (0,0)$ oraz $\lim_{t\to-\pi^+} \beta(t) = (0,0)$ — oba końce krzywej zbiegają do tego samego punktu $(0,0) = \beta(0)$. Odwzorowanie odwrotne $\beta^{-1}$ nie jest więc ciągłe w $(0,0)$: dla ciągu $t_k \to \pi^-$, $\beta(t_k) \to (0,0) = \beta(0)$, ale $\beta^{-1}(\beta(t_k)) = t_k \to \pi \neq 0 = \beta^{-1}(0,0)$. Zatem $\beta$ jest różnowartościową immersją, która nie jest homeomorfizmem na obraz — nie jest zanurzeniem.




Rysunek 1.16: Krzywa ósemkowa $\beta(t) = (\sin 2t, \sin t)$: różnowartościowa immersja, która nie jest zanurzeniem — oba końce ($t \to \pm\pi$) zbiegają do początku układu współrzędnych.

*Uwaga* 1.11.8 (Nawinięcie niewymierne torusa). Podobny, choć bardziej subtelny, przykład daje *nawinięcie niewymierne* torusa $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Rozważmy odwzorowanie $\gamma : \mathbb{R} \longrightarrow T^2$, $\gamma(t) = (t, \alpha t) + \mathbb{Z}^2$, gdzie $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Pokażemy, że $\gamma$ jest injektywną immersją, która nie jest zanurzeniem, a jej obraz jest gęsty w $T^2$.

**Injektywność i immersyjność.** Jeżeli $\gamma(t) = \gamma(s)$, to $(t-s, \alpha(t-s)) \in \mathbb{Z}^2$. W szczególności $t - s \in \mathbb{Z}$ oraz $\alpha(t-s) \in \mathbb{Z}$. Gdyby $t - s \neq 0$, otrzymalibyśmy $\alpha = \frac{\alpha(t-s)}{t-s} \in \mathbb{Q}$, co przeczy niewymierności $\alpha$. Zatem $t = s$, czyli $\gamma$ jest injektywna.

Ponieważ rzutowanie $\mathbb{R}^2 \to T^2$ jest lokalnym dyfeomorfizmem, różniczka $\gamma$ jest lokalnie reprezentowana przez wektor $\gamma'(t) = (1, \alpha) \neq (0, 0)$. Ma więc rząd 1 w każdym punkcie, co dowodzi, że $\gamma$ jest immersją.

**Nieciągłość odwrotności na obraz.** Wykażemy, że istnieje ciąg liczb całkowitych dodatnich $q_N \to \infty$ taki, że $\gamma(q_N) \longrightarrow \gamma(0)$.

W tym celu ustalmy $N \geq 1$ i podzielmy przedział $[0, 1)$ na $N$ rozłącznych przedziałów $I_j = \left[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}\right)$, $j = 0, \ldots, N-1$. Każdy z nich ma długość $1/N$.

Rozważmy teraz $N+1$ liczb $\{0\alpha\}, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \ldots, \{N\alpha\} \in [0, 1)$, gdzie $\{x\} := x - \lfloor x \rfloor$ oznacza część ułamkową liczby $x$.

Ponieważ mamy $N+1$ liczb i tylko $N$ przedziałów, z zasady szufladkowej istnieją indeksy $0 \leq k < l \leq N$ takie, że $\{k\alpha\}$ i $\{l\alpha\}$ należą do tego samego przedziału $I_j$.

Wobec tego $|\{l\alpha\} - \{k\alpha\}| < \frac{1}{N}$. Korzystając z definicji części ułamkowej, otrzymujemy

$$\left|(l-k)\alpha - (\lfloor l\alpha \rfloor - \lfloor k\alpha \rfloor)\right| < \frac{1}{N}.$$

Oznaczając $q_N := l - k$, $p_N := \lfloor l\alpha \rfloor - \lfloor k\alpha \rfloor$, dostajemy $1 \leq q_N \leq N$, $p_N \in \mathbb{Z}$, $|q_N\alpha - p_N| < \frac{1}{N}$.

Pokażemy, że $q_N \to \infty$. Gdyby tak nie było, istniałyby liczba naturalna $K$ oraz nieskończenie wiele indeksów $N$, dla których $q_N \leq K$. Ponieważ $\alpha$ jest niewymierna, żadna z liczb $q\alpha$, $1 \leq q \leq K$, nie jest całkowita. Zatem $\delta_K := \min_{1 \leq q \leq K} \operatorname{dist}(q\alpha, \mathbb{Z}) > 0$. Jednak dla wspomnianych indeksów $N$ mamy $\delta_K \leq |q_N\alpha - p_N| < \frac{1}{N}$, co dla dostatecznie dużego $N$ prowadzi do sprzeczności. Stąd $q_N \to \infty$.

Z drugiej strony, ponieważ $q_N, p_N \in \mathbb{Z}$, w torusie zachodzi

$$\begin{aligned}\gamma(q_N) &= (q_N, \alpha q_N) + \mathbb{Z}^2 \\ &= (0, \alpha q_N - p_N) + \mathbb{Z}^2.\end{aligned}$$

Ponieważ $|\alpha q_N - p_N| < 1/N$, otrzymujemy $\gamma(q_N) \longrightarrow (0,0) + \mathbb{Z}^2 = \gamma(0)$.

Przypuśćmy teraz, że odwrotność $\gamma^{-1} : \gamma(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła, przy czym $\gamma(\mathbb{R})$ wyposażamy w topologię podprzestrzeni odziedziczoną z $T^2$.

Z ciągłości $\gamma^{-1}$ w punkcie $\gamma(0)$ oraz ze zbieżności $\gamma(q_N) \to \gamma(0)$ wynikałoby

$$q_N = \gamma^{-1}(\gamma(q_N)) \longrightarrow \gamma^{-1}(\gamma(0)) = 0.$$

Jest to sprzeczne z $q_N \to \infty$.

Zatem $\gamma^{-1}$ nie jest ciągła, a więc $\gamma$ nie jest homeomorfizmem na swój obraz. W szczególności nie jest zanurzeniem.

**Gęstość obrazu.** Pokażemy jeszcze, że $\gamma(\mathbb{R})$ jest gęsty w $T^2$.

Najpierw udowodnimy, że zbiór $\{k\alpha + \mathbb{Z} : k \in \mathbb{Z}\}$ jest gęsty w okręgu $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Niech $\varepsilon \in (0,1)$. Z wykazanego wyżej przybliżenia wynika, że istnieją $q \in \mathbb{N}$ i $p \in \mathbb{Z}$ takie, że $0 < |q\alpha - p| < \varepsilon$. Oznaczmy $\delta := q\alpha - p$ oraz $d := |\delta|$. Mamy więc $0 < d < \varepsilon$.

Rozważmy punkty $0, d, 2d, \ldots, \left\lfloor \frac{1}{d} \right\rfloor d$ w przedziale $[0,1]$. Odległości między kolejnymi punktami wynoszą $d$, natomiast odległość ostatniego punktu od 1 jest mniejsza niż $d$. Zatem każdy punkt przedziału $[0,1]$ znajduje się w odległości mniejszej niż $\varepsilon$ od jednego z tych punktów.

Ponadto każda wielokrotność $nd$ jest, modulo $\mathbb{Z}$, całkowitą wielokrotnością $\alpha$, gdyż $nd = n|q\alpha - p| \equiv \operatorname{sgn}(\delta) nq\alpha \pmod{\mathbb{Z}}$. Wobec tego całkowite wielokrotności $\alpha$ są $\varepsilon$-gęste w $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Ponieważ $\varepsilon > 0$ było dowolne, otrzymujemy żądaną gęstość.

Niech teraz $(a,b) + \mathbb{Z}^2$ będzie dowolnym punktem torusa. Z wykazanej gęstości możemy dla dowolnego $\varepsilon > 0$ wybrać $k \in \mathbb{Z}$ tak, aby $\operatorname{dist}(\alpha k - (b - \alpha a), \mathbb{Z}) < \varepsilon$. Wtedy

$$\begin{aligned} \gamma(a+k) &= (a+k, \alpha a + \alpha k) + \mathbb{Z}^2 \\ &= (a, \alpha a + \alpha k) + \mathbb{Z}^2, \end{aligned}$$

a druga współrzędna tego punktu jest, modulo $\mathbb{Z}$, odległa od $b$ o mniej niż $\varepsilon$.

Ponieważ pierwsza współrzędna jest dokładnie równa $a$ modulo $\mathbb{Z}$, punkt $\gamma(a+k)$ może leżeć dowolnie blisko $(a,b) + \mathbb{Z}^2$. Stąd $\overline{\gamma(\mathbb{R})} = T^2$.

## Twierdzenie o rzędzie stałym

**Lemat 1.11.9** (Półciągłość rzędu z dołu)**.** *Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie. Zbiór $\{p \in M : \operatorname{rz}(dF_p) \geq r\}$ jest otwarty w $M$, dla każdego $r$.*

*Dowód.* Warunek $\operatorname{rz}(dF_p) \geq r$ oznacza, w mapach lokalnych, że macierz Jacobiego $DF$ w $\varphi(p)$ ma pewien minor stopnia $r$ różny od zera. Wyznacznik danego minora jest funkcją ciągłą (wielomianem od wyrazów macierzy Jacobiego, gładkich funkcji punktu), więc zbiór punktów, w których ten minor jest niezerowy, jest otwarty. Zbiór $\{\operatorname{rz}(dF_p) \geq r\}$ jest sumą (po wszystkich wyborach minora stopnia $r$) takich zbiorów otwartych, a więc otwarty. □

**Wniosek 1.11.10.** *Jeśli $F\colon M \to N$ jest immersją (submersją) w punkcie $p$, to $F$ jest immersją (submersją) na pewnym otoczeniu $p$, o* stałym *rzędzie na tym otoczeniu.*

*Dowód.* Niech $m = \dim M$, $n = \dim N$. Jeśli $F$ jest immersją w $p$, $\operatorname{rz}(dF_p) = m$; ale rząd $dF_q\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ jest zawsze $\leq m$, więc z Lematu 1.11.9 ($r = m$), $\{\operatorname{rz}(dF_q) \geq m\} = \{\operatorname{rz}(dF_q) = m\}$ jest otoczeniem otwartym $p$, na którym $F$ ma stały rząd $m$. Przypadek submersji jest analogiczny z $r = n$. □

**Twierdzenie 1.11.11** (Twierdzenie o rzędzie stałym)**.** *Niech $F\colon M \to N$ będzie odwzorowaniem gładkim o stałym rzędzie $k$ na pewnym otoczeniu punktu $p \in M$, gdzie* $\dim M = m$, $\dim N =$

*n. Wówczas istnieją mapy $(U,\varphi)$ oraz $(V,\psi)$ wokół odpowiednio $p$ i $F(p)$, takie że $\varphi(p) = 0,\ \psi(F(p)) = 0,\ F(U) \subseteq V$, oraz*

$$(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(u^1,\dots,u^m) = (u^1,\dots,u^k,0,\dots,0).$$

*Dowód.* Wybierzmy najpierw dowolne mapy

$$\varphi_0 \colon U_0 \to \varphi_0(U_0) \subset \mathbb{R}^m, \qquad \psi_0 \colon V_0 \to \psi_0(V_0) \subset \mathbb{R}^n$$

wokół odpowiednio punktów $p$ i $F(p)$, takie że $\varphi_0(p) = 0,\ \psi_0(F(p)) = 0$. Po ewentualnym zmniejszeniu $U_0$ możemy założyć, że $F(U_0) \subseteq V_0$ oraz że $F$ ma stały rząd $k$ na całym $U_0$.

W tych mapach odwzorowanie $F$ jest reprezentowane przez gładkie odwzorowanie

$$\widehat{F} := \psi_0 \circ F \circ \varphi_0^{-1} \colon \varphi_0(U_0) \longrightarrow \psi_0(V_0).$$

Ponieważ $\varphi_0(p) = 0$ oraz $\psi_0(F(p)) = 0$, mamy $\widehat{F}(0) = 0$.

Pokażmy najpierw, że $\widehat{F}$ ma ten sam rząd co $F$. Niech $q \in U_0,\ u := \varphi_0(q)$. Z reguły łańcuchowej otrzymujemy

$$D\widehat{F}_u = D(\psi_0)_{F(q)} \circ \mathrm{d}F_q \circ D(\varphi_0^{-1})_u.$$

Ponieważ $\varphi_0$ i $\psi_0$ są mapami, odwzorowania $D(\psi_0)_{F(q)}$ oraz $D(\varphi_0^{-1})_u$ są izomorfizmami liniowymi. Złożenie odwzorowania liniowego z izomorfizmami po lewej i prawej stronie nie zmienia jego rzędu, a zatem $\mathrm{rz}(D\widehat{F}_u) = \mathrm{rz}(\mathrm{d}F_q) = k$. Odwzorowanie $\widehat{F}$ ma więc stały rząd $k$ na rozważanym otoczeniu zera.

Dalszą część dowodu przeprowadzimy dla $\widehat{F}$ pomiędzy otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych, a na końcu przeniesiemy skonstruowane współrzędne z powrotem na rozmaitości.

*Przypadek $k = 0$.*

Jeżeli $k = 0$, to $D\widehat{F}_u = 0$ dla każdego $u$ w dostatecznie małym otoczeniu zera. Zmniejszając to otoczenie, możemy założyć, że jest ono wypukłe.

Dla ustalonego $u$ rozważmy krzywą $\gamma(t) := \widehat{F}(tu),\ 0 \le t \le 1$. Z reguły łańcuchowej $\gamma'(t) = D\widehat{F}_{tu}(u) = 0$. Krzywa $\gamma$ jest więc stała, a zatem $\widehat{F}(u) = \widehat{F}(0) = 0$. Wobec tego $\widehat{F}(u) = (0,\dots,0)$, czyli $\widehat{F}$ ma już żądaną postać normalną.

Po odpowiednim zmniejszeniu dziedzin możemy więc przyjąć $\varphi = \varphi_0,\ \psi = \psi_0$, co kończy dowód w przypadku $k = 0$.

Dalej zakładamy, że $k > 0$.

*Krok 1: wybór odpowiednich współrzędnych i pierwszy dyfeomorfizm lokalny.*

Ponieważ $\mathrm{rz}(D\widehat{F}(0)) = k$, istnieje niezerowy minor stopnia $k$ macierzy $D\widehat{F}(0)$. Po odpowiednim przenumerowaniu współrzędnych w $\mathbb{R}^m$ oraz $\mathbb{R}^n$ możemy założyć, że jest to minor utworzony z pierwszych $k$ wierszy i pierwszych $k$ kolumn.

Formalnie takie przenumerowanie odpowiada złożeniu map $\varphi_0$ i $\psi_0$ z odpowiednimi liniowymi izomorfizmami będącymi permutacjami współrzędnych. Aby nie komplikować notacji, otrzymane w ten sposób mapy nadal oznaczamy przez $\varphi_0$ i $\psi_0$, a odpowiadającą im reprezentację $F$ przez $\widehat{F}$.

Piszemy $\widehat{F} = (\widehat{F}^1,\dots,\widehat{F}^n)$. Macierz

$$A := \left(\frac{\partial \widehat{F}^i}{\partial u^j}(0)\right)_{1 \le i,j \le k}$$

jest zatem odwracalna.

Definiujemy odwzorowanie $\Phi\colon \varphi_0(U_0) \to \mathbb{R}^m$ wzorem

$$\Phi(u) := (\widehat{F}^1(u), \dots, \widehat{F}^k(u), u^{k+1}, \dots, u^m).$$

Macierz jego różniczki w zerze ma postać blokową

$$D\Phi(0) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & I_{m-k} \end{pmatrix}.$$

Blok zerowy w lewym dolnym rogu pojawia się dlatego, że ostatnie $m-k$ składowych $\Phi$ są funkcjami $u^{k+1}, \dots, u^m$ i nie zależą od $u^1, \dots, u^k$.

Ponieważ macierz jest blokowo trójkątna, $\det D\Phi(0) = \det A \neq 0$. Na mocy twierdzenia o odwzorowaniu odwrotnym istnieje otwarte otoczenie $W$ punktu 0 takie, że $\Phi\colon W \longrightarrow \Phi(W)$ jest dyfeomorfizmem.

Po dalszym zmniejszeniu $U_0$ możemy zakładać, że $\varphi_0(U_0) \subseteq W$.

*Krok 2: przepisanie $\widehat{F}$ w nowych współrzędnych dziedziny.*

Definiujemy $G := \widehat{F} \circ \Phi^{-1}$. Niech $w = \Phi(u)$. Z definicji $\Phi$ mamy $w^i = \widehat{F}^i(u),\ i = 1, \dots, k$. Ponieważ $G(w) = \widehat{F}(\Phi^{-1}(w)) = \widehat{F}(u)$, otrzymujemy $G^i(w) = w^i,\ i = 1, \dots, k$.

Dla pozostałych składowych wprowadzamy oznaczenie $h^i(w) := G^i(w),\ i = k+1, \dots, n$. Wobec tego $G(w) = (w^1, \dots, w^k, h^{k+1}(w), \dots, h^n(w))$.

*Krok 3: funkcje $h^i$ zależą tylko od $w^1, \dots, w^k$.*

Ponieważ $G = \widehat{F} \circ \Phi^{-1}$, a $\Phi^{-1}$ jest lokalnym dyfeomorfizmem, $G$ ma ten sam stały rząd co $\widehat{F}$, czyli $\operatorname{rz}(DG(w)) = k$.

Macierz różniczki $G$ ma postać

$$DG(w) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ * & \left(\frac{\partial h^i}{\partial w^j}(w)\right)_{\substack{i=k+1,\dots,n \\ j=k+1,\dots,m}} \end{pmatrix}.$$

Przypuśćmy, że dla pewnych $i_0 > k,\ j_0 > k$ oraz pewnego punktu $w_0$ zachodzi $\frac{\partial h^{i_0}}{\partial w^{j_0}}(w_0) \neq 0$. Rozważmy minor stopnia $k+1$ macierzy $DG(w_0)$ utworzony z wierszy $1, \dots, k, i_0$ oraz kolumn $1, \dots, k, j_0$. Odpowiadająca mu macierz ma postać

$$\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ * & \dfrac{\partial h^{i_0}}{\partial w^{j_0}}(w_0) \end{pmatrix},$$

więc jej wyznacznik wynosi $\frac{\partial h^{i_0}}{\partial w^{j_0}}(w_0) \neq 0$. Oznaczałoby to $\operatorname{rz}(DG(w_0)) \geq k+1$, co przeczy założeniu, że $G$ ma stały rząd $k$.

Zatem

$$\frac{\partial h^i}{\partial w^j} = 0 \qquad \text{dla wszystkich } i > k,\ j > k.$$

Zmniejszmy teraz dziedzinę $G$ tak, aby zawierała produkt otwartych kul $A \times B \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k}$ o środku 0. Piszemy $w = (a, b),\ a = (w^1, \dots, w^k),\ b = (w^{k+1}, \dots, w^m)$. Dla $(a, b) \in A \times B$ oraz $i > k$ mamy

$$\begin{aligned} h^i(a,b) - h^i(a,0) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} h^i(a, tb)\, dt \\ &= \int_0^1 \sum_{j=k+1}^{m} b^j \frac{\partial h^i}{\partial w^j}(a, tb)\, dt \\ &= 0. \end{aligned}$$

Zatem $h^i(a,b) = h^i(a,0)$. Każda funkcja $h^i$ zależy więc jedynie od pierwszych $k$ współrzędnych. Dalej będziemy pisać po prostu $h^i(w^1,\dots,w^k)$ zamiast $h^i(w^1,\dots,w^k,0,\dots,0)$.

W konsekwencji

$$G(w) = (w^1,\dots,w^k,h^{k+1}(w^1,\dots,w^k),\dots,h^n(w^1,\dots,w^k)).$$

*Krok 4: zmiana współrzędnych w przestrzeni docelowej.*

Na dostatecznie małym otwartym otoczeniu zera w $\mathbb{R}^n$ definiujemy

$$\Psi(y^1,\dots,y^n) := (y^1,\dots,y^k,y^{k+1}-h^{k+1}(y^1,\dots,y^k),\dots,y^n-h^n(y^1,\dots,y^k)).$$

Odwzorowanie to ma jawną odwrotność

$$\Psi^{-1}(z^1,\dots,z^n) = (z^1,\dots,z^k,z^{k+1}+h^{k+1}(z^1,\dots,z^k),\dots,z^n+h^n(z^1,\dots,z^k)).$$

Bezpośrednie podstawienie pokazuje, że

$$\Psi^{-1}\circ\Psi = \mathrm{id} \qquad \text{oraz} \qquad \Psi\circ\Psi^{-1} = \mathrm{id}\,.$$

Odwzorowania $\Psi$ i $\Psi^{-1}$ są gładkie, zatem $\Psi$ jest dyfeomorfizmem swojego otwartego obszaru definicji na obraz.

Dla $w$ dostatecznie bliskiego 0 mamy

$$G(w) = (w^1,\dots,w^k,h^{k+1}(w^1,\dots,w^k),\dots,h^n(w^1,\dots,w^k)),$$

a zatem

$$\begin{aligned}(\Psi\circ G)(w) &= \Psi(w^1,\dots,w^k,h^{k+1}(w^1,\dots,w^k),\dots,h^n(w^1,\dots,w^k))\\ &= (w^1,\dots,w^k,0,\dots,0).\end{aligned}$$

Otrzymaliśmy więc w przestrzeniach euklidesowych postać normalną

$$\Psi\circ\widehat{F}\circ\Phi^{-1} = (w^1,\dots,w^k,0,\dots,0).$$

*Krok 5: powrót do map na rozmaitościach.*

Pozostaje przełożyć skonstruowane powyżej zmiany współrzędnych na nowe mapy rozmaitości $M$ i $N$.

Przypomnijmy, że początkowa reprezentacja $F$ miała postać $\widehat{F} = \psi_0\circ F\circ\varphi_0^{-1}$. Odwzorowanie $\Phi$ jest zmianą współrzędnych po stronie dziedziny, natomiast $\Psi$ jest zmianą współrzędnych po stronie przeciwdziedziny.

Definiujemy zatem nowe mapy przez

$$\boxed{\varphi := \Phi\circ\varphi_0}$$

oraz

$$\boxed{\psi := \Psi\circ\psi_0.}$$

Po odpowiednim zmniejszeniu $U_0$ oraz $V_0$ są to mapy

$$\varphi\colon U\to\varphi(U)\subset\mathbb{R}^m, \qquad \psi\colon V\to\psi(V)\subset\mathbb{R}^n$$

wokół odpowiednio $p$ i $F(p)$.

Sprawdźmy najpierw położenie wyróżnionych punktów. Ponieważ $\varphi_0(p) = 0$ oraz $\widehat{F}(0) = 0$, z definicji $\Phi$ otrzymujemy

$$\Phi(0) = \big(\widehat{F}^1(0), \dots, \widehat{F}^k(0), 0, \dots, 0\big) = 0.$$

Stąd $\varphi(p) = \Phi(\varphi_0(p)) = \Phi(0) = 0$.

Ponadto $G(0) = \widehat{F}(\Phi^{-1}(0)) = \widehat{F}(0) = 0$. Ponieważ $G(0) = \big(0, \dots, 0, h^{k+1}(0), \dots, h^n(0)\big)$, wynika stąd $h^{k+1}(0) = \cdots = h^n(0) = 0$. Z definicji $\Psi$ otrzymujemy więc $\Psi(0) = 0$. Wobec tego $\psi(F(p)) = \Psi(\psi_0(F(p))) = \Psi(0) = 0$.

Sprawdźmy teraz postać odwzorowania $F$ w nowych mapach. Ponieważ $\varphi = \Phi \circ \varphi_0$, mamy $\varphi^{-1} = \varphi_0^{-1} \circ \Phi^{-1}$. Zatem

$$\begin{aligned}
\psi \circ F \circ \varphi^{-1} &= (\Psi \circ \psi_0) \circ F \circ (\varphi_0^{-1} \circ \Phi^{-1}) \\
&= \Psi \circ (\psi_0 \circ F \circ \varphi_0^{-1}) \circ \Phi^{-1} \\
&= \Psi \circ \widehat{F} \circ \Phi^{-1} \\
&= \Psi \circ G.
\end{aligned}$$

Z Kroku 4 wynika więc, że

$$(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^k, 0, \dots, 0).$$

Na końcu, zmniejszając w razie potrzeby otoczenie $U$ punktu $p$, możemy zapewnić $F(U) \subseteq V$. Otrzymaliśmy zatem mapy $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ spełniające $\varphi(p) = 0$, $\psi(F(p)) = 0$, $F(U) \subseteq V$, oraz

$$\boxed{(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^k, 0, \dots, 0).}$$

To kończy dowód. □

**Wniosek 1.11.12** (Postać lokalna immersji)**.** *Jeśli $F\colon M \to N$ jest immersją w $p$ ($m \le n$), to istnieją mapy wokół $p$, $F(p)$, w których $F(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^m, 0, \dots, 0)$.*

*Dowód.* Na mocy Wniosku 1.11.10, $F$ ma stały rząd $m$ na otoczeniu $p$; stosujemy Twierdzenie 1.11.11 z $k = m$. □

**Wniosek 1.11.13** (Postać lokalna submersji)**.** *Jeśli $F\colon M \to N$ jest submersją w $p$ ($m \ge n$), to istnieją mapy wokół $p$, $F(p)$, w których $F(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^n)$.*

*Dowód.* Na mocy Wniosku 1.11.10, $F$ ma stały rząd $n$ na otoczeniu $p$; stosujemy Twierdzenie 1.11.11 z $k = n$ (teza redukuje się do $(u^1, \dots, u^n, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, czyli po prostu $(u^1, \dots, u^n)$). □

**Przykład 1.11.14.** Rzutowanie kanoniczne $\mathrm{pr}_1\colon M \times N \to M$ jest submersją: w mapach produktowych, $\mathrm{pr}_1$ przyjmuje postać rzutowania liniowego $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, którego różniczka (ono samo) jest surjektywna. Podobnie, rzutowanie wiązki stycznej $\pi\colon TM \to M$ jest submersją — w mapach $\tilde{\varphi}_\alpha$ z Sekcji 1.9, $\pi$ przyjmuje postać $(x, v) \mapsto x$.

## 1.12 Podrozmaitości


Rozmaitość opisujemy za pomocą jej własnych map, bez wybierania przestrzeni otaczającej. Podrozmaitość $S \subseteq M$ można badać zarówno jako samodzielną rozmaitość, jak i jako część $M$: podobnie powierzchnię Ziemi można opisywać mapami na samej powierzchni albo jako powierzchnię w przestrzeni. Na przykład okrąg $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ jest jednowymiarowy w swoich mapach,

choć jego punkty mają dwie współrzędne w $\mathbb{R}^2$. Poniższy warunek mapy plasterkowej precyzuje tę sytuację: lokalnie $S$ zajmuje dokładnie $\mathbb{R}^k \times \{0\}$ w przestrzeni współrzędnych $\mathbb{R}^n$ rozmaitości $M$.

**Definicja 1.12.1.** Niech $M$ będzie rozmaitością gładką wymiaru $n$, $S \subseteq M$ podzbiorem, $k \leq n$. Mapa $(U, \varphi)$ na $M$ jest *mapą plasterkową* (dostosowaną do $S$) rzędu $k$, jeżeli

$$\varphi(U \cap S) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}) \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k} \cong \mathbb{R}^n.$$

Mówimy, że $S$ jest *podrozmaitością zanurzoną* wymiaru $k$ w $M$, jeśli każdy punkt $p \in S$ posiada mapę plasterkową rzędu $k$ wokół $p$.




Rysunek 1.17: Mapa plasterkowa: w mapie $\varphi$, przecięcie $U \cap S$ odpowiada dokładnie przecięciu $\varphi(U)$ z podprzestrzenią $\mathbb{R}^k \times \{0\}$.

**Stwierdzenie 1.12.2.** *Jeśli $S \subseteq M$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $k$, to $S$ (z topologią podprzestrzeni) jest rozmaitością topologiczną wymiaru $k$, posiadającą strukturę gładką, względem której inkluzja $\iota\colon S \hookrightarrow M$ jest immersją; co więcej, $\iota$ jest zanurzeniem.*

*Dowód.* Wyposażamy $S$ w topologię podprzestrzeni. Ponieważ podprzestrzeń przestrzeni Hausdorffa jest Hausdorffa, $S$ spełnia pierwszy warunek. Jeśli $\mathcal{B}$ jest przeliczalną bazą $M$, to $\{B \cap S : B \in \mathcal{B}\}$ jest przeliczalną bazą $S$: dla otwartego $O \cap S$ i $p \in O \cap S$ znajdziemy $B \in \mathcal{B}$ z $p \in B \subset O$, a wtedy $p \in B \cap S \subset O \cap S$.

Ustalmy $p \in S$ i mapę plasterkową $(U, \varphi)$ przy $p$. Ponieważ $U$ jest otwarte w $M$, zbiór $U_S = U \cap S$ jest otwarty w $S$. Oznaczmy $W = \varphi(U)$, otwarty w $\mathbb{R}^n$. Odwzorowanie $\varphi_S = \mathrm{pr}_1 \circ \varphi|_{U_S}$ ma obraz $W_S = \{u \in \mathbb{R}^k : (u, 0) \in W\}$, otwarty w $\mathbb{R}^k$ jako przeciwobraz $W$ przez ciągłe zanurzenie $u \mapsto (u, 0)$. Odwrotność $u \mapsto \varphi^{-1}(u, 0)$ jest ciągła; zatem $\varphi_S : U_S \to W_S$ jest homeomorfizmem. To dowodzi lokalnej euklidesowości $S$.

Niech teraz $(V, \psi)$ będzie drugą mapą plasterkową. Na $\varphi_S(U \cap V \cap S)$ przejście ma wzór

$$\psi_S \circ \varphi_S^{-1}(u) = \mathrm{pr}_1\big((\psi \circ \varphi^{-1})(u, 0)\big).$$

Zanurzenie $u \mapsto (u, 0)$, przejście $\psi \circ \varphi^{-1}$ i rzutowanie $\mathrm{pr}_1$ są gładkie, więc złożenie jest gładkie. Zamieniając $\varphi$ i $\psi$, otrzymujemy gładką odwrotność. Mapy $\varphi_S$ tworzą więc atlas gładki na $S$.

W mapach $\varphi_S$ i $\varphi$ inkluzja $\iota : S \to M$ ma postać $u \mapsto (u, 0)$, a jej różniczka wysyła $v$ na $(v, 0)$ i jest injektywna. Inkluzja jest więc immersją. Jako odwzorowanie $S \to \iota(S)$ z *topologią podprzestrzeni*, $\iota$ jest homeomorfizmem już z wyboru topologii na $S$ (tożsamość na zbiorze punktów). Zatem jest zanurzeniem. □

**Przykład 1.12.3** (Wiązka normalna jako wiązka ilorazowa)**.** Niech $S \subset M$ będzie podrozmaitością włożoną wymiaru $k$, gdzie $\dim M = n$. Poprzez różniczkę inkluzji utożsamiamy $T_pS$ z podprzestrzenią $T_pM$, a $TS$ traktujemy jako podwiązkę wiązki ograniczonej $TM|_S$.

*Wiązkę normalną* podrozmaitości $S$ definiujemy jako wiązkę ilorazową $\nu S := TM|_S/TS$, $\nu_pS := T_pM/T_pS$. Jej włókna są przestrzeniami wektorowymi wymiaru $n-k$. Konstrukcja ta nie wymaga wyboru metryki ani dopełnienia podprzestrzeni $T_pS$ w $T_pM$.

Pokażemy, że $\nu S$ jest wiązką wektorową rzędu $n-k$. W mapie plasterkowej o współrzędnych $(x,y)$, gdzie $x \in \mathbb{R}^k$ i $y \in \mathbb{R}^{n-k}$, podrozmaitość $S$ jest opisana równaniem $y = 0$. Wówczas

$$T_pM = T_pS \oplus \operatorname{span}\left\{ \left.\frac{\partial}{\partial y^1}\right|_p, \ldots, \left.\frac{\partial}{\partial y^{n-k}}\right|_p \right\}.$$

Każda klasa $[v] \in T_pM/T_pS$ ma zatem jednoznaczny reprezentant w kierunkach $\partial/\partial y^a$, co pozwala utożsamić lokalnie $\nu_pS$ z $\mathbb{R}^{n-k}$.

Sprawdźmy zmiany współrzędnych. Przejście między dwiema mapami plasterkowymi ma postać $(x,y) \longmapsto (a(x,y), b(x,y))$, przy czym $b(x,0) = 0$. Różniczkując tę tożsamość względem $x$, otrzymujemy $D_x b(x,0) = 0$, więc różniczka przejścia w punktach $S$ ma postać blokową

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Cała macierz jest odwracalna, zatem kwadratowy blok $C$ również jest odwracalny. Wektor o współrzędnych $(u,v) \in \mathbb{R}^k \oplus \mathbb{R}^{n-k}$ przechodzi na $(u,v) \longmapsto (Au + Bv, Cv)$. Ponieważ wektory styczne do $S$ odpowiadają składowym $(u,0)$, klasa wektora w ilorazie zmienia współrzędne według wzoru $[v] \longmapsto [Cv]$. Zmiana ta zależy wyłącznie od składowej poprzecznej.

Macierze $C$ są gładkie i spełniają warunek kocyklu, ponieważ różniczki przejść się składają, a iloczyn macierzy blokowych zachowuje powyższą postać. Twierdzenie o sklejaniu daje więc wiązkę wektorową rzędu $n-k$ o włóknach $T_pM/T_pS$.

Otrzymujemy w ten sposób naturalny ciąg dokładny wiązek wektorowych

$$0 \longrightarrow TS \longrightarrow TM|_S \longrightarrow \nu S \longrightarrow 0.$$

W szczególności konstrukcja wiązki normalnej jest kanoniczna i nie wymaga żadnej dodatkowej struktury geometrycznej na $M$.

Poniższe twierdzenie i jego następstwa pokazują, w jaki sposób podrozmaitości powstają „w praktyce” — jako obrazy zanurzeń oraz jako przeciwobrazy wartości regularnych.

**Twierdzenie 1.12.4** (Twierdzenie o obrazie)**.** *Jeśli $F\colon S \to M$ jest zanurzeniem ($\dim S = k \leq n = \dim M$), to $F(S)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $k$ w $M$, a $F\colon S \to F(S)$ (z topologią podprzestrzeni) jest dyfeomorfizmem.*

*Dowód.* Ustalmy $q = F(p_0) \in F(S)$. Ponieważ $F$ jest immersją w $p_0$, na mocy Wniosku 1.11.12 istnieją mapy $(U,\varphi)$ wokół $p_0$ w $S$ i $(V,\psi)$ wokół $q$ w $M$, w których $F$ przyjmuje postać $u \mapsto (u,0)$. Uzasadnijmy potrzebne dopasowanie dziedzin: wybieramy małe otwarte kule $A \subset \mathbb{R}^k$, $B \subset \mathbb{R}^{n-k}$ o środku 0, tak aby $A \subset \varphi(U)$ i $A \times B \subset \psi(V)$. Zastępujemy $U$ przez $\varphi^{-1}(A)$, a $V$ przez $\psi^{-1}(A \times B)$. Wtedy rzeczywiście $\psi(F(U)) = A \times \{0\} = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. Zatem $(V,\psi)$ jest „prawie” mapą plasterkową dla $F(S)$, z tą różnicą, że warunek dotyczy $F(U)$, a nie od razu $F(S) \cap V$.

W tym miejscu wykorzystujemy założenie, że $F$ jest *zanurzeniem*, nie tylko różnowartościową immersją (por. Przykład 1.11.7): ponieważ $F\colon S \to F(S)$ jest homeomorfizmem na obraz, zbiór

$F(U)$ jest otwarty w $F(S)$, tzn. $F(U) = F(S) \cap W$ dla pewnego otwartego $W \subseteq M$. Zastępując $V$ przez $V' := V \cap W$, otrzymujemy $F(S) \cap V' = F(U) \cap V'$, a

$$\begin{aligned}\psi(F(S) \cap V') &= \psi(F(U) \cap V') \\ &= \psi(F(U)) \cap \psi(V') \\ &= (\psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})) \cap \psi(V') \\ &= \psi(V') \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}).\end{aligned}$$

Zatem $(V', \psi|_{V'})$ jest mapą plasterkową rzędu $k$ dla $F(S)$ wokół $q$. Ponieważ $q \in F(S)$ był dowolny, $F(S)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $k$.

Wreszcie, $F\colon S \to F(S)$ jest bijekcją gładką (w mapach plasterkowych powyżej, $F$ przyjmuje postać identyczności), której odwrotność $F^{-1}\colon F(S) \to S$ jest gładka z tego samego powodu. Zatem $F\colon S \to F(S)$ jest dyfeomorfizmem. □

**Definicja 1.12.5.** Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie, $q \in N$. Punkt $q$ jest *wartością regularną* $F$, jeśli dla każdego $p \in F^{-1}(q)$, $F$ jest submersją w $p$ (jeśli $F^{-1}(q) = \emptyset$, $q$ jest — pusto — wartością regularną).

**Twierdzenie 1.12.6** (Twierdzenie o przeciwobrazie wartości regularnej)**.** *Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie, $\dim M = m$, $\dim N = n$, i niech $q \in N$ będzie wartością regularną $F$ z $F^{-1}(q) \neq \emptyset$. Wówczas $F^{-1}(q)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $m - n$ w $M$, a dla każdego $p \in F^{-1}(q)$, $T_p(F^{-1}(q)) = \ker(dF_p) \subseteq T_pM$.*

*Dowód.* Niech $p \in F^{-1}(q)$. Ponieważ $F$ jest submersją w $p$, na mocy Wniosku 1.11.13 istnieją mapy $(U, \varphi)$ wokół $p$ ($\varphi(p) = 0$) i $(V, \psi)$ wokół $q$ ($\psi(q) = 0$), w których $F$ przyjmuje postać $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^n)$. W tych mapach,

$$\varphi(U \cap F^{-1}(q)) = \{u \in \varphi(U) : (u^1, \dots, u^n) = 0\} = \varphi(U) \cap (\{0\} \times \mathbb{R}^{m-n}).$$

Po przenumerowaniu współrzędnych w $\mathbb{R}^m$ (zamiana miejscami pierwszych $n$ z pozostałymi $m-n$), $(U, \varphi)$ staje się mapą plasterkową rzędu $m-n$ dla $F^{-1}(q)$ wokół $p$. Ponieważ $p \in F^{-1}(q)$ był dowolny, $F^{-1}(q)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $m - n$.

W drugiej części niech $\iota\colon F^{-1}(q) \hookrightarrow M$ będzie inkluzją. Jest ona immersją na mocy Stwierdzenia 1.12.2. Ponieważ $F \circ \iota$ jest odwzorowaniem stale równym $q$, jego różniczka znika: $dF_p \circ d\iota_p = 0$ (reguła łańcucha). Zatem $d\iota_p(T_pF^{-1}(q)) \subseteq \ker(dF_p)$; utożsamiając (poprzez injektywną różniczkę $d\iota_p$) $T_pF^{-1}(q)$ z jego obrazem w $T_pM$, mamy $T_pF^{-1}(q) \subseteq \ker(dF_p)$. Z rachunku wymiarów: $\dim T_pF^{-1}(q) = m - n$ (z pierwszej części dowodu), a $\dim \ker(dF_p) = m - \mathrm{rz}(dF_p) = m - n$ (bo $dF_p$ jest surjektywne na $T_qN$ wymiaru $n$, z definicji submersji). Zatem obie podprzestrzenie $T_pM$ mają ten sam, skończony wymiar $m-n$, a jedna zawiera się w drugiej — więc są równe. □

**Wniosek 1.12.7** (Twierdzenie o poziomicy)**.** *Jeśli $\dim M = n$, $f\colon M \to \mathbb{R}$ jest gładka, $c \in \mathbb{R}$ jest wartością regularną $f$ (tzn. $df_p \neq 0$ dla każdego $p \in f^{-1}(c)$) i $f^{-1}(c) \neq \emptyset$, to $f^{-1}(c)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $n - 1$ w $M$ („hiperpowierzchnią"), z $T_pf^{-1}(c) = \ker(df_p)$.*

*Dowód.* Szczególny przypadek Twierdzenia 1.12.6 z $N = \mathbb{R}$: submersywność $f$ w $p \in f^{-1}(c)$ to dokładnie warunek $df_p \neq 0$. □

**Przykład 1.12.8.** Niech $f\colon \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \|x\|^2$. Wtedy $df_x(v) = 2\langle x, v\rangle$, niezerowe dla $x \neq 0$. Ponieważ $S^n = f^{-1}(1)$ i $0 \notin f^{-1}(1)$, 1 jest wartością regularną — na mocy Wniosku powyżej, $S^n$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $n$ w $\mathbb{R}^{n+1}$ (zgodnie z tym, co wiedzieliśmy już z Przykładu 1.6.4; twierdzenie o poziomicy daje jednak krótszy dowód gładkości struktury na $S^n$, choć nie podaje jawnych map).

**Przykład 1.12.9** (Grupa ortogonalna)**.** Niech $F\colon M_n(\mathbb{R}) \to \mathrm{Sym}(n)$, $F(A) := A^TA$, gdzie $\mathrm{Sym}(n) \cong \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$ oznacza przestrzeń macierzy symetrycznych. Dla $H \in T_AM_n(\mathbb{R}) \cong M_n(\mathbb{R})$ stosujemy definicję różniczki przez krzywe do $\gamma(t) = A + tH$ w $M_n(\mathbb{R})$:

$$dF_A(H) = (F\circ\gamma)'(0) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0}(A+tH)^T(A+tH) = A^TH + H^TA.$$

Dla $A \in \mathrm{O}(n) := F^{-1}(I) = \{A : A^TA = I\}$, $dF_A$ jest surjektywne na $\mathrm{Sym}(n)$: dla symetrycznej $S$, kładąc $H := \frac{1}{2}AS$,

$$dF_A(H) = A^T(\tfrac{1}{2}AS) + (\tfrac{1}{2}AS)^TA = \tfrac{1}{2}(A^TA)S + \tfrac{1}{2}S^TA^TA = \tfrac{1}{2}S + \tfrac{1}{2}S = S$$

(korzystając z $A^TA = I$, $S^T = S$). Zatem $I$ jest wartością regularną $F$, więc $\mathrm{O}(n) = F^{-1}(I)$ jest podrozmaitością zanurzoną $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ wymiaru $n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$. Co więcej, $T_I\mathrm{O}(n) = \ker(dF_I) = \{H : H + H^T = 0\} =: \mathfrak{so}(n)$ — przestrzeń macierzy antysymetrycznych, wymiaru $n(n-1)/2$ (zgodnie z powyższym rachunkiem wymiaru).

*Uwaga* 1.12.10. Powyższy przykład jest pierwszym spotkaniem z fundamentalnym zjawiskiem: $\mathrm{O}(n)$ jest nie tylko rozmaitością, ale i grupą (względem mnożenia macierzy), w której mnożenie i branie odwrotności są gładkie — tzw. *grupą Liego* — a $T_I\mathrm{O}(n) = \mathfrak{so}(n)$ jest jej *algebrą Liego*.

**Przykład 1.12.11** (Torus jako regularna poziomica)**.** Niech $R > r > 0$, $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$ oraz $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \rho > 0\}$. Na tym otwartym zbiorze $f(x,y,z) = (\rho - R)^2 + z^2$ jest gładka. Poziom $f = r^2$ leży w $\Omega$, gdyż $|\rho - R| \le r < R$ daje $\rho \ge R - r > 0$. Różniczka w punkcie $\Omega$ ma postać

$$df = 2(\rho - R)\left(\frac{x}{\rho}\,dx + \frac{y}{\rho}\,dy\right) + 2z\,dz.$$

Jeżeli $df = 0$, to $z = 0$ oraz $\rho = R$: ponieważ $(x,y) \neq (0,0)$, nie mogą jednocześnie znikać współczynniki przy $dx, dy$, chyba że $\rho - R = 0$. Lecz wtedy $f = 0$, a więc taki punkt nie leży na poziomie $r^2 > 0$. Zatem $r^2$ jest wartością regularną i torus obrotowy $f^{-1}(r^2)$ jest gładką powierzchnią. Ponadto $T_pT^2 = \ker df_p$: wektor $(a,b,c)$ jest styczny wtedy i tylko wtedy, gdy $(\rho - R)(xa + yb)/\rho + zc = 0$.

*Dalsza lektura:* T. S. Mrowka, *Geometry of Manifolds*, wykład 1, definicje i przykłady rozmaitości; tenże, wykład 7, wiązka styczna; A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, § 1.1, wiązki wektorowe.

# Rozdział 2

# Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego

W Rozdziale 1 zbudowaliśmy przestrzenie styczne i wiązkę $TM$. Teraz wybieramy wektor $w$ *każdym* punkcie, w sposób gładki. Otrzymujemy pole wektorowe: jednocześnie operator różniczkowy, kierunek ruchu i infinitezymalny generator lokalnych dyfeomorfizmów. Z tego jednego pojęcia wynikają nawias Liego, krzywe całkowe, przepływy oraz pochodna Liego.

Rozdział rozwija rachunek pól oraz geometrię ich przepływów: najpierw rozwiązujemy równanie krzywej całkowej, a następnie badamy ruch punktów i sposób przenoszenia funkcji oraz pól wektorowych. Do dalszej topologii różniczkowej przydadzą się zwłaszcza prostowanie pola, pola zależne od czasu oraz rozszerzanie izotopii. Przez $M$ rozumiemy rozmaitość gładką w sensie Definicji 1.2.11, bez brzegu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszystkie pola i odwzorowania są klasy $C^\infty$. Uwagi o brzegu i końcach przedziału czasu rozumiemy według Definicji 1.3.1 i opisu przestrzeni stycznej w Stwierdzeniu 1.7.12. Tak samo interpretujemy gładkie rodziny na domkniętym przedziale czasu.

## 2.1 Pola wektorowe i derywacje globalne

W Sekcji 1.7 utożsamiliśmy wektor $v \in T_pM$ z *derywacją w punkcie* $v\colon C^\infty(M) \to \mathbb{R}$: po zastosowaniu do funkcji otrzymujemy liczbę. Pole wybiera taki wektor w każdym punkcie, a jego działanie na funkcję zwraca nową funkcję. Rozróżnienie tych dwóch typów derywacji będzie istotne.

**Definicja 2.1.1.** *Pole wektorowe* $X$ na $M$ to gładka sekcja wiązki stycznej $TM \to M$, czyli gładkie odwzorowanie $X\colon M \to TM$ spełniające $X(p) \in T_pM$ dla każdego $p$. Przestrzeń pól oznaczamy $\mathfrak{X}(M) = \Gamma(TM)$.

Wartość pola w ustalonym punkcie oznaczamy $X_p := X(p)$. Jest to jeden wektor styczny w $T_pM$; zapis $X_p(f)$ oznacza działanie tego wektora jako derywacji w punkcie $p$ na funkcję $f$. Na przykład wzór $X_{(u,v)} = (-v, u)$ na $\mathbb{R}^2$, po utożsamieniu $T_{(u,v)}\mathbb{R}^2$ z $\mathbb{R}^2$, określa pole: w każdym punkcie przypisuje wektor styczny zależny gładko od $(u, v)$. Poza początkiem układu wektor jest styczny do okręgu o środku w zerze, a w początku $X_{(0,0)} = 0$.

W mapie $(U; x^1, \dots, x^n)$ pole zapisuje się jednoznacznie jako

$$X\big|_U = \sum_{i=1}^{n} X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad X^i \in C^\infty(U). \tag{2.1.1}$$

Dokładniej, dla $p \in U$ jest to równość w $T_pM$: $X_p = \sum_i X^i(p)\, \partial_{x^i}|_p$. Lokalna trywializacja $TM$ z Rozdziału 1 pokazuje, że gładkość sekcji $X$ jest równoważna gładkości wszystkich $X^i$ w każdej

mapie. W drugą stronę gładkie współczynniki na obszarach map określają jedno pole, jeżeli na przecięciach opisują te same wektory styczne.

*Uwaga* 2.1.2 (Zmiana mapy a współczynniki pola). Niech $(U,\varphi)$ i $(V,\psi)$ będą mapami wokół $p$, o współrzędnych odpowiednio $x^1,\dots,x^n$ i $y^1,\dots,y^n$. Na $U\cap V$ to samo pole ma dwa zapisy:

$$X=\sum_i X^i_\varphi\frac{\partial}{\partial x^i}=\sum_j X^j_\psi\frac{\partial}{\partial y^j}.$$

W punkcie $p$ podstawiamy regułę zmiany baz z (1.7.1) do pierwszej sumy. Jednoznaczność współczynników w bazie $\{\partial_{y^j}|_p\}_j$ daje

$$X^j_\psi(p)=\sum_i \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\,X^i_\varphi(p). \tag{2.1.2}$$

Regułę stosujemy w każdym punkcie $U\cap V$; we wzorze występują wartości funkcji współczynnikowych w punkcie $p$. Można ją też zapisać dla reprezentantów pola w obrazach map. Jeśli $G=\psi\circ\varphi^{-1}$ oraz $\widehat{X}_\varphi(u):=(\mathrm{d}\varphi)_{\varphi^{-1}(u)}X_{\varphi^{-1}(u)}$ (analogicznie dla $\widehat{X}_\psi$), to

$$\widehat{X}_\psi(G(u))=DG(u)\,\widehat{X}_\varphi(u),\qquad u\in\varphi(U\cap V).$$

Równość wynika także wprost z reguły łańcucha dla $\psi=G\circ\varphi$ na $U\cap V$. Na przykład dla zmiany współrzędnej $y=2x$ na $\mathbb{R}$ pole $X=a(x)\partial_x$ ma w nowej współrzędnej postać $X=2a(y/2)\partial_y$.

Geometrycznie $X_p$ wskazuje kierunek i prędkość w punkcie $p$. Jeżeli $f\in C^\infty(M)$, czyli $f\colon M\to\mathbb{R}$, opisuje na przykład temperaturę, to $X_p(f)$ jest chwilowym tempem jej zmiany w kierunku wyznaczonym przez $X_p$.

Wyjaśnijmy, skąd bierze się krzywa używana do tego opisu. W modelu z Sekcji 1.7 każdy wektor styczny jest reprezentowany przez klasę krzywych. Wybierzmy mapę $(U,\varphi)$ wokół $p$, gdzie $\varphi=(x^1,\dots,x^n)$, i zapiszmy $X_p=\sum_{i=1}^n X^i(p)\,\partial_{x^i}|_p$. Oznaczmy $a=(X^1(p),\dots,X^n(p))\in\mathbb{R}^n$ i rozważmy krzywą $c(t)=\varphi(p)+ta$ w przestrzeni współrzędnych. Ponieważ $\varphi(U)$ jest otwarty i $c(0)=\varphi(p)$, istnieje $\varepsilon>0$ takie, że $c((-\varepsilon,\varepsilon))\subset\varphi(U)$. Możemy zatem zdefiniować

$$\gamma\colon(-\varepsilon,\varepsilon)\to U,\qquad \gamma(t)=\varphi^{-1}(\varphi(p)+ta).$$

Krzywa ta jest gładka i spełnia $\gamma(0)=p$ oraz $(\varphi\circ\gamma)'(0)=a$, więc jej klasa $[\gamma]$ odpowiada wektorowi $X_p$ przy utożsamieniu z rozdziału 1.

Pokażemy, że $X_p(f)$ jest pochodną funkcji $f$ wzdłuż skonstruowanej krzywej. Ponieważ $\gamma=\varphi^{-1}\circ c$ i $\gamma(t)\in U$, złożenie $f\circ\gamma$ jest dobrze określone oraz $f\circ\gamma=(f\circ\varphi^{-1})\circ c$. Stosując regułę łańcucha, otrzymujemy

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(\gamma(t)) &= D(f\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))\cdot c'(0)\\ &=\sum_{i=1}^n X^i(p)\frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})}{\partial u^i}(\varphi(p))=X_p(f).\end{aligned}$$

Ostatnia równość wynika z definicji derywacji współrzędnościowych. Rachunek obowiązuje dla każdej krzywej o klasie $[\gamma]=X_p$: jej prędkość w mapie w chwili $t=0$ jest zawsze równa $a$. Niezależność tej klasy od wyboru mapy ustaliliśmy w Sekcji 1.7.

Krzywa $\gamma$ reprezentuje zatem wektor w jednym punkcie; jej dalszy przebieg nie wpływa na $X_p(f)$. Nie musi być przy tym krzywą całkową pola $X$, gdyż wymagamy jedynie zgodności jej wektora stycznego z $X_p$ w chwili $t=0$.

**Definicja 2.1.3.** *Derywacją* algebry $C^\infty(M)$ nazywamy $\mathbb{R}$-liniowe odwzorowanie $D\colon C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ spełniające regułę Leibniza

$$D(fg) = fD(g) + gD(f), \qquad f, g \in C^\infty(M).$$

Zbiór takich derywacji oznaczamy $\mathrm{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M))$.

Warunek $\mathbb{R}$-liniowości oznacza liniowość względem stałych liczb. Z reguły Leibniza wynika $D(1) = D(1 \cdot 1) = 2D(1)$, więc $D(1) = 0$ i $D(c) = 0$ dla stałej $c$. Derywacja nie jest na ogół $C^\infty(M)$-liniowa jako operator na funkcjach: jej działanie na $hf$ zawiera dodatkowy składnik $fD(h)$.

Zacznijmy od pola $X$. Dla każdej funkcji $f \in C^\infty(M)$ określamy *funkcję* $D_X(f)$ przez

$$D_X(f)(p) := X_p(f), \qquad p \in M.$$

W mapie $X_p = \sum_i X^i(p)\, \partial_i|_p$, więc

$$D_X(f)\big|_U = \sum_i X^i \partial_i f, \qquad D_X(f)(p) = \sum_i X^i(p)\, \partial_i f(p).$$

W pierwszym wzorze $\partial_i f$ oznacza lokalną pochodną $f \circ \varphi^{-1}$, przeniesioną z powrotem na $U$. Suma gładkich funkcji jest gładka. Drugi wzór daje liczbę, bo po ustaleniu $p$ współczynniki $X^i(p)$ są liczbami. Punktowa reguła Leibniza dla $X_p$ daje $D_X(fg) = fD_X(g) + gD_X(f)$ po sprawdzeniu równości w każdym punkcie. Tak z pola otrzymujemy derywację globalną $D_X$.

W drugą stronę zacznijmy od *dowolnej* derywacji globalnej $D$. Dla ustalonego $p$ składamy ją z ewaluacją w $p$ i oznaczamy

$$v_p(f) := (D(f))(p), \qquad C^\infty(M) \xrightarrow{D} C^\infty(M) \xrightarrow{\mathrm{ev}_p} \mathbb{R}.$$

Funkcjonał $v_p$ jest $\mathbb{R}$-liniowy. Po ewaluacji globalnej reguły Leibniza dostajemy *punktową* regułę:

$$v_p(fg) = f(p)v_p(g) + g(p)v_p(f).$$

Z definicji przestrzeni stycznej $v_p \in T_pM$; nie jest to już operator o wartościach funkcyjnych. Lemat 1.7.6 zapewnia, że $v_p(f) = D(f)(p)$ zależy tylko od kiełka $f$ w $p$. Samo złożenie z ewaluacją daje na razie rodzinę wektorów; jej gładkość trzeba jeszcze udowodnić.

Na przykład na $\mathbb{R}$ operator $D(f)(x) = x^2 f'(x)$ jest derywacją globalną: $D(fg)(x) = x^2(f'(x)g(x) + f(x)g'(x)) = D(f)(x)g(x) + f(x)D(g)(x)$. Dla każdego $p$ daje derywację w punkcie $v_p = p^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big|_p$; w szczególności $v_2(f) = 4f'(2)$. Współczynnik $x^2$ globalnej derywacji staje się liczbą $p^2$ po ustaleniu punktu.

**Twierdzenie 2.1.4.** *Odwzorowanie*

$$\mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathrm{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M)), \qquad X \longmapsto D_X, \qquad D_X(f)(p) = X_p(f),$$

*jest izomorfizmem $C^\infty(M)$-modułów.*

*Dowód.* Sprawdziliśmy wyżej, że $D_X(f)$ jest gładka i że $D_X$ jest derywacją. Niech teraz $D$ będzie dowolną derywacją globalną. Z reguły Leibniza wynika, że $X_p(f) := D(f)(p)$ jest derywacją w punkcie, czyli elementem $T_pM$. Pokażemy, że $X\colon p \mapsto X_p$ jest gładką sekcją.

Ustalmy $p_0 \in M$ i mapę $(U; x^1, \ldots, x^n)$ wokół $p_0$. Wybierzmy otoczenie $V$ punktu $p_0$ o domknięciu zawartym w $U$ oraz funkcję odcinającą $\chi \in C^\infty(M)$, równą 1 na otoczeniu $\overline{V}$ i o nośniku zawartym w $U$. Funkcja $\widetilde{x}^i$, zadana na $U$ przez $\chi x^i$ i równa 0 poza $U$, jest gładka na

$M$. Na $V$ ma ten sam kiełek co $x^i$. Z Twierdzenia 1.7.7 (po ewentualnym przesunięciu początku współrzędnych) i lokalności derywacji punktowych wynika, że dla $p \in V$

$$X_p = \sum_i a^i(p)\, \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p, \qquad a^i(p) = X_p(\widetilde{x}^i) = D(\widetilde{x}^i)(p).$$

Istotnie, działanie obu stron na $\widetilde{x}^j$ daje tę samą liczbę $a^j(p)$, ponieważ $\partial_{x^i}|_p(\widetilde{x}^j) = \delta_i^j$. Każde $a^i = D(\widetilde{x}^i)|_V$ jest gładkie, gdyż $D$ przyjmuje wartości w $C^\infty(M)$. Gładkość lokalnych współczynników wokół każdego $p_0$ dowodzi gładkości $X$.

Dla każdego $f$ i $p$ mamy z konstrukcji $D_X(f)(p) = X_p(f) = D(f)(p)$, zatem $D_X = D$. Odwrotnie, jeśli zaczniemy od pola $X$, to ewaluacja $D_X$ w $p$ odzyskuje $X_p$ jako derywację punktową. Konstrukcje są więc wzajemnie odwrotne. Dodawanie pól odpowiada dodawaniu derywacji, a dla $h \in C^\infty(M)$ zachodzi $D_{hX}(f)(p) = h(p)X_p(f) = (hD_X)(f)(p)$. □

Odtąd skracamy zapis $D_X(f)$ do $X(f)$; jest to funkcja na $M$, podczas gdy $X_p(f) = X(f)(p)$ jest liczbą.

**Przykład 2.1.5** (Działanie pola na funkcję na okręgu)**.** Niech $S^1_r = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u^2+v^2 = r^2\}$, gdzie $r > 0$, oraz $\iota\colon S^1_r \hookrightarrow \mathbb{R}^2$ będzie inkluzją. Oznacza to po prostu $\iota(u,v) = (u,v)$: punkt okręgu traktujemy jako ten sam punkt płaszczyzny. Jest to ograniczenie identyczności $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ do $S^1_r$, a nie identyczność $S^1_r \to S^1_r$, bo przeciwdziedziną inkluzji jest $\mathbb{R}^2$. Pole $W = -v\partial_u + u\partial_v$ na $\mathbb{R}^2$ jest styczne do okręgu, bo $(u,v)\cdot(-v,u) = 0$. Określa zatem pole $X$ na $S^1_r$ przez $(\mathrm{d}\iota)_p X_p = W_p$. Wybierzmy lokalną mapę kątową $\varphi$ wokół rozważanego punktu: $\varphi^{-1}(t) = (r\cos t, r\sin t)$ i oznaczmy $p = \varphi^{-1}(t)$. Niech $F$ będzie gładka w otoczeniu okręgu. Z definicji różniczki oraz z reguły łańcucha otrzymujemy

$$\begin{aligned}\left[(\mathrm{d}\varphi^{-1})_t\Big(\frac{\partial}{\partial t}\Big|_t\Big)\right](F|_{S^1_r}) &= \frac{\partial}{\partial t}\Big|_t(F\circ\varphi^{-1}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(F\circ\varphi^{-1})(t)\\ &= -r\sin t\,\frac{\partial F}{\partial u}(p) + r\cos t\,\frac{\partial F}{\partial v}(p) = W_p(F) = X_p(F|_{S^1_r}).\end{aligned}$$

Ostatnia równość wynika z definicji różniczki inkluzji. Każda funkcja gładka $h$ na okręgu ma takie przedłużenie: w pierścieniu $q \neq 0$ możemy wziąć $F(q) = h(rq/\|q\|)$. Równość działań na wszystkich funkcjach na okręgu daje zatem równość w $T_pS^1_r$:

$$(\mathrm{d}\varphi^{-1})_t\Big(\frac{\partial}{\partial t}\Big|_t\Big) = X_p.$$

Po zastosowaniu $(\mathrm{d}\iota)_p$ ten wektor ma w $T_p\mathbb{R}^2$ zapis $-r\sin t\,\partial_u|_p + r\cos t\,\partial_v|_p$. Po utożsamieniu $T_p\mathbb{R}^2$ z $\mathbb{R}^2$ otrzymujemy parę $(-r\sin t, r\cos t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi^{-1}(t)$: symbole $\partial_u|_p, \partial_v|_p$ nie znikają, lecz stają się bazą, względem której zapisujemy parę współczynników.

Samo $\partial_u|_p$ na ogół nie jest styczne do okręgu; wektorowi $\partial_t|_t$ po zastosowaniu różniczki inkluzji odpowiada wskazana kombinacja obu wektorów otaczającej $\mathbb{R}^2$. Aby odczytać współrzędną pola w mapie kątowej, stosujemy $(\mathrm{d}\varphi)_p$ do równości wektorów powyżej:

$$\begin{aligned}X^1(t)\frac{\partial}{\partial t}\Big|_t &= (\mathrm{d}\varphi)_p(X_p)\\ &= (\mathrm{d}\varphi)_p(\mathrm{d}\varphi^{-1})_t\Big(\frac{\partial}{\partial t}\Big|_t\Big) = \frac{\partial}{\partial t}\Big|_t.\end{aligned}$$

Stąd $X^1(t) = 1$.

Dla $f(u,v) = u^2+v^2$ bierzemy funkcję $h = f|_{S^1_r}$. Wzór współrzędnościowy na działanie pola daje

$$X(h)(\varphi^{-1}(t)) = X^1(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(h\circ\varphi^{-1})(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\cos^2 t + r^2\sin^2 t) = 0.$$

Ta sama konstrukcja mapy działa lokalnie wokół każdego punktu okręgu. Wynik oznacza, że funkcja $f$ jest stała w kierunku pola stycznego do jej poziomicy $S^1_r$. Pole samo nie znika: dla $g(u,v)=u$ mamy $X(g|_{S^1_r})(\varphi^{-1}(t)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\cos t) = -r\sin t$.

*Uwaga* 2.1.6 (Moduł pól i lokalne bazy). Przestrzeń $\mathfrak{X}(M)$ jest modułem nad pierścieniem funkcji: $(hX)_p = h(p)X_p$. Po stronie derywacji mnożenie określa wzór $(hD)(f) = hD(f)$; reguła Leibniza dla $hD$ wynika przez pomnożenie obu stron reguły dla $D$ przez $h$. Nie musi mieć jednej globalnej bazy nad $C^\infty(M)$. Na przykład $TS^2$ nie jest wiązką trywialną; nie da się wybrać dwóch globalnych, wszędzie liniowo niezależnych pól na sferze. Lokalne bazy $\partial_{x^1},\dots,\partial_{x^n}$ zawsze istnieją. Używamy tu klasycznego twierdzenia o nieistnieniu nigdzie niezerowego pola na $S^2$; wynika ono również z późniejszego Twierdzenia 21.9.2 i $\chi(S^2)=2$.

*Uwaga* 2.1.7 (Kiedy używamy mapy do rachunku z polem). Dla pola na abstrakcyjnej rozmaitości mapa $(U; x^1,\dots,x^n)$ pozwala zapisać jego współczynniki i obliczyć działanie na funkcję:

$$X(f)(p) = \sum_{i=1}^{n} X^i(p)\,\frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p)), \qquad p\in U.$$

Jeśli rozmaitość jest podrozmaitością $\mathbb{R}^N$, można podać pole przez wzór na wektor w przestrzeni otaczającej przypisany każdemu jej punktowi. Trzeba wtedy sprawdzić, że wektor jest styczny oraz że zależy gładko od punktu. W poniższym przykładzie na $S^2$ styczność sprawdzamy przez prostopadłość do wektora normalnego $p$; nie obliczamy tam działania pola na funkcję.

Gdy chcemy obliczyć $X(f)$ dla funkcji $f$ określonej na podrozmaitości, możemy użyć wzoru w mapie. Możemy też wybrać lokalne gładkie przedłużenie $\widetilde{f}$ do otoczenia $p$ w $\mathbb{R}^N$ i obliczyć $X_p\cdot\nabla\widetilde{f}(p)$. Wynik nie zależy od przedłużenia: dwa przedłużenia są równe wzdłuż każdej krzywej na podrozmaitości, więc ich pochodne w kierunku stycznym $X_p$ też są równe.

**Przykład 2.1.8** (Pole na sferze)**.** Niech $S^2 = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2=1\}$. Symbole $x,y,z$ oznaczają tu ograniczenia trzech funkcji współrzędnych z $\mathbb{R}^3$ do $S^2$. Są to gładkie funkcje na sferze, lecz nie są trzema niezależnymi współrzędnymi mapy sfery: ich wartości spełniają równanie $x^2+y^2+z^2=1$. Mapa dwuwymiarowej sfery używa lokalnie dwóch współrzędnych, jak w przykładzie poniżej. Każdemu $p=(x,y,z)\in S^2$ przypiszmy wektor przestrzeni otaczającej

$$X_p = (-y,x,0)\in\mathbb{R}^3.$$

Wzór jest określony dla wszystkich punktów sfery i zależy od nich gładko, ponieważ jest ograniczeniem gładkiego odwzorowania $(x,y,z)\mapsto(-y,x,0)$ na $\mathbb{R}^3$. Ponieważ $p\cdot X_p = -xy+xy = 0$ oraz $T_pS^2 = \{w\in\mathbb{R}^3 : p\cdot w = 0\}$, mamy $X_p\in T_pS^2$. Otrzymujemy więc gładkie pole na sferze, mimo że do jego podania nie wybraliśmy mapy sfery. Dla przykładu, na górnej półsferze mapa $\varphi(x,y,z)=(x,y)=(u,v)$ ma odwrotność $\varphi^{-1}(u,v)=(u,v,\sqrt{1-u^2-v^2})$. Istotnie, $-v\,\partial_u\varphi^{-1} + u\,\partial_v\varphi^{-1} = (-v,u,0)$, więc w tej mapie pole ma postać $X = -v\partial_u + u\partial_v$. Pole ma zera na biegunach; poza nimi wskazuje kierunek obrotu wokół osi $z$.

*Uwaga* 2.1.9 (Pole wzdłuż odwzorowania). Dla gładkiego $F\colon M\to N$ i $X\in\mathfrak{X}(M)$ wektory $\mathrm{d}F_p(X_p)$ leżą w różnych przestrzeniach $T_{F(p)}N$. Tworzą *pole wzdłuż* $F$, czyli gładką sekcję wiązki cofniętej

$$F^*TN = \{(p,v) : p\in M,\ v\in T_{F(p)}N\} \longrightarrow M, \qquad (p,v)\longmapsto p.$$

Jeśli $x^i$ i $y^a$ są odpowiednio współrzędnymi na $M$ i $N$, to współrzędne tego przekroju nad $p$ mają postać $\sum_i X^i(p)\,\partial_i(y^a\circ F)(p)$. Są gładkie, bo $X^i$ i $y^a\circ F$ są gładkie. Nie musi on określać pola na $N$: dla $F(t)=t^2$ na $\mathbb{R}$ i $X=\partial_t$ otrzymujemy $\mathrm{d}F_t(X_t) = 2t\,\partial_y|_{t^2}$. Punkty $t$ oraz $-t$ mają ten sam obraz, lecz przeciwne wektory, gdy $t\neq 0$. Nawet zgodność wektorów na włóknach $F$ nie zapewnia zawsze gładkości pola na $N$; dla $F(t)=t^3$ otrzymalibyśmy na obrazie współczynnik $3|y|^{2/3}$, który nie jest gładki w zerze. Gdy $F$ jest dyfeomorfizmem, otrzymujemy natomiast pole

$$(F_*X)_q = \mathrm{d}F_{F^{-1}(q)}X_{F^{-1}(q)}.$$

Jest ono gładkie jako złożenie gładkich odwzorowań.

## 2.2 Nawias Liego: mierzenie nieprzemienności

Dwa pola są operatorami na funkcjach. Można je więc składać i wziąć ich komutator.

**Definicja 2.2.1.** *Nawiasem Liego* pól $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ nazywamy pole $[X, Y]$ zadane przez

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)), \qquad f \in C^\infty(M). \tag{2.2.1}$$

Choć $X \circ Y$ jako operator jest na ogół drugiego rzędu, wyrazy z pochodnymi drugimi znoszą się w różnicy.

**Fakt 2.2.2.** *$[X, Y]$ jest polem wektorowym. Ponadto nawias jest dwuliniowy nad $\mathbb{R}$, antysymetryczny i spełnia tożsamość Jacobiego*

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

*Jego reguła Leibniza względem funkcji ma postać*

$$[X, fY] = f[X, Y] + X(f)Y, \qquad [fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X. \tag{2.2.2}$$

*Dowód.* Pokażmy najpierw, że komutator jest derywacją, choć samo złożenie dwóch derywacji nią zazwyczaj nie jest. Dla funkcji $f, g$ dwukrotnie stosujemy regułę Leibniza:

$$\begin{aligned}
[X, Y](fg) &= X\big(Y(f)g + fY(g)\big) - Y\big(X(f)g + fX(g)\big) \\
&= X(Yf)g + Y(f)X(g) + X(f)Y(g) + fX(Yg) \\
&\quad - Y(Xf)g - X(f)Y(g) - Y(f)X(g) - fY(Xg) \\
&= [X, Y](f)g + f[X, Y](g).
\end{aligned}$$

Wyrazy mieszane znoszą się dokładnie parami. Komutator jest liniowy nad $\mathbb{R}$ i spełnia regułę Leibniza, więc z Twierdzenia 2.1.4 odpowiada gładkiemu polu wektorowemu. Z definicji natychmiast $[X, Y] = -[Y, X]$; liniowość w obu argumentach wynika z liniowości składania operatorów.

Sprawdźmy tożsamość Jacobiego, pokazując wszystkie wyrazy. Jako operatory na funkcjach mamy

$$\begin{aligned}
[X, [Y, Z]] &= XYZ - XZY - YZX + ZYX, \\
[Y, [Z, X]] &= YZX - YXZ - ZXY + XZY, \\
[Z, [X, Y]] &= ZXY - ZYX - XYZ + YXZ.
\end{aligned}$$

Suma prawych stron jest zerowa: np. $XYZ$ znosi się z $-XYZ$, a analogicznie pozostałe pięć możliwych kolejności. Ponieważ równość operatorów zachodzi na każdej funkcji, zachodzi równość pól wektorowych.

Na koniec stosujemy definicję do dowolnej funkcji $g$:

$$\begin{aligned}
[X, fY](g) &= X\big(fY(g)\big) - fY\big(X(g)\big) = X(f)Y(g) + f[X, Y](g), \\
[fX, Y](g) &= fX\big(Y(g)\big) - Y\big(fX(g)\big) = f[X, Y](g) - Y(f)X(g).
\end{aligned}$$

Funkcje rozróżniają pola, zatem są to dokładnie równości (2.2.2). □

W mapie, jeśli $X = X^i \partial_i$ i $Y = Y^j \partial_j$, to

$$[X, Y] = \sum_{j=1}^{n} \left( \sum_{i=1}^{n} X^i \frac{\partial Y^j}{\partial x^i} - Y^i \frac{\partial X^j}{\partial x^i} \right) \partial_j. \tag{2.2.3}$$

Istotnie, współczynnik przy $\partial_j$ jest równy $[X, Y](x^j) = X(Y^j) - Y(X^j)$; na funkcjach lokalnych możemy działać dzięki lokalności derywacji. Tu i dalej $\partial_i$ skraca $\partial/\partial x^i$, a powtórzony indeks w zapisie takim jak $X^i \partial_i$ oznacza sumowanie po tym indeksie. Ważny wniosek: $[\partial_i, \partial_j] = 0$ w układzie współrzędnych, ale ogólne pola bazowe, np. ramy ruchome, nie muszą komutować.

**Przykład 2.2.3** (Ścinanie płaszczyzny)**.** Niech $X = \partial_x$ i $Y = x\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$. Wtedy $[X, Y] = \partial_y$. Najpierw przesunięcie w kierunku $x$ zmienia prędkość pionową $Y$; wykonanie ruchów w odwrotnej kolejności daje inny wynik. Pole $Y$ ma zera na osi $x = 0$ i nie jest polem przesunięcia o stałej prędkości.

**Przykład 2.2.4** (Obrót i skalowanie)**.** Dla $R = -y\partial_x + x\partial_y$ i $E = x\partial_x + y\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$ mamy $[R, E] = 0$. Obrót i jednolite powiększenie można wykonywać w dowolnej kolejności. Jeśli zaś $X = \partial_x$, $Y = x\partial_y$, to wynik jest niezerowy mimo że w punkcie $(0, 0)$ mamy $Y = 0$; nawias uwzględnia zmienność pola w otoczeniu punktu.

*Uwaga* 2.2.5 (Rozkłady styczne i twierdzenie Frobeniusa). Rozkładem gładkim stałego rzędu $k$ nazywamy podwiązkę $\mathcal{D} \subset TM$, lokalnie rozpiętą przez $k$ gładkich, punktowo liniowo niezależnych pól. Jest *inwolutywny*, jeśli $[X, Y]$ jest sekcją $\mathcal{D}$, gdy $X, Y$ są jej sekcjami. Twierdzenie Frobeniusa mówi, że dokładnie wtedy lokalnie istnieją współrzędne $(u^1, \dots, u^n)$, w których $\mathcal{D} = \operatorname{span}(\partial_{u^1}, \dots, \partial_{u^k})$. Plasterki o stałych $u^{k+1}, \dots, u^n$ są wtedy lokalnymi podrozmaitościami całkowymi (fragmentami *liści*). Przykład przeciwny na $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{D} = \operatorname{span}\{\partial_x, \partial_y + x\partial_z\}.$$

Nawias generatorów jest równy $\partial_z$, który nie należy do $\mathcal{D}$. Nie ma zatem powierzchni, których przestrzenie styczne pokrywałyby się z tym rozkładem. Konieczność warunku jest widoczna już w mapie plasterkowej: składowe normalne pól stycznych znikają na podrozmaitości, więc ich pochodne w kierunkach stycznych również tam znikają; wzór (2.2.3) pokazuje, że nawias jest styczny. W przykładzie $\partial_z$ nie jest kombinacją generatorów: składowe $x, y$ wymusiłyby zerowe współczynniki. Dowód dostateczności podamy po twierdzeniu o prostowaniu pola, w Stwierdzeniu 2.5.4.

## 2.3 Krzywe całkowe i równania różniczkowe na rozmaitości

**Definicja 2.3.1.** *Krzywą całkową* pola $X$ nazywamy krzywą $\gamma\colon I \to M$ na otwartym przedziale $I \subset \mathbb{R}$ spełniającą

$$\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}. \tag{2.3.1}$$

Jeśli $0 \in I$ i $\gamma(0) = p$, mówimy o krzywej wychodzącej z $p$. Jest *maksymalna*, gdy nie daje się przedłużyć jako rozwiązanie na większy przedział.

Współrzędnie, dla $\gamma(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$, warunek (2.3.1) staje się układem równań różniczkowych zwyczajnych (ODE)

$$\frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t} = X^i(x^1(t), \dots, x^n(t)), \qquad i = 1, \dots, n.$$

Krzywa nie musi być prostą nawet wtedy, gdy wektory pola rysujemy jako małe strzałki. W każdym swoim punkcie porusza się w kierunku aktualnej strzałki; prędkość także jest przez nią określona.

**Twierdzenie 2.3.2** (Istnienie, jednoznaczność i zależność od danych)**.** *Dla każdego $p \in M$ istnieje dokładnie jedna maksymalna krzywa całkowa $\gamma_p\colon I_p \to M$ pola $X$, gdzie $I_p$ jest otwartym przedziałem zawierającym $0$ i $\gamma_p(0) = p$. Rozwiązania zależą gładko od czasu i punktu początkowego tam, gdzie są określone.*

*Dowód. Krok 1: konstrukcja w mapie.* Wybierzmy mapę wokół $p$ i oznaczmy przez $u_0$ współrzędne punktu $p$. Równanie (2.3.1) przyjmuje postać $u'(t) = F(u(t))$, gdzie $F$ jest gładkim odwzorowaniem otwartego zbioru w $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^n$. Wybierzmy $r > 0$ tak, aby domknięta kula

$\overline{B}_{2r}(u_0)$ leżała w dziedzinie mapy. Na tej kuli istnieją stałe $A, L \geq 0$ spełniające $\|F(u)\| \leq A$ oraz $\|\mathrm{D}F(u)\| \leq L$. Twierdzenie o wartości średniej daje $\|F(u)-F(v)\| \leq L\|u-v\|$ dla punktów tej kuli. Wybierzmy $h > 0$ tak, aby $hA < r$ i $hL < 1$ (gdy $A = 0$ lub $L = 0$, odpowiedni warunek jest automatyczny).

Dla każdego warunku początkowego $a \in B_r(u_0)$ rozważmy zupełną przestrzeń krzywych ciągłych $z\colon [-h,h] \to \overline{B}_{2r}(u_0)$ z normą supremum. Operator Picarda

$$(\mathcal{T}_a z)(t) = a + \int_0^t F(z(\tau))\,\mathrm{d}\tau$$

odwzorowuje ją w siebie, ponieważ $\|\mathcal{T}_a z(t) - u_0\| < r + hA < 2r$. Ponadto $\|\mathcal{T}_a z - \mathcal{T}_a w\|_\infty \leq hL\|z-w\|_\infty$. Z twierdzenia Banacha o punkcie stałym otrzymujemy jedną krzywą $z_a$ spełniającą równanie całkowe, a po zróżniczkowaniu $z_a'(t) = F(z_a(t))$. Jest ona gładka w czasie, bo $F$ jest gładkie.

*Krok 2: zależność od punktu początkowego.* Z równań całkowych dla $z_a$ i $z_b$ oraz z oszacowania kontrakcji otrzymujemy

$$\|z_a - z_b\|_\infty \leq \|a-b\| + hL\|z_a - z_b\|_\infty, \qquad \|z_a - z_b\|_\infty \leq \frac{\|a-b\|}{1-hL}.$$

To dowodzi najpierw ciągłej zależności, jednak do gładkości potrzeba więcej. Dla ustalonego $a$ rozwiążmy liniowe równanie całkowe dla macierzy $J_a(t)$:

$$J_a(t) = I + \int_0^t \mathrm{D}F(z_a(\tau))J_a(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Operator po prawej, działający na ciągłe funkcje o wartościach macierzowych, również ma stałą kontrakcji $hL < 1$. Istnieje więc jedyne $J_a$; spełnia ono równanie wariacyjne $J_a' = \mathrm{D}F(z_a)J_a$, $J_a(0) = I$.

Sprawdźmy, że jest to rzeczywiście pochodna względem $a$. Niech $v$ będzie małe, $\delta = z_{a+v} - z_a$. Ponieważ $\mathrm{D}^2F$ jest ograniczona na $\overline{B}_{2r}(u_0)$, rozwinięcie Taylora na odcinku między $z_a(\tau)$ a $z_{a+v}(\tau)$ daje, z pewną stałą $C$ niezależną od $v$ i $\tau$,

$$\|F(z_a(\tau)+\delta(\tau)) - F(z_a(\tau)) - \mathrm{D}F(z_a(\tau))\delta(\tau)\| \leq C\|\delta\|_\infty^2.$$

Odejmujemy równania całkowe dla $z_{a+v}$, $z_a$ i $J_a v$. Dla $R = z_{a+v} - z_a - J_a v$ dostajemy

$$\|R\|_\infty \leq hL\|R\|_\infty + hC\|\delta\|_\infty^2 \leq hL\|R\|_\infty + \frac{hC}{(1-hL)^2}\|v\|^2.$$

Zatem $\|R\|_\infty = O(\|v\|^2)$ i $\mathrm{D}_a z_a(t) = J_a(t)$. Dla ciągłości tej pochodnej zauważmy, że $\|J_a\|_\infty \leq (1-hL)^{-1}$ oraz

$$\|J_a - J_b\|_\infty \leq \frac{h}{(1-hL)^2}\|\mathrm{D}F(z_a) - \mathrm{D}F(z_b)\|_\infty.$$

Prawa strona dąży do zera dla $b \to a$, dzięki ciągłości $a \mapsto z_a$ i jednostajnej ciągłości $\mathrm{D}F$ na zwartej kuli. Dalsze pochodne otrzymujemy w ten sam sposób, ale trzeba odróżnić ich konstrukcję od formalnego różniczkowania. Na przykład kandydat na drugą pochodną $H_a(t)[v,w]$ spełnia

$$H_a(t)[v,w] = \int_0^t \big(\mathrm{D}F(z_a)H_a[v,w] + \mathrm{D}^2F(z_a)[J_a v, J_a w]\big)(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Najpierw rozwiązujemy to liniowe równanie całkowe dla $H_a$. Następnie odejmujemy równania dla $J_{a+v}$ i $J_a$ oraz kandydata $H_a[v,\cdot]$. Wzór Taylora dla $\mathrm{D}F$ i już dowiedziona różniczkowalność $z_a$ dają dla reszty oszacowanie $\|R\|_\infty \leq hL\|R\|_\infty + o(\|v\|)$, a więc $H_a = \mathrm{D}_a J_a$. Ogólnie, po $k$ różniczkowaniach złożenia $F(z_a)$ jedynym wyrazem zawierającym nieznaną $k$-tą pochodną $Z_k$

jest $\mathrm{D}F(z_a)Z_k$. Wszystkie pozostałe wyrazy są sumami iloczynów pochodnych $F$ i już skonstruowanych pochodnych $Z_j$ z $j<k$. Wyznaczają więc znane ciągłe wymuszenie. Równanie dla $Z_k$ ma ponownie stałą kontrakcji $hL<1$; porównanie równań dla $Z_{k-1}(a+v)$ i $Z_{k-1}(a)$ z wzorem Taylora daje tę samą resztę $o(\|v\|)$. Indukcyjnie dowodzi to istnienia wszystkich pochodnych, a porównanie równań przy $a,b$ — ich ciągłości. Równanie $z_a'=F(z_a)$ zapewnia również ciągłość pochodnych mieszanych po $t$ i $a$. Otrzymujemy gładkość $(t,a)\mapsto z_a(t)$.


*Krok 3: przedział maksymalny.* Dwie krzywe całkowe wychodzące z $p$ są równe w pobliżu zera na mocy powyższej jednoznaczności. Zbiór czasów, w których się zgadzają, jest domknięty w części wspólnej ich przedziałów przez ciągłość obu krzywych. Jest też otwarty: w punkcie, w którym się zgadzają, stosujemy lokalną jednoznaczność ponownie. Ponieważ część wspólna jest przedziałem, krzywe pokrywają się wszędzie, gdzie obie są określone. Można więc skleić wszystkie rozwiązania przez $p$ na sumie ich przedziałów. Suma ta jest otwartym przedziałem $I_p$ zawierającym zero; sklejenie daje rozwiązanie, którego żadne dalsze przedłużenie nie istnieje. Jednoznaczność w mapach zapewnia, że konstrukcja nie zależy od wyboru współrzędnych. Gładkość przy innych chwilach niż zero uzyskujemy, zaczynając lokalny argument od dowolnego punktu tej krzywej; szczegóły otwartości wspólnej dziedziny podajemy w dowodzie Twierdzenia 2.4.2. □

Jeśli $X_p=0$, to jedyną krzywą wychodzącą z $p$ jest krzywa stała. Jeśli dwie krzywe całkowe spotkają się, to po odpowiednim przesunięciu parametru czasu pokrywają się tam, gdzie obie są określone. Mogą więc tworzyć orbitę okresową, lecz nie mogą przecinać się transwersalnie jako trajektorie tego samego pola.

**Przykład 2.3.3** (Obrót)**.** Na $\mathbb{R}^2$ niech $X=-y\partial_x+x\partial_y$. Układ $x'=-y$, $y'=x$ daje

$$\gamma_{(a,b)}(t)=(a\cos t-b\sin t,\ a\sin t+b\cos t). \tag{2.3.2}$$

Dla $(a,b)\neq(0,0)$ trajektorią jest okrąg o promieniu $\sqrt{a^2+b^2}$, przebiegany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Początek układu jest punktem stałym.




Rysunek 2.1: Pole obrotowe $X=(-y,x)$: zielone strzałki przedstawiają wartości pola pomniejszone wspólnym czynnikiem 0.22, a czerwona krzywa jest jego krzywą całkową. Strzałka pola w każdym punkcie jest styczna do trajektorii.

**Przykład 2.3.4** (Zmiana prędkości bez zmiany orbit)**.** Jeżeli $Y=fX$, gdzie $f>0$, to $X$ i $Y$ wyznaczają te same *zorientowane ślady* krzywych całkowych, choć czas ich przebiegania jest inny. Gdy $f$ zmienia znak, orientacja ruchu może się zmienić; gdy znika, pojawiają się punkty stałe. Dlatego sam obraz krzywych nie wyznacza pola ani jego przepływu. Dokładniej, jeśli $\gamma:I\to M$ jest krzywą $X$ z $\gamma(0)=p$, to funkcja

$$s(\tau)=\int_0^{\tau}\frac{du}{f(\gamma(u))}$$

ma dodatnią pochodną i jest dyfeomorfizmem $I$ na pewien przedział $J$. Dla odwrotności $\tau = \tau(s)$ krzywa $\eta(s) = \gamma(\tau(s))$ spełnia $\eta' = f(\eta)X_\eta = Y_\eta$. Ta sama konstrukcja z $X = Y/f$ pokazuje równość orbit maksymalnych. Dokładniej, gdyby $\eta$ dała się przedłużyć przez skończony koniec $J$, równanie $\tau'(s) = f(\eta(s))$ dawałoby tam skończoną wartość $\tau$ i dodatnią pochodną. Odwrotna zmiana czasu przedłużyłaby wtedy $\gamma$ przez koniec $I$, wbrew jej maksymalności. Przedziały czasu mogą jednak być różne: zupełne $X = \partial_x$ po pomnożeniu przez $f(x) = 1 + x^2$ daje niezupełne pole z krzywą $\tan s$ przez zero.

## 2.4 Przepływ lokalny, maksymalny i zupełny

Krzywe całkowe dla wszystkich punktów początkowych łączą się w jedno odwzorowanie. W czasie $t$ przesuwamy punkt o tyle, ile pozwala równanie (2.3.1).

**Definicja 2.4.1.** Niech $\gamma_p\colon I_p \to M$ będzie maksymalną krzywą całkową. *Dziedziną maksymalnego przepływu* jest zbiór $\mathcal{D}_X = \{(t,p) \in \mathbb{R}\times M : t \in I_p\}$, a *przepływem* pola $X$ odwzorowanie

$$\Phi\colon \mathcal{D}_X \to M, \qquad \Phi(t,p) = \Phi_t(p) := \gamma_p(t).$$

Pole jest *zupełne*, jeśli $\mathcal{D}_X = \mathbb{R}\times M$.

**Twierdzenie 2.4.2** (Podstawowe własności przepływu)**.** *Zbiór $\mathcal{D}_X$ jest otwarty, a $\Phi$ jest gładki. Zachodzi*

$$\Phi_0 = \mathrm{id}_M, \qquad \Phi_{t+s}(p) = \Phi_t(\Phi_s(p))$$

*dokładnie dla $s \in I_p$ i $t \in I_{\Phi_s(p)}$; przy tym $I_{\Phi_s(p)} = I_p - s$. Dla $M_t := \{p \in M : t \in I_p\}$ odwzorowania $\Phi_t\colon M_t \to M_{-t}$ i $\Phi_{-t}$ są wzajemnie odwrotnymi dyfeomorfizmami między otwartymi zbiorami. Ponadto*

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \Phi_t(p) = X_p, \qquad (\mathrm{d}\Phi_t)_p X_p = X_{\Phi_t(p)}. \tag{2.4.1}$$

*Jeśli $X$ jest zupełne, $(\Phi_t)_{t\in\mathbb{R}}$ jest jednoparametrową grupą dyfeomorfizmów.*

*Dowód. Otwartość i gładkość.* Krok 1 poprzedniego dowodu daje dla każdego $q \in M$ otoczenie $W_q$ i liczbę $\varepsilon_q > 0$, wspólną dla punktów początkowych z $W_q$, na której lokalne rozwiązanie istnieje i jest gładkie względem $(u,x)$. Ustalmy $(t_0,p_0) \in \mathcal{D}_X$; rozważmy najpierw $t_0 > 0$. Krzywa $\gamma_{p_0}$ jest określona na pewnym otwartym przedziale obejmującym $[0,t_0]$. Jej obraz $K = \gamma_{p_0}([0,t_0])$ jest zwarty. Z pokrycia $K$ przez otwarte zbiory $W_q$ wybierzmy skończone podpokrycie $W_{q_1},\dots,W_{q_m}$. Liczba $\varepsilon = \min_i \varepsilon_{q_i}$ jest dodatnia: z każdego punktu $K$ można rozpocząć lokalne rozwiązanie przez czas co najmniej $\varepsilon$. Podzielmy odcinek czasu na

$$0 = \tau_0 < \tau_1 < \cdots < \tau_N = t_0$$

o długościach $\tau_{j+1} - \tau_j < \varepsilon/2$. Każdy krok wzdłuż $\gamma_{p_0}$ jest wtedy fragmentem lokalnego rozwiązania z jednego $W_{q_i}$.

Dla $j = 0$ lokalny przepływ o czas $\tau_1 - \tau_0$ jest określony i gładki na pewnym otoczeniu $p_0$. Jego obraz punktu $p_0$ to $\gamma_{p_0}(\tau_1)$. Ciągłość pozwala zmniejszyć otoczenie tak, by obrazy pobliskich punktów należały do dziedziny następnego kroku. Powtarzając ten argument skończenie wiele razy, otrzymujemy otoczenie $V$ punktu $p_0$, na którym $p \mapsto \Phi_{t_0}(p)$ jest gładkim złożeniem lokalnych rozwiązań. W otoczeniu punktu $\Phi_{t_0}(p_0)$ można prowadzić rozwiązanie jeszcze przez wspólny krótki czas $u$. Po ewentualnym zmniejszeniu $V$ wzór

$$\Phi_{t_0+u}(p) = \Phi_u\big(\Phi_{t_0}(p)\big)$$

wynika z jednoznaczności i definiuje gładkie odwzorowanie dla $(u,p)$ bliskich $(0,p_0)$. To samo rozumowanie działa dla $t_0 < 0$, idąc po krzywej wstecz; przy $t_0 = 0$ wystarcza konstrukcja

lokalna. W konsekwencji każde $(t_0, p_0) \in \mathcal{D}_X$ ma otoczenie zawarte w $\mathcal{D}_X$, na którym $\Phi$ jest gładkie. Dowodzi to zarazem otwartości dziedziny i gładkości przepływu.

*Przesunięcie czasu i prawo grupowe.* Niech $s \in I_p$ i $q = \Phi_s(p)$. Krzywa $u \mapsto \gamma_p(s+u)$, określona na $I_p - s$, jest rozwiązaniem wychodzącym z $q$, więc z jednoznaczności $I_p - s \subset I_q$. W szczególności $-s \in I_q$. Krzywa $v \mapsto \gamma_q(v-s)$, określona na $s + I_q$, jest rozwiązaniem przez $p$ w chwili $v = 0$. Maksymalność $\gamma_p$ daje $s + I_q \subset I_p$. Oba zawierania dowodzą $I_q = I_p - s$ i

$$\Phi_u(q) = \gamma_q(u) = \gamma_p(s+u) = \Phi_{s+u}(p) \quad \text{dla każdego } u \in I_q.$$

Gdy $s \in I_p$, warunki $u \in I_q$ i $s+u \in I_p$ są więc równoważne. Zatem równość składania obowiązuje dokładnie przy warunkach podanych w tezie. Szczególny przypadek $s = 0$ daje $\Phi_0(p) = p$.

*Odwrotności i generator.* Ponieważ $\mathcal{D}_X$ jest otwarty, każdy $M_t$ jest otwarty. Jeśli $q = \Phi_t(p)$, to $-t \in I_q$ i prawo składania daje $\Phi_{-t}(q) = p$. Ten sam argument z zamienionymi $t$ i $-t$ pokazuje, że $\Phi_t(M_t) = M_{-t}$; gładkość obu odwzorowań daje dyfeomorfizm. Pierwszy wzór w (2.4.1) jest równaniem krzywej całkowej w chwili zero. Dla drugiego różniczkujemy względem $s$ w zerze równość $\Phi_t(\Phi_s(p)) = \Phi_s(\Phi_t(p))$. Po lewej stronie reguła łańcucha daje $(\mathrm{d}\Phi_t)_p X_p$, po prawej $X_{\Phi_t(p)}$.

Jeżeli $X$ jest zupełne, $M_t = M$ dla każdego $t$. Wtedy wszystkie $\Phi_t$ są dyfeomorfizmami całej rozmaitości i $\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$, $\Phi_0 = \mathrm{id}_M$, $\Phi_t^{-1} = \Phi_{-t}$. Składanie dyfeomorfizmów jest łączne, a wzór na parametry daje wprost $\Phi_r \circ (\Phi_s \circ \Phi_t) = \Phi_{r+s+t} = (\Phi_r \circ \Phi_s) \circ \Phi_t$. Odwzorowanie $t \mapsto \Phi_t$ jest więc homomorfizmem $(\mathbb{R}, +) \to \mathrm{Diff}(M)$, a $(t,p) \mapsto \Phi_t(p)$ jest gładkim działaniem tej grupy na $M$. Dla pola niezupełnego te same wzory mają sens tylko w opisanych wyżej otwartych dziedzinach. □

**Stwierdzenie 2.4.3** (Grupa przepływu wyznacza swoje pole)**.** *Jeśli gładkie odwzorowanie $H\colon \mathbb{R} \times M \to M$ spełnia $H_0 = \mathrm{id}_M$ i $H_{t+s} = H_t \circ H_s$, to*

$$X_p := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} H_t(p)$$

*jest gładkim zupełnym polem wektorowym, a $H_t = \Phi_t^X$ dla wszystkich $t \in \mathbb{R}$.*

*Dowód.* Prawo grupowe daje $H_t \circ H_{-t} = H_{-t} \circ H_t = H_0 = \mathrm{id}_M$. Zatem każdy $H_t$ jest dyfeomorfizmem o gładkiej odwrotności $H_{-t}$. Gładkość $H$ zapewnia gładkość przyporządkowania $p \mapsto X_p$. Z prawa grupowego $H_{t+h}(p) = H_h(H_t(p))$ otrzymujemy, różniczkując względem $h$ w zerze,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H_t(p) = X_{H_t(p)}, \qquad H_0(p) = p.$$


Zatem $t \mapsto H_t(p)$ jest krzywą całkową $X$ dla każdego $t \in \mathbb{R}$. Jednoznaczność maksymalnej krzywej daje $H_t(p) = \Phi_t^X(p)$; istnienie $H_t(p)$ dla wszystkich czasów dowodzi zupełności pola. □

**Przykład 2.4.4** (Trzy zupełne przepływy)**.** Na $\mathbb{R}^n$ pole stałe $X = v$ ma $\Phi_t(x) = x + tv$. Pole Eulera $E = \sum_i x^i \partial_i$ ma $\Phi_t(x) = e^t x$. Pole obrotowe z (2.3.2) ma $\Phi_t(a,b) = (a\cos t - b\sin t, a\sin t + b\cos t)$. Wszystkie rozwiązania są określone dla całego $t \in \mathbb{R}$.

**Przykład 2.4.5** (Ucieczka w skończonym czasie)**.** Dla $X = x^2 \partial_x$ na $\mathbb{R}$ krzywa przez $x_0$ spełnia

$$\Phi_t(x_0) = \frac{x_0}{1 - t x_0}, \qquad x_0 \neq 0.$$

Jeśli $x_0 > 0$, jej dziedzina to $(-\infty, 1/x_0)$; jeśli $x_0 < 0$, to $(1/x_0, \infty)$. Dla $x_0 = 0$ krzywa jest stała i istnieje dla wszystkich czasów. Pole jest gładkie na całej prostej, ale nie jest zupełne: nieograniczony wzrost rozwiązania powoduje ucieczkę do nieskończoności w skończonym czasie.




Rysunek 2.2: Przepływ przesuwa punkty wzdłuż krzywych całkowych. Czerwony przekrój poprzeczny $S_0$ przechodzi w zielony $S_t$; oba przekroje mają dokładnie te same wartości stałej $y - A\sin(\kappa x)$, gdzie $A = 0.17$ i $\kappa = 38\pi/180$. Są to trajektorie pola $X = (1, A\kappa\cos(\kappa x))$. Jego przepływ to $\Phi_s(x, y) = (x{+}s, y{+}A[\sin(\kappa(x{+}s)){-}\sin(\kappa x)])$; na rysunku $t = 1.68{-}(-1.88) = 3.56$.

**Twierdzenie 2.4.6** (Kryterium przedłużenia i dwa warunki zupełności)**.** *Jeśli maksymalna krzywa całkowa ma skończony prawy koniec $b$, to opuszcza w pobliżu $b$ każdy zwarty podzbiór $M$. W konsekwencji każde pole na rozmaitości zwartej jest zupełne. Każde pole o zwartym nośniku na dowolnej rozmaitości także jest zupełne.*

*Dowód. Kryterium przedłużenia.* Niech $I_p = (a, b)$ i $b < \infty$. Załóżmy przeciwnie, że istnieją zbiór zwarty $K \subset M$ i ciąg $t_j \nearrow b$ taki, że $\gamma_p(t_j) \in K$. Po wybraniu podciągu mamy $\gamma_p(t_j) \to q \in K$. Lokalne twierdzenie o istnieniu w $q$ daje otoczenie $W \ni q$ i $\varepsilon > 0$ takie, że z każdego punktu $W$ można prowadzić rozwiązanie przez wszystkie czasy $u \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Dla dużego $j$ zachodzi $\gamma_p(t_j) \in W$ oraz $b - t_j < \varepsilon/2$. Krzywa

$$u \longmapsto \Phi_u(\gamma_p(t_j)), \qquad -\varepsilon < u < \varepsilon,$$

pokrywa się z $u \mapsto \gamma_p(t_j{+}u)$ w ich wspólnej dziedzinie, bo obie zaczynają w $\gamma_p(t_j)$. Możemy więc skleić je w krzywą określoną także dla $t > b$, sprzecznie z maksymalnością $I_p$. Przy skończonym lewym końcu stosujemy ten sam argument do pola $-X$ i czasu odwróconego.

*Zupełność na zbiorach zwartych.* Jeśli $M$ jest zwarta, każda trajektoria przez cały czas leży w jednym zwartym zbiorze $M$. Kryterium wyklucza oba skończone końce $I_p$, zatem $I_p = \mathbb{R}$. Teraz niech $K = \operatorname{supp} X$ będzie zwarty. Jeśli $p \notin K$, to $X_p = 0$, więc krzywa stała w $p$ jest, z jednoznaczności, całą krzywą maksymalną. Jeśli $p \in K$, krzywa nie może wejść do $M \setminus K$: od chwili wejścia byłaby stała, a jednoznaczność, zastosowana także wstecz w czasie, zmusiłaby ją do bycia stałą już w chwili zero. W obu przypadkach obraz $\gamma_p$ leży w zwartym zbiorze $K \cup \{p\}$; kryterium znów daje $I_p = \mathbb{R}$. □

*Uwaga* 2.4.7 (Nie mylić zupełności z brakiem zer). Zupełne pole może mieć zera (obrót na płaszczyźnie), a pole bez zer może być niezupełne, np. $X = (1 + x^2)\partial_x$ na $\mathbb{R}$. Dla rozmaitości z brzegiem pole musi dodatkowo być styczne do brzegu, aby dać dwustronny przepływ zachowujący tę rozmaitość. Istotnie, dyfeomorfizmy zachowują brzeg, więc różniczkowanie krzywej $t \mapsto \Phi_t(p)$ dla $p \in \partial M$ daje $X_p \in T_p\partial M$. Odwrotnie, dla pola stycznego do brzegu rozwiązujemy równanie również na $\partial M$; jednoznaczność w lokalnym przedłużeniu pola zapewnia, że jego krzywe przez brzeg pozostają na brzegu. Krzywe z wnętrza nie mogą go przekroczyć, bo przy pierwszym spotkaniu jednoznaczność wstecz wymuszałaby wcześniejszy pobyt na brzegu. Pole skierowane do wnętrza na brzegu daje zwykle przepływ tylko dla małych dodatnich czasów, co wykorzystamy do budowania kołnierza. Na przykład na $M = [0, \infty)$ pole $X = \partial_r$ jest gładkim przekrojem pełnej wiązki stycznej, także w 0. Krzywa całkowa zaczynająca się w 0 musiałaby mieć postać $r(t) = t$, więc dla $t < 0$ opuszczałaby $M$. Nie ma tu sprzeczności ze Stwierdzeniem 1.7.12: $T_0M \cong \mathbb{R}$, ale $T_0\partial M = \{0\}$ i $X_0 \notin T_0\partial M$. Styczność do brzegu zapewnia lokalny przepływ dwustronny; jego istnienie dla wszystkich czasów wymaga ponadto zupełności.

## 2.5 Geometria przepływu: prostowanie, niezmienniki, komutowanie

**Definicja 2.5.1** (Orbita i nasycenie przez przepływ)**.** *Orbitą* punktu $p$ pod przepływem pola $X$ jest $\mathcal{O}_X(p) = \{\Phi_t(p) : t \in I_p\}$. Dla $A \subseteq M$ jego *nasycenie przez przepływ* to suma orbit punktów z $A$:

$$\mathrm{Sat}_X(A) = \bigcup_{p \in A} \mathcal{O}_X(p).$$

Zbiór $A$ jest *nasycony przez* $X$, gdy $\mathrm{Sat}_X(A) = A$, czyli gdy $p \in A$ i $t \in I_p$ pociągają za sobą $\Phi_t(p) \in A$.

To jest nasycenie względem relacji „leżeć na tej samej orbicie” w sensie Definicji 1.1.4. Istotnie, gdy $q = \Phi_s(p)$, to $I_q = I_p - s$ i $\mathcal{O}_X(q) = \mathcal{O}_X(p)$ na mocy Twierdzenia 2.4.2; orbity rozcinają więc $M$ na rozłączne klasy. Na przykład dla $X = \partial_x$ na $\mathbb{R}^2$ nasyceniem $\{0\} \times (0,1)$ jest cały pas $\mathbb{R} \times (0,1)$.

**Twierdzenie 2.5.2** (Twierdzenie o prostowaniu pola)**.** *Jeśli $X_p \neq 0$, to istnieją współrzędne $(t, z^2, \ldots, z^n)$ w otoczeniu $p$, w których $X = \partial_t$. W tych współrzędnych lokalny przepływ ma postać*

$$(t, z^2, \ldots, z^n) \longmapsto (t + s, z^2, \ldots, z^n).$$

*Dowód.* Wybieramy małą $(n-1)$-wymiarową podrozmaitość $S$ przechodzącą przez $p$ i poprzeczną do $X_p$, oraz parametryzację $\sigma\colon V \subset \mathbb{R}^{n-1} \to S$ z $\sigma(0) = p$. Można ją zbudować bez dodatkowego twierdzenia: wybieramy mapę z $p = 0$ i po liniowej zmianie współrzędnych z pierwszą składową $X_p$ niezerową; bierzemy $S = \{x^1 = 0\}$ w tej mapie. Odwzorowanie $F(t, z) = \Phi_t(\sigma(z))$ ma w $(0,0)$ różniczkę, której pierwszą kolumną jest $X_p$, a pozostałe kolumny rozpinają $T_pS$. Jest więc izomorfizmem. Z twierdzenia o funkcji odwrotnej $F$ jest lokalnym dyfeomorfizmem. Zmniejszamy jego dziedzinę do produktu $(-\varepsilon, \varepsilon) \times V_0$. Ponieważ $\partial_t F(t,z) = X_{F(t,z)}$, we współrzędnych $F^{-1}$ pole ma postać $\partial_t$. Prawo grupowe daje $\Phi_s(F(t,z)) = F(t+s, z)$, dopóki $t$ i $t+s$ leżą w tym przedziale. To wyjaśnia lokalny zakres wzoru z tezy. □

*Uwaga* 2.5.3. Pola nie można wyprostować w zerze $X_p = 0$: dyfeomorfizm przenosi wektor zerowy na wektor zerowy, natomiast $\partial_t$ nigdzie nie znika. W zerze lokalne trajektorie i zachowanie przepływu bada się innymi metodami niż prostowanie pola.

**Stwierdzenie 2.5.4** (Lokalne twierdzenie Frobeniusa)**.** *Gładki rozkład inwolutywny $\mathcal{D}$ stałego rzędu $k$ ma lokalnie współrzędne, w których jest rozpięty przez pierwsze $k$ pól współrzędnych.*

*Dowód.* Przeprowadzimy indukcję po $k$, jednocześnie dla wszystkich wymiarów rozmaitości. Dla $k = 0$ teza jest natychmiastowa. Dla $k \geq 1$ wybieramy lokalną bazę $X_1, \ldots, X_k$ rozkładu i prostujemy niezerowe $X_1$. Mamy więc współrzędne $(t, z)$ w produkcie wokół $(0,0)$, z $X_1 = \partial_t$. Od każdego $X_j$, $j \geq 2$, odejmujemy jego składową w kierunku $\partial_t$. Otrzymane pola $Y_2, \ldots, Y_k$ nie mają tej składowej, a wraz z $\partial_t$ nadal stanowią bazę $\mathcal{D}$. Jeśli $k = 1$, dowód jest już zakończony.

Niech $B(t,z)$ będzie macierzą o $k-1$ kolumnach złożonych ze składowych $Y_2, \ldots, Y_k$ w kierunkach $z$. Inwolutywność daje $[\partial_t, Y_j] \in \mathcal{D}$; ponieważ ten nawias nie ma składowej czasowej, jest kombinacją samych $Y_2, \ldots, Y_k$. Zatem

$$\partial_t B(t,z) = B(t,z) A(t,z)$$

dla pewnej gładkiej macierzy kwadratowej $A$. Gładkość współczynników wynika z rozwiązania układu za pomocą niezerowego minora macierzy $B$, po zmniejszeniu otoczenia. Rozwiązujemy macierzowe równanie

$$\partial_t Q(t,z) = -A(t,z) Q(t,z), \qquad Q(0,z) = I.$$

Istnienie i gładka zależność od $z$ wynikają z Twierdzenia 2.3.2: dołączamy zmienne z równaniami $t' = 1$, $z' = 0$. Po zmniejszeniu produktu $Q$ jest odwracalna, bo $Q(0,0) = I$. Reguła iloczynu daje

$$\partial_t(BQ) = BAQ - BAQ = 0, \qquad B(t,z)Q(t,z) = B(0,z).$$

Kolumny $BQ$ wyznaczają więc nową bazę pól pionowych niezależnych od $t$, rozpinającą te same kierunki co kolumny $B$. Na przekroju $t = 0$ tworzą rozkład rzędu $k-1$. Jest on inwolutywny: nawiasy tych pól nie mają składowej czasowej, należą do $\mathcal{D}$ i nie zależą od $t$; reguła Leibniza dla nawiasu rozszerza to na dowolne sekcje. Z założenia indukcyjnego istnieje zmiana współrzędnych $z$ prostująca ten rozkład. Stosujemy ją niezależnie od $t$. Ponieważ baza pionowa nie zależy od czasu, w całym produkcie $\mathcal{D}$ jest rozpięty przez $\partial_t$ i pierwsze $k-1$ nowych pól współrzędnych na przekroju. To kończy indukcję. □

**Stwierdzenie 2.5.5** (Funkcje i pola niezmiennicze)**.** *Dla zupełnego $X$ funkcja $f$ jest stała na każdej jego trajektorii wtedy i tylko wtedy, gdy $X(f) = 0$. Przepływ zawsze zachowuje pole, które go generuje: $(\Phi_t)_* X = X$. Dla innego pola $Y$ następujące warunki są równoważne:*

*(i)* $[X, Y] = 0$*;*

*(ii)* $(\Phi_t)_* Y = Y$ *dla wszystkich* $t$*;*

*(iii) lokalne przepływy $X$ i $Y$ komutują tam, gdzie są określone.*

*W przypadku pól zupełnych ostatni punkt oznacza $\Phi_t^X \circ \Phi_s^Y = \Phi_s^Y \circ \Phi_t^X$ dla wszystkich $s, t$.*

*Dowód.* Reguła łańcucha daje $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\Phi_t(p)) = X(f)(\Phi_t(p))$. Druga równość wynika z (2.4.1). Dla $Y$ użyjemy wzoru udowodnionego poniżej w Stwierdzeniu 2.6.3: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_t^* Y = \Phi_t^*[X, Y]$. Jeśli (i) zachodzi, cofnięte pole ma zerową pochodną i wartość $Y$ w chwili zero, więc $\Phi_t^* Y = Y$. Ponieważ $\Phi_t^* Y = (\Phi_{-t})_* Y$, jest to (ii). Odwrotnie, różniczkowanie (ii) w zerze daje $[X, Y] = 0$. Niech $\Psi_s$ oznacza maksymalny przepływ $Y$. Przy (ii) dla każdego ustalonego $t$ krzywa $s \mapsto \Phi_t(\Psi_s(p))$ ma pochodną $\mathrm{d}\Phi_t(Y) = Y$ i zaczyna w $\Phi_t(p)$. Jednoznaczność daje $\Phi_t(\Psi_s(p)) = \Psi_s(\Phi_t(p))$. Ponieważ $\Phi_t$ jest globalnym dyfeomorfizmem, zastosowanie tego samego argumentu do $\Phi_{-t}$ pokazuje równość maksymalnych przedziałów $Y$ przez $p$ i $\Phi_t(p)$. Wyjaśnia to również zgodność dziedzin w (iii). Różniczkując (iii) po $s$ w zerze, odzyskujemy $\mathrm{d}\Phi_t(Y_p) = Y_{\Phi_t(p)}$, czyli (ii). □

**Przykład 2.5.6** (Pierwsza całka)**.** Dla pola obrotowego $R = -y\partial_x + x\partial_y$ funkcja $f(x,y) = x^2 + y^2$ spełnia $R(f) = 0$. Jej dodatnie poziomice są okręgami, po których biegnie przepływ; poziomica zerowa to nieruchomy punkt $(0,0)$, a ujemne są puste. W zagadnieniach dynamiki taka funkcja to *pierwsza całka*.

## 2.6 Pochodna Liego: porównywanie danych w różnych punktach


Nie można po prostu odjąć wektorów $Y_{\Phi_t(p)}$ i $Y_p$: należą do różnych przestrzeni stycznych. Przepływ $X$ dostarcza *kanonicznego w tej sytuacji* sposobu ich porównania: różniczka odwrotnego przepływu przenosi pierwszy z nich do $T_pM$. Otrzymujemy odpowiedź na pytanie, jak obiekt zmienia się wraz z ruchem generowanym przez $X$.

**Definicja 2.6.1.** Dla funkcji $f$ i pola $Y$ określamy

$$(\mathcal{L}_X f)(p) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 f(\Phi_t(p)) = X(f)(p), \tag{2.6.1}$$

$$(\mathcal{L}_X Y)_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 (\mathrm{d}\Phi_{-t})_{\Phi_t(p)} Y_{\Phi_t(p)}. \tag{2.6.2}$$

Definicja jest lokalna: przepływ jest potrzebny tylko dla małego $t$. Wzór (2.6.2) zapisujemy krótko jako $\mathcal{L}_X Y = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_0 \Phi_t^* Y$.




Rysunek 2.3: Punkty $p = \gamma(0)$ i $q = \gamma(t) = \Phi_t^X(p)$ leżą na tej samej krzywej całkowej na $M$; czerwona strzałka pokazuje ruch w czasie od $p$ do $q$. Wektor $Y_q$ cofamy różniczką przepływu do $T_pM$, otrzymując $\widetilde{Y}_t(p)$. Tam porównujemy go z $Y_p$; $\Delta_t(p)$ jest ich różnicą. Przerywana strzałka przedstawia transport wektora, nie ruch punktu.

Dokładnie, oznaczając $q = \Phi_t^X(p)$, mamy

$$\widetilde{Y}_t(p) := (\mathrm{d}\Phi^X_{-t})_q Y_q \in T_pM, \qquad (\mathcal{L}_X Y)_p = \lim_{t\to 0} \frac{\widetilde{Y}_t(p) - Y_p}{t}.$$

Dla każdego małego $t$ oba odejmowane wektory leżą w $T_pM$. Rysunek 2.3 pokazuje różnicę $\Delta_t(p)$, której iloraz przez $t$ ma granicę dla $t \to 0$.

**Twierdzenie 2.6.2.** *Dla dowolnych pól $X, Y$ zachodzi*

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y]. \tag{2.6.3}$$

*Zatem pochodna Liego funkcji jest działaniem derywacji, a pochodna Liego pola jest nawiasem.*

*Dowód.* Ustalmy $p \in M$ i $f \in C^\infty(M)$. Pracujemy w otoczeniu $p$ i dla na tyle małych $|t|$, aby lokalny przepływ $\Phi_t = \Phi_t^X$ oraz $\Phi_{-t}$ były określone we wszystkich rozważanych punktach. Z definicji cofnięcia pola, przy $q = \Phi_t(p)$,

$$Z_t(p) := (\Phi_t^* Y)_p = (\mathrm{d}\Phi_{-t})_q Y_q \in T_pM.$$

Wektory $Z_t(p)$ leżą więc w *jednej* przestrzeni $T_pM$, a $Z_0(p) = Y_p$. Aby obliczyć ich pochodną, zadziałajmy nimi na dowolną funkcję $f$. Definicja różniczki daje

$$Z_t(p)(f) = Y_q(f \circ \Phi_{-t}) = Y(f \circ \Phi_{-t})(\Phi_t(p)). \tag{2.6.4}$$

Oznaczmy $F(t, r) := f(\Phi_{-t}(r))$ dla $r$ w otoczeniu $p$. Ponieważ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_{-t}(r) = -X_{\Phi_{-t}(r)}$, reguła łańcucha daje

$$F(0, r) = f(r), \qquad \frac{\partial F}{\partial t}\Big|_{(0,r)} = -X(f)(r).$$

Niech $H(t, r) := Y_r(F(t, \cdot))$. Wtedy prawa strona (2.6.4) jest równa $H(t, \Phi_t(p))$. Różniczkując to złożenie, musimy uwzględnić zarówno zmianę funkcji $H$ z czasem, jak i ruch punktu $\Phi_t(p)$:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H(t, \Phi_t(p))\Big|_{t=0} &= \frac{\partial H}{\partial t}\Big|_{(0,p)} + X_p(H(0, \cdot)) \\ &= -Y_p(X(f)) + X_p(Y(f)).\end{aligned}$$

W drugim kroku użyliśmy $H(0,\cdot) = Y(f)$ oraz $\partial_t H(0,p) = Y_p(\partial_t F(0,\cdot))$. Zamiana kolejności $Y$ i $\partial_t$ jest dopuszczalna: w lokalnych współrzędnych $Y = \sum_i Y^i(r)\partial_{r^i}$, współczynniki $Y^i$ nie zależą od $t$, a funkcja $F$ jest gładka. Wreszcie, ponieważ $Z_t(p)$ jest gładką krzywą w $T_pM$, jej pochodną można obliczyć po przyłożeniu do $f$. Otrzymujemy

$$(\mathcal{L}_X Y)_p(f) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} Z_t(p)(f)\Big|_{t=0} = X(Yf)(p) - Y(Xf)(p) = [X,Y]_p(f).$$

Równość zachodzi dla każdej funkcji gładkiej $f$. Funkcje gładkie rozróżniają wektory styczne: wystarczy wziąć funkcje, które w pobliżu $p$ pokrywają się ze współrzędnymi lokalnymi. Zatem $(\mathcal{L}_X Y)_p = [X,Y]_p$; punkt $p$ był dowolny. □

**Stwierdzenie 2.6.3.** *Na wspólnych dziedzinach lokalnego przepływu pola $X$ zachodzi*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_t^* Y = \Phi_t^*[X,Y].$$

*Dowód.* Dla dyfeomorfizmu $F$ cofnięcie pola oznacza $F^*Y = (F^{-1})_* Y$. Reguła łańcucha daje $(F\circ G)^* = G^*F^*$. Prawo grupowe przepływu pozwala zatem napisać $\Phi_{t+h}^* Y = \Phi_t^*(\Phi_h^* Y)$. Ustalamy punkt i dostatecznie małe wspólne otoczenie, aby wszystkie te odwzorowania były określone dla $h$ bliskiego zeru. Różniczkujemy po $h$ w zerze: liniowa mapa cofająca przez ustalone $\Phi_t$ nie zależy od $h$, a $\partial_h|_0\, \Phi_h^* Y = [X,Y]$ na mocy Twierdzenia 2.6.2. □

*Uwaga* 2.6.4 (Ten sam rachunek we współrzędnych). W lokalnych współrzędnych, zapisując pola jako kolumny funkcji, gładkość przepływu daje przy $t \to 0$

$$\Phi_t(x) = x + tX(x) + o(t), \qquad \mathrm{d}\Phi_t|_x = I + t\,\mathrm{d}X|_x + o(t),$$

a stąd $\mathrm{d}\Phi_{-t}|_{\Phi_t(x)} = (\mathrm{d}\Phi_t|_x)^{-1} = I - t\,\mathrm{d}X|_x + o(t)$ oraz $Y(\Phi_t(x)) = Y(x) + t\,\mathrm{d}Y|_x X(x) + o(t)$. Po pomnożeniu obu wyrażeń otrzymujemy

$$(\Phi_t^* Y)(x) = Y(x) + t\big(\mathrm{d}Y|_x X(x) - \mathrm{d}X|_x Y(x)\big) + o(t).$$

Zatem składowa $j$ pochodnej wynosi $\sum_i (X^i \partial_i Y^j - Y^i \partial_i X^j)$, co zgadza się ze wzorem na nawias Liego.

**Przykład 2.6.5** (Obliczenie w polu przesunięć)**.** Dla $X = \partial_x$ i $Y = x\partial_y$ mamy $\Phi_t(x,y) = (x+t, y)$. W punkcie $q = (x+t, y)$ jest $Y_q = (x+t)\partial_y$, a cofająca różniczka przesunięcia działa identycznościowo na wektory. Zatem

$$((\Phi_t)^* Y)_{(x,y)} = (x+t)\partial_y, \qquad \mathcal{L}_X Y = \partial_y.$$

Nie chodzi o różnicę położeń punktów, tylko o zmianę pola po przeniesieniu obu wektorów do tej samej przestrzeni stycznej.


Jeśli $C_t = \Phi_{-t}^Y \circ \Phi_{-t}^X \circ \Phi_t^Y \circ \Phi_t^X$, to w dowolnej mapie wokół $p$ (i dla małego $t$)

$$x(C_t(p)) = x(p) + t^2\,\mathrm{d}x_p([X,Y]_p) + O(t^3).$$

W przykładzie $X = \partial_x$, $Y = (1+x)\partial_y$ i $p = (0,0)$ można to policzyć dokładnie: $p \to (t,0) \to (t, t+t^2) \to (0, t+t^2) \to (0,t^2)$. Geometria rysunku zgadza się więc ze znakiem konwencji (2.2.1).

Uzasadnijmy także wzór ogólny, zamiast wnioskować z jednego przykładu. W ustalonej mapie przepływ gładkiego pola $Z$ ma rozwinięcie

$$\Phi_t^Z(x) = x + tZ(x) + \tfrac{1}{2}t^2 DZ(x)Z(x) + O(t^3),$$




$C_t = \Phi^Y_{-t} \circ \Phi^X_{-t} \circ \Phi^Y_t \circ \Phi^X_t$

Końcowy punkt leży o rząd $t^2$ ponad początkiem.

Rysunek 2.4: Komutator małych przepływów. Po przejściu kolejno wzdłuż $X, Y, -X, -Y$ droga zwykle się nie zamyka; wyraz przemieszczenia rzędu $t^2$ jest wyznaczony przez nawias $[X, Y]$. Jeśli nawias znika, pierwszy niezerowy wyraz może mieć wyższy rząd. Rysunek schematycznie ilustruje przykład $X = \partial_x$, $Y = (1 + x)\partial_y$.

bo druga pochodna krzywej całkowej w zerze to $DZ(x)Z(x)$. Oznaczmy kolejne punkty czterech kroków przez $x_1, \dots, x_4$. Rozwijając pola w punktach pośrednich, dostajemy

$$\begin{aligned} x_1 &= x + tX + \tfrac{1}{2}t^2 DX\,X + O(t^3), \\ x_2 &= x + t(X+Y) + t^2(\tfrac{1}{2}DX\,X + DY\,X + \tfrac{1}{2}DY\,Y) + O(t^3), \\ x_3 &= x + tY + t^2(DY\,X + \tfrac{1}{2}DY\,Y - DX\,Y) + O(t^3), \\ x_4 &= x + t^2(DY\,X - DX\,Y) + O(t^3). \end{aligned}$$

Wszystkie pola i ich macierze pochodnych po prawej stronie są obliczone w $x$. Równość $DY\,X - DX\,Y = [X, Y](x)$ wynika ze wzoru (2.2.3). Reszty $O(t^3)$ są rozumiane w tej mapie, dla punktów w dostatecznie małym otoczeniu i małego czasu, gdy złożenia istnieją.

*Uwaga* 2.6.6 (Znaczenie znaku). W (2.6.2) wektor cofamy przez $\Phi_{-t}$. Przy tej konwencji $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$. Gdyby transportować $Y_p$ w przód i porównywać z $Y_{\Phi_t(p)}$ w punkcie $\Phi_t(p)$ w odwrotnej kolejności, otrzymalibyśmy zapis z przeciwnym znakiem. Przed rachunkiem warto zawsze ustalić, które dwa wektory są porównywane i w jakim punkcie.

## 2.7 Pola zależne od czasu i izotopie

Przepływ pola stałego w czasie spełnia lokalne prawo grupowe; dla pola zupełnego tworzy jednoparametrową grupę dyfeomorfizmów. W topologii różniczkowej często trzeba deformować obiekty według zaplanowanego ruchu, którego prędkość może zmieniać się z czasem.

**Definicja 2.7.1.** *Pole zależne od czasu* to rodzina $X_t \in \mathfrak{X}(M)$, $t \in [0, 1]$, gładka łącznie w $(t, p)$ (na końcach przedziału w sensie lokalnego gładkiego przedłużenia). Jej krzywe całkowe spełniają nieautonomiczne równanie $\gamma'(t) = (X_t)_{\gamma(t)}$. Odwzorowanie ewolucji $F_{t,s}(p)$ przenosi położenie w chwili $s$ do położenia w chwili $t$, tam gdzie rozwiązanie istnieje.

Dodanie czasu jako zmiennej sprowadza to równanie do autonomicznego pola $\widehat{X} = \partial_t + X_t$ na czasoprzestrzeni. Krzywa tego pola startująca w $(s, p)$ ma postać $(s + u, F_{s+u,s}(p))$. Twierdzenie 2.3.2, zastosowane lokalnie także do przedłużeń przy końcach przedziału, daje gładkość ewolucji łącznie w $(t, s, p)$. Jednoznaczność daje prawo

$$F_{s,s} = \mathrm{id}, \qquad F_{u,t} \circ F_{t,s} = F_{u,s}, \qquad F_{s,t} = F_{t,s}^{-1}. \tag{2.7.1}$$

Równości obowiązują tam, gdzie odpowiednie rozwiązania istnieją; $F_{t,s}$ jest dyfeomorfizmem swojej otwartej dziedziny na obraz, z odwrotnością $F_{s,t}$. Zwykle $F_{t,0}$ *nie* spełnia $F_{t+s,0} = F_{t,0} \circ F_{s,0}$, bo samo pole się zmienia. Jeżeli nośniki wszystkich $X_t$ mieszczą się w jednym

zwartym $K \subset M$, ewolucja istnieje dla całego przedziału $[0,1]$: poza $K$ krzywe stałe są rozwiązaniami, a jednoznaczność w obu kierunkach czasu nie pozwala trajektorii z $K$ wyjść poza $K$. Trajektoria startująca w $p$ pozostaje więc w $K \cup \{p\}$. Jej podniesienie do czasoprzestrzeni leży w zwartym $[0,1] \times (K \cup \{p\})$. Argument przedłużania z dowodu Twierdzenia 2.4.6, z lokalnymi przedłużeniami pola na końcach przedziału, wyklucza skończony czas zakończenia rozwiązania przed dojściem do wymaganej chwili. Istotny jest *wspólny* zwarty nośnik, a nie tylko zwartość każdego z nośników osobno.

**Definicja 2.7.2.** Gładka rodzina dyfeomorfizmów $h_t\colon M \to M$ z $h_0 = \mathrm{id}_M$ to *izotopia otoczenia*. Gładka rodzina zanurzeń $i_t\colon N \hookrightarrow M$ to *izotopia zanurzeń*. Drugie pojęcie dotyczy tylko ruchu podrozmaitości, pierwsze przesuwa całe otoczenie. Zanurzenie rozumiemy jak w Rozdziale 1: jest to immersja będąca homeomorfizmem na obraz. Nośnikiem izotopii otoczenia nazywamy domknięcie zbioru $\{p \in M : h_t(p) \neq p \text{ dla pewnego } t \in [0,1]\}$.

Każda izotopia otoczenia jest generowana przez pole zależne od czasu: dla $q = h_t(p)$ kładziemy

$$(X_t)_q = \left.\frac{\partial h_t(p)}{\partial t}\right|_{p=h_t^{-1}(q)}. \tag{2.7.2}$$

Gładkość tego pola wymaga także gładkości $(t,q) \mapsto h_t^{-1}(q)$. Wynika ona z twierdzenia o funkcji odwrotnej zastosowanego do $H(t,p) = (t, h_t(p))$: różniczka jest blokowo trójkątna z odwracalnymi blokami 1 i $\mathrm{d}h_t$. Przy $t = 0,1$ stosujemy lokalne przedłużenia; pierwsza współrzędna pozostaje czasem. Jednoznaczność rozwiązań daje $h_t = F_{t,0}$. W szczególności pole zależne od czasu o wspólnym zwartym nośniku buduje izotopię otoczenia stałą poza tym nośnikiem.

**Twierdzenie 2.7.3** (Rozszerzenie izotopii, wersja zwarta)**.** *Niech $M$ będzie rozmaitością bez brzegu, $N$ jej zwartą podrozmaitością bez brzegu, a $i_t\colon N \hookrightarrow M$, $t \in [0,1]$, gładką izotopią zanurzeń. Istnieje izotopia otoczenia $h_t$ taka, że $h_t \circ i_0 = i_t$. Jej nośnik można umieścić w dowolnym otwartym otoczeniu zwartego śladu $\bigcup_{t\in[0,1]} i_t(N)$.*

*Dowód. Krok 1: pole na śladzie izotopii.* Zbudujmy *ślad w czasoprzestrzeni*

$$\mathcal{T} := \{(t, i_t(x)) : t \in [0,1],\ x \in N\} \subset [0,1] \times M.$$

Odwzorowanie $I(t,x) = (t, i_t(x))$ jest różnowartościowe: z równości pierwszych współrzędnych mamy ten sam $t$, a różnowartościowość $i_t$ daje ten sam $x$. Jego różniczka jest injektywna: jeśli $\mathrm{d}I_{(t,x)}(a,v) = 0$, to pierwsza współrzędna daje $a = 0$, a następnie $\mathrm{d}(i_t)_x(v) = 0$ wymusza $v = 0$. Ponieważ $[0,1] \times N$ jest zwarta, $I$ jest zanurzeniem (ciągła bijekcja z przestrzeni zwartej na podprzestrzeń Hausdorffa ma ciągłą odwrotność). Zatem $\mathcal{T}$ jest zwartą podrozmaitością z brzegiem w $[0,1]\times M$. Wyjaśnijmy postać lokalną także dla $t = 0,1$. W lokalnych współrzędnych $u$ na $N$ wybieramy $k = \dim N$ składowych $i_t(u)$, których różniczka względem $u$ jest odwracalna. Odwzorowanie $(t,u) \mapsto (t, i_t^1(u), \ldots, i_t^k(u))$ jest lokalnym dyfeomorfizmem. Pozostałe składowe śladu są więc wykresem $w = b(t,z)$. Zmiana $(t,z,w) \mapsto (t,z,w - b(t,z))$ prostuje ślad i zachowuje czas, a zatem również brzeg przy $t = 0,1$. Homeomorficzność $I$ na obraz pozwala zmniejszyć otoczenie tak, aby nie zawierało innych fragmentów śladu. Wzdłuż niej mamy dobrze określony *pionowy* wektor

$$V(t, i_t(x)) := \frac{\partial i_t(x)}{\partial t} \in T_{i_t(x)}M.$$

Jest gładki, bo $I$ ma gładką odwrotność na $\mathcal{T}$.

*Krok 2: przedłużenie o małym nośniku.* Niech $O \subset M$ będzie wskazanym otwartym otoczeniem rzutu $\mathcal{T}$ na $M$. Wokół każdego punktu $\mathcal{T}$ wybieramy lokalne współrzędne na $[0,1] \times M$, w których $\mathcal{T}$ ma postać normalną opisaną powyżej; otoczenia wybieramy wewnątrz $[0,1] \times O$. W lokalnej trywializacji $TM$ składowe wektora $V$ są gładkimi funkcjami współrzędnych na $\mathcal{T}$;

przedłużamy je, nadając im te same wartości w pobliskich kierunkach normalnych. Otrzymujemy lokalne pola pionowe $V^{(j)}$, których ograniczenia do $\mathcal{T}$ są równe $V$. Zwartość $\mathcal{T}$ pozwala wybrać skończenie wiele takich otoczeń i nieujemne gładkie funkcje odcinające $\chi_j$ o zwartych nośnikach w tych otoczeniach, z $\sum_j \chi_j > 0$ na $\mathcal{T}$. Na otwartym zbiorze $U = \{\sum_j \chi_j > 0\}$ kładziemy $Y = (\sum_j \chi_j V^{(j)})/(\sum_k \chi_k)$, przedłużając każde $\chi_j V^{(j)}$ przez zero poza jego otoczenie. Na $\mathcal{T}$ wszystkie składniki $V^{(j)}$ są równe $V$, więc $Y|_{\mathcal{T}} = V$. Wybieramy jeszcze funkcję odcinającą $\rho$ równą 1 w otoczeniu zwartej $\mathcal{T}$, o zwartym nośniku w $U \subset [0,1] \times O$, i mnożymy przez nią $Y$. Taka funkcja powstaje ze skończonego pokrycia $\mathcal{T}$ otoczeniami z funkcjami $0 \le \rho_j \le 1$, równymi 1 na mniejszych otoczeniach: $\rho = 1 - \prod_j (1 - \rho_j)$. Przy końcach czasu wystarczą ograniczenia zwykłych funkcji odcinających do półprzestrzeni. Warunek $\operatorname{supp}\rho \subset U$ zapewnia, że nie dzielimy przez zero. Przedłużenie przez zero definiuje gładkie pole $X_t$ na całym $M$, gładkie w $t$, którego wszystkie nośniki leżą w jednym zwartym $K \subset O$ (rzucie $\operatorname{supp}\rho$ na $M$) i które spełnia $(X_t)_{i_t(x)} = \partial_t i_t(x)$.

*Krok 3: całkowanie.* Każda krzywa $t \mapsto i_t(x)$ spełnia równanie $\dot q(t) = (X_t)_{q(t)}$ z warunkiem początkowym $q(0) = i_0(x)$. Lokalna jednoznaczność dla pola zależnego od czasu wynika z tego samego argumentu co Twierdzenie 2.3.2, po dodaniu czasu jako zmiennej. Wspólny zwarty nośnik $K$ wyklucza ucieczkę rozwiązania w skończonym czasie, więc ewolucja $F_{t,s}$ istnieje dla $s,t \in [0,1]$. Z jednoznaczności $F_{t,0}(i_0(x)) = i_t(x)$. Kładąc $h_t := F_{t,0}$, otrzymujemy izotopię dyfeomorfizmów: jej odwrotnością w chwili $t$ jest $F_{0,t}$. Poza $K$ pole $X_t$ znika, zatem punkty tam pozostają nieruchome i nośnik $h_t$ leży w $O$. □

**Przykład 2.7.4** (Przesuwanie punktu)**.** Gdy $i_t\colon \{*\} \hookrightarrow M$ opisuje gładką drogę $p_t$ w spójnej składowej $M$, rozszerzenie izotopii daje rodzinę dyfeomorfizmów $h_t$ z $h_t(p_0) = p_t$. Można ją zbudować konkretnie, przedłużając prędkość $\dot p_t$ do pola wspieranego w małym otoczeniu całej drogi. To narzędzie pozwala przesuwać lokalne konstrukcje bez zmieniania odległych części rozmaitości.

*Uwaga* 2.7.5 (Kołnierz brzegu)*.* Jeśli $M$ ma zwarty brzeg, wybieramy pole $X$, które na $\partial M$ jest skierowane do wnętrza i poprzeczne do brzegu. Jego mały dodatni przepływ daje dyfeomorfizm na obraz $\partial M \times [0,\varepsilon) \to M$, $(p,t) \mapsto \Phi_t(p)$, zwany *kołnierzem*. Pole takie otrzymujemy z lokalnych pól skierowanych do wnętrza przez nieujemne funkcje odcinające; dodatnia składowa normalna pozostaje dodatnia przy ich sumowaniu. W mapach półprzestrzeni przedłużamy pole za brzeg, aby zastosować lokalne twierdzenie o przepływie. Jego dodatnie trajektorie pozostają początkowo w $M$. Różniczka $(v,a) \mapsto v + aX_p$ jest izomorfizmem w $(p,0)$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej, z uwzględnieniem znaku składowej normalnej, daje lokalny dyfeomorfizm półotoczeń. Zwartość brzegu pozwala wybrać wspólny czas istnienia i lokalnej odwracalności. Pozostaje globalna injektywność dla małego czasu. Gdyby żadna wartość $\varepsilon$ jej nie dawała, istniałyby różne pary $(p_j,t_j),(q_j,s_j)$ o tym samym obrazie i $0 \le t_j, s_j < 1/j$. Po przejściu do podciągu $p_j \to p$, $q_j \to q$; ciągłość daje $p = q$. Obie pary leżą wtedy w jednym otoczeniu lokalnej injektywności przy $(p,0)$, sprzeczność. Obraz jest otwartym otoczeniem brzegu w $M$, bo mapa jest lokalnym dyfeomorfizmem półotoczeń. Kołnierz pozwala opisywać otoczenie brzegu współrzędnymi niezależnymi od punktu na brzegu.

*Dalsza lektura:* J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, wyd. 2, rozdziały 8–9: pola, przepływy (także przy brzegu), pochodna Liego i pola zależne od czasu; rozdział 12: rozszerzenie pochodnej Liego na pola tensorowe; J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §4, s. 20–24: gładka izotopia i przemieszczanie punktów przez przepływ; §6, s. 32–41: pola wektorowe i liczba Eulera.


# Rozdział 3

# Algebra tensorowa i zewnętrzna

Wektor styczny i kowektor z Rozdziału 1 są obiektami liniowymi. Do opisu odwzorowań wieloliniowych, operatorów i wyznaczników potrzebujemy przestrzeni, w której symbole $v \otimes w$ spełniają dokładnie relacje wymuszone przez dwuliniowość. Zbudujemy ją bez wyboru bazy, a dopiero potem wyprowadzimy rachunek współrzędnych. W całym rozdziale $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$; przestrzenie mają skończony wymiar, chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku zespolonym wszystkie odwzorowania wieloliniowe są $\mathbb{C}$-liniowe w każdym argumencie: nie stosujemy tu sprzężenia zespolonego. W szczególności dualność algebraiczna nie jest utożsamieniem przez iloczyn hermitowski.

## 3.1 Iloczyn tensorowy: definicja, istnienie i jednoznaczność

**Definicja 3.1.1** (Własność uniwersalna)**.** *Iloczynem tensorowym* przestrzeni $V, W$ nazywamy parę $(T, \tau)$, gdzie $T$ jest przestrzenią liniową, $\tau\colon V \times W \to T$ jest odwzorowaniem dwuliniowym, a dla każdej przestrzeni $Z$ i każdego odwzorowania dwuliniowego $B\colon V \times W \to Z$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $\widetilde{B}\colon T \to Z$ takie, że $B = \widetilde{B} \circ \tau$. Piszemy $T = V \otimes W$ i $\tau(v, w) = v \otimes w$. Elementy $v \otimes w$ nazywamy *tensorami prostymi*.




Samo zapisanie $v \otimes w$ nie jest definicją: najpierw trzeba wykazać, że przestrzeń o tej własności istnieje.

*Uwaga* 3.1.2 (Co znaczy „formalna kombinacja liniowa”?). Jeśli $S$ jest dowolnym zbiorem, *wolna przestrzeń liniowa* o bazie symboli $[s]$, $s \in S$, składa się z zapisów

$$\sum_{s \in S} c_s [s], \qquad c_s \in \mathbb{K}, \quad c_s = 0 \text{ poza skończoną liczbą indeksów.}$$

To jest kombinacja *formalna*: dodajemy współczynniki stojące przy tym samym symbolu i mnożymy je przez skalary, ale nie przypisujemy symbolom żadnych innych relacji. Dwa takie zapisy są równe dokładnie wtedy, gdy ich współczynniki przy każdym $[s]$ są równe. W szczególności $[s]$ i $[s']$ są niezależnymi wektorami, jeśli $s \neq s'$. Można myśleć o takim zapisie jako o funkcji $s \mapsto c_s$ o *skończonym nośniku*.

W dowodzie poniżej bierzemy $S = V \times W$. Jeśli $v, v'$ są niezależne, symbole $[(v+v', w)]$, $[(v, w)]$ i $[(v', w)]$ mają różne indeksy, więc przed podzieleniem przez relacje są niezależne. Dopiero iloraz nakazuje równość $[(v + v', w)] + R = [(v, w)] + [(v', w)] + R$. Równość dwóch klas $x + R = y + R$ oznacza dokładnie $x - y \in R$. Ta ostatnia reguła wyjaśnia, dlaczego relacje dwuliniowości pojawiają się w konstruowanej przestrzeni, a nie były ukrytym założeniem o symbolach.

**Twierdzenie 3.1.3** (Konstrukcja iloczynu tensorowego)**.** *Dla dowolnych przestrzeni liniowych $V, W$ iloczyn tensorowy istnieje. Ponadto tensory proste rozpinają $V \otimes W$.*

*Dowód.* Niech $F$ będzie wolną przestrzenią liniową o bazie formalnych symboli $[(v, w)]$, po jednym dla każdej pary $(v, w) \in V \times W$. Jej elementy są kombinacjami z Uwagi 3.1.2. Ta pomocnicza przestrzeń jest na ogół nieskończenie wymiarowa, nawet gdy $V, W$ mają skończony wymiar; dopiero iloraz narzuci relacje. Niech $R \subseteq F$ będzie podprzestrzenią rozpiętą przez wszystkie elementy czterech rodzajów:

$$[(v + v', w)] - [(v, w)] - [(v', w)], \qquad [(av, w)] - a[(v, w)],$$
$$[(v, w + w')] - [(v, w)] - [(v, w')], \qquad [(v, aw)] - a[(v, w)],$$

gdzie $a \in \mathbb{K}$. Kładziemy $T := F/R$ oraz $v \otimes w := [(v, w)] + R$. Cztery relacje pokazują kolejno, że $\tau(v, w) := v \otimes w$ jest liniowa w każdej zmiennej. Każda klasa w $F/R$ jest skończoną kombinacją liniową klas $[(v, w)] + R$, więc tensory proste rozpinają $T$.

Weźmy teraz dowolne odwzorowanie dwuliniowe $B\colon V \times W \to Z$. Na $F$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $L\colon F \to Z$ o wartościach $L([(v, w)]) = B(v, w)$: określamy je na bazie i przedłużamy liniowo. Dwuliniowość $B$ oznacza, że $L$ zeruje każdy z czterech typów generatorów $R$, a więc $R \subseteq \ker L$. Odwzorowanie $L$ przechodzi na iloraz: $\widetilde{B}(x + R) := L(x)$ dla $x \in F$. Jest dobrze określone, bo $x + R = x' + R$ implikuje $L(x - x') = 0$, i spełnia $\widetilde{B}(v \otimes w) = B(v, w)$. Jeśli drugie odwzorowanie liniowe spełniałoby tę samą równość, zgadzałoby się z $\widetilde{B}$ na zbiorze rozpinającym $T$, a zatem wszędzie. □

*Uwaga* 3.1.4 (Faktoryzacja przez iloraz a izomorfizm). W dowodzie wystarczyło $R \subseteq \ker L$, aby otrzymać odwzorowanie $\widetilde{B} : F/R \to Z$. To jest ten sam mechanizm przechodzenia do ilorazu, który w ogólnej postaci porządkuje Twierdzenie 5.3.6 w Rozdziale 5 (przestrzenie liniowe są modułami nad $\mathbb{K}$). Pełne twierdzenie daje $F/\ker L \cong \operatorname{im} L$. Nie utożsamiamy natomiast $F/R$ z $\operatorname{im} L$, chyba że $R = \ker L$; do istnienia iloczynu tensorowego taka równość nie jest potrzebna.

**Twierdzenie 3.1.5** (Jednoznaczność)**.** *Jeżeli $(T, \tau)$ i $(T', \tau')$ spełniają Definicję 3.1.1, istnieje dokładnie jeden izomorfizm spełniający*

$$J\colon T \to T', \qquad J \circ \tau = \tau'.$$

*Dowód.* Własność uniwersalna $(T, \tau)$ zastosowana do $\tau'$ daje jedyne odwzorowanie liniowe $J\colon T \to T'$ z żądaną własnością. Podobnie $(T', \tau')$ daje $K\colon T' \to T$ z $K \circ \tau' = \tau$. Zatem $(KJ) \circ \tau = \tau$. Również $\mathrm{id}_T \circ \tau = \tau$; jednoznaczność faktoryzacji przez $T$ wymusza $KJ = \mathrm{id}_T$. Tak samo $JK = \mathrm{id}_{T'}$. Odwzorowanie $J$ jest więc izomorfizmem i jedynym możliwym odwzorowaniem zachowującym wskazane obrazy par $(v, w)$. □

W szczególności

$$(av + bv') \otimes w = a(v \otimes w) + b(v' \otimes w), \qquad v \otimes (aw + bw') = a(v \otimes w) + b(v \otimes w'). \tag{3.1.1}$$

*Każdy* element $V \otimes W$ jest skończoną sumą tensorów prostych, ale nie musi sam być tensorem prostym.

## 3.2 Baza, wymiar i wiele czynników

**Twierdzenie 3.2.1** (Baza iloczynu tensorowego)**.** *Jeżeli $e_1, \dots, e_m$ jest bazą $V$, a $f_1, \dots, f_n$ bazą $W$, to*

$$\{e_i \otimes f_j : 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n\}$$

*jest bazą $V \otimes W$. W szczególności* $\dim(V \otimes W) = mn$.

*Dowód.* Dla $v = \sum_i a_i e_i$ i $w = \sum_j b_j f_j$ dwuliniowość daje

$$v \otimes w = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_i b_j (e_i \otimes f_j).$$

Ponieważ tensory proste rozpinają $V \otimes W$, wyświetlone wektory są układem rozpinającym. Dla liniowej niezależności wprowadźmy przestrzeń $\mathbb{K}^{m\times n}$ z bazą jednostek macierzowych $E_{ij}$: jedynka na miejscu $(i,j)$ i zera poza nim. Przypisanie $B(v,w) = (a_i b_j)_{i,j}$ jest dwuliniowe; własność uniwersalna daje $\widetilde{B}\colon V \otimes W \to \mathbb{K}^{m\times n}$ z $\widetilde{B}(e_i \otimes f_j) = E_{ij}$. Jeśli $\sum_{i,j} c_{ij} e_i \otimes f_j = 0$, zastosowanie $\widetilde{B}$ daje $\sum_{i,j} c_{ij} E_{ij} = 0$, czyli wszystkie $c_{ij} = 0$. Tak wykazaliśmy również podany wymiar. □

**Przykład 3.2.2** (Tensor prosty a suma tensorów)**.** Dla $V = W = \mathbb{R}^2$ odwzorowanie z dowodu przypisuje $(1,2) \otimes (3,-1)$ macierz $\left(\begin{smallmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{smallmatrix}\right)$. Każdy niezerowy tensor prosty ma tu macierz rzędu 1: jest ona iloczynem kolumny współrzędnych $v$ i wiersza współrzędnych $w$. Natomiast $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$ odpowiada macierzy identycznościowej rzędu 2, więc nie jest prosty. Należy też pamiętać, że $v \otimes w$ nie oznacza pary $(v,w)$: na przykład $(2v) \otimes w = v \otimes (2w)$.

**Stwierdzenie 3.2.3** (Łączność i przestawianie czynników)**.** *Istnieją kanoniczne izomorfizmy*

$$(V \otimes W) \otimes U \longrightarrow V \otimes (W \otimes U), \quad (v \otimes w) \otimes u \longmapsto v \otimes (w \otimes u),$$

$$V \otimes W \longrightarrow W \otimes V, \quad v \otimes w \longmapsto w \otimes v.$$

*Dlatego możemy pisać $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ bez nawiasów.*

*Dowód.* Odwzorowanie $(v,w,u) \mapsto v \otimes (w \otimes u)$ jest trójliniowe. Każde odwzorowanie trójliniowe na $V \times W \times U$ faktoryzuje jednoznacznie przez $(V \otimes W) \otimes U$: najpierw przy ustalonym $u$ faktoryzujemy względem $(v,w)$; otrzymane odwzorowania $(V \otimes W) \to Z$ zależą liniowo od $u$, co sprawdzamy na rozpinających $v \otimes w$. Następnie faktoryzujemy powstałe odwzorowanie dwuliniowe $(V \otimes W) \times U \to Z$. Otrzymujemy zatem odwzorowanie w treści stwierdzenia. Analogiczna konstrukcja w drugą stronę daje $v \otimes (w \otimes u) \mapsto (v \otimes w) \otimes u$. Oba złożenia są identycznością na tensorach prostych trzech czynników, które rozpinają odpowiednie przestrzenie. Izomorfizm przestawiający dwa czynniki pochodzi z dwuliniowego odwzorowania $(v,w) \mapsto w \otimes v$; jego odwrotność powstaje po ponownym przestawieniu. Przy większej liczbie czynników dowolne dwa sposoby zmiany nawiasowania dają to samo odwzorowanie: na każdym tensorze prostym zachowują kolejność i wartości wszystkich czynników, a takie tensory rozpinają dziedzinę. To uzasadnia pomijanie nawiasów również dla czterech i więcej przestrzeni. □

Kładziemy $V^{\otimes 0} := \mathbb{K}$ oraz $V^{\otimes k} := V \otimes \cdots \otimes V$ dla $k \ge 1$. Jeżeli $\dim V = n$, iterowanie Twierdzenia 3.2.1 daje bazę $e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}$ i wymiar

$$\dim V^{\otimes k} = n^k \qquad (k \ge 0). \tag{3.2.1}$$

Dla $k = 0$ jest to konwencja $n^0 = 1$, również gdy $V = 0$.

## 3.3 Tensory mieszane i operacje na nich

Oznaczmy $V^* := \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K})$. Jest to przestrzeń liniowych funkcjonałów, zwanych kowektorami. Dla nieujemnych $r, s$ przyjmujemy konwencję

$$T^r_s(V) := V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s}. \tag{3.3.1}$$

Tensory typu $(r, s)$ mają $r$ czynników wektorowych i $s$ kowektorowych; powiązane z nimi funkcje wieloliniowe przyjmują $r$ kowektorów i $s$ wektorów. Na tensorze prostym wyznacza je wzór

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \otimes \alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_s)(\xi_1, \ldots, \xi_r; w_1, \ldots, w_s) = \prod_{a=1}^{r} \xi_a(v_a) \prod_{b=1}^{s} \alpha_b(w_b).$$

Puste iloczyny mają wartość 1. Dla $r = s = 0$ mamy $T^0_0(V) = \mathbb{K}$; odwzorowanie bez argumentów określa po prostu skalar (dziedziną jest jednoelementowy zbiór pustych układów).

**Twierdzenie 3.3.1** (Postać wieloliniowa tensora)**.** *Dla skończenie wymiarowej przestrzeni $V$ powyższy wzór daje izomorfizm*

$$T^r_s(V) \cong \mathrm{Mult}\big((V^*)^r \times V^s, \mathbb{K}\big).$$

*Jeśli $e_1, \ldots, e_n$ jest bazą $V$ i $e^1, \ldots, e^n$ bazą dualną, każdy tensor ma dokładnie jedno rozwinięcie*

$$T = \sum_{\substack{i_1,\ldots,i_r \\ j_1,\ldots,j_s}} T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s}. \tag{3.3.2}$$

*Dowód.* Rozwinięcie i jego jednoznaczność wynikają z kolejnych zastosowań Twierdzenia 3.2.1. Wzór na działanie na argumentach jest wieloliniowy w czynnikach tensora, więc przez własność uniwersalną definiuje odwzorowanie liniowe $T^r_s(V)$ do wskazanej przestrzeni funkcji. Aby wykazać jego iniektywność, podstawmy w miejsce argumentów elementy baz:

$$e^{i_1}, \ldots, e^{i_r}; \qquad e_{j_1}, \ldots, e_{j_s}.$$

Uzyskana wartość jest dokładnie współczynnikiem $T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}$. Jeśli wszystkie wartości są zerowe, znikają więc wszystkie współczynniki. Odwrotnie, dla dowolnej funkcji wieloliniowej $F$ wstawmy te wartości do prawej strony (3.3.2). Otrzymany tensor ma te same wartości co $F$ na wszystkich układach elementów bazowych. Rozwinięcie argumentów i ich wieloliniowość dają równość na dowolnych argumentach. □

Przykładowo $T^0_2(V)$ to formy dwuliniowe na $V$. Związek tensorów z operatorami wymaga pilnowania, z której przestrzeni operator *przyjmuje* argument.

**Twierdzenie 3.3.2** (Tensory i przestrzenie operatorów)**.** *Dla skończenie wymiarowych $V, W$ istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$\Theta_{V,W} \colon V \otimes W^* \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(W, V), \qquad \Theta_{V,W}(v \otimes \lambda)(w) := \lambda(w)v. \tag{3.3.3}$$

*W szczególności po zamianie nazw przestrzeni otrzymujemy $W \otimes V^* \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$.*

*Dowód.* Dla ustalonego $w \in W$ wyrażenie $\lambda(w)v$ zależy liniowo od $v$ oraz liniowo od $\lambda$; samo przypisanie $w \mapsto \lambda(w)v$ jest liniowe. Dlatego odwzorowanie $(v, \lambda) \mapsto (w \mapsto \lambda(w)v)$ ma wartości w $\mathrm{Hom}(W, V)$ i jest dwuliniowe. Własność uniwersalna iloczynu tensorowego wyznacza *jedno* odwzorowanie liniowe $\Theta_{V,W}$ o wzorze (3.3.3). Tym samym wzór działa również na sumach: $\Theta_{V,W}(\sum_a v_a \otimes \lambda_a)(w) = \sum_a \lambda_a(w)v_a$. Nie musimy wybierać sposobu zapisania takiej sumy, bo $\Theta_{V,W}$ została zdefiniowana na całej przestrzeni tensorowej.

Zbudujmy odwrotność. Wybierzmy bazę $f_1, \ldots, f_m$ przestrzeni $W$ i jej bazę dualną $f^1, \ldots, f^m$. Dla $A \in \mathrm{Hom}(W, V)$ połóżmy

$$\mathcal{I}(A) := \sum_{j=1}^{m} A(f_j) \otimes f^j \in V \otimes W^*. \tag{3.3.4}$$

Sprawdzimy oba złożenia. Jeśli $w \in W$, to

$$\Theta_{V,W}(\mathcal{I}(A))(w) = \sum_j f^j(w) A(f_j) = A\left(\sum_j f^j(w) f_j\right) = A(w),$$

bo $w = \sum_j f^j(w) f_j$. Odwrotnie, dla prostego tensora $v \otimes \lambda$ mamy

$$\mathcal{I}(\Theta_{V,W}(v \otimes \lambda)) = \sum_j \lambda(f_j) v \otimes f^j = v \otimes \left(\sum_j \lambda(f_j) f^j\right) = v \otimes \lambda.$$

Tensory proste rozpinają $V \otimes W^*$, więc drugie złożenie też jest identycznością wszędzie. Wzór (3.3.4) wygląda zależnie od bazy, ale jest odwrotnością kanonicznej $\Theta_{V,W}$; dlatego jego wynik od bazy nie zależy. □

Przy $W = V$ otrzymujemy $T^1_1(V) = V \otimes V^* \cong \mathrm{End}(V)$. Na tensorze prostym odpowiada temu wzór

$$v \otimes \alpha \longmapsto \big(w \longmapsto \alpha(w) v\big). \tag{3.3.5}$$

Na przykład $e_i \otimes e^j$ przechodzi na jednostkę macierzową $E_{ij}$: wysyła $e_j$ na $e_i$, a pozostałe wektory bazowe na zero. W bazie $e'_i = \sum_a A^a{}_i e_a$ macierz operatora $S$ ma postać $[S]' = A^{-1}[S]A$: zmieniają się współczynniki, nie sam operator. Istotnie, jeśli $[v]$ i $[v]'$ oznaczają kolumny współrzędnych, to $[v] = A[v]'$. Stąd $[Sv]' = A^{-1}[S]A[v]'$. Baza dualna zmienia się według $e'^i = \sum_b (A^{-1})^i{}_b e^b$, co wynika z warunku $e'^i(e'_j) = \delta^i_j$; używamy odwrotności bez sprzężenia zespolonego.

*Uwaga* 3.3.3 (Funkcja dwuliniowa a operator). Z Twierdzenia 3.3.1 dla typu $(1,1)$ dostajemy

$$V \otimes V^* \cong \mathrm{Mult}(V^* \times V, \mathbb{K}).$$

Dlaczego równie często spotyka się zapis $\mathrm{Mult}(V \times V^*, \mathbb{K})$? Kolejność argumentów można po prostu zamienić: jeśli $C(\lambda, v)$ jest dwuliniowa, to $B(v, \lambda) := C(\lambda, v)$ też jest dwuliniowa. Jest to odwracalna operacja, niezależna od wyboru bazy. W obu zapisach odpowiadający operatorowi $A \in \mathrm{Hom}(V, V)$ wzór ma postać

$$B_A(v, \lambda) = \lambda(Av), \qquad v \in V, \quad \lambda \in V^*. \tag{3.3.6}$$

Wektor $v$ jest argumentem operatora $A$; kowektor $\lambda$ odczytuje liczbę z wyniku $Av$.

Sprawdźmy, że przy $\dim V < \infty$ wzór ten obejmuje *każdą* taką funkcję dwuliniową $B$. Wybierzmy bazę $e_1, \ldots, e_n$ i bazę dualną $e^1, \ldots, e^n$, po czym zdefiniujmy

$$A_B(v) := \sum_{i=1}^{n} B(v, e^i) e_i.$$

Odwzorowanie $A_B$ jest liniowe, bo $B$ jest liniowa w pierwszym argumencie. Dla dowolnego $\lambda \in V^*$ zachodzi

$$\lambda(A_B v) = \sum_i B(v, e^i) \lambda(e_i) = B\left(v, \sum_i \lambda(e_i) e^i\right) = B(v, \lambda).$$

Jeżeli dwa operatory dają tę samą funkcję $B$, każdy kowektor przyjmuje na ich wartościach ten sam wynik, więc operatory są równe. Zatem $\mathrm{Mult}(V \times V^*, \mathbb{K}) \cong \mathrm{Hom}(V, V)$. Na przykład tensor $u \otimes \alpha$ odpowiada operatorowi $A(v) = \alpha(v)u$, a następnie funkcji $B_A(v, \lambda) = \alpha(v)\lambda(u)$. Nie utożsamiamy przy tym $V$ z $V^*$; korzystamy jedynie z naturalnego sparowania $\lambda(v)$.

**Przykład 3.3.4** (Tensor prosty i nieprosty typu $(1,1)$)**.** Niech $V=\mathbb{R}^2$, niech $e_1,e_2$ będzie jego bazą, a $e^1,e^2$ bazą dualną. Tensor

$$P=(e_1+e_2)\otimes(e^1-e^2)$$

jest *prosty*: ma postać jednego iloczynu tensorowego. Odpowiada mu operator $A_P(v)=(e^1(v)-e^2(v))(e_1+e_2)$, o macierzy $\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\1&-1\end{smallmatrix}\right)$. Wszystkie jego wartości leżą na jednej prostej, więc $\operatorname{rank}A_P=1$. Jego funkcja dwuliniowa to $B_P(v,\lambda)=(e^1(v)-e^2(v))\lambda(e_1+e_2)$.

Z kolei tensor $Q=e_1\otimes e^1+e_2\otimes e^2$ jest *nieprosty*. Odpowiada mu operator $A_Q(v)=e^1(v)e_1+e^2(v)e_2=v$, czyli macierz $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ i funkcja $B_Q(v,\lambda)=\lambda(v)$. Gdyby $Q=u\otimes\alpha$, obraz $A_Q$ mieściłby się w prostej $\mathbb{K}u$. Jednak $A_Q(e_1)=e_1$ i $A_Q(e_2)=e_2$ są niezależne; stąd $Q$ nie może być jednym tensorem prostym.

*Uwaga* 3.3.5 (Kolejność czynników jest istotna). Równość $V\otimes W^*\cong\operatorname{Hom}(V,W)$ nie jest naturalnym utożsamieniem: wzór (3.3.3) przyjmuje argument $w\in W$ i zwraca wynik w $V$. Do otrzymania odwzorowań z $V$ do $W$ trzeba wziąć $W\otimes V^*$. Przestrzenie $V\otimes W^*$ oraz $\operatorname{Hom}(V,W)$ mają wprawdzie równy wymiar, ale równość wymiarów daje jedynie istnienie pewnego izomorfizmu po dokonaniu dodatkowych wyborów, np. baz.

**Twierdzenie 3.3.6** (Iloczyn tensorowy odwzorowań)**.** *Dla odwzorowań liniowych $A\colon V\to V'$ i $B\colon W\to W'$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $A\otimes B\colon V\otimes W\to V'\otimes W'$ spełniające*

$$(A\otimes B)(v\otimes w)=Av\otimes Bw. \tag{3.3.7}$$

*Jeżeli $A'\colon V'\to V''$ i $B'\colon W'\to W''$, to*

$$(A'\otimes B')\circ(A\otimes B)=(A'\circ A)\otimes(B'\circ B),\qquad \mathrm{id}_V\otimes\mathrm{id}_W=\mathrm{id}_{V\otimes W}.$$

*Dla przestrzeni skończenie wymiarowych* $\operatorname{rank}(A\otimes B)=\operatorname{rank}A\operatorname{rank}B$.

*Dowód.* Odwzorowanie $(v,w)\mapsto Av\otimes Bw$ jest dwuliniowe: liniowość $A$ i pierwszego miejsca $\otimes$ dają liniowość w $v$, analogicznie w $w$. Własność uniwersalna tworzy dokładnie jedno odwzorowanie o wzorze (3.3.7). Obie strony równości złożeń przyłożone do $v\otimes w$ dają $A'Av\otimes B'Bw$. Tensory proste rozpinają dziedzinę, więc odwzorowania są równe. Identyczność sprawdzamy tak samo.

Obraz $A\otimes B$ jest rozpięty przez wszystkie $Av\otimes Bw$, więc równa się $(\operatorname{im}A)\otimes(\operatorname{im}B)$, rozumianemu jako podprzestrzeń $V'\otimes W'$. Aby uzasadnić to ostatnie włączenie bez ukrytego założenia, dopełnijmy bazy obu obrazów do baz $V'$ i $W'$; Twierdzenie 3.2.1 pokazuje, że iloczyny wektorów z mniejszych baz pozostają liniowo niezależne w większym iloczynie tensorowym. Ich liczba to iloczyn rang. □

Jeśli macierze $A,B$ mają współczynniki $a_{pi},b_{qj}$, to w bazach $e_i\otimes f_j$ współczynnik macierzy $A\otimes B$ o indeksach $(p,q),(i,j)$ jest $a_{pi}b_{qj}$. Jest to *iloczyn Kroneckera*. Pary porządkujemy leksykograficznie: $(1,1),(1,2),\dots,(2,1),\dots$. W takim porządku na przykład

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix},\qquad A\otimes B=\begin{pmatrix}2&0&4&0\\0&3&0&6\\0&0&2&0\\0&0&0&3\end{pmatrix}.$$

Iloczyn tensorów mieszanych wymaga ustalenia kolejności. Jeśli $S\in T^r_s(V)$ i $T\in T^{r'}_{s'}(V)$, ich surowy iloczyn ma kolejno bloki $V^{\otimes r}$, $(V^*)^{\otimes s}$, $V^{\otimes r'}$, $(V^*)^{\otimes s'}$. Przenosimy trzeci blok przed drugi kanonicznym przestawieniem czynników i tak otrzymany element $T^{r+r'}_{s+s'}(V)$ oznaczamy także $S\otimes T$. Wewnątrz bloków zachowujemy kolejność. Nie pojawia się znak: jest to zwykły iloczyn tensorowy, a nie iloczyn zewnętrzny.

**Definicja 3.3.7** (Kontrakcja)**.** *Kontrakcja* usuwa jedną parę: czynnik $V$ i czynnik $V^*$, łącząc je przez ewaluację $\alpha(v)$. W najprostszym przypadku jest to odwzorowanie $C\colon V\otimes V^*\to\mathbb{K}$, $C(v\otimes\alpha)=\alpha(v)$. W ogólności dostajemy $C_{a,b}\colon T^r_s(V)\to T^{r-1}_{s-1}(V)$, gdy $r,s\geq 1$. Indeksy spełniają $1\leq a\leq r$ i $1\leq b\leq s$. Na tensorze prostym mnożymy przez $\alpha_b(v_a)$, usuwamy czynniki $v_a$ i $\alpha_b$, a pozostałe zachowujemy w pierwotnej kolejności. Przykładowo kontrakcja pierwszej pary ma współczynniki

$$(C_{1,1}T)^{i_2\cdots i_r}{}_{j_2\cdots j_s}=\sum_{a=1}^{\dim V} T^{ai_2\cdots i_r}{}_{aj_2\cdots j_s}.$$

**Stwierdzenie 3.3.8** (Kontrakcja i ślad)**.** *Kontrakcja jest liniowa i nie zależy od wyboru bazy. Dla $S=\sum_{i,j}S^i{}_j e_i\otimes e^j\in T^1_1(V)$ zachodzi*

$$C(S)=\sum_i S^i{}_i=\operatorname{tr}S,$$

*gdzie ostatni ślad dotyczy operatora z* (3.3.5)*.*

*Dowód.* Ewaluacja $(v,\alpha)\mapsto\alpha(v)$ jest dwuliniowa, więc ma jednoznaczne przedłużenie do $V\otimes V^*$. Pozostałe czynniki przestawiamy izomorfizmami ze Stwierdzenia 3.2.3 i stosujemy tę ewaluację w wybranej parze. Ponieważ definicja używa jedynie wartości kowektora na wektorze, wynik nie zależy od bazy. Dla współrzędnych $C(e_i\otimes e^j)=e^j(e_i)=\delta^j_i$, więc $C(S)=\sum_i S^i{}_i$. Z (3.3.5) współczynniki $S^i{}_j$ są współczynnikami macierzy operatora, a powyższa suma jest jej śladem. □

**Przykład 3.3.9** (Iloczyn i kontrakcja)**.** Niech $S=e_1\otimes e^1+2e_2\otimes e^2$ na $\mathbb{R}^2$. Wtedy $S(e_1)=e_1$, $S(e_2)=2e_2$, a $C(S)=3$. Dla $u\otimes v\otimes\alpha\in T^2_1(V)$ kontrakcja $v$ z $\alpha$ daje $\alpha(v)u$, zaś kontrakcja $u$ z $\alpha$ daje $\alpha(u)v$. Wybór pary ma znaczenie.

## 3.4 Algebra tensorowa i symetryzacja

Wyjaśnijmy użyte dalej słowa. *Algebra* to przestrzeń liniowa z dwuliniowym mnożeniem; u nas mnożenie będzie łączne i będzie miało element jednostkowy 1. *Suma prosta* $\bigoplus_{k\geq 0}U_k$ zawiera ciągi $(u_0,u_1,\ldots)$ z tylko skończenie wieloma niezerowymi składnikami. *Ideał obustronny* $I$ algebry $A$ to podprzestrzeń taka, że $ai, ia\in I$ dla wszystkich $a\in A$, $i\in I$. Dzięki temu na klasach w $A/I$ można określić mnożenie $(a+I)(b+I)=ab+I$: zamiana $a$ na $a+i$ i $b$ na $b+j$ dodaje do iloczynu wyrazy $aj+ib+ij\in I$. Algebra jest *stopniowana*, gdy $A=\bigoplus_{k\geq 0}A^k$ i $A^kA^\ell\subseteq A^{k+\ell}$. Element należący do $A^k$ nazywamy jednorodnym stopnia $k$. Homomorfizm algebr z jedynką to odwzorowanie liniowe zachowujące mnożenie i jedynkę.

**Definicja 3.4.1** (Algebra tensorowa)**.** *Algebra tensorowa* przestrzeni $V$ to suma prosta

$$T(V):=\bigoplus_{k=0}^{\infty}V^{\otimes k},\qquad V^{\otimes 0}=\mathbb{K}.$$

Elementy tej sumy mają tylko skończenie wiele niezerowych składników. Mnożenie tensorów jednorodnych definiujemy przez *konkatenację*:

$$(v_1\otimes\cdots\otimes v_k)\cdot(w_1\otimes\cdots\otimes w_\ell):=v_1\otimes\cdots\otimes v_k\otimes w_1\otimes\cdots\otimes w_\ell.$$

Rozszerzamy je dwuliniowo na $T(V)$; jedynką jest $1\in\mathbb{K}$. W stopniu 0 mnożenie jest zwykłym mnożeniem przez skalar. Definicja na tensorach prostych przechodzi na całe potęgi tensorowe dzięki iterowanej własności uniwersalnej: jest liniowa w każdym czynniku. Skończoność nośnika sum zapewnia, że wynik znów należy do $T(V)$.

**Twierdzenie 3.4.2** (Łączność i swoboda algebry tensorowej)**.** *$T(V)$ jest łączną algebrą z jedynką, na ogół nieprzemienną. Dla każdej łącznej algebry $\mathcal{A}$ z jedynką i każdego odwzorowania liniowego $f\colon V \to \mathcal{A}$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr z jedynką $\widehat{f}\colon T(V) \to \mathcal{A}$ spełniający $\widehat{f}|_V = f$.*

*Dowód.* Na tensorach prostych obu stron równości $(ab)c = a(bc)$ otrzymujemy ten sam tensor przez zapisanie wszystkich czynników po kolei. Stwierdzenie 3.2.3 pozwala pominąć nawiasy; dwuliniowość rozszerza równość na sumy skończone. Podobnie $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$.

Dla ustalonego $k \geq 1$ odwzorowanie $(v_1, \ldots, v_k) \mapsto f(v_1) \cdots f(v_k)$ jest $k$-liniowe, ponieważ mnożenie w $\mathcal{A}$ jest dwuliniowe. Iterowana własność uniwersalna daje jedyne odwzorowanie liniowe $f_k\colon V^{\otimes k} \to \mathcal{A}$ spełniające $f_k(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k)$. W stopniu 0 kładziemy $f_0(a) = a1_{\mathcal{A}}$. Definiujemy $\widehat{f}$ na całej sumie prostej jako sumę $f_k$ po jej skończenie wielu niezerowych składowych. Dla tensorów prostych zachodzi $\widehat{f}(a \cdot b) = \widehat{f}(a)\widehat{f}(b)$; dwuliniowość dowodzi tego dla dowolnych $a, b$. Jedynka też jest zachowana. Jeśli $g$ jest drugim takim homomorfizmem, to na $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ musi przyjmować wartość $g(v_1) \cdots g(v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k)$; te tensory i 1 rozpinają $T(V)$. Stąd $g = \widehat{f}$. □

Dla niezależnych $e_1, e_2$ tensory $e_1 \otimes e_2$ i $e_2 \otimes e_1$ są różnymi elementami $V^{\otimes 2}$. Wymuszenie przemienności prowadzi do algebry symetrycznej, a wymuszenie $v \wedge v = 0$ do algebry zewnętrznej.

**Definicja 3.4.3** (Symetryzator i antysymetryzator)**.** Dla $k \geq 1$ permutacja $\sigma \in S_k$ działa na $V^{\otimes k}$ przez

$$P_\sigma(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(k)}.$$

Odwzorowania te istnieją na mocy iterowanej własności uniwersalnej. Definiujemy projekcje

$$\operatorname{Sym}_k := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} P_\sigma, \qquad \operatorname{Alt}_k := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) P_\sigma. \tag{3.4.1}$$

W stopniu 0 przyjmujemy $\operatorname{Sym}_0 = \operatorname{Alt}_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$.

**Twierdzenie 3.4.4** (Własności obu projekcji)**.** *Dla $t \in V^{\otimes k}$ zachodzi*

$$\operatorname{Sym}_k^2 = \operatorname{Sym}_k, \qquad \operatorname{Alt}_k^2 = \operatorname{Alt}_k,$$

*a ich obrazy są dokładnie przestrzeniami tensorów spełniających, odpowiednio, $P_\sigma t = t$ albo $P_\sigma t = \operatorname{sgn}(\sigma) t$ dla każdego $\sigma$.*

*Dowód.* Dzięki wyborowi $\sigma^{-1}$ w definicji $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$; sprawdzamy to bezpośrednio na tensorach prostych. Dla ustalonej $\tau$ podstawienie $\rho = \tau\sigma$ w sumach (3.4.1) daje

$$P_\tau \operatorname{Sym}_k = \operatorname{Sym}_k, \qquad P_\tau \operatorname{Alt}_k = \operatorname{sgn}(\tau) \operatorname{Alt}_k .$$

Tak samo, zmieniając indeks po prawej stronie, otrzymujemy $\operatorname{Sym}_k P_\tau = \operatorname{Sym}_k$ oraz $\operatorname{Alt}_k P_\tau = \operatorname{sgn}(\tau) \operatorname{Alt}_k$. Każdy element pierwszego obrazu jest więc niezmienniczy, a drugiego zmienia znak zgodnie z parzystością permutacji. Jeżeli odwrotnie $P_\sigma t = t$ dla wszystkich $\sigma$, to $\operatorname{Sym}_k t = \frac{1}{k!} \sum_\sigma t = t$. Jeśli $P_\sigma t = \operatorname{sgn}(\sigma) t$, to $\operatorname{Alt}_k t = \frac{1}{k!} \sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma)^2 t = t$. Zastosowanie projekcji do jej obrazu nic więc nie zmienia, co daje obie równości idempotencji. □

Na przykład

$$\operatorname{Sym}_2(u \otimes v) = \tfrac{1}{2}(u \otimes v + v \otimes u), \qquad \operatorname{Alt}_2(u \otimes v) = \tfrac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u).$$

Dla $u = v$ drugi tensor znika. W stopniu $k = 1$ obie projekcje są identycznością.

**Przykład 3.4.5** (Rozkład tensora dwukowariantnego)**.** Niech $e^1, e^2$ będzie bazą $V^*$ i $t = e^1 \otimes e^2 + 3e^2 \otimes e^1$. Wówczas $t(e_1, e_2) = 1$, $t(e_2, e_1) = 3$, a

$$\operatorname{Sym}_2(t) = 2(e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1), \qquad \operatorname{Alt}_2(t) = -e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1.$$

Ich suma jest równa $t$. Pierwszy składnik jest symetryczny, drugi zmienia znak po zamianie argumentów.

Równość $t = \operatorname{Sym}_2 t + \operatorname{Alt}_2 t$ zachodzi dla każdego tensora drugiego stopnia, bo w sumie $\frac{1}{2}(\mathrm{id} + P_{(12)}) + \frac{1}{2}(\mathrm{id} - P_{(12)})$ zostaje id. Nie jest to ogólny rozkład na dwie części dla $k \geq 3$. Na przykład dla trzech niezależnych wektorów bazowych współczynnik $e_1 \otimes e_2 \otimes e_3$ w $(\operatorname{Sym}_3 + \operatorname{Alt}_3)(e_1 \otimes e_2 \otimes e_3)$ wynosi $2/6$, a nie 1.

**Definicja 3.4.6** (Algebra symetryczna)**.** Niech $J$ będzie obustronnym ideałem w $T(V)$ generowanym przez wszystkie $u \otimes v - v \otimes u$. Iloraz $S(V) := T(V)/J$ jest *algebrą symetryczną*. Jego składową stopnia $k$ oznaczamy $S^k(V)$. Jest ona równa $V^{\otimes k}/(J \cap V^{\otimes k})$. Istotnie, $J$ jest sumą swoich części jednorodnych: w każdym elemencie $a(u \otimes v - v \otimes u)b$ rozwijamy $a, b$ na skończone sumy składników jednorodnych. Każda otrzymana część nadal należy do $J$. To uzasadnia stopniowanie ilorazu.

**Stwierdzenie 3.4.7** (Baza algebry symetrycznej)**.** *Dla bazy $e_1, \ldots, e_n$ i $k \geq 0$ klasy $e_1^{a_1} \cdots e_n^{a_n}$, gdzie $a_i \geq 0$ i $a_1 + \cdots + a_n = k$, tworzą bazę $S^k(V)$. Zatem*

$$\dim S^k(V) = \binom{n+k-1}{k} \quad (n \geq 1), \qquad S^k(V) \cong \operatorname{im} \operatorname{Sym}_k \quad (k \geq 1).$$

*Dowód.* Niech $q\colon T(V) \to S(V)$ będzie ilorazem. Ponieważ $q(e_i)q(e_j) = q(e_j)q(e_i)$, każdą klasę tensora prostego można uporządkować do postaci $e_1^{a_1} \cdots e_n^{a_n}$; te jednomiany rozpinają. Zdefiniujmy homomorfizm $\pi\colon S(V) \to \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ przez $\pi(q(e_i)) = x_i$. Istnieje, bo odwzorowanie z algebry tensorowej wysyłające $e_i$ na $x_i$ zeruje każdy generator $J$. Z drugiej strony przypisanie $x_i \mapsto q(e_i)$ wyznacza homomorfizm $\rho\colon \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \to S(V)$: na wielomianie podstawiamy za zmienne te przemienne elementy. Oba złożenia ustalają wszystkie generatory i jedynkę, więc są identycznościami. Niezależność i rozpinanie wynikają teraz z niezależności zwykłych jednomianów. Liczbę rozwiązań $a_1 + \cdots + a_n = k$ otrzymujemy przez rozmieszczenie $n-1$ przegród wśród $n+k-1$ pozycji, czyli $\binom{n+k-1}{k}$.

Na koniec w stopniu $k$ zachodzi $q_k P_\sigma = q_k$, zatem $q_k \operatorname{Sym}_k = q_k$. Symetryzator zeruje generatory jednorodnej części ideału $J$: zamiana dwóch sąsiednich czynników nie zmienia średniej po wszystkich permutacjach. Przechodzi zatem na odwzorowanie $S^k(V) \to \operatorname{im} \operatorname{Sym}_k$. W jedną stronę jego złożenie z $q_k$ daje symetryzator, w drugą $q_k \operatorname{Sym}_k = q_k$; są to izomorfizmy odwrotne. Dokładniej: ograniczamy $q_k$ do obrazu symetryzatora, na którym $\operatorname{Sym}_k$ jest identycznością. W stopniu 0 obie przestrzenie to $\mathbb{K}$ i izomorfizm jest identycznością. Jeśli $V = 0$, to $S^0(V) = \mathbb{K}$ i $S^k(V) = 0$ dla $k > 0$; wzoru z symbolem Newtona dla $n \geq 1$ nie stosujemy w tym przypadku. □

Dla $V = \mathbb{R}^2$ mamy np. bazę $S^2(V) = \langle e_1^2, e_1 e_2, e_2^2 \rangle$, podczas gdy $\dim V^{\otimes 2} = 4$. W algebrze symetrycznej $e_1 e_2 = e_2 e_1$, ale w $T(V)$ odpowiednie tensory są różne.

## 3.5 Algebra zewnętrzna i własność uniwersalna

**Definicja 3.5.1** (Algebra zewnętrzna)**.** Niech $I$ będzie obustronnym ideałem algebry $T(V)$ generowanym przez $v \otimes v$ dla wszystkich $v \in V$. *Algebra zewnętrzna* jest ilorazem

$$\Lambda(V) := T(V)/I, \qquad \Lambda^k(V) := V^{\otimes k}/(I \cap V^{\otimes k}).$$

Iloczyn w ilorazie zapisujemy $\wedge$, a obraz $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ oznaczamy $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$.

Ideał $I$ jest jednorodny: jego generatory mają stopień 2, a każdy iloczyn z tensorami jednorodnymi ma określony stopień. Stąd podana definicja $\Lambda^k(V)$ jest zgodna z rozkładem $\Lambda(V) = \bigoplus_{k\geq 0}\Lambda^k(V)$. W stopniach 0 i 1 ideał nie ma elementów niezerowych, dlatego $\Lambda^0(V) = \mathbb{K}$ i $\Lambda^1(V) = V$.

**Stwierdzenie 3.5.2** (Relacje i znaki)**.** *W $\Lambda(V)$ zachodzą*

$$v \wedge v = 0, \qquad u \wedge v = -v \wedge u. \tag{3.5.1}$$

*Jeżeli $\alpha \in \Lambda^k(V)$ i $\beta \in \Lambda^\ell(V)$, to*

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell}\beta \wedge \alpha. \tag{3.5.2}$$

*Mnożenie $\wedge$ jest dwuliniowe, łączne i ma jedynkę* 1.

*Dowód.* Pierwsza równość (3.5.1) jest relacją z definicji ideału. Po podstawieniu $u+v$ dostajemy $0 = (u+v)\wedge(u+v) = u\wedge v + v\wedge u$; stąd druga równość. Iloraz algebry łącznej z jedynką przez ideał obustronny dziedziczy łączność i dwuliniowość. Ponieważ ideał składa się z elementów stopni co najmniej 2, nie zawiera jedynki i jej klasa pozostaje jedynką.

Dla prostych $\alpha = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ i $\beta = w_1 \wedge \cdots \wedge w_\ell$ przejście od $\alpha\wedge\beta$ do $\beta\wedge\alpha$ wymaga $k\ell$ zamian miejsc sąsiednich wektorów. Każda zamiana zmienia znak, co dowodzi (3.5.2) dla prostych wielowektorów. Te rozpinają składowe jednorodne, a dwuliniowość kończy dowód. □

**Twierdzenie 3.5.3** (Własność uniwersalna algebry zewnętrznej)**.** *Niech $\mathcal{A}$ będzie łączną algebrą z jedynką, a $f\colon V \to \mathcal{A}$ odwzorowaniem liniowym takim, że $f(v)^2 = 0$ dla każdego $v \in V$. Istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr z jedynką $\bar f\colon \Lambda(V) \to \mathcal{A}$ spełniający $\bar f(v) = f(v)$ dla $v \in \Lambda^1(V) = V$.*

*Dowód.* Z Twierdzenia 3.4.2 mamy jedyny homomorfizm $\widehat f\colon T(V) \to \mathcal{A}$ przedłużający $f$. Dla każdego generatora ideału $I$ zachodzi $\widehat f(v\otimes v) = f(v)^2 = 0$. Jądro homomorfizmu jest ideałem obustronnym, więc zawiera cały $I$. Odwzorowanie $\bar f([t]) := \widehat f(t)$ na $T(V)/I$ jest zatem dobrze określone i jest homomorfizmem. Każdy homomorfizm przedłużający $f$ musi na klasie $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ przyjmować wartość $f(v_1)\cdots f(v_k)$; te klasy wraz z jedynką rozpinają $\Lambda(V)$. Stąd jednoznaczność. □

Przypomnijmy związek alternowania ze znakiem. Jeśli odwzorowanie wieloliniowe $b$ znika przy powtórzeniu argumentów, to rozwinięcie $0 = b(\ldots, u+v, \ldots, u+v, \ldots)$ w dwóch wskazanych miejscach daje

$$b(\ldots,u,\ldots,v,\ldots) = -b(\ldots,v,\ldots,u,\ldots).$$

Wyrazy z dwoma $u$ i dwoma $v$ znikają. Każda permutacja jest złożeniem transpozycji, więc przestawienie argumentów mnoży wynik przez jej znak. Odwrotnie, zmiana znaku przy każdej transpozycji daje $b = -b$ przy równych argumentach, czyli $b = 0$ nad $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$. Stąd w tym rozdziale „alternujący” i „antysymetryczny” są równoważne dla odwzorowań wieloliniowych.

**Twierdzenie 3.5.4** (Własność uniwersalna stopnia $k$)**.** *Dla $k \geq 1$ odwzorowanie*

$$(v_1,\ldots,v_k) \longmapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$$

*jest $k$-liniowe i alternujące: znika, gdy dwa jego argumenty są równe. Dla każdej przestrzeni $Z$ i każdego alternującego $k$-liniowego odwzorowania $b\colon V^k \to Z$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $\bar b\colon \Lambda^k(V) \to Z$ takie, że*

$$\bar b(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = b(v_1,\ldots,v_k).$$

*Dowód.* Wieloliniowość wynika z definicji mnożenia i z liniowego włączenia $V = \Lambda^1(V)$. Jeśli dwa wektory są równe, przesuwamy jeden przez sąsiednie czynniki, korzystając z (3.5.1), aż znajdą się obok siebie. Wtedy ich iloczyn jest zerowy.

Przez iterowaną własność iloczynu tensorowego odwzorowanie $b$ wyznacza jedyne odwzorowanie liniowe $\widetilde{b}\colon V^{\otimes k} \to Z$ z $\widetilde{b}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) = b(v_1, \ldots, v_k)$. Jednorodna część $I \cap V^{\otimes k}$ jest rozpięta przez elementy postaci $x \otimes v \otimes v \otimes y$, gdzie $x, y$ są tensorami prostymi, a łączny stopień wynosi $k$. Na każdym z nich $\widetilde{b}$ znika, bo w $b$ występują dwa jednakowe argumenty. Wobec tego $\widetilde{b}$ przechodzi na iloraz $\Lambda^k(V)$ i określa $\bar{b}$. Wielowektory proste rozpinają ten iloraz, więc faktoryzacja jest jednoznaczna. □

**Twierdzenie 3.5.5** (Antysymetryzacja a iloczyn zewnętrzny)**.** *Niech $q_k\colon V^{\otimes k} \to \Lambda^k(V)$ będzie odwzorowaniem ilorazowym. Istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$j_k\colon \Lambda^k(V) \longrightarrow \operatorname{im} \mathrm{Alt}_k \subseteq V^{\otimes k}, \qquad j_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \mathrm{Alt}_k(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k).$$

*W szczególności $j_2(u \wedge v) = \frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)$. Przy tym utożsamieniu, dla tensorów antysymetrycznych $a$ stopnia $k$ i $b$ stopnia $\ell$ ich iloczyn zewnętrzny odpowiada $\mathrm{Alt}_{k+\ell}(a \otimes b)$.*

*Dowód.* Jeżeli tensor prosty zawiera kolejno $v \otimes v$, to transpozycja tych dwóch miejsc pozostawia go bez zmian, ale zmienia znak jego antysymetryzacji zgodnie z Twierdzeniem 3.4.4. Ponieważ pracujemy nad $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$, jego antysymetryzacja jest zerowa. To samo dotyczy wielokrotności i sum takich tensorów, zatem $\mathrm{Alt}_k$ zeruje $I \cap V^{\otimes k}$ i przechodzi na wskazane odwzorowanie $j_k$.

W ilorazie permutacja czynników zmienia znak o $\operatorname{sgn}(\sigma)$, na mocy (3.5.1). Dla wielowektora prostego mamy więc

$$q_k j_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma)^2 (v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k.$$

Wynika stąd iniektywność $j_k$. Z drugiej strony $j_k q_k = \mathrm{Alt}_k$ na tensorach prostych, a więc wszędzie, co dowodzi surjektywności na obraz. Jeśli $a = j_k(\alpha)$ i $b = j_\ell(\beta)$, to $j_{k+\ell}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{Alt}_{k+\ell}(a \otimes b)$, bo $q_k(a) = \alpha$, $q_\ell(b) = \beta$ i stosujemy właśnie sprawdzoną równość $j_{k+\ell} q_{k+\ell} = \mathrm{Alt}_{k+\ell}$. □

*Uwaga* 3.5.6 (Skąd bierze się czynnik $1/k!$?). Obraz $u \wedge v$ w *algebrze zewnętrznej* to klasa $u \otimes v$. Dopiero jego kanoniczny reprezentant w *przestrzeni tensorów antysymetrycznych*, dany przez $j_2$, ma postać $\frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)$. W szczególności nie wolno utożsamiać tych dwóch zapisów bez podania normalizacji. Dla kowektorów standardowe odwzorowanie $\Lambda^k(V^*)$ na funkcje alternujące na $V^k$ przyjmiemy z normalizacją przez wyznacznik w Sekcji 3.7.

## 3.6 Baza i wymiar potęg zewnętrznych

**Twierdzenie 3.6.1** (Baza potęgi zewnętrznej)**.** *Niech $e_1, \ldots, e_n$ będzie bazą $V$. Dla $0 \le k \le n$ rodzina*

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}, \qquad 1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n,$$

*stanowi bazę $\Lambda^k(V)$; dla $k = 0$ jest to wektor 1. Dla $k > n$ zachodzi $\Lambda^k(V) = 0$. W szczególności*

$$\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}, \qquad \dim \Lambda(V) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n. \tag{3.6.1}$$

*Dowód.* Rozwijamy każdy czynnik $v_a$ w bazie $e_i$ i korzystamy z wieloliniowości iloczynu zewnętrznego. Otrzymujemy sumę wielowektorów $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$. Jeśli indeks się powtarza, składnik

znika, bo dwa jednakowe wektory można ustawić obok siebie. Pozostałe porządkujemy rosnąco, a każda zamiana sąsiadów daje minus. Rodzina z tezy rozpięła więc $\Lambda^k(V)$; dla $k > n$ wszystkie ciągi $k$ indeksów mają powtórzenie, więc cała przestrzeń jest zerowa.

Aby udowodnić niezależność, nie wystarczy samo porządkowanie. Dla rosnącego indeksu $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ i $v_b = \sum_j a_{jb} e_j$ definiujemy

$$D_I(v_1, \ldots, v_k) := \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{b=1}^{k} a_{i_{\sigma(b)}, b}. \tag{3.6.2}$$

W każdym składniku dla ustalonego $b$ występuje dokładnie jeden współczynnik wektora $v_b$, więc $D_I$ jest wieloliniowa. Zamiana dwóch argumentów przestawia dwie kolumny: permutacje w sumie parują się ze znakami przeciwnymi. Dlatego $D_I$ jest alternująca. Własność uniwersalna z Twierdzenia 3.5.4 daje funkcjonał $\overline{D}_I \colon \Lambda^k(V) \to \mathbb{K}$. Na uporządkowanym wielowektorze bazowym $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$ wartość $\overline{D}_I$ wynosi 1, gdy $I = (j_1, \ldots, j_k)$, oraz 0 w przeciwnym razie. Jeżeli zatem suma $\sum_J c_J e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$ jest zerowa, zastosowanie kolejno $\overline{D}_I$ daje $c_I = 0$ dla każdego $I$. Rodzina jest liniowo niezależna. Indeksów rosnących długości $k$ jest $\binom{n}{k}$; sumę wymiarów obliczamy z dwumianu Newtona. □

**Przykład 3.6.2** (Współczynniki $u \wedge v$)**.** Dla $V = \mathbb{R}^3$, $u = e_1 + 2e_2$ i $v = e_2 + e_3$ mamy

$$u \wedge v = (e_1 + 2e_2) \wedge (e_2 + e_3) = e_1 \wedge e_2 + e_1 \wedge e_3 + 2e_2 \wedge e_3.$$

Współczynnik przy $e_i \wedge e_j$ jest wyznacznikiem $\left(\begin{smallmatrix} u^i & v^i \\ u^j & v^j \end{smallmatrix}\right) = u^i v^j - u^j v^i$, zgodnie z (3.6.2).

**Przykład 3.6.3** (Nie każdy dwuwektor jest prosty)**.** W $\Lambda^2(\mathbb{R}^4)$ weźmy $\omega = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$. Wówczas

$$\omega \wedge \omega = 2 e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 \neq 0.$$

Natomiast $(u \wedge v) \wedge (u \wedge v) = 0$ dla każdego $u, v$, gdyż $u$ występuje dwa razy. Zatem $\omega$ nie jest pojedynczym iloczynem $u \wedge v$. Pokazuje to, że również w algebrze zewnętrznej potrzebujemy sum wielowektorów prostych.

## 3.7 Potęgi zewnętrzne i wyznacznik

**Twierdzenie 3.7.1** (Potęga zewnętrzna odwzorowania)**.** *Dla liniowego $A \colon V \to W$ i $k \geq 1$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe*

$$\Lambda^k A \colon \Lambda^k(V) \to \Lambda^k(W), \qquad (\Lambda^k A)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = Av_1 \wedge \cdots \wedge Av_k.$$

*Dla $B \colon W \to U$ zachodzi $\Lambda^k(B \circ A) = \Lambda^k B \circ \Lambda^k A$ i $\Lambda^k \mathrm{id}_V = \mathrm{id}_{\Lambda^k(V)}$. Przyjmujemy również $\Lambda^0 A = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$; wtedy powyższe prawa obowiązują także dla $k = 0$, a pusty iloczyn zewnętrzny oznacza 1.*

*Dowód.* Odwzorowanie $(v_1, \ldots, v_k) \mapsto Av_1 \wedge \cdots \wedge Av_k$ jest wieloliniowe, bo $A$ jest liniowe, a iloczyn zewnętrzny wieloliniowy. Gdy dwa argumenty są równe, odpowiadające im obrazy też są równe, więc iloczyn znika. Twierdzenie 3.5.4 daje jedyne odwzorowanie $\Lambda^k A$. Na wielowektorze prostym obie strony wzoru na złożenie dają $BAv_1 \wedge \cdots \wedge BAv_k$. Wielowektory proste rozpinają $\Lambda^k(V)$, co dowodzi równości na całej przestrzeni. Argument dla identyczności jest taki sam. □

**Definicja 3.7.2** (Wyznacznik operatora)**.** Jeżeli $\dim V = n$, to $\Lambda^n(V)$ jest jednowymiarowa na mocy Twierdzenia 3.6.1. Dla operatora $A \colon V \to V$ jego *wyznacznik* jest jedynym skalarem $\det A \in \mathbb{K}$, dla którego

$$\Lambda^n A = (\det A) \mathrm{id}_{\Lambda^n(V)}. \tag{3.7.1}$$

Dla $V = 0$ przyjmujemy $\det \mathrm{id}_V = 1$; odpowiada temu wyznacznik pustej macierzy równy 1.

**Twierdzenie 3.7.3** (Wzór Leibniza i własności wyznacznika)**.** *Jeśli* $Ae_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$*, to*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j}. \tag{3.7.2}$$

*Ponadto*

$$\det \mathrm{id}_V = 1, \qquad \det(B \circ A) = \det B \det A, \qquad \det A \neq 0 \iff A \text{ jest odwracalne.}$$

*Wartość* $\det A$ *nie zależy od bazy; wyznacznik jest liniowy w każdej kolumnie macierzy i zmienia znak po zamianie dwóch kolumn.*

*Dowód.* Niech $\varepsilon = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n \neq 0$. Z (3.7.1) i wieloliniowości mamy

$$(\det A)\varepsilon = Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n = \sum_{i_1,\ldots,i_n} a_{i_1,1} \cdots a_{i_n,n} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_n}.$$

Wyrazy z powtarzającym się indeksem znikają. Pozostałe ciągi $(i_1, \ldots, i_n)$ są permutacjami $(\sigma(1), \ldots, \sigma(n))$, a przestawienie odpowiadającego iloczynu zewnętrznego do $\varepsilon$ daje znak $\operatorname{sgn}(\sigma)$. Porównanie współczynników przy niezerowym $\varepsilon$ daje (3.7.2).


Twierdzenie 3.7.1 w stopniu $n$ daje $\Lambda^n(B \circ A) = \Lambda^n B \circ \Lambda^n A$. Ponieważ każde z tych odwzorowań jest mnożeniem przez odpowiedni skalar, otrzymujemy $\det(BA) = \det B \det A$; tak samo $\det \mathrm{id}_V = 1$. Jeśli $A$ ma odwrotność, $1 = \det(A^{-1}A) = \det(A^{-1}) \det A$, więc $\det A \neq 0$. Jeżeli $A$ nie ma odwrotności, kolumny $Ae_1, \ldots, Ae_n$ są liniowo zależne. Jedna z nich jest kombinacją pozostałych, a po rozwinięciu odpowiadającego czynnika każdy wyraz $Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n$ zawiera powtórzony wektor i znika. Stąd $\det A = 0$.

Definicja (3.7.1) mówi o skalarze działania operatora na samej jednowymiarowej przestrzeni $\Lambda^n(V)$, dlatego nie zależy od wyboru jej bazy. Wreszcie $Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n$ jest liniowy w każdym czynniku i antysymetryczny przy ich zamianie; jego współczynnik przy $\varepsilon$, czyli wyznacznik, ma takie same własności względem kolumn. □

**Przykład 3.7.4** (Pole zorientowane w $\mathbb{R}^2$)**.** Niech $u = (3, 1)$ i $v = (1, 2)$ w standardowej bazie. Wówczas

$$u \wedge v = (3e_1 + e_2) \wedge (e_1 + 2e_2) = (3 \cdot 2 - 1 \cdot 1)e_1 \wedge e_2 = 5e_1 \wedge e_2.$$

Wartość 5 jest polem równoległoboku ze znakiem określonym przez kolejność $(u, v)$; pole geometryczne wynosi $|5|$. Zmiana kolejności wektorów daje $v \wedge u = -5e_1 \wedge e_2$.




Rysunek 3.1: Iloczyn zewnętrzny w $\mathbb{R}^2$ koduje pole i orientację równoległoboku. Zmiana kolejności wektorów zmienia znak.

**Twierdzenie 3.7.5** (Minory jako macierz $\Lambda^k A$)**.** *Niech $A\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ ma macierz $(a_{ij})$. W bazach uporządkowanych z Twierdzenia 3.6.1 współczynnik macierzy $\Lambda^k A$ w wierszu $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ i kolumnie $J = (j_1 < \cdots < j_k)$ jest wyznacznikiem podmacierzy $A_{I,J} = (a_{i_a,j_b})_{a,b=1}^k$.*

*Dowód.* Rozwijamy $Ae_{j_1} \wedge \cdots \wedge Ae_{j_k}$ według $Ae_{j_b} = \sum_i a_{i,j_b} e_i$. Przy bazowym $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ pojawiają się tylko składniki, których $k$ indeksów stanowi permutację $I$. Po ustawieniu ich w kolejności rosnącej dostajemy

$$\sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{b=1}^{k} a_{i_{\sigma(b)},j_b} = \det A_{I,J}$$

na mocy wzoru (3.7.2) dla macierzy $k \times k$. Nie występują żadne inne składniki przy wskazanym wektorze bazowym, więc to jest szukany współczynnik. □

**Wniosek 3.7.6** (Wzór Cauchy'ego–Bineta)**.** *Dla macierzy $A$ o wymiarach $m \times n$ i $B$ o wymiarach $n \times p$, oraz rosnących indeksów $I \subseteq \{1,\dots,m\}$, $J \subseteq \{1,\dots,p\}$ długości $k$, gdzie $0 \le k \le \min(m,p)$, zachodzi*

$$\det\bigl((AB)_{I,J}\bigr) = \sum_{\substack{K \subseteq \{1,\dots,n\} \\ |K|=k}} \det A_{I,K} \det B_{K,J}. \tag{3.7.3}$$

*Dowód.* Z Twierdzenia 3.7.1 mamy $\Lambda^k(AB) = (\Lambda^k A)(\Lambda^k B)$. Twierdzenie 3.7.5 mówi, że macierze trzech występujących tu operatorów mają za współczynniki odpowiednie minory. Współczynnik iloczynu macierzy w wierszu $I$ i kolumnie $J$ to suma po wszystkich $k$-elementowych indeksach pośrednich $K$; jest ona dokładnie prawą stroną (3.7.3). Dla $k = 0$ obie strony są równe 1. Gdy $k > n$, nie ma indeksów $K$ i suma jest zerowa, zgodnie z tym, że $\Lambda^k(\mathbb{K}^n) = 0$. □

Oznaczamy przez $\operatorname{Alt}^k(V;\mathbb{K})$ przestrzeń alternujących $k$-liniowych funkcji $V^k \to \mathbb{K}$. Dla $k = 0$ jest to $\mathbb{K}$.

**Twierdzenie 3.7.7** (Kowektory zewnętrzne jako odwzorowania alternujące)**.** *Dla skończenie wymiarowego $V$ istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$\mathcal{E}_k\colon \Lambda^k(V^*) \longrightarrow \operatorname{Alt}^k(V;\mathbb{K}),$$

*ustalony na iloczynach prostych przez*

$$\mathcal{E}_k(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k)(v_1,\dots,v_k) = \det\bigl(\alpha_a(v_b)\bigr)_{a,b=1}^k. \tag{3.7.4}$$

*W szczególności $\Lambda^k(V^*) \cong (\Lambda^k V)^*$. Dla kowektorów $\alpha, \beta$ otrzymujemy*

$$\mathcal{E}_2(\alpha \wedge \beta)(u,v) = \alpha(u)\beta(v) - \alpha(v)\beta(u). \tag{3.7.5}$$

*Dla $k = 0$ przyjmujemy $\mathcal{E}_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$ i wyznacznik pustej macierzy równy 1. Dla $k > \dim V$ obie strony izomorfizmu są przestrzeniami zerowymi.*

*Dowód.* Wyznacznik w (3.7.4) jest wieloliniowy i alternujący w wierszach, a zatem w $\alpha_a$; Twierdzenie 3.5.4, zastosowane do $V^*$, zapewnia dobrze określone odwzorowanie liniowe $\mathcal{E}_k$. Jest ono alternujące w argumentach $v_b$, bo zamiana dwóch kolumn wyznacznika zmienia znak, i wieloliniowe w tych argumentach. Jeśli $e^1,\dots,e^n$ jest bazą dualną, to wartość $\mathcal{E}_k(e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k})$ na $(e_{j_1},\dots,e_{j_k})$, dla indeksów rosnących, wynosi $\delta_{I,J}$. Wektory bazowe w $\Lambda^k(V^*)$ przechodzą więc na bazę dualną do wektorów bazowych $\Lambda^k V$: daje to izomorfizm $\Lambda^k(V^*) \cong (\Lambda^k V)^*$. Każde odwzorowanie alternujące $V^k \to \mathbb{K}$ wyznacza funkcjonał na $\Lambda^k V$ przez Twierdzenie 3.5.4, więc powyższy izomorfizm obejmuje dokładnie wszystkie takie odwzorowania. Przy $k = 2$ wzór wyznacznika $2 \times 2$ daje równość (3.7.5). □

*Uwaga* 3.7.8 (Dwie zgodne normalizacje). Utożsamienie $j_2$ z Twierdzenia 3.5.5 wysyła $\alpha\wedge\beta$ na $\frac{1}{2}(\alpha\otimes\beta-\beta\otimes\alpha)$. Natomiast $\mathcal{E}_2$ wysyła go na *dwukrotność* tego antysymetrycznego odwzorowania dwuliniowego: wzór (3.7.5) nie zawiera czynnika $1/2$. Ogólnie, po odczytaniu tensorów kowariantnych jako funkcji wieloliniowych, zachodzi $\mathcal{E}_k = k!\,j_k$: suma w wyznaczniku ma te same składniki ze znakami co antysymetryzacja, lecz bez dzielenia przez $k!$. Po utożsamieniu elementów $\Lambda^k(V^*)$ z odwzorowaniami alternującymi za pomocą $\mathcal{E}_k$, iloczyn $\omega\wedge\eta$ stopni $k$ i $\ell$ jest dany przez

$$(\omega\wedge\eta)(v_1,\dots,v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!}\sum_{\sigma\in S_{k+\ell}} \operatorname{sgn}(\sigma)\,\omega(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)})\,\eta(v_{\sigma(k+1)},\dots,v_{\sigma(k+\ell)}). \tag{3.7.6}$$

Dla iloczynów kowektorów prostych jest to rozwinięcie wyznacznika względem pierwszych $k$ wierszy: każdemu wyborowi $k$ kolumn odpowiada $k!\ell!$ permutacji wewnątrz dwóch bloków. Ponieważ takie iloczyny rozpinają przestrzenie zewnętrzne, wzór zachodzi zawsze. Równoważnie współczynnik przed $\operatorname{Alt}_{k+\ell}(\omega\otimes\eta)$ jest równy $(k+\ell)!/(k!\ell!)$, gdy $\omega,\eta$ są już funkcjami alternującymi. Wynika to bezpośrednio z $\mathcal{E}_m = m!j_m$ i wzoru na mnożenie dla $j_m$. To wyjaśnia, dlaczego wzór w modelu tensorów antysymetrycznych i wzór dla form mają różne współczynniki, mimo że opisują tę samą algebrę.

## 3.8 Tensory w punkcie rozmaitości

Dla gładkiej rozmaitości $M$ i $p\in M$ bierzemy teraz $V = T_pM$ jako rzeczywistą przestrzeń liniową, a $V^* = T_p^*M$ z Sekcji 1.7 i 1.8. Tensor typu $(r,s)$ *w punkcie* $p$ jest elementem $T^r_s(T_pM)$; to pojedynczy obiekt w jednym włóknie.

**Stwierdzenie 3.8.1** (Iloczyn tensorowy wiązek)**.** *Niech $E,F\to M$ będą wiązkami wektorowymi rzędów odpowiednio $a,b$. Przestrzenie $(E\otimes F)_p := E_p\otimes F_p$ tworzą wiązkę wektorową rzędu $ab$ nad $M$. Jeśli $g_{ji}$ i $h_{ji}$ są macierzami przejścia wiązek $E$ i $F$, to macierzami przejścia $E\otimes F$ są $g_{ji}\otimes h_{ji}$.*

*Dowód.* Na obszarze, gdzie $E$ i $F$ mają bazy lokalne $e_1,\dots,e_a$ oraz $f_1,\dots,f_b$, ich $ab$ iloczynów $e_u\otimes f_v$ stanowi bazę każdego włókna $E_p\otimes F_p$ na mocy twierdzenia o bazie iloczynu tensorowego. Gdy zmienimy obie bazy, wzór na współczynniki iloczynu prostego pokazuje, że nowe współczynniki otrzymujemy przez przemnożenie starych macierzą $g_{ji}\otimes h_{ji}$; jej elementy są iloczynami gładkich funkcji. Na przecięciu trzech obszarów własność złożenia z Twierdzenia 3.3.6 daje

$$(g_{kj}\otimes h_{kj})(g_{ji}\otimes h_{ji}) = (g_{kj}g_{ji})\otimes(h_{kj}h_{ji}) = g_{ki}\otimes h_{ki}.$$

Jest to warunek sklejania; macierze są odwracalne, bo ich odwrotnościami są $g_{ji}^{-1}\otimes h_{ji}^{-1}$. Konstrukcja wiązki z takich danych, podana w Sekcji 1.9, kończy dowód. □

**Definicja 3.8.2** (Pole tensorowe)**.** *Pole tensorowe* typu $(r,s)$ przypisuje każdemu $p\in M$ tensor $T_p\in T^r_s(T_pM)$ w sposób gładki. Dokładnie: jest gładkim przekrojem wiązki

$$T^r_sM := (TM)^{\otimes r}\otimes(T^*M)^{\otimes s}\longrightarrow M. \tag{3.8.1}$$

Przy wykładniku 0 rozumiemy czynnik jako wiązkę trywialną $M\times\mathbb{R}$.

W lokalnej mapie $x^1,\dots,x^n$ bazami włókien są $\partial_i := \partial/\partial x^i$ oraz dualne $\mathrm{d}x^j$, określone przez $\mathrm{d}x^j(\partial_i)=\delta^j_i$. Pole ma zatem postać

$$T = \sum_{\substack{i_1,\dots,i_r\\ j_1,\dots,j_s}} T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}(x)\,\partial_{i_1}\otimes\cdots\otimes\partial_{i_r}\otimes\mathrm{d}x^{j_1}\otimes\cdots\otimes\mathrm{d}x^{j_s}. \tag{3.8.2}$$

Warunek gładkości oznacza dokładnie, że wszystkie funkcje $T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}(x)$ są gładkie. W innej mapie bazowe wektory i kowektory się zmieniają; przepisanie tej samej wartości $T_p$ w nowych bazach narzuca współczynnikom prawa transformacji, które teraz rozpiszemy. Niech $x$ i $y$ będą dwiema mapami wokół $p$, a

$$A^a{}_i = \frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p), \qquad B^j{}_b = \frac{\partial x^j}{\partial y^b}(p), \qquad B = A^{-1}.$$

Reguła łańcucha i dualność dają

$$\partial_{x^i} = \sum_a A^a{}_i \partial_{y^a}, \qquad \mathrm{d}x^j = \sum_b B^j{}_b \mathrm{d}y^b.$$

Podstawiając te równości w każdy czynnik (3.8.2), otrzymujemy

$$(T_y)^{a_1\cdots a_r}{}_{b_1\cdots b_s} = \sum_{I,J} \left(\prod_{\mu=1}^{r} A^{a_\mu}{}_{i_\mu}\right) \left(\prod_{\nu=1}^{s} B^{j_\nu}{}_{b_\nu}\right) (T_x)^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}. \tag{3.8.3}$$

Wszystkie wartości odnoszą się do tego samego punktu $p$; zmienia się jedynie jego opis i baza. Każdy górny indeks wnosi macierz Jacobiego $A$, a każdy dolny jej odwrotność $B$. Odwracając zamianę map, odzyskujemy stare współczynniki. Ponieważ $A, B$ są gładkie, gładkość współczynników w jednej mapie pociąga ją w każdej innej.

Wiązka (3.8.1) powstaje przez wielokrotne zastosowanie Stwierdzenia 3.8.1 do $TM$ i $T^*M$.

Typ $(0,0)$ to zwykła funkcja gładka, typ $(1,0)$ to pole wektorowe z Rozdziału 2, a typ $(0,2)$ to gładko zmieniająca się rodzina form dwuliniowych na przestrzeniach stycznych. Iloczyn tensorowy i kontrakcja działają *punkt po punkcie*. Pozostawiają pola gładkie, bo w mapach ich współczynniki są sumami iloczynów gładkich funkcji współczynnikowych.

**Przykład 3.8.3** (Tensor identycznościowy)**.** Operator $\mathrm{id}_{T_pM}$ z (3.3.5) odpowiada w dowolnej bazie $e_i$ tensorowi

$$\mathsf{I}_p = \sum_i e_i \otimes e^i \in T^1_1(T_pM).$$

Jego zapis w mapie to $\sum_i \partial_i \otimes \mathrm{d}x^i$. Nie zależy od mapy: po przyłożeniu do dowolnego $v$ odzyskujemy $\sum_i e^i(v) e_i = v$, a izomorfizm $T^1_1(T_pM) \cong \mathrm{End}(T_pM)$ jest iniektywny. Tensor $\mathsf{I}$ jest zatem globalnym gładkim polem tensorowym, mimo że zapisaliśmy go lokalnie.

**Przykład 3.8.4** (Tensor jako iloczyn skalarny)**.** Na $\mathbb{R}^2$ pole $g = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ przypisuje każdemu punktowi ten sam iloczyn skalarny. Dla $u = a\partial_x + b\partial_y$ i $v = c\partial_x + d\partial_y$ mamy $g(u,v) = ac + bd$. Oznacza to, że tensor typu $(0,2)$ można czytać jako przepis przyjmujący *dwa* wektory styczne w jednym punkcie i zwracający liczbę. Sama lista jego współczynników zmieni się przy zamianie współrzędnych, ale wartość $g(u,v)$ pozostanie ta sama. Na jednowymiarowym przykładzie widać konkretny czynnik: dla $x > 0$ i $y = x^2$ tensor $\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x$ ma zapis $\frac{1}{4y}\mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$, bo $\mathrm{d}x = \frac{1}{2\sqrt{y}}\mathrm{d}y$. Zmiana współrzędnych nie pozwala więc po prostu zastąpić symbolu $x$ symbolem $y$ przy pozostawieniu tych samych współczynników.

Podobnie $\Lambda^k(T_pM)$ ma wymiar $\binom{n}{k}$. W przypadku różniczki $\mathrm{d}F_p \colon T_pM \to T_{F(p)}N$ między rozmaitościami tego samego wymiaru, $\Lambda^n(\mathrm{d}F_p)$ działa między ich jednowymiarowymi potęgami zewnętrznymi. Jest niezerowe dokładnie wtedy, gdy $\mathrm{d}F_p$ jest izomorfizmem: wynika to z dowodu Twierdzenia 3.7.3, zastosowanego do baz w dwóch różnych przestrzeniach. W mapach odpowiada temu warunek niezerowego wyznacznika macierzy Jacobiego. W odróżnieniu od endomorfizmu jednej przestrzeni, dla mapy $T_pM \to T_{F(p)}N$ nie otrzymujemy jednak kanonicznego skalara „wyznacznik" bez wyboru baz lub elementów objętości w obu włóknach. Kanoniczne jest odwzorowanie $\Lambda^n(\mathrm{d}F_p)$ między dwiema prostymi; jego macierz liczbową określają wybrane mapy.

*Uwaga* 3.8.5 (Cztery sposoby widzenia tej samej konstrukcji). Iloczyn tensorowy powstaje z dwuliniowości (Definicja 3.1.1); algebra tensorowa gromadzi wszystkie stopnie i mnoży przez konkatenację (Definicja 3.4.1). Symetryzator $\mathrm{Sym}_k$ wybiera część niezmienniczą względem permutacji, zaś $\mathrm{Alt}_k$ część zmieniającą znak. Algebra zewnętrzna jest ilorazem, w którym kwadrat każdego wektora znika (Definicja 3.5.1). Twierdzenie 3.5.5 mówi dokładnie, jak przejść od tego ilorazu do tensorów antysymetrycznych.

## 3.9 Różniczkowanie pól tensorowych: pochodna Liego

Pole tensorowe ma wartości w różnych przestrzeniach nad różnymi punktami. Dlatego wyrażenie „odejmij $T_q - T_p$" nie ma sensu, dopóki nie wskażemy sposobu przeniesienia obu tensorów do jednego włókna. W Sekcji 2.6 przepływ pola $X$ zrobił to dla pól wektorowych; ta sama konstrukcja działa na każdym typie tensora.

Samo różniczkowanie współczynników w mapie nie rozwiązuje problemu: ich pochodne zmieniają się przy zmianie współrzędnych. Na przykład na $(0,\infty)$ wektor $Y = \partial_x$ ma w mapie $x$ stały współczynnik $Y^x = 1$, więc $\partial_x Y^x = 0$. Po podstawieniu $y = x^2$ mamy $Y = 2\sqrt{y}\,\partial_y$ i $\partial_y Y^y = 1/\sqrt{y} \neq 0$. Różnica pochodzi od zmiany samej bazy $\partial_y$. Pochodna Liego uwzględnia również tę zmianę.

**Definicja 3.9.1** (Cofnięcie pola tensorowego)**.** Niech $F\colon U \to V$ będzie dyfeomorfizmem między otwartymi podzbiorami $M$. Dla pola wektorowego $Y$ i pola kowektorowego $\alpha$ na $V$ definiujemy w $p \in U$

$$\begin{aligned}(F^*Y)_p &:= (\mathrm{d}F_p)^{-1} Y_{F(p)} \in T_pM,\\ (F^*\alpha)_p(v) &:= \alpha_{F(p)}(\mathrm{d}F_p v), \qquad v \in T_pM.\end{aligned}$$

Dla funkcji kładziemy $F^*f = f \circ F$. Na tensorach prostych cofamy każdy czynnik osobno, np. $F^*(Y \otimes \alpha) = F^*Y \otimes F^*\alpha$, i przedłużamy liniowo na sumy w każdym włóknie. Do gładkości wystarczy lokalne rozwinięcie w bazie tensorowej; nie zakładamy istnienia jednej globalnej bazy ani globalnego rozkładu na tensory proste. Dostajemy pole tego samego typu na $U$. W szczególności $F^*(fT) = (f \circ F)F^*T$, a nie $fF^*T$. Współczynniki są gładkie: różniczka i jej macierz odwrotna zależą gładko od punktu, a działania tensorowe są wieloliniowe.

Przy cofaniu wektora używamy odwrotnej różniczki, a przy cofaniu kowektora różniczki bez odwracania: obie wartości muszą ostatecznie należeć do włókna nad $p$. Wzór dla tensorów prostych jest dobrze określony na iloczynach tensorowych, ponieważ każda z operacji na czynnikach jest liniowa. W szczególności cofnięcie zachowuje iloczyn tensorowy i kontrakcję. To drugie można sprawdzić na jednej parze:

$$(F^*\alpha)_p\big((F^*Y)_p\big) = \alpha_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p(\mathrm{d}F_p)^{-1}Y_{F(p)}\big) = \alpha_{F(p)}(Y_{F(p)}).$$

Obie strony są cofnięciem funkcji $p \mapsto \alpha_p(Y_p)$; z liniowości wynikają analogiczne równości dla innych tensorów.

**Definicja 3.9.2** (Pochodna Liego dowolnego pola tensorowego)**.** Niech $\Phi_t = \Phi_t^X$ oznacza lokalny przepływ pola $X$. Dla pola tensorowego $T$ dowolnego typu kładziemy

$$(\mathcal{L}_X T)_p := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (\Phi_t^* T)_p. \tag{3.9.1}$$

Każdy tensor $(\Phi_t^*T)_p$ należy do tej samej przestrzeni $T^r_s(T_pM)$, zatem pochodna jest zwykłą pochodną krzywej w przestrzeni liniowej. Jest to gładkie pole tensorowe: w każdej mapie współczynniki cofnięcia są gładkie łącznie w $(t,p)$, więc ich pochodne po $t$ w zerze są gładkie w $p$.

W stopniu $(0,0)$ wzór (3.9.1) daje $\mathcal{L}_X f = X(f)$, ponieważ $\Phi_t^* f = f \circ \Phi_t$. Dla typu $(1,0)$ odzyskujemy dokładnie $\mathcal{L}_X Y = [X,Y]$ z Twierdzenia 2.6.2. Dowód tamtego twierdzenia wyjaśnia szczegółowo znak: przenosimy $Y_{\Phi_t(p)}$ z powrotem różniczką przepływu $\Phi_{-t}$.

**Twierdzenie 3.9.3** (Reguła Leibniza i zgodność z kontrakcją)**.** *Dla pól tensorowych $S, T$, funkcji $f$, pola wektorowego $Y$ i pola kowektorowego $\alpha$ mamy*

$$\mathcal{L}_X(S \otimes T) = (\mathcal{L}_X S) \otimes T + S \otimes (\mathcal{L}_X T), \tag{3.9.2}$$

$$\mathcal{L}_X(fT) = X(f)T + f\mathcal{L}_X T, \tag{3.9.3}$$

$$(\mathcal{L}_X \alpha)(Y) = X\big(\alpha(Y)\big) - \alpha([X,Y]), \tag{3.9.4}$$

$$\mathcal{L}_X(C(S)) = C(\mathcal{L}_X S), \tag{3.9.5}$$

*gdzie w ostatnim wzorze $C$ jest dowolną kontrakcją jednego indeksu wektorowego z jednym kowektorowym.*

*Dowód.* Ustalmy punkt $p$. Cofnięcie zachowuje iloczyn tensorowy: $\Phi_t^*(S \otimes T) = \Phi_t^* S \otimes \Phi_t^* T$. Obie krzywe tensorów po prawej stronie leżą w stałych przestrzeniach nad $p$; różniczkując ich iloczyn dwuliniowy w $t = 0$ dostajemy (3.9.2). Traktując $f$ jako tensor typu $(0,0)$, otrzymujemy (3.9.3) z $\mathcal{L}_X f = X(f)$.

Dla kowektora i wektora równanie o zachowaniu ewaluacji, wykazane tuż przed definicją, przyjmuje postać

$$\Phi_t^*\big(\alpha(Y)\big) = (\Phi_t^*\alpha)(\Phi_t^* Y).$$

Lewa strona po zróżniczkowaniu w zerze wynosi $X(\alpha(Y))$. Prawa, przez zwykłą regułę różniczkowania wartości kowektora na wektorze, wynosi $(\mathcal{L}_X\alpha)(Y) + \alpha(\mathcal{L}_X Y)$. Z $\mathcal{L}_X Y = [X,Y]$ otrzymujemy (3.9.4).

Wreszcie, cofnięcie i kontrakcja spełniają $\Phi_t^* C(S) = C(\Phi_t^* S)$, co dla pojedynczej pary sprawdziliśmy powyżej. Kontrakcja jest liniowym odwzorowaniem między przestrzeniami tensorów w $p$, więc można ją przenieść przez pochodną po $t$. To daje (3.9.5). □

**Twierdzenie 3.9.4** (Wzór we współrzędnych)**.** *Niech $X = \sum_{a=1}^n X^a \partial_a$ i niech $T$ ma współczynniki $T^I{}_J$ z (3.8.2), gdzie $I = (i_1, \dots, i_r)$ i $J = (j_1, \dots, j_s)$. Symbol $I_{\mu \leftarrow a}$ oznacza zastąpienie w $I$ indeksu $i_\mu$ przez $a$, a $J_{\nu \leftarrow a}$ oznacza to samo w $J$. Wtedy*

$$\begin{aligned}(\mathcal{L}_X T)^I{}_J = &\sum_{a=1}^n X^a \partial_a T^I{}_J - \sum_{\mu=1}^r \sum_{a=1}^n (\partial_a X^{i_\mu}) T^{I_{\mu\leftarrow a}}{}_J \\ &+ \sum_{\nu=1}^s \sum_{a=1}^n (\partial_{j_\nu} X^a) T^I{}_{J_{\nu \leftarrow a}}.\end{aligned} \tag{3.9.6}$$

*Pierwszy wyraz różniczkuje funkcje współczynnikowe, każdy indeks wektorowy wnosi wyraz z minusem, a każdy indeks kowektorowy wyraz z plusem. Na przykład dla pola operatorów $S \in \Gamma(T_1^1 M)$ wzór ten ma łatwą do odczytania postać*

$$(\mathcal{L}_X S)^i{}_j = \sum_a X^a \partial_a S^i{}_j - \sum_a S^a{}_j \partial_a X^i + \sum_a S^i{}_a \partial_j X^a.$$

*Dowód.* Z (2.2.3), zastosowanego do $Y = \partial_i$, wynika

$$\mathcal{L}_X \partial_i = [X, \partial_i] = -\sum_a (\partial_i X^a)\partial_a,$$

ponieważ współczynniki pola $\partial_i$ są stałe. Z kolei $\mathrm{d}x^j(\partial_i) = \delta_i^j$ jest funkcją stałą. Wstawiając $Y = \partial_i$ i $\alpha = \mathrm{d}x^j$ do (3.9.4), dostajemy

$$(\mathcal{L}_X \mathrm{d}x^j)(\partial_i) = X(\delta_i^j) - \mathrm{d}x^j([X, \partial_i]) = \partial_i X^j.$$

Wektory $\partial_i$ tworzą bazę, zatem $\mathcal{L}_X \mathrm{d}x^j = \sum_i (\partial_i X^j)\mathrm{d}x^i$. Teraz rozwińmy $T$ według (3.8.2) i stosujmy (3.9.2) kolejno do funkcji współczynnikowej oraz do każdego czynnika. Różniczkowanie funkcji daje pierwszy wyraz (3.9.6). Dla ustalonego miejsca wektorowego $\mu$ współczynnik przy bazowym $\partial_{i_\mu}$ po zróżniczkowaniu wcześniejszego czynnika $\partial_a$ wynosi $-\sum_a (\partial_a X^{i_\mu}) T^{I_{\mu\leftarrow a}}{}_J$; sumowanie po $\mu$ daje drugi wyraz wzoru. Dla ustalonego miejsca kowektorowego $\nu$ wcześniejszy czynnik $\mathrm{d}x^a$ wnosi do współczynnika przy $\mathrm{d}x^{j_\nu}$ sumę $\sum_a (\partial_{j_\nu} X^a) T^I{}_{J_{\nu\leftarrow a}}$; po zsumowaniu po $\nu$ otrzymujemy trzeci wyraz. Ponieważ tensory bazowe są liniowo niezależne, ich współczynniki są dokładnie podanymi wyrażeniami. □

**Przykład 3.9.5** (Sprawdzenie znaków na przepływie)**.** Na $\mathbb{R}^2$ weźmy $X = x\partial_x$. Jego przepływ to $\Phi_t(x, y) = (e^t x, y)$, więc

$$\Phi_t^* \partial_x = e^{-t}\partial_x, \qquad \Phi_t^* \mathrm{d}x = e^t \mathrm{d}x.$$

Po zróżniczkowaniu w zerze otrzymujemy $\mathcal{L}_X \partial_x = -\partial_x = [X, \partial_x]$ oraz $\mathcal{L}_X \mathrm{d}x = \mathrm{d}x$. Pierwszy znak jest ujemny, bo cofamy wektor różniczką odwrotnego przepływu; drugi dodatni, bo kowektor działa na różniczce przepływu. Wyniki są zgodne z tym, że $\mathrm{d}x(\partial_x) = 1$ pozostaje funkcją stałą: $1 + (-1) = 0$ w regule Leibniza dla ewaluacji.

**Przykład 3.9.6** (Jak zmienia się tensor metryczny)**.** Dla $g = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ i $X = x\partial_x$ mamy

$$\Phi_t^* g = e^{2t}\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y, \qquad \mathcal{L}_X g = 2\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x.$$

Przepływ rozciąga kierunek $x$; gdy tensor mierzy iloczyny skalarne dwóch wektorów, pojawia się czynnik $e^t$ dla każdego z dwóch kowektorowych miejsc.

*Uwaga* 3.9.7 (Jaką pochodną zdefiniowaliśmy?). Pochodna Liego porównuje tensory za pomocą przepływu *konkretnego* pola $X$. Jej wzór wymaga tylko struktury gładkiej i pola $X$. Jeśli chcielibyśmy porównywać tensory wzdłuż dowolnej krzywej bez wskazanego przepływu, potrzebowalibyśmy dodatkowej reguły przenoszenia między przestrzeniami stycznymi, nazywanej *koneksją* (połączeniem). Na przykład $\mathcal{L}_{x\partial_x}\partial_x = -\partial_x$ chociaż współczynniki pola $\partial_x$ są stałe: wynik uwzględnia ruch bazy pod przepływem.

*Dalsza lektura:* B. Conrad, *Tensor algebras, tensor pairings, and duality*, notatki do Math 396, s. 1–13: własności uniwersalne i dualność; J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, wyd. 2, rozdziały 12 i 14: pola tensorowe, formy alternujące i pochodne Liego.

# Rozdział 4

# Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory

W Rozdziale 3 skonstruowaliśmy iloczyn zewnętrzny i wiązki tensorowe. Teraz zadamy trzy kolejne pytania: jak opisać *przestrzeń wszystkich podprzestrzeni* danego wymiaru, jak zmienić algebrę zewnętrzną, aby uwzględniała iloczyn skalarny, i dlaczego obrót o $2\pi$ może zmieniać znak spinora. Odpowiedzi prowadzą kolejno do grassmannianów, algebr Clifforda i grup Spin. Przykłady w wymiarach 2 i 3 pozwolą nam sprawdzać każdą konwencję znaku na konkretnych macierzach.

## 4.1 Grassmannian jako przestrzeń podprzestrzeni

Przez $\mathbb{K}$ oznaczamy w tej sekcji $\mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$. Jeśli $0 \leq k \leq n$, *grassmannian* $\mathrm{Gr}_k(\mathbb{K}^n)$ to zbiór wszystkich $k$-wymiarowych podprzestrzeni liniowych $\mathbb{K}^n$. Jego *punktem* jest cała podprzestrzeń $L$, a nie wektor w $L$. Na przykład $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^n) = \mathbb{RP}^{n-1}$ z Przykładu 1.6.5, a $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{C}^n) = \mathbb{CP}^{n-1}$. Dla $k = 0$ i $k = n$ grassmannian jest jednym punktem. Dla dowolnej $n$-wymiarowej przestrzeni $V$ nad $\mathbb{K}$ piszemy analogicznie $\mathrm{Gr}_k(V)$; wybór bazy identyfikuje go z powyższym modelem, lecz konstrukcje nie zależą od tej bazy.

**Twierdzenie 4.1.1** (Mapy wykresowe grassmannianu)**.** *Niech $\mathbb{K}^n = P \oplus Q$, gdzie $\dim_{\mathbb{K}} P = k$. Zbiór*

$$U_P = \{L \in \mathrm{Gr}_k(\mathbb{K}^n) : \pi_P|_L : L \longrightarrow P \text{ jest izomorfizmem}\}$$

*można jednoznacznie opisać odwzorowaniami liniowymi $A : P \to Q$: punktowi $A$ odpowiada jego* wykres $\Gamma(A) = \{u + Au : u \in P\}$. *Mapy $\Gamma(A) \mapsto A$ tworzą gładki atlas grassmannianu. Jego wymiar nad $\mathbb{K}$ wynosi $k(n-k)$. W przypadku zespolonym atlas jest holomorficzny, a rzeczywisty wymiar wynosi $2k(n-k)$. Oznaczenie $U_P$ zależy również od wybranego dopełnienia $Q$; pomijamy je w indeksie tylko dla skrócenia zapisu.*

*Dowód.* Jeśli $L = \Gamma(A)$, to $\pi_P(u + Au) = u$, więc $\pi_P|_L$ jest izomorfizmem. W drugą stronę, dla $L \in U_P$ określmy

$$A_L := \pi_Q|_L \circ (\pi_P|_L)^{-1} : P \longrightarrow Q.$$

Każdy $v \in L$ ma postać $u + \pi_Q v = u + A_L u$ dla $u = \pi_P v$. Stąd $L = \Gamma(A_L)$; dowiedliśmy zarówno istnienia, jak i jednoznaczności parametru.

Sprawdźmy przejścia między mapami, a nie tylko ich liczbę. Niech $\mathbb{K}^n = P' \oplus Q'$ będzie drugim rozkładem. Dla $A : P \to Q$ połóżmy $T_A : P \to \mathbb{K}^n$, $T_A(u) = u + Au$. Wykres $\Gamma(A)$ należy do $U_{P'}$ dokładnie wtedy, gdy $D_A := \pi_{P'} T_A : P \to P'$ jest odwracalny. Po wybraniu baz $P, P'$

wyznacznik macierzy $D_A$ zależy wielomianowo od współczynników $A$; warunek $\det D_A \neq 0$ jest więc otwarty. W nowej mapie parametr ma postać

$$A' = \pi_{Q'} T_A \circ (\pi_{P'} T_A)^{-1} : P' \longrightarrow Q'. \tag{4.1.1}$$

Odwracanie macierzy jest gładkie na zbiorze macierzy odwracalnych, a nad $\mathbb{C}$ jest tam także holomorficzne (wzór przez dopełnienia algebraiczne i wyznacznik). Każde $L$ leży w $U_L$, bo dla rozkładu $\mathbb{K}^n = L \oplus Q$ otrzymujemy $A_L = 0$. Atlasy pokrywają zatem cały zbiór. Współczynniki $A \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(P, Q)$ tworzą przestrzeń $\mathbb{K}^{(n-k)k}$, co daje wymiar.


Definiujemy topologię przez atlas: zbiór jest otwarty, gdy jego obraz w każdej z map wykresowych jest otwarty. Otwartość dziedzin przejść i ich ciągłość zapewniają, że same $U_P$ są otwarte, a mapy są homeomorfizmami. Uzasadnijmy również pozostałe własności topologiczne. Wybierzmy standardowy iloczyn skalarny, a nad $\mathbb{C}$ hermitowski; gwiazdka oznacza operator sprzężony. W tym kroku ograniczmy się do rozkładów ortogonalnych $Q = P^{\perp}$; takie mapy wciąż pokrywają cały grassmannian (dla danego $L$ bierzemy $P = L$). Wzór (4.1.1) zapewnia zgodność z pozostałymi mapami. Każdemu $L$ przypiszmy macierz rzutowania ortogonalnego $\Pi_L$. Jest ona wyznaczona jednoznacznie przez $L$, a jej współczynniki w mapie wykresowej są gładkie:

$$\Pi_{\Gamma(A)} = T_A (T_A^* T_A)^{-1} T_A^*.$$

Odwrót na $U_P$ jest również ciągły w macierzach rzutowania, ponieważ dla $L \in U_P$

$$A_L = \pi_Q \Pi_L|_P \, (\pi_P \Pi_L|_P)^{-1}.$$

Ostatnia odwrotność istnieje, gdyż przy ortogonalnym rzutowaniu $\pi_P$ odwzorowanie $\Pi_L|_P : P \to L$ jest sprzężeniem izomorfizmu $\pi_P|_L : L \to P$. Nasza topologia zgadza się więc z topologią podzbioru macierzy rzutowania: $U_P$ jest w tym modelu zbiorem, gdzie $\pi_P \Pi_L|_P$ jest odwracalne, a więc zbiorem otwartym. Oba podane wzory są ciągłe na tych mapach. Zbiór $\Pi^* = \Pi$, $\Pi^2 = \Pi$, $\operatorname{tr} \Pi = k$ jest domknięty i ograniczony w skończenie wymiarowej przestrzeni macierzy, a więc zwarty. Istotnie, samosprzężone idempotenty mają wartości własne $0, 1$, więc norma operatorowa jest co najwyżej 1, a ślad jest rangą. Są zatem dokładnie rzutami na $k$-płaszczyzny. Ten model jest także Hausdorffa i ma przeliczalną bazę. Atlas definiuje zatem rozmaitość w sensie Rozdziału 1. □




Rysunek 4.1: Mapa wykresowa grassmannianu. Przestrzeń $P$ jest punktem odniesienia; pobliska płaszczyzna $\Gamma(A)$ powstaje, gdy nad $u \in P$ odkładamy przemieszczenie $Au \in Q$.

**Przykład 4.1.2** (Mała mapa, a nie cały grassmannian)**.** Na $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^2) = \mathbb{RP}^1$ ustalmy $P = \mathbb{R}e_1$ i $Q = \mathbb{R}e_2$. Prosta $L_a = \mathrm{span}(e_1 + ae_2)$ ma współrzędną $a \in \mathbb{R}$. Brakuje dokładnie jednej prostej, $\mathbb{R}e_2$: rzutowanie na $P$ jest na niej zerowe. Zatem mapa wykresowa jest lokalna, podobnie jak mapa stereograficzna nie pokrywa całej sfery.

## 4.2 Przestrzeń styczna i wiązka tautologiczna

Wektor styczny do grassmannianu opisuje *pierwszy rząd zmiany podprzestrzeni*. Wektory należące już do danej podprzestrzeni nie zmieniają jej położenia: istotna jest część wychodząca poza nią.

**Twierdzenie 4.2.1** (Styczne jako odwzorowania do ilorazu)**.** *Dla $L \in \mathrm{Gr}_k(V)$ istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$T_L \,\mathrm{Gr}_k(V) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(L, V/L). \tag{4.2.1}$$

*Nad $\mathbb{C}$ prawa strona jest zespoloną przestrzenią styczną; jej podłożem rzeczywistym jest rzeczywista przestrzeń styczna.*

*Dowód.* Niech $L(t)$ będzie gładką krzywą podprzestrzeni, $L(0) = L$. Dla $v \in L$ wybierzmy gładką krzywą $v(t) \in L(t)$ z $v(0) = v$. Definiujemy $D_{L'(0)}(v) := [v'(0)] \in V/L$, gdzie nawias oznacza klasę modulo $L$. Pokażmy niezależność od wyboru $v(t)$. Różnica dwóch takich krzywych $w(t) \in L(t)$ ma $w(0) = 0$. W gładkiej lokalnej bazie $s_i(t)$ zapisuje się $w(t) = \sum_i a_i(t)s_i(t)$ z $a_i(0) = 0$, zatem $w'(0) = \sum_i a_i'(0)s_i(0) \in L$. Klasa $[v'(0)]$ nie zmienia się. Zmiana parametryzacji krzywej nie jest jedyną możliwą zmianą przedstawiciela wektora stycznego; niezależność od dowolnej krzywej o tym samym wektorze stycznym sprawdzimy teraz w mapie.

Ustalmy teraz uzupełnienie $V = L \oplus Q$. W mapie z Twierdzenia 4.1.1 mamy $L(t) = \Gamma(A(t))$ i $A(0) = 0$. Wybieramy $v(t) = v + A(t)v$. Wtedy

$$D_{L'(0)}(v) = [A'(0)v] \in V/L.$$

Tak samo $s_i(t) = e_i + A(t)e_i$ dla bazy $(e_i)$ przestrzeni $L$ daje gładką bazę używaną powyżej. Wzór zależy tylko od $A'(0)$, czyli współrzędnych wektora stycznego, a nie od dalszego przebiegu krzywej. Jeśli $D_{L'(0)} = 0$, to $A'(0)v \in Q \cap L = 0$ dla każdego $v$, więc $A'(0) = 0$ i wektor styczny jest zerowy. To dowodzi iniektywności. Utożsamienie $Q \cong V/L$ pokazuje, że $D_{L'(0)}$ jest liniowe w $v$. Każdy $D \in \mathrm{Hom}(L, V/L)$ można otrzymać: wybierzmy odpowiadające mu odwzorowanie $A : L \to Q$ i krzywą $L(t) = \Gamma(tA)$. Jej pochodna daje właśnie $D$. Konstrukcja rozpoczęła się od krzywej i klas modulo $L$, więc otrzymany izomorfizm nie zależy od wybranego $Q$. □

**Definicja 4.2.2** (Wiązka tautologiczna)**.** Nad $\mathrm{Gr}_k(V)$ określamy *wiązkę tautologiczną*

$$\gamma^k := \{(L, v) \in \mathrm{Gr}_k(V) \times V : v \in L\} \longrightarrow \mathrm{Gr}_k(V), \qquad (L, v) \mapsto L.$$

Jej włókno w punkcie $L$ jest dosłownie podprzestrzenią $L \subseteq V$.

**Stwierdzenie 4.2.3** (Lokalność i wiązka ilorazowa)**.** *Wiązka $\gamma^k$ ma rząd $k$. Jest podwiązką wiązki trywialnej $\mathrm{Gr}_k(V) \times V$. Istnieje też wiązka ilorazowa $\mathcal{Q}$ z włóknem $\mathcal{Q}_L = V/L$, rzędu $n - k$, oraz kanoniczny dokładny ciąg wiązek*

$$0 \longrightarrow \gamma^k \longrightarrow \mathrm{Gr}_k(V) \times V \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0. \tag{4.2.2}$$

*Po wybraniu iloczynu skalarnego otrzymujemy $\mathcal{Q} \cong (\gamma^k)^\perp$.*

*Dowód.* Na $U_P$ każdy element $L = \Gamma(A)$ zawiera dokładnie jeden wektor $u + Au$ dla danego $u \in P$. Odwzorowanie $(L, u) \mapsto (L, u + Au)$ jest zatem lokalną trywializacją $U_P \times P \cong \gamma^k|_{U_P}$; jej odwrotność to $(L, v) \mapsto (L, \pi_P v)$. Oba odwzorowania są gładkie, a na włóknach liniowe. W tym samym rozkładzie $V = P \oplus Q$ klasa $[w] \in V/\Gamma(A)$ ma jednoznacznego reprezentanta w $Q$: od $w$ odejmujemy $u + Au \in \Gamma(A)$, gdzie $u = \pi_P w$. Stąd lokalnie $\mathcal{Q}|_{U_P} \cong U_P \times Q$. Na każdym włóknie włączenie $L \hookrightarrow V$ jest iniekcją, a naturalne odwzorowanie $V \to V/L$ jest surjekcją z jądrem $L$, co wyjaśnia *dokładność* ciągu (4.2.2). Iloczyn skalarny identyfikuje klasę $[v]$ z $(\mathrm{id} - \Pi_L)v \in L^\perp$. Rzut zależy gładko od $L$, więc jest to izomorfizm wiązek, a nie tylko rodzina izomorfizmów włókien. □

*Uwaga* 4.2.4 (Jeszcze jedno zastosowanie Rozdziału 3). Twierdzenie 4.2.1 i izomorfizm tensorowy 3.3.2 dają

$$T\,\mathrm{Gr}_k(V) \cong (\gamma^k)^* \otimes \mathcal{Q}.$$

Włókno po prawej stronie w $L$ to $L^* \otimes (V/L) \cong \mathrm{Hom}(L, V/L)$. Kolejność czynników jest tu ważna: źródłem odwzorowania jest $L$, a jego wartości należą do $V/L$. Zgodność tych izomorfizmów z gładkością również widać w mapie: przy $L = \Gamma(A)$ przyrost $\dot{A}$ wysyła $u + Au$ na klasę $\dot{A}u$. W trywializacji ilorazu $[w] \mapsto \pi_Q w - A\pi_P w$ ma on po prostu macierz $\dot{A}$. Zatem izomorfizmy włókien sklejają się w gładki izomorfizm wiązek.

**Przykład 4.2.5** (Proste w płaszczyźnie i wstęga Möbiusa)**.** Na $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{RP}^1 \cong S^1$ wiązka $\gamma^1$ jest wstęgą Möbiusa z Przykładu 1.9.7. Istotnie, $L(t) = \mathbb{R}(\cos t, \sin t)$, $0 \le t \le \pi$, opisuje pełne okrążenie bazy: $L(0) = L(\pi)$. Wybrany lokalnie wektor jednostkowy $(\cos t, \sin t) \in L(t)$ wraca jako jego przeciwieństwo. To właśnie sklejanie włókna ze zmianą znaku.


## 4.3 Orientacja, współrzędne Plückera i odwzorowanie Gaussa

**Definicja 4.3.1** (Grassmannian zorientowany)**.** Punkt $\mathrm{Gr}_k^+(\mathbb{R}^n)$ to para $(L, o)$: $k$-płaszczyzna $L$ wraz z wyborem jej orientacji $o$. Zapomnienie orientacji daje dwukrotne nakrycie $\mathrm{Gr}_k^+(\mathbb{R}^n) \to \mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ dla $0 < k < n$: nad każdą płaszczyzną są dokładnie dwie możliwe orientacje. W mapie wykresowej orientację przenosimy z $P$ na $\Gamma(A)$ przez $u \mapsto u + Au$, więc lokalnie nakrycie jest sumą dwóch kopii tej samej mapy.

**Przykład 4.3.2** (Płaszczyzny w $\mathbb{R}^3$)**.** Płaszczyźnie $L \in \mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3)$ odpowiada jej nieukierunkowana prosta normalna $L^\perp$, a zatem $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3) \cong \mathbb{RP}^2$. Gdy $L$ ma orientację, wybierzmy dodatnią bazę ortonormalną $(u, v)$ i połóżmy $n = u \times v$. Inna dodatnia baza różni się obrotem w $L$, więc daje ten sam $n$. W drugą stronę $n \in S^2$ wyznacza $L = n^\perp$ i orientację, dla której $(u, v, n)$ jest dodatnią bazą $\mathbb{R}^3$. Otrzymujemy

$$\mathrm{Gr}_2^+(\mathbb{R}^3) \cong S^2, \qquad \mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3) \cong S^2/(n \sim -n).$$

Zmiana orientacji płaszczyzny zamienia $n$ z $-n$. Dla ustalenia gładkości zauważmy, że normalna z lokalnej dodatniej ramki ortonormalnej jest gładka. W drugą stronę rzut na $n^\perp$ ma macierz $I - nn^T$, gładką w $n$; lokalny wybór orientacji jest stały na każdym z dwóch płatów. Są to więc dyfeomorfizmy, nie tylko bijekcje zbiorów.




Rysunek 4.2: Orientacja płaszczyzny w $\mathbb{R}^3$ wybiera jedną z dwóch jednostkowych normalnych. Zapomnienie orientacji utożsamia punkty antypodyczne $n$ i $-n$ na sferze.

**Stwierdzenie 4.3.3** (Bazy ortonormalne i przestrzeń ilorazowa)**.** *Niech $V_k(\mathbb{R}^n)$ będzie zbiorem uporządkowanych ortonormalnych $k$-ramek $(v_1, \dots, v_k)$. Odwzorowanie $(v_i) \mapsto \mathrm{span}(v_i)$ ma włókna izomorficzne z $\mathrm{O}(k)$. Ponadto, jako gładkie przestrzenie,*

$$\mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^n) \cong \mathrm{O}(n)/(\mathrm{O}(k) \times \mathrm{O}(n-k)), \quad \mathrm{Gr}_k(\mathbb{C}^n) \cong \mathrm{U}(n)/(\mathrm{U}(k) \times \mathrm{U}(n-k)).$$

*Dowód.* Dwie ramki wyznaczają tę samą $k$-płaszczyznę wtedy i tylko wtedy, gdy zmiana bazy między nimi należy do $\mathrm{O}(k)$. Wykonując ortonormalizację Grama–Schmidta na wektorach $u_i + Au_i$ z mapy wykresowej, dostajemy gładki lokalny wybór ramki; włókna są więc lokalnie kopiami $\mathrm{O}(k)$. Grupa $\mathrm{O}(n)$ działa tranzytywnie na płaszczyznach: wybieramy bazy ortonormalne dwóch płaszczyzn, uzupełniamy je do baz $\mathbb{R}^n$ i bierzemy odwzorowanie przenoszące pierwszą pełną bazę na drugą. Element zachowujący standardowe $\mathbb{R}^k$ zachowuje też jego dopełnienie prostopadłe, czyli ma postać blokową $\operatorname{diag}(B, C)$ z $B \in \mathrm{O}(k)$, $C \in \mathrm{O}(n-k)$. To daje pierwszy iloraz. Wyjaśnijmy gładką strukturę ilorazu. W rozkładzie ortogonalnym $P \oplus Q$ uzupełniamy ramkę wykresu przez ramkę $\Gamma(-A^*) \subset Q \oplus P$ jego dopełnienia prostopadłego: jej wektory mają postać $-A^*w + w$, $w \in Q$. Ortonormalizacja obu ramek daje macierz $s(A) \in \mathrm{O}(n)$ zależną gładko od $A$. Każda macierz ortogonalna nad tą mapą ma jednoznaczną postać $s(A)\operatorname{diag}(B, C)$. Parametr $A$ odzyskujemy z obrazu pierwszych $k$ kolumn, a bloki $B, C$ z iloczynu $s(A)^{-1}O$. Daje to lokalny produkt i jego gładką odwrotność; po podzieleniu przez bloki pozostaje dokładnie mapa wykresowa grassmannianu. Argument dla $\mathbb{C}$ jest taki sam, z bazami unitarnymi, sprzężeniem hermitowskim i grupą $\mathrm{U}(n)$. □

Iloczyn zewnętrzny z Sekcji 3.5 pozwala zapisać $k$-płaszczyznę jednym wielowektorem, określonym z dokładnością do niezerowego skalara.

**Twierdzenie 4.3.4** (Zanurzenie Plückera)**.** *Jeśli $(v_1, \dots, v_k)$ jest bazą $L$, to wzór*

$$\mathrm{Pl}(L) := [v_1 \wedge \cdots \wedge v_k] \in \mathbb{P}(\Lambda^k V) \tag{4.3.1}$$

*określa gładkie zanurzenie $\mathrm{Gr}_k(V) \hookrightarrow \mathbb{P}(\Lambda^k V)$. Nawias $[\xi]$ oznacza prostą $\mathbb{K}\xi$, $\xi \neq 0$. Obraz składa się dokładnie z klas niezerowych* wielowektorów prostych.

*Dowód.* Zmiana bazy $(v_i)$ macierzą $C$ mnoży iloczyn zewnętrzny przez $\det C \neq 0$ na mocy Twierdzenia 3.7.3, więc klasa projektowa jest dobrze określona. Jeżeli $\xi = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \neq 0$, to

$$L = \{w \in V : w \wedge \xi = 0\}.$$

Wektory z $L$ dają zero przez powtórzenie czynnika. Jeśli $w \notin L$, rodzina $(v_1, \dots, v_k, w)$ jest liniowo niezależna; po uzupełnieniu do bazy Twierdzenie 3.6.1 mówi, że jej iloczyn zewnętrzny jest niezerowy. Zatem $\mathrm{Pl}(L)$ wyznacza $L$ jednoznacznie.

Pokażmy, skąd bierze się gładki odwrotny wzór na obrazie. W mapie $V = P \oplus Q$ wybierzmy bazy $e_1, \dots, e_k$ przestrzeni $P$ oraz $e_{k+1}, \dots, e_n$ przestrzeni $Q$ i zapiszmy $Ae_j = \sum_{a=1}^{n-k} a_{aj} e_{k+a}$. W wielowektorze $\xi_A = (e_1 + Ae_1) \wedge \cdots \wedge (e_k + Ae_k)$ współczynnik $p_{1\dots k}$ wynosi 1. Współczynnik przy $e_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{e_j} \wedge \cdots \wedge e_k \wedge e_{k+a}$ wynosi $(-1)^{k-j} a_{aj}$: przesuwamy $e_{k+a}$ przez $k-j$ późniejszych czynników. Z ilorazów tych współczynników przez $p_{1\dots k}$ odzyskujemy wszystkie $a_{aj}$. W ogólnej mapie projektowej dzielimy przez odpowiedni niezerowy współczynnik $p_I$. Odwzorowanie (4.3.1) jest więc gładkie. Wzory odzyskujące $a_{aj}$ są określone na całym otwartym zbiorze przestrzeni projektowej $p_{1\dots k} \neq 0$, nie tylko na obrazie. Ich złożenie z Pl jest mapą identyczną w parametrach $A$; różniczkowanie daje lewą odwrotność różniczki Pl, która jest zatem injektywna. Otrzymaliśmy immersję. Ponieważ grassmannian jest zwarty, a przestrzeń projektowa Hausdorffa, ciągła injekcja jest homeomorfizmem na obraz. To daje zanurzenie i domkniętość obrazu. □

**Przykład 4.3.5** (Relacja Plückera dla $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^4)$)**.** Zapiszmy $\xi = \sum_{1 \le i < j \le 4} p_{ij} e_i \wedge e_j$. Rozwinięcie $\xi \wedge \xi$ daje

$$\xi \wedge \xi = 2(p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23}) e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4. \tag{4.3.2}$$

Jeżeli $\xi = u \wedge v$, to $\xi \wedge \xi = 0$, więc współczynniki spełniają relację w nawiasie. Odwrotnie, dla $\xi \neq 0$ z taką relacją możemy przestawić współrzędne tak, by $p_{12} \neq 0$. Po podzieleniu przez $p_{12}$ ustawiamy w wykresie $e_1 + ae_3 + ce_4$, $e_2 + be_3 + de_4$ liczby $b = p_{13}/p_{12}$, $d = p_{14}/p_{12}$, $a = -p_{23}/p_{12}$, $c = -p_{24}/p_{12}$. Pięć współczynników się zgadza z definicji, a szósty jest równy

$ad - bc = p_{34}/p_{12}$ właśnie dzięki relacji. To dowodzi również wystarczalności. Na przykład $e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$ ma $p_{12}p_{34} = 1$ i pozostałe wyrazy zerowe, więc nie jest wielowektorem prostym, zgodnie z wcześniejszym Przykładem w Sekcji 3.6.

**Twierdzenie 4.3.6** (Odwzorowanie Gaussa i wiązka styczna)**.** *Niech $M^m \subset \mathbb{R}^N$ będzie gładką podrozmaitością. Przypisanie $G(p) = T_pM \in \mathrm{Gr}_m(\mathbb{R}^N)$ jest gładkim* odwzorowaniem Gaussa. *Wiązki $TM$ i normalna $\nu M$ są odpowiednio cofnięciami $G^*\gamma^m$ i $G^*\mathcal{Q}$ z* (4.2.2).

*Dowód.* W mapie podrozmaitości zapisujemy jej parametryzację $F : U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^N$. Wektory $\partial_i F(x)$ tworzą gładką bazę $T_{F(x)}M$. W pobliżu ustalonego punktu pewien minor $m \times m$ macierzy $\mathrm{d}F$ pozostaje niezerowy. W odpowiadającym mu rozkładzie $\mathbb{R}^N = P \oplus Q$ przestrzeń $T_{F(x)}M$ jest wykresem macierzy $A(x) = D_Q F(x)(D_P F(x))^{-1}$, gładkiej w $x$. Stąd $G$ jest gładka. Włókno $(G^*\gamma^m)_p$ to z definicji $\gamma^m_{G(p)} = T_pM$; lokalne ramki po obu stronach są tymi samymi $\partial_i F$. Włókno $(G^*\mathcal{Q})_p$ to $\mathbb{R}^N/T_pM$, czyli $\nu_pM$ z Przykładu o wiązce normalnej w Sekcji o podrozmaitościach Rozdziału 1. Zgodność lokalnych trywializacji daje oba izomorfizmy wiązek. □

*Uwaga* 4.3.7 (Dlaczego wiązka tautologiczna jest uniwersalna?). Na zwartej rozmaitości każdą gładką wiązkę $E$ rzędu $k$ można umieścić w trywialnej wiązce $M \times \mathbb{R}^N$ dla pewnego $N$. Oto konstrukcja. Wybieramy skończone pokrycie trywializujące $U_i$, jego mniejsze podpokrycie oraz funkcje gładkie $\beta_i$ o nośnikach w $U_i$, takie że dla każdego $p$ co najmniej jedna $\beta_i(p)$ jest niezerowa. Jeśli $[v]_i \in \mathbb{R}^k$ oznacza współrzędne $v \in E_p$ na $U_i$, definiujemy różnowartościowe odwzorowanie liniowe w $v$

$$j_p(v) = (\beta_1(p)[v]_1, \ldots, \beta_r(p)[v]_r) \in \mathbb{R}^{kr},$$

przyjmując wartość 0 dla bloku poza $U_i$. Podparcie $\beta_i$ wewnątrz $U_i$ zapewnia gładkość po przedłużeniu zerem; co najmniej jeden niezerowy blok zapewnia iniektywność $j_p$. Obrazy $j_p(E_p)$ zmieniają się gładko, ponieważ lokalnie tworzą kolumny macierzy gładkiej i stałego rzędu $k$, a więc definiują odwzorowanie $f : M \to \mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^{kr})$. Wprost z definicji włókien mamy $E \cong f^*\gamma^k$. Ta konkretna konstrukcja wyjaśnia użyteczność grassmannianów dla topologii wiązek; nie potrzebuje jeszcze teorii klas charakterystycznych.

## 4.4 Algebra Clifforda: iloczyn i dowód wymiaru

Od tego miejsca $V$ jest rzeczywistą przestrzenią euklidesową wymiaru $n$ z iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$ i normą $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$. Algebra zewnętrzna pamięta zorientowane pola: $v \wedge v = 0$. Algebra Clifforda pamięta ponadto *długość*: kwadrat wektora jest skalarem $-\|v\|^2$. Przyjmujemy konsekwentnie ten znak minus; w literaturze spotyka się również konwencję przeciwną.

**Definicja 4.4.1** (Algebra Clifforda)**.** Niech $I_q$ będzie ideałem obustronnym algebry tensorowej $T(V)$ z Definicji 3.4.1, generowanym przez $v \otimes v + \|v\|^2\, 1$ dla wszystkich $v \in V$. *Algebra Clifforda* to

$$\mathrm{Cl}(V) := T(V)/I_q.$$

Obraz $v \in V$ oznaczamy nadal $v$, a mnożenie w ilorazie zapisujemy bez symbolu $\otimes$. Z definicji $v^2 = -\|v\|^2\, 1$.

Po usunięciu z relacji składnika $\|v\|^2\, 1$ otrzymujemy algebrę zewnętrzną (Definicja 3.5.1). Tak więc obie algebry startują z tej samej algebry tensorowej; zmieniamy tylko relację, przez którą dzielimy. W algebrze Clifforda nie można zachować zwykłego stopnia tensorowego: relacja utożsamia wyraz stopnia 2 ze skalarem stopnia 0. Pozostaje rozróżnienie stopnia *parzystego* i *nieparzystego*, bo oba wyrazy relacji mają tę samą parzystość.

**Twierdzenie 4.4.2** (Relacja Clifforda i własność uniwersalna)**.** *Dla $v, w \in V$ w $\mathrm{Cl}(V)$ zachodzi*

$$vw + wv = -2\langle v, w\rangle\, 1. \tag{4.4.1}$$

*Jeżeli $\mathcal{A}$ jest łączną algebrą rzeczywistą z jedynką, a $f : V \to \mathcal{A}$ jest liniowa i spełnia $f(v)^2 = -\|v\|^2 1_{\mathcal{A}}$ dla każdego $v$, to istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr $\widehat{f} : \mathrm{Cl}(V) \to \mathcal{A}$ przedłużający $f$.*

*Dowód.* Rozwijając $(v+w)^2$ na dwa sposoby, otrzymujemy

$$v^2 + vw + wv + w^2 = -\|v+w\|^2\, 1 = -(\|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\langle v, w\rangle)\, 1.$$

Po odjęciu $v^2 = -\|v\|^2 1$ i $w^2 = -\|w\|^2 1$ zostaje (4.4.1). Z Twierdzenia 3.4.2 odwzorowanie $f$ przedłuża się jednoznacznie do homomorfizmu $F : T(V) \to \mathcal{A}$. Dla każdego generatora ideału $I_q$ mamy $F(v \otimes v + \|v\|^2 1) = f(v)^2 + \|v\|^2 1_{\mathcal{A}} = 0$. Jądro homomorfizmu jest ideałem, więc zawiera $I_q$. Wobec tego wzór $\widehat{f}([t]) = F(t)$ nie zależy od przedstawiciela $t \in T(V)$ i wyznacza żądany homomorfizm na ilorazie. Jednoznaczność wynika stąd, że $V$ i jedynka generują $\mathrm{Cl}(V)$. □

Przy bazie ortonormalnej $(e_1, \dots, e_n)$ relacja (4.4.1) mówi

$$e_i^2 = -1, \qquad e_i e_j = -e_j e_i \quad (i \neq j). \tag{4.4.2}$$

Stąd każdy iloczyn generatorów można uporządkować rosnąco, redukując powtórzone indeksy. Trudniejszą częścią jest wykazanie, że tak otrzymane wyrazy nie mają dodatkowych relacji.

**Twierdzenie 4.4.3** (Baza algebry Clifforda)**.** *Dla bazy ortonormalnej $e_1, \dots, e_n$ elementy*

$$1, \qquad e_{i_1} \cdots e_{i_r} \quad (1 \le i_1 < \cdots < i_r \le n,\ 1 \le r \le n)$$

*stanowią bazę $\mathrm{Cl}(V)$. Zatem $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{Cl}(V) = 2^n$. Dla $n \ge 1$ części parzysta i nieparzysta mają po $2^{n-1}$ wymiarów.*

*Dowód. Rozpinanie.* Obrazy słów $v_1 \cdots v_r$ rozpinają iloraz $T(V)/I_q$. Po rozwinięciu każdego $v_j$ w bazie wystarczą słowa z liter $e_i$. Równości (4.4.2) pozwalają zamienić każde dwie sąsiednie różne litery (ze zmianą znaku) i usunąć parę równych liter ($e_i^2 = -1$). Powtarzając te operacje, dostajemy kombinację iloczynów o rosnących, różnych indeksach.

*Niezależność.* Skorzystamy z algebry zewnętrznej $\Lambda(V)$ z Rozdziału 3. Na niej określmy dwie operacje:

$$\varepsilon(v)\omega := v \wedge \omega, \qquad \iota_v(w_1 \wedge \cdots \wedge w_r) := \sum_{j=1}^{r} (-1)^{j-1} \langle v, w_j\rangle\, w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w_j} \wedge \cdots \wedge w_r.$$

Kreska nad $w_j$ oznacza pominięcie tego czynnika; przyjmujemy $\iota_v(1) = 0$. Wzór na $\iota_v$ jest wieloliniowy i alternujący w $w_j$: przy zamianie dwóch sąsiednich argumentów składniki pomijające inny argument zmieniają znak przez antysymetrię iloczynu zewnętrznego, a dwa pozostałe zamieniają się miejscami z przeciwnymi znakami. Zatem własność uniwersalna z Twierdzenia 3.5.4 zapewnia, że operator jest dobrze określony. Bezpośrednio z tego wzoru otrzymujemy

$$\iota_v(w \wedge \omega) = \langle v, w\rangle \omega - w \wedge \iota_v \omega.$$

Pierwszy składnik powstaje przy usunięciu pierwszego czynnika; pozostałe mają o jeden minus więcej niż w $\iota_v\omega$. Usunięcie dwóch czynników w dwóch przeciwnych kolejnościach daje składniki o przeciwnych znakach, zatem $\iota_v^2 = 0$. Również $\varepsilon(v)^2 = 0$, bo $v \wedge v = 0$. Jeżeli $c(v) := \varepsilon(v) - \iota_v$, to

$$c(v)^2 = -(\varepsilon(v)\iota_v + \iota_v \varepsilon(v)) = -\|v\|^2 \mathrm{id}_{\Lambda(V)}.$$

Własność uniwersalna z poprzedniego twierdzenia daje więc reprezentację $c : \mathrm{Cl}(V) \to \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\Lambda V)$. Przyłóżmy ją do $1 \in \Lambda^0 V$. Dla różnych ortonormalnych $e_{i_j}$ wszystkie kontrakcje pojawiające się podczas kolejnego działania znikają: nowy $e_{i_j}$ jest prostopadły do wcześniej utworzonych czynników. Stąd

$$c(e_{i_1} \cdots e_{i_r})\, 1 = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}, \qquad c(1)\, 1 = 1.$$

Prawa strona przebiega bazę $\Lambda(V)$ z Twierdzenia 3.6.1. Jeśli kombinacja uporządkowanych słów znikałaby w algebrze Clifforda, jej działanie na 1 dawałoby zerową kombinację *różnych* wektorów tej bazy. Wszystkie współczynniki muszą więc być zerowe. Słów o $r$ indeksach jest $\binom{n}{r}$; sumując po $r$ otrzymujemy $2^n$. Wreszcie bijekcja $I \mapsto I \triangle \{1\}$ zamienia podzbiory parzystej i nieparzystej liczności, co dowodzi równości ich liczby. □


*Uwaga* 4.4.4 (Podobne przestrzenie, różne mnożenia). Istnieje kanoniczny izomorfizm *przestrzeni liniowych* $\Lambda V \cong \mathrm{Cl}(V)$: wysyła $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$ na antysymetryzację $\frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \mathrm{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \cdots v_{\sigma(r)}$. Jest dobrze określony, bo wyrażenie jest alternujące; na bazowych wektorach ortonormalnych daje $e_{i_1} \cdots e_{i_r}$, więc poprzednie twierdzenie zapewnia odwracalność. Nie jest to jednak izomorfizm algebr: w $\Lambda V$ mamy $v \wedge v = 0$, a w $\mathrm{Cl}(V)$ mamy $v^2 = -\|v\|^2$. To wyjaśnia, dlaczego obie przestrzenie mają wymiar $2^n$, choć kodują inne mnożenia.

**Przykład 4.4.5** (Wymiary 0, 1 i 2)**.** Dla $V = 0$ otrzymujemy $\mathrm{Cl}(0) = \mathbb{R}$. W wymiarze 1, przy $e_1^2 = -1$, każdy element ma postać $a + be_1$ i mnoży się jak liczba $a + bi \in \mathbb{C}$. Stąd $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{C}$ *jako algebra rzeczywista*. W wymiarze 2 baza $(1, e_1, e_2, e_1e_2)$ spełnia dokładnie relacje kwaternionów: $e_1 \leftrightarrow i$, $e_2 \leftrightarrow j$, $e_1e_2 \leftrightarrow k$, zatem $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{H}$. Na przykład $(e_1 + 2e_2)^2 = -5$, podczas gdy $(e_1 + 2e_2) \wedge (e_1 + 2e_2) = 0$ w algebrze zewnętrznej. Porównujemy więc kwadraty tego samego wektora.

**Stwierdzenie 4.4.6** (Iloczyn wektorów: skalar i dwuwektor)**.** *Przez powyższy izomorfizm przestrzeni liniowych iloczyn Clifforda dwóch wektorów rozkłada się na*

$$vw = -\langle v, w\rangle + \tfrac{1}{2}(vw - wv) \quad \longleftrightarrow \quad -\langle v, w\rangle + v \wedge w. \tag{4.4.3}$$

*Dowód.* Suma $vw + wv$ jest równa $-2\langle v, w\rangle$ z (4.4.1). Dodając połowę tej sumy do połowy różnicy, odzyskujemy $vw$. Antysymetryzacja $v \wedge w \mapsto \frac{1}{2}(vw - wv)$ jest przypadkiem stopnia 2 opisanym w poprzedniej uwadze. □




Rysunek 4.3: Dla jednostkowych $u = e_1$ i $v = \cos\alpha\, e_1 + \sin\alpha\, e_2$ iloczyn Clifforda $uv = -\cos\alpha + \sin\alpha\, e_1e_2$ łączy ujemny iloczyn skalarny ze zorientowanym polem.

## 4.5 Od odbić do grupy Spin

Ustalmy najpierw dwie operacje na algebrze Clifforda. Zmiana każdego $v$ na $-v$ zachowuje relacje definiujące, więc daje automorfizm $\alpha$, z $\alpha^2 = \mathrm{id}$. Jego przestrzenie własne dla $+1$ i $-1$

są rozpięte odpowiednio przez słowa parzyste i nieparzyste; dowód bazy pokazuje, że ich suma jest prosta. Drugą operacją jest *rewersja*, oznaczana tyldą:

$$\widetilde{v_1 \cdots v_r} = v_r \cdots v_1, \qquad \widetilde{1} = 1,$$

przedłużona liniowo. Jest dobrze określona na ilorazie: odwracanie słów w $T(V)$ ustala każdy generator $v \otimes v + \|v\|^2 1$, a element $a(v \otimes v + \|v\|^2 1)b$ wysyła na $\widetilde{b}(v \otimes v + \|v\|^2 1)\widetilde{a}$, nadal należący do ideału. Zatem $\widetilde{st} = \widetilde{t}\,\widetilde{s}$ i $\widetilde{\widetilde{s}} = s$, niezależnie od zapisu $s$ jako sumy słów.

Odbicie względem hiperpłaszczyzny prostopadłej do jednostkowego $u \in V$ ma wzór

$$r_u(v) = v - 2\langle u, v\rangle u. \tag{4.5.1}$$

Rozkład $v = \langle u, v\rangle u + w$, $w \perp u$, pokazuje, że $r_u$ odwraca składową równoległą do $u$ i zostawia składową $w$. Jego wyznacznik jest równy $-1$. Relacja Clifforda daje zaskakujący opis tego odbicia: ponieważ $u^2 = -1$, mamy $u^{-1} = -u$ i

$$-uvu^{-1} = uvu = -\langle u, v\rangle u + w = r_u(v).$$

**Definicja 4.5.1** (Grupa Pin)**.** Dla euklidesowej przestrzeni $V$ grupą $\mathrm{Pin}(V)$ nazywamy podgrupę odwracalnych elementów $\mathrm{Cl}(V)$ złożoną ze wszystkich skończonych iloczynów wektorów jednostkowych; dopuszczamy pusty iloczyn 1. W odróżnieniu od grupy Spin dopuszczamy także nieparzystą liczbę czynników. Dla $s \in \mathrm{Pin}(V)$ określamy

$$\rho_{\mathrm{Pin}}(s)(v) := \alpha(s) v s^{-1}, \qquad v \in V,$$

gdzie $\alpha$ zmienia znak każdego wektora, jak wyżej.

Wzór jest skręconym sprzężeniem: dla jednostkowego $u$ daje $\rho_{\mathrm{Pin}}(u)(v) = -uvu^{-1} = r_u(v)$. Zatem pojedynczy wektor reprezentuje odbicie, a jego parzysty iloczyn reprezentuje obrót. Na przykład w $\mathbb{R}^2$ element $e_1 \in \mathrm{Pin}(2)$ daje odbicie w prostej $e_1^{\perp}$, podczas gdy $e_1 e_2$ daje obrót o pół obiegu. Przy przyjętej relacji $u^2 = -\|u\|^2$ grupa ta bywa oznaczana $\mathrm{Pin}^-(n)$; znak rozróżnia dwie konwencje algebry Clifforda.

**Definicja 4.5.2** (Grupa Spin)**.** Niech $n = \dim V \geq 2$. *Grupą spinową* $\mathrm{Spin}(V)$ nazywamy podgrupę odwracalnych elementów $\mathrm{Cl}(V)$, składającą się z iloczynów *parzystej* liczby wektorów jednostkowych:

$$\mathrm{Spin}(V) := \{u_1 \cdots u_{2r} : \|u_j\| = 1,\ r \geq 0\}.$$

Pusty iloczyn to 1. Skrót $\mathrm{Spin}(n)$ oznacza $\mathrm{Spin}(\mathbb{R}^n)$ ze standardową metryką. Dla $s \in \mathrm{Spin}(V)$ określamy $\rho(s)v := svs^{-1}$. Topologię na grupie bierzemy z jej włączenia do skończenie wymiarowej przestrzeni $\mathrm{Cl}(V)$. Gładką strukturę zgodną z tym włączeniem uzasadnimy w dowodzie nakrycia.

Zbiór w definicji jest grupą: iloczyn dwóch słów parzystych jest parzysty, a odwrotność słowa $u_1 \cdots u_{2r}$ to $(-u_{2r}) \cdots (-u_1)$, ponownie słowo parzyste złożone z wektorów jednostkowych. Każdy jego czynnik ma dobrze określoną odwrotność.

**Twierdzenie 4.5.3** (Dwukrotne nakrycie grupy obrotów)**.** *Przypisanie $\rho$ jest surjektywnym homomorfizmem*

$$\rho : \mathrm{Spin}(n) \longrightarrow \mathrm{SO}(n), \qquad \ker \rho = \{1, -1\}.$$

*Jest gładkim dwukrotnym nakryciem: każdy obrót ma dokładnie dwa podniesienia $s$ i $-s$.*

*Dowód. Dlaczego obrazem jest obrót?* Dla słowa $s = u_1 \cdots u_{2r}$ zastosujmy wzór na odbicie do kolejnych czynników. W odwzorowaniu $v \mapsto -uvu^{-1}$ pojawia się jedno odbicie $r_u$; przy parzystej liczbie czynników wszystkie minusy się znoszą i

$$\rho(s) = r_{u_1} \circ \cdots \circ r_{u_{2r}}.$$

To złożenie zachowuje iloczyn skalarny i ma wyznacznik $(-1)^{2r} = 1$. Ponieważ $\rho(st)(v) = s(tvt^{-1})s^{-1}$, $\rho$ jest homomorfizmem do $\mathrm{SO}(n)$.

*Dlaczego jest surjektywna?* Pokażmy elementarnie, że każdą izometrię liniową można zapisać jako iloczyn odbić. Weźmy bazę ortonormalną $e_1, \ldots, e_n$ i $A \in \mathrm{O}(n)$. Jeśli $Ae_1 \neq e_1$, to dla $u = (Ae_1 - e_1)/\|Ae_1 - e_1\|$ rachunek z (4.5.1) daje $r_u(Ae_1) = e_1$: licznik iloczynu $\langle Ae_1 - e_1, Ae_1\rangle$ to $1 - \langle Ae_1, e_1\rangle$, a kwadrat mianownika to $2(1 - \langle Ae_1, e_1\rangle)$. Jeśli $Ae_1 = e_1$, pomijamy ten krok. Nowa izometria zachowuje $e_1$, więc działa na $e_1^\perp$. Powtarzamy argument dla $e_2$ w tym dopełnieniu, potem dla $e_3$, itd. Po skończenie wielu krokach otrzymujemy identyczność. Zapisujemy więc $A$ jako iloczyn odbić. Ponieważ $\det A = 1$, liczba użytych odbić musi być parzysta; odpowiadający im iloczyn jednostkowych $u_j$ jest szukanym elementem $\mathrm{Spin}(n)$.

*Dlaczego jądro ma tylko dwa elementy?* Niech $s$ działa trywialnie na $V$. Wtedy $se_j = e_j s$ dla każdego wektora bazy ortonormalnej. Rozwińmy $s$ w bazie z Twierdzenia 4.4.3, używając tylko słów parzystej długości: $s = \sum_{|I| \text{ parzyste}} a_I e_I$. Dla parzystego niepustego $I$ i $j \in I$ relacja (4.4.2) daje $e_j e_I e_j^{-1} = -e_I$; gdy $j \notin I$, otrzymujemy $+e_I$. Równość $e_j s e_j^{-1} = s$ dla *wszystkich* $j$ wymusza więc $a_I = 0$ dla każdego niepustego $I$. Zatem $s = a\,1$. Aby ustalić $a$, odwróćmy porządek wektorów w słowie: $\widetilde{s} = u_{2r} \cdots u_1$. Wtedy $s\widetilde{s} = (-1)^{2r} = 1$, bo wektory są jednostkowe i $u_i^2 = -1$. Dla skalarnego $s = a$ również $\widetilde{s} = a$, stąd $a^2 = 1$. Oba znaki występują, gdyż $-1 = e_1 e_1 \in \mathrm{Spin}(n)$.

*Dlaczego rzeczywiście jest to nakrycie?* Pokażmy, że w pobliżu identyczności obroty mają gładko wybrane podniesienie. Dla bliskich jednostkowych $a, b$ połóżmy

$$R(a,b) := -\frac{a+b}{\|a+b\|}\,a = \frac{1-ba}{\|a+b\|} \in \mathrm{Spin}(n).$$

Jest to iloczyn dwóch jednostkowych wektorów, zależy gładko od $(a,b)$, spełnia $R(a,a) = 1$ i przenosi $a$ na $b$: pierwsze odbicie w hiperpłaszczyźnie do $a$ wysyła $a$ na $-a$, drugie, o normalnej $(a+b)/\|a+b\|$, wysyła $-a$ na $b$. Jeśli $A$ jest bliski identyczności, stosujemy taki rotor, aby skorygować $Ae_1$ do $e_1$. Otrzymany obrót zachowuje $e_1$. W $e_1^\perp$ korygujemy następnie obraz $e_2$, potem $e_3$, kończąc na $e_{n-1}$; ostatni wektor jest ustalony dzięki wyznacznikowi 1. Każdy rotor zależy gładko od $A$ w niewielkim otoczeniu identyczności. Odwrotność ich iloczynu daje gładką lokalną sekcję $\sigma$ odwzorowania $\rho$. Przy innym obrocie przenosimy to otoczenie przez ustalony element z jego przeciwobrazu. Jądro $\{\pm 1\}$ oznacza, że przeciwobraz takiego dostatecznie małego otoczenia jest sumą rozłącznych kopii obrazu $\sigma$ i $-\sigma$. Są one otwarte w $\mathrm{Spin}(n)$: blisko 1 dwie wartości $\pm\sigma(A)$ odróżnia znak współczynnika skalarnego w algebrze Clifforda, a blisko pozostałych punktów korzystamy z mnożenia przez ustalone podniesienie. To jest dokładnie definicja dwukrotnego nakrycia. W ten sposób otrzymujemy także atlas gładki: na każdym płacie używamy współrzędnych z $\mathrm{SO}(n)$ przeniesionych przez $\rho$. Jest on zgodny z włączeniem do algebry Clifforda. Istotnie, $\sigma$ jest gładka jako mapa do tej algebry, a pochodna $\rho \circ \sigma = \mathrm{id}$ jest identycznością. Do różniczkowania $\rho$ w otoczeniu płata wystarczy gładki wzór $s \mapsto (v \mapsto \mathrm{pr}_V(svs^{-1}))$ na otwartym zbiorze elementów odwracalnych; na grupie Spin rzut $\mathrm{pr}_V$ niczego nie zmienia. Wynika stąd injektywność różniczki $\sigma$, więc płaty są lokalnie podrozmaitościami algebry Clifforda. Mnożenie jest dwuliniowe, a odwracanie gładkie: można je obliczać przez odwracanie macierzy lewego mnożenia. Obie operacje ograniczają się więc do gładkich operacji grupy Spin, a $\rho$ jest lokalnym dyfeomorfizmem. □

**Wniosek 4.5.4** (Nakrycie grupy ortogonalnej przez Pin)**.** *Dla $n \geq 2$ odwzorowanie*

$$\rho_{\mathrm{Pin}} : \mathrm{Pin}(n) \longrightarrow \mathrm{O}(n)$$

*jest surjektywnym homomorfizmem o jądrze* $\{1,-1\}$. *Jest gładkim dwukrotnym nakryciem, a przeciwobraz* $\mathrm{SO}(n)$ *jest równy* $\mathrm{Spin}(n)$.

*Dowód.* Automorfizm $\alpha$ jest multiplikatywny, więc $\rho_{\mathrm{Pin}}(st) = \rho_{\mathrm{Pin}}(s)\rho_{\mathrm{Pin}}(t)$. Każdy czynnik jednostkowy daje odbicie. Rozkład izometrii na odbicia wykonano w dowodzie Twierdzenia 4.5.3; zapewnia on surjektywność. Wyznacznik obrazu iloczynu $r$ wektorów wynosi $(-1)^r$. Parzyste słowa tworzą zatem dokładnie przeciwobraz $\mathrm{SO}(n)$, czyli $\mathrm{Spin}(n)$. Element jądra musi być parzysty, a jądro na $\mathrm{Spin}(n)$ obliczono w tym samym twierdzeniu jako $\{\pm 1\}$. Lokalnie nad składową $\mathrm{SO}(n)$ mamy już dwa gładkie płaty nakrycia Spin. Mnożenie przez ustalony wektor jednostkowy przenosi je na drugą składową $\mathrm{O}(n)$, co dowodzi ostatniej tezy. □

**Przykład 4.5.5** (Dlaczego pojawia się połowa kąta?)**.** W płaszczyźnie $B = e_1e_2$ spełnia $B^2 = -1$. Ponieważ część parzysta ma bazę $(1, B)$, jej elementy mają postać $a + bB$. Dla słów należących do $\mathrm{Spin}(2)$ równość $s\widetilde{s} = 1$ z poprzedniego dowodu daje $a^2 + b^2 = 1$. Odwrotnie, jeśli $a = \cos t$, $b = \sin t$, to

$$a + bB = (-\cos t\, e_1 - \sin t\, e_2)e_1,$$


czyli iloczyn dwóch jednostkowych wektorów. Grupa $\mathrm{Spin}(2)$ jest zatem okręgiem. Połóżmy

$$s_\theta = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2)B.$$

Korzystając z $Be_1 = e_2$ i $Be_2 = -e_1$, obliczamy bez pomijania kroku

$$s_\theta e_1 s_\theta^{-1} = (\cos^2\tfrac{\theta}{2} - \sin^2\tfrac{\theta}{2})e_1 + 2\sin\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{\theta}{2}\, e_2 = \cos\theta\, e_1 + \sin\theta\, e_2.$$

Analogicznie obraz $e_2$ to $-\sin\theta\, e_1 + \cos\theta\, e_2$. Jeden pełny obrót ma zatem podniesienie $s_{2\pi} = -1$, a dopiero $s_{4\pi} = 1$. Po utożsamieniu obu grup z okręgiem odwzorowanie $\rho$ ma postać $z \mapsto z^2$.




Rysunek 4.4: Droga od 1 do $-1$ w $\mathrm{Spin}(2)$ rzutuje się na pełen obrót w $\mathrm{SO}(2)$. Końce drogi są różne w grupie Spin, choć odpowiadają temu samemu obrotowi.

**Przykład 4.5.6** (Trzy wymiary: kwaterniony)**.** W $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^3)$ część parzysta ma bazę $1, I = e_2e_3, J = e_3e_1, K = e_1e_2$. Rachunek przy użyciu (4.4.2) daje $I^2 = J^2 = K^2 = -1$ i $IJ = K$, $JK = I$, $KI = J$. Jest to algebra kwaternionów $\mathbb{H}$. Odwracanie kolejności czynników wysyła $a + bI + cJ + dK$ na $a - bI - cJ - dK$, więc $s\widetilde{s} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Każdy element $\mathrm{Spin}(3)$ jest zatem jednostkowym kwaternionem. I odwrotnie, dowolny jednostkowy kwaternion można zapisać jako $\cos t + \sin t\, B$, gdzie $B$ jest jednostkowym dwuwektorem w $\mathbb{R}^3$ (przypadki $\pm 1$ są natychmiastowe). Każdy taki $B$ jest iloczynem dwóch prostopadłych wektorów jednostkowych. Aby to sprawdzić, zapiszmy $B = be_2e_3 + ce_3e_1 + de_1e_2$ z $b^2+c^2+d^2 = 1$. Wybierzmy jednostkowy $u \perp n = (b, c, d)$ i połóżmy $v = n \times u$. Wtedy $u, v$ są ortonormalne i $u \times v = n$. Współczynniki $u \wedge v$ w bazie $(e_2 \wedge e_3, e_3 \wedge e_1, e_1 \wedge e_2)$ są właśnie $(b, c, d)$, więc $uv = B$. Z kolei $\cos t + \sin t\, B$ jest także iloczynem dwóch wektorów jednostkowych: jeśli $B = uv$ dla $u \perp v$, to wprost z $vu = -uv$ i $u^2 = -1$ otrzymujemy

$$(-\cos t\, u - \sin t\, v)u = \cos t + \sin t\, uv.$$

Zatem $\mathrm{Spin}(3) \cong S^3$ jako grupa jednostkowych kwaternionów, a $\rho : S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ utożsamia parę $s, -s$.

## 4.6 Spinory: moduły algebry Clifforda

Wektor w $\mathbb{R}^n$ obraca się przez $\rho(s) \in \mathrm{SO}(n)$. Spinor ma podlegać działaniu samego $s \in \mathrm{Spin}(n)$, tak aby dwa podniesienia tego samego obrotu mogły działać odmiennie. Do opisania wszystkich wymiarów użyjemy liczb zespolonych. *Zespolenie* $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}} := \mathrm{Cl}(\mathbb{R}^n) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ ma tę samą bazę uporządkowanych słów co algebra rzeczywista, ale współczynniki zespolone. Jego wymiar nad $\mathbb{C}$ wynosi $2^n$.

**Definicja 4.6.1** (Spinor zespolony)**.** *Moduł* algebry $A$ nad $\mathbb{K}$ to przestrzeń liniowa $\Delta$ nad $\mathbb{K}$ z działaniem $A \times \Delta \to \Delta$ dwuliniowym nad $\mathbb{K}$ i zgodnym z mnożeniem: $(ab)\psi = a(b\psi)$ oraz $1\psi = \psi$. Jest *niereducowalny*, jeśli $\Delta \neq 0$ i nie ma właściwej niezerowej podprzestrzeni zachowywanej przez wszystkie działania $a \in A$. W tym rozdziale *przestrzenią spinorów* w wymiarze $n$ nazwiemy niereducowalny zespolony moduł $\Delta_n$ algebry $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$. Jej element $\psi$ to spinor. Ograniczenie działania do $\mathrm{Spin}(n) \subset \mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$ jest *reprezentacją spinową*.

Słowo *moduł* brzmi abstrakcyjnie, lecz tutaj oznacza po prostu konkretne macierze $c(v)$ działające na kolumny $\psi$, z warunkiem $c(v)^2 = -\|v\|^2 I$. Działanie na całej algebrze jest wtedy wyznaczone przez jej własność uniwersalną. Przykładem modułu jest $\Lambda V$ z dowodu Twierdzenia 4.4.3, ale zwykle jest on *większy* niż niereducowalna przestrzeń spinorów. Nie należy więc utożsamiać automatycznie wielowektora ze spinorem.

**Przykład 4.6.2** (Macierze Pauliego)**.** Niech

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bezpośrednie mnożenie daje $\sigma_i^2 = I_2$ i $\sigma_i\sigma_j = -\sigma_j\sigma_i$ przy $i \neq j$; na przykład $\sigma_1\sigma_2 = i\sigma_3$. Macierze $c(e_j) = i\sigma_j$ spełniają więc

$$c(e_i)c(e_j) + c(e_j)c(e_i) = -2\delta_{ij} I_2.$$

Dla $n = 2$ wystarczą $c(e_1), c(e_2)$. Ich iloczyn to $-i\sigma_3$, a cztery macierze $I_2, i\sigma_1, i\sigma_2, -i\sigma_3$ są liniowo niezależne i rozpinają $M_2(\mathbb{C})$. Z wymiaru 4 obu stron dostajemy $\mathrm{Cl}_2^{\mathbb{C}} \cong M_2(\mathbb{C})$. Przestrzeń spinorów $\Delta_2 = \mathbb{C}^2$ jest zwykłą przestrzenią kolumn długości 2.

**Twierdzenie 4.6.3** (Klasyfikacja zespolona i wymiar spinorów)**.** *Dla $m \geq 0$ istnieją izomorfizmy algebr*

$$\mathrm{Cl}_{2m}^{\mathbb{C}} \cong M_{2^m}(\mathbb{C}), \tag{4.6.1}$$

$$\mathrm{Cl}_{2m+1}^{\mathbb{C}} \cong M_{2^m}(\mathbb{C}) \oplus M_{2^m}(\mathbb{C}). \tag{4.6.2}$$

*Wobec tego niereducowalny moduł zespolony ma wymiar $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$. Dla parzystego $n$ jest jeden taki moduł z dokładnością do izomorfizmu, a dla nieparzystego $n$ są dwa.*

*Dowód.* W wymiarze 0 algebra ma postać $\mathbb{C}$. W wymiarze 1 składa się z $a + be_1$ przy $e_1^2 = -1$, więc podstawienia $e_1 = i$ i $e_1 = -i$ dają $\mathrm{Cl}_1^{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$. Przykład 4.6.2 daje $\mathrm{Cl}_2^{\mathbb{C}} \cong M_2(\mathbb{C})$.

Wykażmy krok indukcyjny zwiększający wymiar o 2. Iloczyn tensorowy algebr wyposażamy tu w mnożenie $(a \otimes A)(b \otimes B) = ab \otimes AB$, rozszerzone dwuliniowo; własność uniwersalna iloczynu tensorowego zapewnia jego poprawne określenie. Łączność sprawdzamy na tensorach prostych, a jedynką jest $1 \otimes I_2$. Niech $e_1, \ldots, e_n$ będą generatorami $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$. W algebrze $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}} \otimes M_2(\mathbb{C})$ weźmy $n + 2$ elementów:

$$F_j = e_j \otimes \sigma_3 \ (j \leq n), \qquad F_{n+1} = 1 \otimes i\sigma_1, \qquad F_{n+2} = 1 \otimes i\sigma_2.$$

Każdy $F_j^2 = -1$. Dwa różne elementy antykomutują: dla $j, \ell \le n$ wynika to z relacji starych $e_j$; między pierwszymi $n$ a ostatnimi dwoma wynika z tego, że $\sigma_3$ antykomutuje z $\sigma_1, \sigma_2$; ostatnie dwa antykomutują jako macierze Pauliego. Własność uniwersalna daje homomorfizm

$$\mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}_{n+2} \longrightarrow \mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}_n \otimes M_2(\mathbb{C}).$$

Obrazy dwóch ostatnich generatorów dają całą podalgebrę $1 \otimes M_2(\mathbb{C})$: ich iloczyn jest $-i(1 \otimes \sigma_3)$, a wraz z jedynką tworzą bazę czterech macierzy. Następnie z $(e_j \otimes \sigma_3)(1 \otimes \sigma_3) = e_j \otimes I_2$ otrzymujemy wszystkie generatory pierwszego czynnika. Homomorfizm jest więc surjektywny. Obie algebry mają wymiar $2^{n+2}$ nad $\mathbb{C}$ (Twierdzenie 4.4.3), więc jest izomorfizmem. Używamy przy tym $M_d(\mathbb{C}) \otimes M_2(\mathbb{C}) \cong M_{2d}(\mathbb{C})$: jednostka macierzowa $E_{ab} \otimes E_{rs}$ odpowiada jednostce z indeksem wiersza $(a, r)$ i kolumny $(b, s)$. To bijekcja baz zachowująca mnożenie. Iloczyn tensorowy rozdziela się też względem sumy prostej obu składników. Iteracja od $n = 0$ i $n = 1$ daje (4.6.1) i (4.6.2).

Pozostaje uzasadnić wymiary modułów. Algebra $M_d(\mathbb{C})$ działa na $\mathbb{C}^d$ nieredukowalnie: jeśli podprzestrzeń zawiera $x \neq 0$, to dla dowolnego $y \in \mathbb{C}^d$ można znaleźć macierz $A$ z $Ax = y$, więc zawiera wszystkie $y$. Każdy nieredukowalny moduł $M_d(\mathbb{C})$ jest izomorficzny z tym standardowym: wybieramy wektor $\psi$ z $E_{11}\psi \neq 0$ (w razie potrzeby zmieniamy indeks; jest to możliwe, gdyż $\sum_j E_{jj} = I$). Wektory $E_{i1}\psi$, $1 \le i \le d$, są liniowo niezależne: zastosowanie $E_{1j}$ do ich kombinacji liniowej zerowej pozostawia tylko $j$-ty współczynnik razy $E_{11}\psi \neq 0$. Ich rozpiętość zachowują wszystkie macierze, bo $E_{ab}(E_{i1}\psi) = \delta_{bi}E_{a1}\psi$. Jest zatem niezerowym podmodułem, a nieredukowalność wymusza, że stanowi cały moduł. Dla sumy dwóch algebr macierzowych jej dwa centralne idempotenty $(I, 0)$, $(0, I)$ rozkładają każdy moduł na dwie niezmiennicze części. W module nieredukowalnym tylko jedna z nich jest niezerowa, co daje dokładnie dwa wybory modułu wymiaru $d$. □

*Uwaga* 4.6.4 (Dwa moduły w wymiarze nieparzystym). Gdy $n = 2m + 1 \ge 3$, dwa nieredukowalne moduły $\mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}_n$ są różne, lecz po ograniczeniu do $\mathrm{Spin}(n)$ dają izomorficzne reprezentacje. Rzeczywiście, podalgebra parzysta jest izomorficzna z $\mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}_{n-1}$: przypiszmy jego generatorowi $e_j$ element $e_j e_n$ dla $j < n$. Te elementy mają kwadrat $-1$ i wzajemnie antykomutują, a ponadto generują wszystkie parzyste słowa (każde $e_j e_\ell$ z $j, \ell < n$ jest iloczynem odpowiednich $e_j e_n$ i $e_\ell e_n$ z dokładnością do znaku). Obie strony mają wymiar $2^{n-1}$, więc to izomorfizm. Ponieważ $n - 1 = 2m$, algebra parzysta jest $M_{2^m}(\mathbb{C})$ i ma tylko jeden nieredukowalny moduł. Trzeba jeszcze sprawdzić nieredukowalność ograniczeń: każdy z dwóch modułów ma wymiar $d = 2^m$, a w dowolnym niezerowym module $M_d(\mathbb{C})$ konstrukcja z jednostkami $E_{ij}$ z poprzedniego dowodu daje podmoduł wymiaru $d$. Tutaj musi on być całą przestrzenią. Ponadto słowa parzyste z wektorów ortonormalnych należą do Spin i rozpinają algebrę parzystą, więc niezmienniczość względem Spin jest równoważna niezmienniczości względem tej algebry. W szczególności spinor dla obrotów wymiaru 3 ma po prostu dwie zespolone składowe.

**Stwierdzenie 4.6.5** (Spinory chiralne w wymiarze parzystym)**.** *Dla $n = 2m \ge 2$ ustalmy orientację $V$ i dodatnią bazę ortonormalną $(e_1, \dots, e_{2m})$. W module $\Delta_{2m}$ element*

$$\Gamma := i^m c(e_1 e_2 \cdots e_{2m})$$

*ma własność $\Gamma^2 = I$, komutuje z działaniem $\mathrm{Spin}(2m)$ i dzieli przestrzeń na dwa podmoduły dla grupy Spin:*

$$\Delta_{2m} = \Delta^+_{2m} \oplus \Delta^-_{2m}, \qquad \Delta^\pm_{2m} = \ker(\Gamma \mp I), \qquad \dim_{\mathbb{C}} \Delta^\pm_{2m} = 2^{m-1}.$$

*Nazywamy je* półspinorami.

*Dowód.* Niech $\omega = e_1 \cdots e_{2m}$. Aby uporządkować czynniki w iloczynie $\omega^2$, wykonujemy $(2m)(2m-1)/2$ transpozycji; następnie mnożymy $2m$ kwadratów $e_j^2 = -1$. Otrzymujemy $\omega^2 = (-1)^{m(2m-1)}(-1)^{2m} = (-1)^m$. Ponieważ $i^{2m} = (-1)^m$, mamy $\Gamma^2 = I$. Zatem

$P_\pm = \frac{1}{2}(I \pm \Gamma)$ są projekcjami o sumie $I$ i zerowym iloczynie; dają podany rozkład na przestrzenie własne. Zmiana dodatniej bazy ortonormalnej nie zmienia $\omega$: jej iloczyn jest antysymetryzacją najwyższego iloczynu zewnętrznego, a ten zmienia się o wyznacznik, równy 1. Przy odwróceniu orientacji $\Gamma$ zmienia znak i oznaczenia $\Delta^+$, $\Delta^-$ zamieniają się miejscami. Przesunięcie dowolnego $e_j$ przez pozostałe $2m-1$ generatory zmienia znak: $\Gamma c(e_j) = -c(e_j)\Gamma$. Zatem $\Gamma$ komutuje z iloczynami parzystej liczby generatorów, w szczególności ze $\mathrm{Spin}(2m)$; obie przestrzenie własne są niezmiennicze. Operator $c(e_1)$ jest odwracalny i przestawia te przestrzenie własne, więc mają równe wymiary. Suma wymiarów to $2^m$ z poprzedniego twierdzenia, co daje $2^{m-1}$. □

**Przykład 4.6.6** (Półspinory w płaszczyźnie)**.** Dla $n=2$ w modelu Pauliego $\Gamma = i\,c(e_1)c(e_2) = \sigma_3$, więc $\Delta_2^+ = \mathbb{C}\binom{1}{0}$ oraz $\Delta_2^- = \mathbb{C}\binom{0}{1}$. Element $s_\theta$ z Przykładu 4.5.5 działa przez

$$c(s_\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

Wektor po obrocie o $2\pi$ wraca do swego położenia, a każdy z obu półspinorów zostaje przemnożony przez $-1$.

**Przykład 4.6.7** (Spinor w $\mathbb{R}^3$ i sfera Blocha)**.** W wymiarze 3 działanie $c(e_j) = i\sigma_j$ na $\Delta_3 = \mathbb{C}^2$ spełnia relacje Clifforda. Na parzystych generatorach z Przykładu 4.5.6 otrzymujemy macierze $-i\sigma_1, -i\sigma_2, -i\sigma_3$. Dla $s = a + bI + cJ + dK \in \mathrm{Spin}(3)$ macierz działania ma postać

$$U_s = aI_2 - i(b\sigma_1 + c\sigma_2 + d\sigma_3).$$

Z relacji Pauliego dostajemy $U_s^* U_s = (a^2+b^2+c^2+d^2)I_2 = I_2$ oraz $\det U_s = 1$. Każda macierz z $\mathrm{SU}(2)$ ma taką postać: z warunków unitarności i wyznacznika 1 wynika $U = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{smallmatrix}\right)$, gdzie $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$; cztery rzeczywiste części $\alpha, \beta$ odpowiadają jedynej czwórce $(a,b,c,d)$. Zatem $\mathrm{Spin}(3) \cong \mathrm{SU}(2)$.

Niech teraz $\psi = (z_1, z_2)^T$ ma normę 1. Liczby rzeczywiste

$$b_j(\psi) := \psi^* \sigma_j \psi \quad \text{dają} \quad b(\psi) = \big(2\,\mathrm{Re}(\overline{z}_1 z_2), 2\,\mathrm{Im}(\overline{z}_1 z_2), |z_1|^2 - |z_2|^2\big). \tag{4.6.3}$$


Rachunek daje $\|b(\psi)\|^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 + (|z_1|^2 - |z_2|^2)^2 = 1$. Zmiana fazy $\psi \mapsto e^{i\varphi}\psi$ nie zmienia $b(\psi)$. Odwrotnie, liczby $b_j$ wyznaczają macierz $\psi\psi^* = \frac{1}{2}(I_2 + \sum_j b_j\sigma_j)$, a ta macierz wyznacza prostą $\mathbb{C}\psi$. Każdy punkt sfery otrzymujemy: dla $b = (x,y,z)$ z $z > -1$ bierzemy $z_1 = \sqrt{(1+z)/2}$, $z_2 = (x+iy)/\sqrt{2(1+z)}$; dla bieguna południowego bierzemy $(0,1)$. Otrzymujemy więc konkretną identyfikację

$$\mathbb{CP}^1 = \mathrm{Gr}_1(\mathbb{C}^2) \cong S^2.$$

Jest to także gładka identyfikacja: na mapie $[1:w]$ wzór ma postać $b = (2\,\mathrm{Re}\,w, 2\,\mathrm{Im}\,w, 1 - |w|^2)/(1+|w|^2)$, a odwrotność poza biegunem południowym to $w = (x+iy)/(1+z)$; druga mapa analogicznie obsługuje biegun południowy. Macierze $U_s$ obracają odpowiedni punkt sfery. Istotnie, z $U_s c(v) U_s^{-1} = c(\rho(s)v)$ i $c(v) = i\sum_j v_j\sigma_j$ otrzymujemy

$$(U_s\psi)(U_s\psi)^* = U_s\psi\psi^*U_s^{-1} = \tfrac{1}{2}\big(I_2 + \textstyle\sum_j (\rho(s)b(\psi))_j\sigma_j\big).$$

Jednoznaczność współczynników przy $\sigma_j$ daje $b(U_s\psi) = \rho(s)b(\psi)$. Znak spinora $\psi \mapsto -\psi$ jest niewidoczny po przejściu do punktu sfery.




Rysunek 4.5: Spinor jednostkowy $\psi \in \mathbb{C}^2$ ma fazę, która nie zmienia prostej $[\psi] \in \mathbb{CP}^1$. Wzór (4.6.3) przypisuje tej prostej punkt sfery. To łączy spinory z grassmannianem prostych.

## 4.7 Struktury spinowe i wiązki spinorów

Dotąd wektory, obroty i spinory należały do jednej ustalonej przestrzeni $\mathbb{R}^n$. Na rozmaitości przestrzeń $T_pM$ zmienia się z $p$. Gładka rodzina dodatnio określonych iloczynów skalarnych $g_p$ na $T_pM$ to *metryka riemannowska*. Pozwala wybierać bazy ortonormalne w każdym punkcie. Jeśli $M$ jest zorientowana, możemy wybierać bazy o dodatniej orientacji.

*Wiązka dodatnio zorientowanych ramek ortonormalnych* $F^+(M) \to M$ ma w punkcie $p$ za włókno wszystkie uporządkowane bazy $(u_1, \dots, u_n)$ przestrzeni $T_pM$, które są ortonormalne i dodatnie. Grupa $\mathrm{SO}(n)$ działa z prawej strony przez zmianę takiej bazy. Nie ma wyróżnionej bazy w każdym włóknie; lokalnie wiązka wygląda jednak jak $U \times \mathrm{SO}(n)$. Wiązkę o takiej lokalnej postaci, z wolnym działaniem grupy przechodzącym tranzytywnie na każdym włóknie, nazywamy *wiązką główną*.

**Definicja 4.7.1** (Struktura spinowa i wiązka spinorów)**.** Dla zorientowanej rozmaitości riemannowskiej $M^n$, $n \geq 2$, *struktura spinowa* składa się z wiązki głównej $P_{\mathrm{Spin}} \to M$ o grupie $\mathrm{Spin}(n)$ oraz odwzorowania gładkiego $\lambda : P_{\mathrm{Spin}} \to F^+(M)$ nad identycznością bazy, takiego że

$$\lambda(pg) = \lambda(p)\rho(g), \qquad g \in \mathrm{Spin}(n),$$

a $\lambda$ ograniczona do każdego włókna jest dwukrotnym nakryciem. *Wiązka spinorów* to wiązka zespolona

$$S := P_{\mathrm{Spin}} \times_{\mathrm{Spin}(n)} \Delta_n.$$

Jej elementami są klasy par $(p, \psi)$, $p \in P_{\mathrm{Spin}}$, $\psi \in \Delta_n$, z relacją $(pg, \psi) \sim (p, c(g)\psi)$. *Polem spinorowym* nazywamy gładki przekrój $S$. Tę samą definicję stosujemy do dowolnej zorientowanej wiązki euklidesowej $E$ rzędu $n$, zastępując $F^+(M)$ wiązką jej dodatnich ramek ortonormalnych $F^+(E)$.

Po wyborze lokalnej ramki spinowej $s_i : U_i \to P_{\mathrm{Spin}}$ wiązka $S$ wygląda jak $U_i \times \Delta_n$. Ustalmy kierunek zmian: jeśli $s_j = s_i h_{ij}$, to $[s_j, \psi_j] = [s_i, c(h_{ij})\psi_j]$, zatem współrzędne tego samego spinora spełniają $\psi_i = c(h_{ij})\psi_j$. Przy przejściu od kolumny $i$ do kolumny $j$ używamy więc macierzy odwrotnej. Z równości dla lokalnych ramek wynika też $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$; reprezentacja $c$ przenosi tę równość na macierze przejścia, co uzasadnia strukturę wiązki wektorowej $S$. Zauważmy też, że $\lambda$ jest nakryciem całych przestrzeni: w lokalnej trywializacji zadanej przez $s_i$ i ramkę $\lambda \circ s_i$ ma postać $(x, g) \mapsto (x, \rho(g))$. Jeśli zmiana ramki wektorowej wykonuje pełny obrót o $2\pi$, jej podniesienie w Spin może dojść do $-1$. Wtedy wektory wracają do wartości początkowych, lecz spinor dostaje znak minus. To lokalna treść różnicy między wiązką wektorów i wiązką spinorów.

**Przykład 4.7.2** (Płaszczyzna i sfera są spinowe)**.** Na $\mathbb{R}^n$ standardowe ramki dają $F^+(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^n \times \mathrm{SO}(n)$. Bierzemy $P_{\mathrm{Spin}} = \mathbb{R}^n \times \mathrm{Spin}(n)$ i $\lambda(x, s) = (x, \rho(s))$; spinory tworzą trywialną wiązkę $S \cong \mathbb{R}^n \times \Delta_n$.

Na sferze $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ każda dodatnia ramka styczna $(u, v)$ w punkcie $p$ wyznacza macierz o kolumnach $(u, v, p) \in \mathrm{SO}(3)$. To utożsamia $F^+(S^2)$ z $\mathrm{SO}(3)$, a rzut do bazy wysyła macierz na

jej trzecią kolumnę $p$. Dwukrotne nakrycie $\mathrm{SU}(2) \cong \mathrm{Spin}(3) \to \mathrm{SO}(3)$ z Przykładu 4.5.6 daje odwzorowanie $\lambda$. Rzut z $\mathrm{Spin}(3)$ do sfery ma postać $q(s) = \rho(s)e_3$. Używamy jednej, ustalonej podgrupy $H = \rho^{-1}(\mathrm{Stab}(e_3)) = \mathrm{Spin}(2)$, złożonej z $\cos t + \sin t\, e_1e_2$. Działa ona z prawej strony na $\mathrm{Spin}(3)$ i zachowuje $q(s)$. Jeśli $q(s) = q(s')$, to $s^{-1}s' \in H$, więc działanie jest wolne i przechodnie na każdym włóknie. Lokalne gładkie ramki styczne $(u, v)$ dają lokalne sekcje w $\mathrm{SO}(3)$; po zmniejszeniu otoczenia podnosimy je przez lokalną odwrotność nakrycia $\rho$. To zapewnia lokalną trywialność wiązki głównej. Równość $\lambda(sh) = \lambda(s)\rho(h)$ kończy sprawdzenie definicji struktury spinowej na sferze.

*Uwaga* 4.7.3 (Podnoszenie na zbiorze ściągalnym). Użyjemy elementarnego faktu o nakryciach: gładkie odwzorowanie ze ściągalnego obszaru $U$ do podstawy gładkiego nakrycia ma gładkie podniesienie po wybraniu obrazu jednego punktu. Istotnie, drogę od tego punktu podnosimy kolejno przez lokalne odwrotności nakrycia, dzieląc jej przedział parametrów na skończenie wiele odcinków. Jednoznaczność na przecięciach daje jednoznaczność podniesionej drogi. Homotopię dróg o ustalonych końcach podnosimy analogicznie po podziale kwadratu parametrów na małe prostokąty, których obrazy leżą w dziedzinach lokalnych odwrotności. Końcowy punkt podniesienia nie zmienia się w tej homotopii: poruszałby się ciągle w dyskretnym włóknie. W obszarze ściągalnym każde dwie drogi o tych samych końcach są tak homotopijne, więc ich podniesienia wyznaczają tę samą wartość w punkcie końcowym. Otrzymana funkcja jest lokalnie złożeniem danej funkcji z jedną lokalną odwrotnością nakrycia, zatem jest gładka. Ten sam argument działa na dysku z brzegiem.

**Przykład 4.7.4** (Wiązka, której nie da się podnieść)**.** Podłoże $S^2 \cong \mathbb{CP}^1$ jest spinowe, ale nie każda *wiązka* nad nim dopuszcza podniesienie struktury do Spin. Weźmy zespoloną wiązkę tautologiczną $\gamma^1_{\mathbb{C}}$ nad $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{C}^2) = \mathbb{CP}^1$ i potraktujmy jej włókna jako rzeczywiste zorientowane płaszczyzny wymiaru 2. Na mapie $[1 : z]$ mamy ramkę zespoloną $s_0(z) = (1, z)$, a na mapie $[w : 1]$, $w = 1/z$, ramkę $s_\infty(w) = (w, 1)$. Na przecięciu $s_\infty(1/z) = z^{-1}s_0(z)$. Po unormowaniu ramek, przy $|z| = 1$, $z = e^{i\theta}$, unitarny czynnik przejścia jest więc $e^{-i\theta}$: jako rzeczywista izometria obraca płaszczyznę o kąt $-\theta$. Po przejściu $0 \le \theta \le 2\pi$ daje pętlę o nieparzystej liczbie pełnych obrotów. Ta pętla w $\mathrm{SO}(2)$ nie ma *zamkniętego* podniesienia do $\mathrm{Spin}(2)$: połowa kąta biegnie od 0 do $-\pi$ i kończy w $-1$, nie w 1. Gdyby istniała struktura spinowa, ramkę ortonormalną nad każdą z dwóch półkul można by podnieść do ramki spinowej. Rzeczywiście, przeciwobraz takiej ramki przez $\lambda$ jest dwukrotnym nakryciem dysku; Uwagi 4.7.3 używamy do podniesienia identyczności dysku. Przejście między otrzymanymi ramkami spinowymi na równiku byłoby właśnie zamkniętym podniesieniem opisanej pętli, co jest sprzecznością. Zmiana ramki na którejś z dwóch półkul zmienia pętlę tylko o taką, która przedłuża się na dysk i ma zerowy całkowity obrót. Dlatego ten brak podniesienia nie zależy od wybranych ramek. Wiązka rzeczywista otrzymana przez zapomnienie struktury zespolonej $\gamma^1_{\mathbb{C}}$ nie ma struktury spinowej, mimo że sama sfera $S^2$ ją ma.

**Stwierdzenie 4.7.5** (Znaki na potrójnych przecięciach)**.** *Niech $E$ będzie zorientowaną wiązką euklidesową rzędu $n \ge 2$ nad $M$. Weźmy dostatecznie drobne pokrycie trywializujące $(U_i)$, w którym niepuste skończone przecięcia są ściągalne. Takie pokrycie nazywamy* dobrym*; w tym stwierdzeniu zakładamy jego wybór. Niech $g_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{SO}(n)$ przepisują współrzędne z trywializacji $j$ do trywializacji $i$, więc $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$. Na przecięciach wybierzmy podniesienia $h_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{Spin}(n)$ z $\rho(h_{ij}) = g_{ij}$ i $h_{ji} = h_{ij}^{-1}$. Wtedy na potrójnym przecięciu*

$$\varepsilon_{ijk} := h_{ij}h_{jk}h_{ki} \in \{1, -1\}. \tag{4.7.1}$$

*Wiązka $E$ ma strukturę spinową dokładnie wtedy, gdy wybory $h_{ij}$ można zmodyfikować znakami tak, aby wszystkie $\varepsilon_{ijk}$ wynosiły* 1.

*Dowód.* Z warunku kocyklu dla $g_{ij}$ mamy $\rho(\varepsilon_{ijk}) = g_{ij}g_{jk}g_{ki} = I$. Twierdzenie 4.5.3 mówi, że jądro $\rho$ to $\{\pm 1\}$; ponieważ znak jest dyskretny, $\varepsilon_{ijk}$ jest lokalnie stały. Nie ma problemu z

samym podniesieniem $g_{ij}$ na ściągalnym przecięciu: zapewnia je Uwaga 4.7.3. Przyjmujemy też $h_{ii} = 1$.

Jeżeli na każdym potrójnym przecięciu $\varepsilon_{ijk} = 1$, to $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$. Są to funkcje przejścia z warunkiem kocyklu. Sklejamy $U_i \times \mathrm{Spin}(n)$ relacją $(x, a)_j \sim (x, h_{ij}(x)a)_i$. Warunek kocyklu zapewnia przechodniość tej relacji, a gładkie przejścia zapewniają lokalne trywializacje, jak w Sekcji 1.9. Działanie z prawej strony jest dobrze określone, wolne i przechodnie we włóknach, więc otrzymujemy wiązkę główną. Jeśli $f_i$ oznacza wybraną lokalną ramkę $E$, to $\lambda([x, a]_i) = f_i(x)\rho(a)$ jest niezależne od reprezentanta, ponieważ $f_j = f_i g_{ij}$ i $\rho(h_{ij}) = g_{ij}$. Lokalnie jest to $\mathrm{id} \times \rho$, a więc spełnia definicję struktury spinowej. Odwrotnie, w istniejącej strukturze spinowej podnosimy każdą ustaloną ramkę $f_i$ do ramki spinowej nad ściągalnym $U_i$. Stosujemy Uwagę 4.7.3 do dwukrotnego nakrycia będącego przeciwobrazem $f_i$ przez $\lambda$. Przejścia tych ramek podnoszą właśnie dane $g_{ij}$ i spełniają warunek kocyklu, więc wszystkie znaki są 1. Dowolne dwa odwzorowania $h_{ij}$ nad tym samym $g_{ij}$ różnią się na spójnym przecięciu stałym znakiem $\delta_{ij} \in \{\pm 1\}$. Zmiana podniesień zastępuje $\varepsilon_{ijk}$ przez $\delta_{ij}\delta_{jk}\delta_{ki}\varepsilon_{ijk}$, co dowodzi sformułowania o modyfikacji znakami. □

*Uwaga* 4.7.6 (Druga klasa Stiefela–Whitneya). Zdarza się, że pojedynczych znaków $\varepsilon_{ijk}$ nie da się wszystkich usunąć. Ich układ spełnia warunek zgodności na poczwórnych przecięciach: dwa sposoby pomnożenia $h_{ij}h_{jk}h_{k\ell}$ dają $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ik\ell} = \varepsilon_{jk\ell}\varepsilon_{ij\ell}$. Taką rodzinę znaków nazywamy *dwukocyklowym* zapisem przeszkody. Zmiany przez $\delta_{ij}$ z dowodu uznajemy za równoważne. Nie zmienia tego wybór lokalnych ramek: jeśli $f'_i = f_i a_i$, wybieramy podniesienia $b_i$ funkcji $a_i$ nad ściągalnymi $U_i$. Wtedy $g'_{ij} = a_i^{-1} g_{ij} a_j$ mają podniesienia $h'_{ij} = b_i^{-1} h_{ij} b_j$. Ich iloczyn na potrójnym przecięciu to $b_i^{-1}\varepsilon_{ijk}b_i = \varepsilon_{ijk}$, bo znaki należą do centrum grupy Spin. Klasa tego układu w $H^2(M; \mathbb{Z}/2)$ nazywa się *drugą klasą Stiefela–Whitneya* $w_2(E)$. Na dobrym pokryciu $w_2(E) = 0$ oznacza dokładnie, że znaki można usunąć, czyli że struktura spinowa istnieje. Identyfikacja klas z różnych pokryć to twierdzenie kohomologii Čech; używamy tu tylko elementarnego testu podnoszenia funkcji przejścia dowiedzionego wyżej. Dla wiązki w Przykładzie 4.7.4 przeszkoda jest niezerowa.

*Dalsza lektura:* Rachunki z konwencją $v^2 = -\|v\|^2$ można porównać z notatkami Briana Conrada, *Clifford algebras and spin groups*, `https://math.stanford.edu/~conrad/210CPage/handouts/clifford.pdf`. Budowę struktur spinowych i opis przeszkody $w_2$ rozwijają notatki Konstantina Wernliego, *Lecture Notes on Spin Geometry*, `https://arxiv.org/pdf/1911.09766`. Obie lektury używają miejscami innej kolejności tematów. Powyższy test znaków został dowiedziony bez użycia kohomologii; jego interpretacja jako klasy w $H^2$ korzysta z teorii kohomologii Čech, której tutaj nie dowodziliśmy.

# Rozdział 5

# Podstawy algebry abstrakcyjnej

Zbierzemy pojęcia grup, pierścieni i modułów potrzebne do algebry homologicznej. Konstrukcje ilorazowe pozwalają narzucać relacje, a iloczyn tensorowy pozwala zastąpić odwzorowanie dwuliniowe liniowym. Wcześniejszy Rozdział 3 dotyczył przestrzeni nad ciałem; tutaj pracujemy nad pierścieniem. W Rozdziale 4 wystąpił też moduł algebry Clifforda; wrócimy do tego przykładu.

## 5.1 Grupy, słowa i prezentacje

Zanim przejdziemy do modułów, zbierzmy język potrzebny przy grupie podstawowej i Twierdzeniu 7.3.1. Grupa opisuje odwracalne składanie działań. W grupie klas pętli opartych w jednym punkcie działaniem jest składanie pętli, a odwrotność reprezentuje pętla przebiegnięta w przeciwnym kierunku.

### Grupy, homomorfizmy i ilorazy

**Definicja 5.1.1** (Grupa i homomorfizm)**.** *Grupa* $(G, \cdot, 1)$ to zbiór z łącznym mnożeniem, elementem neutralnym 1 i odwrotnością $g^{-1}$ każdego $g \in G$. Nie zakładamy przemienności. Odwzorowanie $\varphi : G \to H$ jest *homomorfizmem*, jeśli $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$. Wtedy $\varphi(1) = 1$ i $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. Istotnie, $\varphi(1)^2 = \varphi(1)$, więc skracanie daje $\varphi(1) = 1$; następnie stosujemy $\varphi$ do $gg^{-1} = 1$. Bijektywny homomorfizm nazywamy *izomorfizmem*.

Przykładem jest $(\mathbb{Z}, +, 0)$; w zapisie addytywnym odwrotnością $m$ jest $-m$. Grupa permutacji trzech elementów dostarcza przykładu nieprzemiennego: przestawienia $(12)(23)$ i $(23)(12)$ są różne.

**Definicja 5.1.2** (Podgrupa normalna i iloraz)**.** *Podgrupa* $N \leq G$ to podzbiór zawierający 1 i zamknięty na mnożenie oraz branie odwrotności. *Warstwa lewostronna* to $gN = \{gn : n \in N\}$. Mamy $gN = hN$ dokładnie wtedy, gdy $h^{-1}g \in N$: z równości warstw wynika $g = hn$ dla pewnego $n \in N$, a z $g = hn$ wynika $gN = hnN = hN$. Podgrupa $N \leq G$ jest *normalna*, gdy $gNg^{-1} = N$ dla każdego $g \in G$. Wówczas zbiór warstw $G/N$ staje się grupą przez $(gN)(hN) = ghN$. Jądro homomorfizmu $\ker\varphi = \{g : \varphi(g) = 1\}$ jest normalne. *Domknięcie normalne* zbioru $R \subset G$, oznaczane $\langle\langle R \rangle\rangle$, jest najmniejszą podgrupą normalną zawierającą $R$.

*Dlaczego iloraz jest dobrze określony?* Jeśli $g' = gn$ i $h' = hm$ dla $n, m \in N$, to $g'h' = gnhm = gh(h^{-1}nh)m$. Normalność daje $h^{-1}nh \in N$, zatem $g'h'N = ghN$. Mnożenie nie zależy więc od wybranych reprezentantów. Łączność dziedziczymy z $G$; elementem neutralnym jest $N$, a odwrotnością $gN$ jest $g^{-1}N$. Dla jądra: $\varphi(gng^{-1}) = \varphi(g)1\varphi(g)^{-1} = 1$. Elementy domknięcia

normalnego są skończonymi iloczynami sprzężeń $grg^{-1}$ i ich odwrotności, $r \in R$: zbiór tych iloczynów jest podgrupą normalną zawierającą $R$ i mieści się w każdej takiej podgrupie. □

**Przykład 5.1.3** (Reszty modulo $m$)**.** Niech $m \geq 2$. W grupie addytywnej $\mathbb{Z}$ każda podgrupa jest normalna. Iloraz $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ma elementy $[0], \ldots, [m-1]$ i dodawanie $[a]+[b] = [a+b]$. Homomorfizm $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ma jądro $m\mathbb{Z}$.

## Grupy wolne i iloczyn wolny

**Definicja 5.1.4** (Grupa wolna i iloczyn wolny)**.** Niech $A$ będzie zbiorem *symboli*, zwanych generatorami. Dla każdego $a \in A$ tworzymy nowy symbol $a^{-1}$; zbiór tych nowych symboli oznaczamy $A^{-1}$ i przyjmujemy $(a^{-1})^{-1} = a$. *Słowo* w alfabecie $A^{\pm 1} = A \sqcup A^{-1}$ jest skończonym ciągiem liter $x_1 \cdots x_r$, $r \geq 0$. Długość słowa to $r$; jedyne słowo długości zero oznaczamy $\varnothing$ i nazywamy pustym. Słowa można sklejać, czyli konkatenować: $(x_1 \cdots x_r)(y_1 \cdots y_s) = x_1 \cdots x_r y_1 \cdots y_s$.

*Redukcja elementarna* usuwa sąsiednie litery $xx^{-1}$ lub $x^{-1}x$. Słowo jest *zredukowane*, gdy nie zawiera takiej pary. Dwa słowa uznajemy za równoważne, jeżeli można przejść od jednego do drugiego skończonym ciągiem wstawień lub usunięć takich par. *Grupa wolna* $F(A)$ to zbiór tych klas, z mnożeniem zadanym przez sklejanie słów.

Dla grup $G, H$ *iloczyn wolny* $G * H$ powstaje ze słów w *rozłącznej sumie* alfabetów $(G \setminus \{1_G\}) \sqcup (H \setminus \{1_H\})$. Litera pamięta swój czynnik, nawet gdy $G = H$. Redukcja zastępuje sąsiednie litery jednego czynnika ich iloczynem w tym czynniku; jeśli iloczyn jest jedynką, usuwa obie litery. Równoważność słów dopuszcza zarówno te redukcje, jak i operacje odwrotne. $G * H$ jest zbiorem klas z mnożeniem przez konkatenację. Słowo zredukowane ma litery z obu czynników naprzemiennie.

Zanim utożsamimy klasy ze słowami zredukowanymi, trzeba wiedzieć, że wynik redukcji nie zależy od kolejności kasowania par. Sam zbiór *wszystkich* słów z konkatenacją jest tylko monoidem: słowa $aa^{-1}$ i $\varnothing$ nie są w nim dosłownie równe.

**Stwierdzenie 5.1.5** (Jednoznaczna postać zredukowana)**.** *Każda klasa w $F(A)$ zawiera dokładnie jedno słowo zredukowane. Jeżeli* $\mathrm{red}(w)$ *oznacza to słowo, działanie grupowe ma postać*

$$u \cdot v = \mathrm{red}(uv), \qquad 1 = \varnothing, \qquad (x_1 \cdots x_r)^{-1} = x_r^{-1} \cdots x_1^{-1}.$$


*Dowód.* Czytamy słowo od lewej do prawej i trzymamy *stos* już przeczytanych liter. Gdy następna litera jest odwrotnością litery na wierzchu stosu, zdejmujemy wierzch; w przeciwnym razie dokładamy nową literę. Po ostatnim kroku na stosie nie ma sąsiedniej pary odwrotnej, więc otrzymaliśmy słowo zredukowane. Po każdym kroku stos reprezentuje tę samą klasę co przeczytany fragment: dopisujemy literę albo usuwamy końcową parę odwrotną. Wynik należy więc do klasy początkowego słowa.

Sprawdźmy niezależność od usuwania par. Operacja dopisania litery $x$ do słowa na stosie jest odwracalna: operacja dopisania $x^{-1}$ cofa ją, zarówno gdy pierwszy krok dołożył literę, jak i wtedy, gdy ją skasował. Dlatego przeczytanie fragmentu $xx^{-1}$ nie zmienia stanu stosu. Usunięcie takiego fragmentu z dowolnego miejsca słowa nie zmienia końcowego wyniku algorytmu. Każde słowo równoważne daje zatem ten sam wynik. Jeśli słowo jest już zredukowane, algorytm pozostawia je bez zmian; w każdej klasie może więc być tylko jedno takie słowo.

Sklejanie jest łączne przed redukcją, a usuwanie par nie zmienia wyniku algorytmu. Stąd $\mathrm{red}(\mathrm{red}(uv)w) = \mathrm{red}(uvw) = \mathrm{red}(u\,\mathrm{red}(vw))$. Słowo puste jest jedynką. Zapisane w tezie słowo odwrotne po sklejeniu z oryginałem redukuje się kolejno od środka do słowa pustego. To sprawdza wszystkie aksjomaty grupy. □

**Przykład 5.1.6** (Słowa i działanie na słowach)**.** W $F(\{a,b\})$ słowo $ab\,b^{-1}a^{-1}ba$ redukujemy najpierw do $aa^{-1}ba$, a następnie do $ba$. Słowa $ab$ i $ba$ są już zredukowane i różne, więc grupa ta nie jest przemienna. Dla jednego generatora każde słowo redukuje się do $a^m$ z jednoznacznym $m \in \mathbb{Z}$; stąd $F(\{a\}) \cong \mathbb{Z}$.

Grupa $F(A)$ działa na zbiorze zredukowanych słów przez mnożenie z lewej: $u \cdot w = \mathrm{red}(uw)$. Na przykład $a \cdot (a^{-1}b) = b$. Jest to działanie, bo łączność udowodniono powyżej; odwrotna operacja do działania przez $a$ to działanie przez $a^{-1}$. Jest ono przechodnie, gdyż $w \cdot \varnothing = w$, i wolne: jeśli $u \cdot w = w$, to w grupie $uw = w$, zatem po pomnożeniu przez $w^{-1}$ dostajemy $u = 1$. Ten sam zbiór ma również działanie z prawej $w \cdot u = \mathrm{red}(wu)$. Rysunek 5.1 pokazuje pojedyncze kroki tego drugiego działania. Na przykład iloczyn dwóch zredukowanych słów $ab$ i $b^{-1}a$ trzeba jeszcze skrócić: $\mathrm{red}(ab\,b^{-1}a) = a^2$.




Rysunek 5.1: Fragment grafu słów zredukowanych w $F(\{a,b\})$. Krawędź oznacza dopisanie z prawej jednej litery $a^{\pm 1}$ albo $b^{\pm 1}$ i ewentualną redukcję. Powrót po krawędzi odpowiada dopisaniu litery odwrotnej.

**Stwierdzenie 5.1.7** (Własność uniwersalna grupy wolnej)**.** *Dla dowolnej grupy $K$ i dowolnego wyboru elementów $h_a \in K$, $a \in A$, istnieje dokładnie jeden homomorfizm $\Phi : F(A) \to K$ spełniający $\Phi(a) = h_a$.*

*Dowód.* Na słowach musi on mieć postać

$$\Phi(a_1^{\epsilon_1} \cdots a_r^{\epsilon_r}) = h_{a_1}^{\epsilon_1} \cdots h_{a_r}^{\epsilon_r}, \qquad \epsilon_i \in \{1, -1\}.$$

Usunięcie sąsiedniej pary odwrotnej nie zmienia iloczynu po prawej. Wzór zależy więc tylko od klasy słowa i jest dobrze określony. Sklejanie słów odpowiada mnożeniu obrazów, zatem $\Phi$ jest homomorfizmem. Każde słowo jest iloczynem generatorów i ich odwrotności, co dowodzi jednoznaczności. Właśnie brak dodatkowych relacji między generatorami nazywamy *wolnością*. □

**Stwierdzenie 5.1.8** (Postać normalna i własność uniwersalna iloczynu wolnego)**.** *Każdy element $G * H$ ma dokładnie jeden zapis jako słowo naprzemienne o literach różnych od jedynki, z dopuszczeniem słowa pustego. Odwzorowania $G \to G * H$ i $H \to G * H$, wysyłające element niejednostkowy na słowo jednoliterowe, a jedynkę na słowo puste, są iniektywnymi homomorfizmami. Dla każdej pary homomorfizmów $f : G \to K$, $h : H \to K$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm $\Phi : G * H \to K$ ograniczający się na czynnikach do $f$ oraz $h$.*

*Dowód.* Czytamy litery po kolei i przechowujemy stos liter niejednostkowych, pochodzących naprzemiennie z obu czynników. Dla $x$ z jednego czynnika oznaczmy przez $T_x$ operację dopisania $x$: literę z innego czynnika dokładamy, a z tego samego mnożymy z ostatnią literą stosu. Gdy iloczyn jest jedynką, zdejmujemy tę ostatnią literę. Przyjmujemy $T_1 = \mathrm{id}$. Każdy krok jest dozwoloną redukcją, więc wynik algorytmu należy do klasy czytanego słowa.

Kluczowa jest równość $T_y(T_x(u)) = T_{xy}(u)$, gdy $x, y$ pochodzą z tego samego czynnika. Jeśli któraś litera jest jedynką, równość jest natychmiastowa. W pozostałym przypadku:

- Gdy $u$ jest pusty albo kończy się literą drugiego czynnika, najpierw dopisujemy $x$, potem zastępujemy $xy$ jedną literą albo usuwamy je, jeśli $xy = 1$. To właśnie $T_{xy}(u)$.
- Gdy $u = vz$ i $z$ jest z tego samego czynnika co $x, y$, słowo $v$ jest puste albo kończy się w drugim czynniku. Jeśli $zx \neq 1$, dwa kroki zastępują końcówkę przez $(zx)y = z(xy)$, z usunięciem jedynki. Dla $xy = 1$ odzyskujemy $vz$; dla $xy \neq 1$ jest to pojedynczy krok $T_{xy}$. Jeśli $zx = 1$, pierwszy krok usuwa $z$, a drugi daje $vy$. Z kolei $z(xy) = y$; gdy $xy \neq 1$, pojedynczy krok również daje $vy$. Gdy $xy = 1$, mamy $y = z$, więc $vy = u = T_1(u)$.

Zastąpienie sąsiednich liter ich iloczynem nie zmienia zatem stosu po przeczytaniu tego fragmentu, ani wyniku po przeczytaniu reszty słowa. Dotyczy to także odwrotnej operacji. Wynik jest stały na klasie równoważności. Ponieważ algorytm pozostawia słowo naprzemienne bez zmian, w każdej klasie jest dokładnie jedno takie słowo.

Relacje można wykonywać wewnątrz dowolnego dłuższego słowa, więc konkatenacja jest dobrze określona na klasach i łączna. Słowo puste jest jedynką, a odwrócenie kolejności liter i zastąpienie ich odwrotnościami daje odwrotność słowa. Relacje wewnątrz czynników zapewniają, że ich odwzorowania do $G * H$ są homomorfizmami. Jednoznaczność postaci normalnej daje ich iniektywność; obrazy czynników mają tylko jedynkę wspólną.

Definiujemy $\Phi(x_1 \cdots x_r)$ jako iloczyn obrazów liter, używając $f$ lub $h$ zależnie od czynnika. Redukcja w jednym czynniku nie zmienia tego iloczynu, bo $f$ i $h$ są homomorfizmami. Wzór przechodzi więc na klasy. Konkatenacja słów odpowiada mnożeniu obrazów, a każdy element jest iloczynem liter z czynników; daje to istnienie i jednoznaczność $\Phi$. □

Ta własność uniwersalna będzie używana w Twierdzeniu 7.3.1.

Na przykład dla $G = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}$ i $H = \langle b \rangle \cong \mathbb{Z}$ własności uniwersalne dają $G * H \cong F(\{a, b\})$. Iloczyn słów naprzemiennych $(ab)(b^{-1}a)$ redukuje się do $a^2$: po skasowaniu $bb^{-1}$ zostaje $aa$.

Nie należy mylić iloczynu wolnego z iloczynem prostym. Dla $G = \langle a \mid a^2 = 1 \rangle$ i $H = \langle b \mid b^2 = 1 \rangle$, obu rzędu dwa, słowa $(ab)^k$, $k \geq 0$, są różnymi postaciami normalnymi. Zatem $G * H$ jest nieskończony, podczas gdy $G \times H$ ma cztery elementy. W $G * H$ nie narzucamy przemienności liter z różnych czynników.

### Generatory i relacje

**Definicja 5.1.9** (Prezentacja grupy)**.** Jeśli $R$ jest zbiorem słów w $F(A)$, to

$$\langle A \mid R \rangle := F(A)/\langle\langle R \rangle\rangle$$

nazywamy *grupą o generatorach* $A$ i *relacjach* $R$. Relacja $r = 1$ oznacza, że jej wszystkie konsekwencje po mnożeniu i sprzęganiu również stają się jedynką.

**Przykład 5.1.10** (Prezentacja grupy torusa)**.** Niech $F(a, b)$ będzie grupą wolną na dwóch symbolach. Relacja $aba^{-1}b^{-1} = 1$ jest równoważna $ab = ba$. Po jej narzuceniu każde słowo można przestawić do postaci $a^m b^n$, $m, n \in \mathbb{Z}$. Odwzorowanie $F(a, b) \to \mathbb{Z}^2$ dane przez $a \mapsto (1, 0)$,

$b \mapsto (0,1)$ zabija tę relację i wysyła $a^m b^n$ na $(m,n)$. Postacie te są więc wzajemnie różne, a zatem

$$\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Sklejenie przeciwnych boków kwadratu tworzy torus. Brzeg kwadratu przed sklejeniem odczytujemy jako słowo $aba^{-1}b^{-1}$. Topologiczne uzasadnienie, że prezentacja opisuje $\pi_1(T^2)$, podamy przy Twierdzeniu 7.3.1.

### Iloczyn prosty grup

Iloczyn prosty opisuje niezależne wykonywanie dwóch działań.

**Definicja 5.1.11** (Iloczyn prosty)**.** Dla grup $G, H$ ich *iloczyn prosty* jest zbiorem $G \times H$ z mnożeniem $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$. Jedynką jest $(e_G, e_H)$, a $(g,h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$. Łączność wynika z łączności w każdej współrzędnej.

Inkluzje $g \mapsto (g, e_H)$ i $h \mapsto (e_G, h)$ są homomorfizmami. Ich obrazy są normalne: sprzęganie odbywa się współrzędnie. Elementy z różnych czynników komutują i każdy element ma jednoznaczny rozkład $(g,h) = (g, e_H)(e_G, h)$.

**Stwierdzenie 5.1.12** (Wewnętrzny iloczyn prosty)**.** *Jeśli $G, H$ są normalnymi podgrupami $K$, $G \cap H = \{e\}$ i $K = GH$, to $F : G \times H \to K$, $F(g,h) = gh$, jest izomorfizmem. Zapis $GH$ oznacza zbiór wszystkich iloczynów $gh$.*

*Dowód.* Komutator $ghg^{-1}h^{-1}$ należy do $G$ i do $H$ przez normalność, więc jest jedynką. Dlatego $gh = hg$ i

$$F(g_1 g_2, h_1 h_2) = g_1 g_2 h_1 h_2 = g_1 h_1 g_2 h_2 = F(g_1, h_1) F(g_2, h_2).$$

Warunek $K = GH$ daje surjektywność. Jeśli $F(g,h) = e$, to $g = h^{-1} \in G \cap H$, zatem $g = h = e$; jądro jest trywialne. □

**Przykład 5.1.13** (Grupy cykliczne i grupa Kleina)**.** Grupę generowaną przez jeden element nazywamy *cykliczną*. Piszemy $C_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ dla $m \geq 1$. Rząd elementu jest najmniejszą dodatnią liczbą potęg dającą jedynkę, o ile taka liczba istnieje. W $C_m \times C_n$ element $([1],[1])$ ma rząd $\operatorname{lcm}(m,n)$: jego $j$-krotność znika dokładnie wtedy, gdy $m \mid j$ i $n \mid j$. Dla $\gcd(m,n) = 1$ rząd wynosi $mn$, więc ten element generuje całą grupę i $C_m \times C_n \cong C_{mn}$. Na przykład $C_2 \times C_3 \cong C_6$. Natomiast w $V_4 := C_2 \times C_2$, zwanej *grupą Kleina*, każdy niezerowy element ma rząd dwa, więc nie ma generatora całej czteroelementowej grupy.

### Iloczyn półprosty grup

Teraz jedna grupa może zmieniać sposób działania drugiej. *Automorfizmem* grupy $N$ nazywamy izomorfizm $N \to N$; ich grupa ze składaniem to $\operatorname{Aut}(N)$. Działanie $H$ na $N$ przez automorfizmy jest homomorfizmem $\varphi : H \to \operatorname{Aut}(N)$, a więc $\varphi(h_1 h_2) = \varphi(h_1) \circ \varphi(h_2)$.

**Definicja 5.1.14** (Iloczyn półprosty)**.** *Iloczyn półprosty* $N \rtimes_\varphi H$ ma zbiór elementów $N \times H$ i mnożenie

$$(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 \varphi(h_1)(n_2), h_1 h_2).$$

Gdy działanie jest ustalone, skracamy zapis do $N \rtimes H$.

Sprawdźmy łączność. Pierwsza współrzędna obu sposobów mnożenia trzech elementów jest równa

$$n_1 \varphi(h_1)(n_2) \varphi(h_1 h_2)(n_3) = n_1 \varphi(h_1)\big(n_2 \varphi(h_2)(n_3)\big).$$

Druga to $h_1h_2h_3$. Jedynką jest $(e_N, e_H)$, a

$$(n,h)^{-1} = (\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1});$$

wstawienie tego wzoru po obu stronach daje jedynkę. Inkluzje $n \mapsto (n, e_H)$ i $h \mapsto (e_N, h)$ są homomorfizmami. Pierwszy obraz jest normalny jako jądro homomorfizmu $(n,h) \mapsto h$. Drugi nie musi być normalny, a wzór

$$(e_N, h)(n, e_H)(e_N, h)^{-1} = (\varphi(h)(n), e_H)$$

pokazuje, że zadane działanie realizuje się przez sprzężenie. Dla działania trywialnego, $\varphi(h) = \mathrm{id}_N$, odzyskujemy iloczyn prosty.

**Stwierdzenie 5.1.15** (Wewnętrzny iloczyn półprosty)**.** *Niech $N, H \leq G$, $N \trianglelefteq G$, $N \cap H = \{e\}$ i $G = NH$. Wtedy $G \cong N \rtimes H$, z działaniem $\varphi(h)(n) = hnh^{-1}$.*

*Dowód.* Normalność zapewnia, że sprzężenie przez $h$ jest automorfizmem $N$, a składanie sprzężeń daje homomorfizm $\varphi$. Dla $F(n,h) = nh$ mamy

$$F(n_1(h_1n_2h_1^{-1}), h_1h_2) = n_1h_1n_2h_2 = F(n_1,h_1)F(n_2,h_2).$$

Surjektywność wynika z $G = NH$, a $nh = e$ wymusza $n = h^{-1} \in N \cap H = \{e\}$, więc $F$ jest iniektywny. □

*Uwaga* 5.1.16 (Rozszczepiony ciąg dokładny). Zapis $1 \to N \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H \to 1$ oznacza, że $i$ jest iniekcją, $p$ surjekcją i $i(N) = \ker p$; to *krótki ciąg dokładny grup*, czyli rozszerzenie $H$ przez $N$. Jest *rozszczepiony*, gdy istnieje homomorfizm $s : H \to G$ z $p \circ s = \mathrm{id}_H$. Dla iloczynu półprostego są to $i(n) = (n, e_H)$, $p(n,h) = h$ i $s(h) = (e_N, h)$. Odwrotnie, w rozszczepionym ciągu $s$ jest iniektywny, $i(N) \cap s(H) = \{e\}$ i każdy $g \in G$ ma rozkład $g = (g\, s(p(g))^{-1})s(p(g))$, z pierwszym czynnikiem w $\ker p$. Poprzednie stwierdzenie daje zatem $G \cong N \rtimes H$.

**Przykład 5.1.17** (Grupa diedralna)**.** Dla $n \geq 3$ niech $r$ będzie obrotem foremnego $n$-kąta o $2\pi/n$, a $s$ jego odbiciem. Mamy $r^n = s^2 = e$ i $srs^{-1} = r^{-1}$. Każda symetria ma postać $r^j$ lub $r^j s$, $0 \leq j < n$: jej obraz jednego wierzchołka i wybór kierunku do sąsiedniego wyznaczają całą symetrię. Te $2n$ możliwości są różne. Grupa symetrii $D_n$ jest więc $C_n \rtimes C_2$, gdzie nietrywialny element $C_2$ odwraca generator $C_n$. Dla trójkąta wszystkie permutacje trzech wierzchołków są symetriami, stąd $S_3 \cong C_3 \rtimes C_2$.

**Przykład 5.1.18** (Grupa afiniczna)**.** Grupa odwracalnych macierzy rzeczywistych $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ działa na addytywnej grupie $\mathbb{R}^n$ przez $A \cdot v = Av$. Grupa odwracalnych odwzorowań afinicznych $x \mapsto Ax + v$ to $\mathrm{Aff}(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, ponieważ

$$A(Bx + w) + v = ABx + (v + Aw), \qquad (v, A)(w, B) = (v + Aw, AB).$$

Macierz i przesunięcie są jednoznaczne: $v$ jest obrazem zera, a $A$ jest częścią liniową. Czynnik $Aw$ odróżnia ten iloczyn od iloczynu prostego.

**Przykład 5.1.19** (Ruchy euklidesowe)**.** Niech $\mathrm{O}(n) = \{A : A^TA = I\}$ i $\mathrm{SO}(n) = \{A \in \mathrm{O}(n) : \det A = 1\}$. Grupa izometrii przestrzeni euklidesowej to $E(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{O}(n)$, z tym samym prawem składania. Istotnie, dla izometrii $f$ połóżmy $v = f(0)$ i $g(x) = f(x) - v$. Tożsamość polaryzacyjna i zachowanie odległości dają $\langle g(x), g(y)\rangle = \langle x, y\rangle$. Wektory $g(e_i)$ tworzą bazę ortonormalną, a współrzędne $g(x)$ w tej bazie wynoszą $\langle g(x), g(e_i)\rangle = x_i$. Zatem $g(x) = \sum_i x_i g(e_i) = Ax$ z $A \in \mathrm{O}(n)$. Odwrotnie, każde $Ax + v$ z taką macierzą zachowuje odległości. Izometrie zachowujące orientację tworzą $E^+(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{SO}(n)$. Więcej o grupach macierzowych znajduje się w Dodatku C.

*Uwaga* 5.1.20 (Kolejność czynników i wybór działania). W zapisie $N \rtimes H$ (również $H \ltimes N$) normalny jest czynnik $N$, a $H$ działa na nim przez automorfizmy. Same grupy $N, H$ nie wyznaczają wyniku: dla $C_3, C_2$ działanie trywialne daje abelową grupę $C_6$, a odwracanie generatora daje nieabelową $S_3$. Dlatego przy nieustalonym działaniu zachowujemy zapis $N \rtimes_\varphi H$.

## 5.2 Pierścienie, ideały i ilorazy

W grupie normalność podgrupy pozwala utworzyć iloraz. Dla pierścieni podobną rolę pełni ideał: trzeba zachować nie tylko dodawanie, lecz także mnożenie klas przez dowolne elementy pierścienia.

**Definicja 5.2.1** (Pierścień przemienny i homomorfizm)**.** *Pierścień przemienny z jedynką* $R$ ma dwa działania $+$ i mnożenie. Grupa $(R,+,0)$ jest abelowa, mnożenie jest łączne i przemienne, ma jedynkę 1, a rozdzielność $r(s+t)=rs+rt$ wiąże oba działania. Pierścień zerowy z $1=0$ jest dozwolony. *Homomorfizm pierścieni* $\varphi: R\to S$ zachowuje dodawanie, mnożenie i jedynkę: $\varphi(1_R)=1_S$.

Przykładami są $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ i pierścień wielomianów $\mathbb{K}[t]$ nad ciałem $\mathbb{K}$. W $\mathbb{Z}$ nie każdy niezerowy element ma odwrotność mnożeniową: równanie $2x=1$ nie ma rozwiązania w $\mathbb{Z}$. Definicja pierścienia, w odróżnieniu od definicji ciała, nie wymaga takich odwrotności.

**Definicja 5.2.2** (Dziedzina całkowitości i ciało)**.** Niezerowy element $a$ pierścienia przemiennego jest *dzielnikiem zera*, jeśli $ab=0$ dla pewnego $b\neq 0$. *Dziedzina całkowitości* to pierścień przemienny z $1\neq 0$ bez dzielników zera, czyli $ab=0$ wymusza $a=0$ lub $b=0$. Pozwala to skracać niezerowy czynnik: z $ac=bc$ i $c\neq 0$ wynika $(a-b)c=0$, więc $a=b$. *Ciało* jest pierścieniem przemiennym z $1\neq 0$, w którym każdy niezerowy element ma odwrotność mnożeniową.

Każde ciało jest dziedziną: z $ab=0$, $a\neq 0$, po pomnożeniu przez $a^{-1}$ dostajemy $b=0$. Dziedzina $\mathbb{Z}$ nie jest ciałem, natomiast $\mathbb{Q}$ jest ciałem. Również $\mathbb{K}[t]$ nad ciałem jest dziedziną, bo iloczyn niezerowych współczynników wiodących jest niezerowy. Pierścień $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ nie jest dziedziną: $[2][3]=[0]$, choć oba czynniki są niezerowe.

**Definicja 5.2.3** (Ideał i pierścień ilorazowy)**.** *Ideał* $I\subseteq R$ jest podgrupą addytywną zamkniętą na mnożenie przez elementy $R$: jeśli $r\in R$ i $x\in I$, to $rx\in I$. Pierścień $R/I$ ma klasy $[r]=r+I$ oraz działania $[r]+[s]=[r+s]$, $[r][s]=[rs]$.

*Dlaczego iloraz jest dobrze określony?* Jeżeli $r'=r+i$ i $s'=s+j$ dla $i,j\in I$, to $r's'-(r+s)=i+j\in I$ oraz $r's'-rs=rj+is+ij\in I$. Dlatego wynik obu działań nie zależy od wyboru przedstawicieli. Jądro homomorfizmu $\varphi: R\to S$ jest ideałem: dla $\varphi(x)=0$ mamy $\varphi(rx)=\varphi(r)\varphi(x)=0$. Gdy $I=R$, iloraz jest pierścieniem zerowym z $[1]=[0]$. □

**Przykład 5.2.4** (Dwie relacje w pierścieniach)**.** Niech $m\geq 2$. Ideał $m\mathbb{Z}$ narzuca relację $m=0$, a iloraz $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ jest pierścieniem reszt modulo $m$. W $\mathbb{K}[t]$ ideał $(t):=t\mathbb{K}[t]=\{tf(t): f\in\mathbb{K}[t]\}$ składa się z wielomianów o zerowym wyrazie stałym. Ewaluacja $f(t)\mapsto f(0)$ ma jądro $(t)$, a odwzorowanie $[f]\mapsto f(0)$ daje izomorfizm $\mathbb{K}[t]/(t)\cong\mathbb{K}$. Istotnie, każda klasa zawiera dokładnie jedną stałą, bo $f(t)-f(0)$ jest podzielny przez $t$.

## 5.3 Moduły, homomorfizmy i ilorazy

Przez $R$ oznaczamy pierścień przemienny z jedynką $1\neq 0$ w sensie Definicji 5.2.1. Pozwala to traktować wszystkie moduły jednakowo, bez rozróżniania strony działania. Wiele definicji działa również dla pierścieni nieprzemiennych i modułów lewych; zaznaczymy, gdzie przemienność upraszcza zapis.

**Definicja 5.3.1** (Moduł nad pierścieniem)**.** *Moduł* $M$ *nad* $R$ to grupa abelowa $(M,+,0)$ z mnożeniem przez skalary $R\times M\to M$, $(r,m)\mapsto rm$, takim że dla $r,s\in R$ i $m,n\in M$ mamy

$$(r+s)m=rm+sm,\qquad r(m+n)=rm+rn,\qquad (rs)m=r(sm),\qquad 1m=m.$$

Grupa abelowa oznacza tutaj, że dodawanie w $M$ jest łączne, przemienne, ma element 0 i każdy element $m$ ma element przeciwny $-m$.

Definicja różni się od definicji przestrzeni liniowej jedynie tym, że nie wymagamy dzielenia przez niezerowy skalar. Ta różnica ma poważne skutki: moduł może nie mieć bazy, a równanie $rm = 0$ może zachodzić dla $r \neq 0$ i $m \neq 0$. W przypadku grup abelowych, czyli $\mathbb{Z}$-modułów, opisujemy to precyzyjnie następująco.

**Definicja 5.3.2** (Element torsyjny i $m$-torsja)**.** Element $x$ grupy abelowej $M$ jest *torsyjny*, jeśli istnieje liczba całkowita $k \neq 0$ taka, że $kx = 0$. Zbiór takich elementów oznaczamy $\mathrm{Tors}(M)$ i nazywamy *podgrupą torsyjną*. Dla ustalonego $m \geq 2$ definiujemy *$m$-torsję*

$$M[m] := \{x \in M : mx = 0\} = \ker(\times m : M \to M).$$

Podgrupa $M[m]$ składa się z elementów zabijanych przez tę jedną liczbę $m$; cały $\mathrm{Tors}(M)$ dopuszcza różne niezerowe liczby dla różnych elementów.

Oba zbiory są rzeczywiście podgrupami: jeśli $kx = 0$ i $\ell y = 0$, to $k\ell(x - y) = 0$; dla ustalonego $m$ mamy od razu $m(x - y) = mx - my = 0$. Na przykład $\mathrm{Tors}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2) = 0 \oplus \mathbb{Z}/2$, podczas gdy $\mathbb{Z}$ nie ma niezerowej torsji.

**Przykład 5.3.3** (Od grup abelowych do spinorów)**.** 1. Każda przestrzeń liniowa nad ciałem $\mathbb{K}$ jest $\mathbb{K}$-modułem.

2. Każda grupa abelowa $A$ jest $\mathbb{Z}$-modułem: $na$ dla $n > 0$ oznacza sumę $n$ kopii $a$, $0a = 0$, a $(-n)a = -(na)$. Aksjomaty modułu wynikają z praw dodawania. Odwrotnie, w każdym $\mathbb{Z}$-module aksjomaty wymuszają właśnie tę regułę, więc pojęcia są równoważne.

3. Dla $m \geq 2$ grupa $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ jest $\mathbb{Z}$-modułem; niezerowa klasa $[1]$ spełnia $m[1] = 0$. Nie ma bazy nad $\mathbb{Z}$. Istotnie, gdyby $[1] = \sum_i a_i e_i$ w takiej bazie, równość $\sum_i m a_i e_i = 0$ i jednoznaczność współczynników wymuszałyby $ma_i = 0$ w $\mathbb{Z}$ dla każdego $i$. Stąd wszystkie $a_i = 0$, sprzecznie z $[1] \neq 0$.

4. $R/I$ dla ideału $I \subseteq R$ jest $R$-modułem: $r[s] = [rs]$. Działanie jest dobrze określone, gdyż z $s - s' \in I$ wynika $r(s - s') \in I$.

5. Moduł spinorów z Definicji 4.6.1 jest modułem nad zespoloną algebrą Clifforda. Tam algebra może być nieprzemienna i działanie jest *lewe*; jest to przykład szerszego pojęcia modułu lewego. W głównej części obecnego rozdziału ograniczamy się do pierścieni przemiennych, wystarczających w podstawowych przykładach grup homologii.

**Definicja 5.3.4** (Podmoduł, homomorfizm i moduł wolny)**.** Podzbiór $N \subseteq M$ jest *podmodułem*, jeśli zawiera 0 i jest zamknięty na dodawanie, branie elementów przeciwnych oraz mnożenie przez elementy $R$. *Homomorfizm $R$-modułów* $f : M \to N$ spełnia $f(m + m') = f(m) + f(m')$ i $f(rm) = rf(m)$. Zbiór takich homomorfizmów oznaczamy przez $\mathrm{Hom}_R(M, N)$.

Moduł *wolny* z bazą $(e_i)_{i \in I}$ ma tę własność, że każdy element jest jednoznaczną skończoną sumą $\sum_{i \in I} r_i e_i$. Modelem jest $R^{(I)}$, czyli rodziny współczynników o skończonym nośniku. Suma prosta $M \oplus N$ składa się z par $(m, n)$ z działaniami składowymi.

Przy dodawaniu punktowym i działaniu $(rf)(m) = rf(m)$ zbiór $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ jest $R$-modułem. Przemienność $R$ zapewnia $R$-liniowość $rf$: $(rf)(sm) = rsf(m) = s(rf)(m)$. Na przykład $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}) = 0$, bo obraz klasy $[1]$ musiałby być elementem $\mathbb{Z}$ zabijanym przez 2.

**Definicja 5.3.5** (Moduł ilorazowy)**.** Niech $M$ będzie $R$-modułem, a $N \subseteq M$ jego podmodułem. Na $M$ wprowadzamy relację równoważności

$$m \sim m' \quad \Longleftrightarrow \quad m - m' \in N.$$

Klasę równoważności elementu $m \in M$ oznaczamy przez

$$[m] = m + N.$$

Zbiór wszystkich klas

$$M/N := \{m + N : m \in M\}$$

nazywamy *modułem ilorazowym* $M$ przez $N$.

Działania definiujemy wzorami

$$[m] + [m'] = [m + m'], \qquad r[m] = [rm].$$

Są one dobrze określone. Istotnie, jeśli

$$m - \widetilde{m} \in N, \qquad m' - \widetilde{m}' \in N,$$

to

$$(m + m') - (\widetilde{m} + \widetilde{m}') = (m - \widetilde{m}) + (m' - \widetilde{m}') \in N,$$

a dla $r \in R$

$$rm - r\widetilde{m} = r(m - \widetilde{m}) \in N.$$

Naturalne odwzorowanie

$$\pi \colon M \to M/N, \qquad \pi(m) = [m],$$

jest surjektywnym homomorfizmem $R$-modułów, a jego jądrem jest dokładnie $N$:

$$\ker \pi = N.$$

Otrzymujemy więc krótki ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \xrightarrow{\pi} M/N \longrightarrow 0.$$

**Twierdzenie 5.3.6** (Pierwsze twierdzenie o izomorfizmie)**.** *Dla homomorfizmu $f : M \to P$ jądro i obraz są podmodułami, a odwzorowanie*

$$\overline{f} : M/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad [m] \longmapsto f(m)$$

*jest izomorfizmem $R$-modułów.*

*Dowód.* Jeśli $f(m) = f(m') = 0$, to $f(m - m') = 0$ i $f(rm) = 0$; zatem jądro jest podmodułem. Obraz jest nim, ponieważ $f(m) + f(m') = f(m + m')$ oraz $rf(m) = f(rm)$. Jeśli $[m] = [m']$ modulo $\ker f$, to $f(m - m') = 0$, więc $f(m) = f(m')$: wzór jest dobrze określony. Jest liniowy i surjektywny na obraz. Równość $\overline{f}([m]) = 0$ oznacza $m \in \ker f$, czyli $[m] = [0]$; stąd jest również injektywny. □

**Przykład 5.3.7.** Dla $M = \mathbb{Z}$ i $N = m\mathbb{Z}$ otrzymujemy

$$M/N = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

Jest to moduł nad $\mathbb{Z}$, lecz dla $m > 1$ nie jest modułem wolnym. Przykład ten pokazuje, że iloraz modułu wolnego przez podmoduł nie musi być modułem wolnym.

**Stwierdzenie 5.3.8** (Wymiar przestrzeni ilorazowej)**.** *Niech $\mathbb{K}$ będzie ciałem, $M$ skończenie wymiarową $\mathbb{K}$-przestrzenią wektorową, a $N \subseteq M$ podprzestrzenią. Wówczas*

$$\dim_{\mathbb{K}}(M/N) = \dim_{\mathbb{K}} M - \dim_{\mathbb{K}} N.$$

*Dowód.* Niech

$$e_1, \ldots, e_k$$

będzie bazą $N$. Uzupełnijmy ją do bazy $M$:

$$e_1, \ldots, e_k, e_{k+1}, \ldots, e_n.$$

Pokażemy, że klasy

$$[e_{k+1}], \ldots, [e_n]$$

tworzą bazę $M/N$.

Każdy $m \in M$ ma postać

$$m = \sum_{i=1}^{k} a_i e_i + \sum_{i=k+1}^{n} a_i e_i.$$

Ponieważ

$$\sum_{i=1}^{k} a_i e_i \in N,$$

w module ilorazowym mamy

$$[m] = \sum_{i=k+1}^{n} a_i [e_i],$$

więc wskazane klasy generują $M/N$.

Jeśli zaś

$$\sum_{i=k+1}^{n} a_i [e_i] = [0],$$

to

$$\sum_{i=k+1}^{n} a_i e_i \in N.$$

Z jednoznaczności rozwinięcia względem bazy $e_1, \ldots, e_n$ wynika

$$a_{k+1} = \cdots = a_n = 0.$$

Klasy są więc liniowo niezależne. Zatem

$$\dim_{\mathbb{K}}(M/N) = n - k.$$

□

Dla modułów nad dziedziną całkowitości analogiczny wzór sformułujemy po zdefiniowaniu iloczynu tensorowego modułów.

## 5.4 Iloczyn tensorowy modułów

W Rozdziale 3 konstruowaliśmy iloczyny tensorowe przestrzeni liniowych nad ciałem. Nad pierścieniem budujemy podobny obiekt, lecz nie wolno już korzystać z bazy dowolnego modułu. Intuicja pozostaje ta sama: symbol $m \otimes n$ ma być liniowy w obu argumentach, a każda dwuliniowa reguła na parach powinna przechodzić przez jedno odwzorowanie liniowe.

**Definicja 5.4.1** (Iloczyn tensorowy modułów)**.** Niech $M, N$ będą $R$-modułami. Weźmy wolny $R$-moduł $F = R^{(M\times N)}$ na formalnych symbolach $[(m,n)]$, po jednym dla każdej pary $(m,n)$. Nawias kwadratowy oznacza tu generator wolnego modułu; dopiero $[(m,n)] + K$ będzie jego klasą w ilorazie. Niech $K \subseteq F$ będzie podmodułem generowanym przez wszystkie elementy

$$\begin{aligned}
&[(m+m',n)] - [(m,n)] - [(m',n)],\\
&[(m,n+n')] - [(m,n)] - [(m,n')],\\
&[(rm,n)] - r[(m,n)], \qquad [(m,rn)] - r[(m,n)],
\end{aligned}$$

gdzie $m, m' \in M$, $n, n' \in N$ i $r \in R$. *Iloczyn tensorowy* to $M \otimes_R N = F/K$, a $m \otimes n$ oznacza klasę $[(m,n)] + K$.

Podmoduł generowany przez relacje składa się z ich *skończonych* kombinacji $R$-liniowych. To jest algebraiczny sens narzucenia relacji. Ukończony iloczyn tensorowy jest innym pojęciem: wymaga dodatkowej topologii lub normy na modułach i nie występuje w tej konstrukcji. Z definicji $rm \otimes n = m \otimes rn = r(m \otimes n)$. Każdy element jest skończoną sumą tensorów prostych, lecz nie musi być jednym tensorem prostym.

**Twierdzenie 5.4.2** (Własność uniwersalna iloczynu tensorowego)**.** *Dla każdego $R$-modułu $P$ i każdego odwzorowania $R$-dwuliniowego $b : M \times N \to P$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm $\widetilde{b} : M \otimes_R N \to P$ spełniający $\widetilde{b}(m \otimes n) = b(m,n)$.*

*Dowód.* Na wolnym module $F$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm $L : F \to P$ z $L([(m,n)]) = b(m,n)$: określamy go na bazie i przedłużamy liniowo. Addytywność i $R$-liniowość $b$ w każdej zmiennej oznaczają, że $L$ zeruje cztery rodzaje generatorów $K$. Stąd $K \subseteq \ker L$, więc wzór $\widetilde{b}(x+K) = L(x)$ jest dobrze określony. Tensory proste rozpinają iloraz $F/K$; wartości na nich wymuszają jednoznaczność. Ten sam argument, zastosowany w obie strony, pokazuje, że każda inna realizacja tej własności jest kanonicznie izomorficzna z $M \otimes_R N$. □

**Przykład 5.4.3** (Jednostka i iloraz przez ideał)**.** Odwzorowanie $R \otimes_R M \to M$, $r \otimes m \mapsto rm$, jest izomorfizmem; jego odwrotność wysyła $m$ na $1 \otimes m$. Jeśli $I \subseteq R$ jest ideałem, połóżmy $IM = \{\sum_{j=1}^{q} i_j m_j : i_j \in I,\ m_j \in M\}$. Wówczas

$$(R/I) \otimes_R M \cong M/IM, \qquad (r+I) \otimes m \longmapsto rm + IM. \tag{5.4.1}$$

Istotnie, wzór jest dwuliniowy i nie zależy od wyboru $r$, bo $im \in IM$ dla $i \in I$. Odwrotność wysyła $m + IM$ na $(1+I)\otimes m$. Jeśli $i \in I$, to $(1+I)\otimes im = (i+I)\otimes m = 0$; znika więc na całym $IM$. Oba złożenia są identycznościami na generatorach. Dla $R = \mathbb{Z}$ i $I = m\mathbb{Z}$ otrzymujemy $(\mathbb{Z}/m) \otimes_{\mathbb{Z}} A \cong A/mA$.

**Stwierdzenie 5.4.4** (Iloczyn tensorowy odwzorowań)**.** *Homomorfizm $f : M \to M'$ indukuje $f \otimes \mathrm{id}_N : M \otimes_R N \to M' \otimes_R N$ przez $(f \otimes \mathrm{id}_N)(m \otimes n) = f(m) \otimes n$. Jeśli $f$ jest surjekcją, to $f \otimes \mathrm{id}_N$ jest surjekcją. Funktor $- \otimes_R N$ nie musi zachowywać iniekcji.*

*Dowód.* Dwuliniowość odwzorowania $(m,n) \mapsto f(m) \otimes n$ i Twierdzenie 5.4.2 dają indukowany homomorfizm. Gdy $f$ jest surjekcją, każdy tensor prosty $m' \otimes n$ ma przeciwobraz $m \otimes n$ z $f(m) = m'$. Tensory proste rozpinają cel, więc indukowany homomorfizm jest surjekcją. Dla iniekcji $f = \times 2 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ oraz $N = \mathbb{Z}/2$ identyfikacja $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2 \cong \mathbb{Z}/2$ pokazuje, że $f \otimes \mathrm{id}_N$ jest odwzorowaniem zerowym: $(2z) \otimes [1] = z \otimes [2] = 0$. Nie jest zatem iniekcją. □

**Definicja 5.4.5** (Rozszerzenie skalarów)**.** Jeśli $\varphi : R \to S$ jest homomorfizmem pierścieni przemiennych z jedynką, to $S$ staje się $R$-modułem przez $r \cdot s = \varphi(r)s$. Na $M \otimes_R S$ działa $S$ przez $s \cdot (m \otimes a) = m \otimes sa$. Ten $S$-moduł nazywamy *rozszerzeniem skalarów* modułu $M$ wzdłuż $\varphi$.

Sprawdźmy relację zbalansowania dla działania $S$: dla $r \in R$ oraz $s, a \in S$ mamy

$$s \cdot ((rm) \otimes a) = m \otimes \varphi(r)sa = m \otimes s\varphi(r)a = s \cdot (m \otimes \varphi(r)a).$$

Przemienność $S$ uzasadnia środkową równość; relacje addytywności sprawdza się składnikowo. Dlatego działanie nie zależy od zapisu elementu jako sumy tensorów prostych. Dla wolnego $M = \bigoplus_{i \in J} Re_i$ mamy

$$M \otimes_R S \cong \bigoplus_{i \in J} Se_i, \quad (\textstyle\sum_i r_i e_i) \otimes s \longmapsto \sum_i \varphi(r_i) s e_i.$$

Odwrotność wysyła $\sum_i s_i e_i$ na $\sum_i e_i \otimes s_i$; wszystkie sumy są skończone. Ogólniej, dla rodziny $R$-modułów $(M_i)_{i \in J}$ otrzymujemy izomorfizm

$$\left( \bigoplus_{i \in J} M_i \right) \otimes_R N \longrightarrow \bigoplus_{i \in J} (M_i \otimes_R N), \qquad (m_i)_i \otimes n \longmapsto (m_i \otimes n)_i.$$

Wzór jest dwuliniowy i ma skończony nośnik, więc określa homomorfizm przez własność uniwersalną. Odwrotność na $i$-tym składniku wysyła $m \otimes n$ na $\iota_i(m) \otimes n$, gdzie $\iota_i$ jest inkluzją do sumy prostej. Oba złożenia są identycznościami na tensorach prostych, które rozpinają moduły. Funktor $- \otimes_R N$ zachowuje też izomorfizmy: dla izomorfizmu $f$ odwrotnością $f \otimes \mathrm{id}$ jest $f^{-1} \otimes \mathrm{id}$. Przykład z $\times 2$ ostrzega natomiast przed wnioskowaniem o dowolnych iniekcjach.

*Uwaga* 5.4.6 (Moduły rzutowe). Moduł $P$ jest *rzutowy*, gdy dla każdej surjekcji $q : E \twoheadrightarrow B$ i każdego homomorfizmu $g : P \to B$ istnieje podniesienie $\widetilde{g} : P \to E$ z $q\widetilde{g} = g$. Równoważnie, $P$ jest składnikiem prostym pewnego modułu wolnego. Jeśli $P$ jest rzutowy, wybieramy wolny moduł $F$ na symbolach elementów $P$ i jego naturalną surjekcję $q : F \twoheadrightarrow P$. Podnosimy $\mathrm{id}_P$ przez $q$; otrzymane rozszczepienie daje $F \cong P \oplus \ker q$. Odwrotnie, odwzorowanie z wolnego modułu można podnieść, wybierając przeciwobrazy wartości na bazie. Jeśli $F = P \oplus Q$, to dla $g : P \to B$ podnosimy $g \circ \mathrm{pr}_P : F \to B$ i ograniczamy otrzymane odwzorowanie do $P$. Moduł rzutowy nie musi być wolny: dla $R = \mathbb{Z}/6$ ideał $3R = \{0, 3\}$ jest składnikiem prostym w $R = 3R \oplus 4R$, lecz jego dwa elementy wykluczają izomorfizm z $R^{(J)}$. Rzeczywiście, $3R \cap 4R = \{0\}$, a $1 = 3 + 4$ w $R$ daje $r = 3r + 4r$ dla każdego $r \in R$. Niezerowy moduł wolny nad $R$ zawiera co najmniej sześć elementów, bo zawiera kopię $R$.

W zastosowaniach do nieprzemiennego pierścienia grupowego $\mathbb{Z}[\pi]$ rozróżnia się moduł prawy i lewy. Dla dowolnego pierścienia z jedynką $\Lambda$ oraz prawego modułu $M$ i lewego $N$ zaczynamy od *wolnej grupy abelowej* na parach $(m, n)$. Dzielimy ją przez podgrupę generowaną przez relacje addytywności w obu argumentach oraz $[(m\lambda, n)] - [(m, \lambda n)]$, $\lambda \in \Lambda$. Otrzymana grupa abelowa $M \otimes_\Lambda N$ spełnia $(m\lambda) \otimes n = m \otimes (\lambda n)$. Każde odwzorowanie do grupy abelowej, addytywne w obu argumentach i spełniające tę relację, przechodzi przez dokładnie jeden homomorfizm z iloczynu tensorowego: przedłużamy je na wolną grupę i dzielimy przez relacje, jak wyżej. Bez dodatkowych danych wynik nie ma naturalnej struktury $\Lambda$-modułu. Dla przemiennego $R$ utożsamiamy działanie prawe z lewym przez $mr = rm$ i odzyskujemy wcześniejszy $R$-moduł z działaniem $r(m \otimes n) = (rm) \otimes n$. Charakteryzacja rzutowości przez podnoszenie i składniki proste wolnych działa również tam.

## 5.5 Ranga modułu i ciało ułamków

Po rozszerzeniu skalarów z dziedziny całkowitości $R$ do jej ciała ułamków moduł staje się przestrzenią wektorową. Jej wymiar mierzy liczbę niezależnych kierunków, które pozostają po usunięciu torsji.

### Konstrukcja ciała ułamków

**Definicja 5.5.1** (Ciało ułamków)**.** Niech $R$ będzie dziedziną całkowitości i $S = R\setminus\{0\}$. Chcemy umożliwić dzielenie przez każdy element $S$. Na parach $(a,s) \in R \times S$ określamy relację

$$(a,s) \sim (b,t) \quad\Longleftrightarrow\quad ta = sb.$$

Klasę oznaczamy $a/s$, a zbiór klas przez $K = \operatorname{Frac}(R)$. Dodawanie i mnożenie mają znane z liczb wymiernych postacie

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{ta+sb}{st}, \qquad \frac{a}{s}\frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

*Poprawność konstrukcji.* Zbiór $S$ zawiera 1 i jest zamknięty na mnożenie, ponieważ $R$ nie ma dzielników zera. Mianowniki pozostają więc dozwolone. Zwrotność i symetria relacji są bezpośrednie. Jeśli $ta = sb$ oraz $ub = tc$, to $t(ua - sc) = 0$; skrócenie $t \neq 0$ daje $ua = sc$. Stąd przechodniość.

Jeśli $a/s = a'/s'$ i $b/t = b'/t'$, mamy $s'a = sa'$ oraz $t'b = tb'$. Po sprowadzeniu sum do wspólnego mianownika równość liczników wynika z

$$s't'(ta+sb) = st(t'a' + s'b'), \qquad s't'ab = sta'b'.$$

Druga równość sprawdza zarazem niezależność iloczynu od przedstawicieli. Prawa pierścienia wynikają z praw w $R$ po sprowadzeniu do wspólnego mianownika. Na przykład suma trzech ułamków ma licznik $tu\,a + su\,b + st\,c$ i mianownik $stu$ niezależnie od nawiasów; rozdzielność sprawdza się przez rozwinięcie liczników. Zerem jest $0/1$, jedynką $1/1$, a elementem przeciwnym do $a/s$ jest $(-a)/s$.

Równość $a/s = 0/1$ zachodzi dokładnie dla $a = 0$. Dla niezerowej klasy $a/s$ element $s/a$ jest więc dozwolony i $(a/s)(s/a) = 1$. Ponadto $0/1 \neq 1/1$. Otrzymaliśmy ciało. Odwzorowanie $R \to K$, $a \mapsto a/1$, zachowuje działania i jest iniektywne; odtąd utożsamiamy $R$ z jego obrazem. □

**Przykład 5.5.2** (Liczby i funkcje wymierne)**.** Dla $R = \mathbb{Z}$ konstrukcja daje $\operatorname{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$. Dla $R = \mathbb{K}[t]$ otrzymujemy ciało funkcji wymiernych $\mathbb{K}(t)$: elementy to ilorazy wielomianów $p(t)/q(t)$ z $q \neq 0$, przy równości przez mnożenie na krzyż. Nie wymagamy, by mianownik nie miał zer; chodzi o ułamki formalne, nie o funkcje określone w każdym punkcie $\mathbb{K}$.

### Lokalizacja modułu i jej związek z iloczynem tensorowym

Niech $S = R \setminus \{0\}$. Aby opisać elementy iloczynu tensorowego przez ułamki, definiujemy *lokalizację* $S^{-1}M$ jako zbiór klas par $(m,s) \in M \times S$ przy relacji

$$(m,s) \sim (m',s') \quad\Longleftrightarrow\quad t(s'm - sm') = 0 \text{ dla pewnego } t \in S.$$

Klasę pary $(m,s)$ oznaczamy $m/s$. Mianowniki stają się tu odwracalne: dla $M = R$ otrzymujemy $S^{-1}R = K$. Relacja jest zwrotna i symetryczna. Jeśli $u(s'm - sm') = 0$ i $v(s''m' - s'm'') = 0$, to $uvs'(s''m - sm'') = 0$, co daje przechodniość. Dodawanie i działanie $K$ określamy przez

$$\frac{m}{s} + \frac{m'}{s'} = \frac{s'm + sm'}{ss'}, \qquad \frac{a}{u}\cdot\frac{m}{s} = \frac{am}{us}.$$

Wzory nie zależą od przedstawicieli. Dla dodawania wynika to z tożsamości

$$tt'(s'm + sm') - ss'(t'n + tn') = t's'(tm - sn) + ts(t'm' - s'n'),$$

gdy $m/s = n/t$ oraz $m'/s' = n'/t'$; oba składniki po prawej stronie zeruje iloczyn odpowiednich elementów $S$. Jeśli ponadto $a/u = b/v$ w $K$, to $va = ub$ i różnica krzyżowa dla $am/(us)$ i $bn/(vt)$ wynosi $vatm - ubsn = va(tm - sn)$; zeruje ją ten sam element $S$ co różnicę $tm - sn$. Działanie $K$ jest więc dobrze określone.

W tym działaniu $a/u$ jest *skalarem* z $K$, a $m/s$ jest *wektorem* z $S^{-1}M$; nie mnożymy dwóch elementów modułu. Na $M \otimes_R K$ ten sam skalar działa wzorem

$$\frac{a}{u} \cdot \left( m \otimes \frac{b}{s} \right) = m \otimes \frac{ab}{us}.$$

Łączność działania na lokalizacji widać z równości

$$(a/u)((b/v)(m/s)) = (abm)/(uvs) = ((a/u)(b/v))(m/s).$$

Rozdzielność wynika ze wspólnych mianowników, a $1/1$ działa identycznie. Dostajemy więc przestrzeń wektorową nad $K$. W przypadku $M = R$ relacja lokalizacji redukuje się do mnożenia na krzyż, bo niezerowy $t$ można skrócić w $R$. W ogólnym module tego robić nie wolno: w $\mathbb{Z}$-module $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ element $[1]$ jest niezerowy, lecz $[1]/1 = 0$ w lokalizacji, gdyż $2[1] = 0$. Właśnie dlatego relacja zawiera dodatkowy czynnik $t$.

**Przykład 5.5.3** (Dwie lokalizacje nad liczbami całkowitymi)**.** Dla $M = \mathbb{Z}$ mamy $S^{-1}M = \mathbb{Q}$ i na przykład $(2/3) \cdot (5/7) = 10/21$. Dla $M = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ torsyjny składnik znika:

$$S^{-1}M \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad (a, [b])/s \longmapsto a/s$$

jest izomorfizmem, z odwrotnością $a/s \mapsto (a, [0])/s$. Istotnie, różnicę $(0, [b])/s$ zeruje $2$, a równość dwóch pierwszych współrzędnych sprawdza się przez mnożenie na krzyż.

**Stwierdzenie 5.5.4** (Iloczyn tensorowy z ciałem ułamków)**.** *Niech $R$ będzie dziedziną całkowitości, $S = R \setminus \{0\}$ i $K = \operatorname{Frac}(R)$. Dla każdego $R$-modułu $M$ istnieje naturalny izomorfizm*

$$M \otimes_R K \cong S^{-1}M, \qquad m \otimes \frac{a}{s} \longmapsto \frac{am}{s}.$$

*W szczególności $m/s = 0$ dokładnie wtedy, gdy $tm = 0$ dla pewnego $t \in S$.*

*Dowód.* Z definicji lokalizacji $m/s = 0/1$ dokładnie wtedy, gdy pewien $t \in S$ zeruje $m$. Podany wzór jest $R$-dwuliniowy i nie zależy od wyboru przedstawiciela $a/s \in K$, więc przez Twierdzenie 5.4.2 określa homomorfizm $M \otimes_R K \to S^{-1}M$. W drugą stronę kładziemy $m/s \mapsto m \otimes (1/s)$. Jeśli $(m, s) \sim (m', s')$, to dla pewnego $t \in S$ zachodzi $t(s'm - sm') = 0$, a więc

$$m \otimes \frac{1}{s} - m' \otimes \frac{1}{s'} = (s'm - sm') \otimes \frac{1}{ss'} = t(s'm - sm') \otimes \frac{1}{tss'} = 0.$$

Odwzorowanie odwrotne jest więc dobrze określone. Wzór na dodawanie ułamków pokazuje jego addytywność; podobnie sprawdza się zgodność z działaniem $K$. Oba złożenia są identycznościami na klasach ułamków i tensorach prostych, które generują odpowiednie moduły. Ponadto dla homomorfizmu $f : M \to M'$ oba sposoby przeniesienia klasy $m/s$ dają $f(m)/s$; izomorfizm jest więc naturalny. □

### Ranga i jej addytywność

**Definicja 5.5.5** (Ranga modułu nad dziedziną całkowitości)**.** Niech $R$ będzie dziedziną całkowitości, a

$$K = \mathrm{Frac}(R)$$

jej ciałem ułamków. Rangą $R$-modułu $M$ nazywamy liczbę

$$\mathrm{rank}_R M := \dim_K(M \otimes_R K),$$

o ile wymiar po prawej stronie jest skończony.

Jeśli $M$ jest wolnym modułem o $n$ generatorach bazowych, to $M \cong R^n$ i wzór na rozszerzenie skalarów daje $M \otimes_R K \cong K^n$. Zatem $\mathrm{rank}_R M = n$.

**Stwierdzenie 5.5.6** (Addytywność rangi)**.** *Niech $R$ będzie dziedziną całkowitości oraz $N \subseteq M$ podmodułem. Jeśli odpowiednie rangi są skończone, to*

$$\mathrm{rank}_R M = \mathrm{rank}_R N + \mathrm{rank}_R(M/N).$$

*W szczególności*

$$\mathrm{rank}_R(M/N) = \mathrm{rank}_R M - \mathrm{rank}_R N.$$

*Dowód.* Z krótkiego ciągu dokładnego

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

po utworzeniu iloczynu tensorowego każdego składnika z ciałem ułamków $K = \mathrm{Frac}(R)$ otrzymujemy ciąg dokładny przestrzeni wektorowych

$$0 \longrightarrow N \otimes_R K \longrightarrow M \otimes_R K \longrightarrow (M/N) \otimes_R K \longrightarrow 0.$$

Wyjaśnijmy tu krok o dokładności, korzystając z izomorfizmu 5.5.4. Jeśli $n/s$ dla $n \in N$ znika w $M \otimes_R K$, to $tn = 0$ dla pewnego $t \in S$ już w $N$, więc $n/s = 0$ także w $N \otimes_R K$. Jeśli obraz $m/s$ znika w $(M/N) \otimes_R K$, to dla pewnego $t \in S$ mamy $tm \in N$, a więc $m/s = (tm)/(ts)$ należy do obrazu $N \otimes_R K$. Surjektywność na końcu wynika z podnoszenia licznika klasy $[m]/s$. Dla skończenie wymiarowych przestrzeni wektorowych wymiar jest addytywny w krótkich ciągach dokładnych, zatem

$$\dim_K(M \otimes_R K) = \dim_K(N \otimes_R K) + \dim_K((M/N) \otimes_R K),$$

co jest dokładnie żądanym wzorem. □

*Uwaga* 5.5.7. Dla ogólnego pierścienia $R$ nie należy bez dodatkowych założeń pisać wzoru

$$\dim(M/N) = \dim M - \dim N.$$

Pojęcie wymiaru jest naturalne dla przestrzeni wektorowych, natomiast dla modułów stosuje się między innymi rangę, liczbę generatorów oraz – w przypadku skończenie generowanych modułów nad pierścieniami głównymi – rozkład na część wolną i torsyjną.

Na przykład $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ma rangę zerową jako $\mathbb{Z}$-moduł, mimo że jest modułem niezerowym. Ranga nie wykrywa więc torsji.

*Dalsza lektura:* Konstrukcję iloczynu wolnego i jego związek z topologią opisuje Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, sekcja 1.2, *Free Products of Groups*, s. 41–42, https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf. Iloczyn tensorowy nad pierścieniem przemiennym rozwija *The Stacks Project*, sekcja 10.12, *Tensor products*, https://stacks.math.columbia.edu/tag/00CV. Lokalizację opisuje sekcja 10.9 tego samego źródła, https://stacks.math.columbia.edu/tag/00CM. Powyższe konstrukcje i dowody nie wymagają jeszcze algebry homologicznej.

# Rozdział 6

# Algebra homologiczna: kompleksy i (ko)homologie

Grupy, moduły i iloczyn tensorowy zebraliśmy w Rozdziale 5. Teraz badamy ciągi odwzorowań między modułami. W kompleksie łańcuchowym elementy spełniające $\partial x = 0$ są cyklami; część z nich ma postać $x = \partial y$ i jest brzegami. Iloraz cykli przez brzegi tworzy homologię. W kohomologii strzałki biegną w przeciwną stronę. Na razie prowadzimy rachunek algebraiczny; później zastosujemy go do przestrzeni.

O ile nie zaznaczono inaczej, $R$ jest pierścieniem przemiennym z jedynką $1 \neq 0$, moduły są $R$-modułami, a odwzorowania między nimi są $R$-liniowe. Zachowujemy więc konwencję z Sekcji 5.3; w szczególności $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ jest znów $R$-modułem.

## 6.1 Ciągi modułów i dokładność

Mając kolejne homomorfizmy

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots,$$

pytamy, które elementy $M_i$ przychodzą z lewej i które znikają po wysłaniu w prawo. Samo słowo *dokładny* odnosi się do ciągu *w danym miejscu*, a nie do pojedynczego modułu.

**Definicja 6.1.1** (Dokładność ciągu)**.** Ciąg jest *dokładny w* $M_i$, jeśli

$$\operatorname{im} f_{i-1} = \ker f_i.$$

Jest *dokładny*, jeśli tak jest w każdym jego miejscu. Równość zawiera dwa żądania: $f_i f_{i-1} = 0$ oraz to, że każdy element zabity przez $f_i$ już pochodzi z $M_{i-1}$. *Długi ciąg dokładny* ma wiele następujących po sobie takich miejsc; może rozciągać się w obie strony bez wyznaczonego początku.

Ponieważ jedyne odwzorowanie $0 \to M$ ma obraz 0, warunek dokładności $0 \to A \xrightarrow{i} B$ w $A$ mówi $\ker i = 0$, czyli $i$ jest iniekcją. Analogicznie dokładność $B \xrightarrow{p} C \to 0$ w $C$ mówi $\operatorname{im} p = C$, czyli $p$ jest surjekcją.

**Definicja 6.1.2** (Krótki ciąg dokładny)**.** Ciąg

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0 \tag{6.1.1}$$

jest *krótki i dokładny*, gdy $i$ jest iniekcją, $p$ jest surjekcją oraz $\operatorname{im} i = \ker p$. Wtedy $C \cong B/i(A)$ przez Twierdzenie 5.3.6 zastosowane do $p$. Mówimy też, że $B$ jest *rozszerzeniem* $C$ przez $A$.

**Przykład 6.1.3** (Reszty z dzielenia)**.** Dla $m \geq 2$ mamy krótki ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \pi(k) = [k].$$

Pierwsze odwzorowanie jest iniektywne: $mk = 0$ w $\mathbb{Z}$ pociąga $k = 0$. Odwzorowanie $\pi$ jest surjektywne, bo każda klasa ma reprezentanta. Jej jądro to dokładnie wielokrotności $m$, czyli obraz pierwszego odwzorowania.

Krótki ciąg może, ale nie musi, rozkładać się na dwie niezależne części. Nie należy mylić wyboru dowolnego przedstawiciela każdej klasy z *liniowym* wyborem przedstawicieli.

**Twierdzenie 6.1.4** (Kiedy krótki ciąg się rozszczepia?)**.** *Dla* (6.1.1) *równoważne są:*

1. *istnieje homomorfizm $s : C \to B$ z $ps = \mathrm{id}_C$ (przekrój $p$);*
2. *istnieje homomorfizm $r : B \to A$ z $ri = \mathrm{id}_A$ (retrakcja $i$);*
3. *istnieje izomorfizm $B \cong A \oplus C$ zgodny z odwzorowaniami $i(a) = (a, 0)$ i $p(a, c) = c$.*

*Wtedy ciąg nazywamy* rozszczepionym.

*Dowód.* Załóżmy najpierw, że mamy $s$. Każde $b \in B$ można rozłożyć jako

$$b = (b - s(p(b))) + s(p(b)).$$

Pierwszy składnik leży w $\ker p = \operatorname{im} i$. Ponieważ $i$ jest iniekcją, istnieje dokładnie jeden $a \in A$ taki, że $i(a) = b - s(p(b))$. Odwzorowanie $\Phi : A \oplus C \to B$, $\Phi(a, c) = i(a) + s(c)$ jest więc surjektywne. Jeżeli $\Phi(a, c) = 0$, to po zastosowaniu $p$ otrzymujemy $c = 0$, a wtedy $i(a) = 0$, czyli $a = 0$. To dowodzi (1)⇒(3).

Z izomorfizmu $\Phi : A \oplus C \to B$ w (3) i rzutu $\mathrm{pr}_A : A \oplus C \to A$ bierzemy $r = \mathrm{pr}_A \circ \Phi^{-1}$. Dostajemy $r : B \to A$ z $ri = \mathrm{id}_A$. To daje (3)⇒(2). Wreszcie, mając $r$, dla $c \in C$ wybierzmy jakikolwiek $b$ z $p(b) = c$ i połóżmy $s(c) = b - i(r(b))$. Jeśli zmienimy $b$ na $b + i(a)$, nowa wartość wyniesie

$$b + i(a) - i(r(b + i(a))) = b + i(a) - i(r(b) + a) = b - i(r(b)),$$

ponieważ $r(i(a)) = a$ i $r$ jest liniowa. Tak otrzymane odwzorowanie $s$ nie zależy od wybranego $b$ i jest liniowe: dla $c, c'$ możemy jako podniesienie $c + c'$ wziąć sumę podniesień $c, c'$, a dla $tc$ podniesienie $tb$. Ponadto $p(s(c)) = p(b) = c$. Otrzymaliśmy (2)⇒(1). □

*Uwaga* 6.1.5 (Dwa kontrastujące przypadki). Jeśli $R = \mathbb{K}$ jest ciałem, każdy krótki ciąg przestrzeni liniowych rozszczepia się: wybierzmy bazę $C$, podnieśmy jej wektory do $B$ przez surjekcję $p$ i rozszerzmy liniowo do odwzorowania $s$. Nie zależy nam na kanoniczności tego wyboru.

Ciąg z Przykładu 6.1.3 dla $m \geq 2$ *nie* rozszczepia się jako ciąg $\mathbb{Z}$-modułów. Gdyby przekrój $s$ istniał, dla $z = s([1]) \in \mathbb{Z}$ byłoby $mz = s(m[1]) = 0$, więc $z = 0$. Ale wtedy $\pi(s([1])) = [0] \neq [1]$. Brak dzielenia przez $m$ uniemożliwia tu liniowy wybór reprezentantów.

## 6.2 Kompleksy łańcuchowe i homologia algebraiczna

W dokładnym ciągu każdy element zabity przez następne odwzorowanie pochodzi z poprzedniego miejsca. Do zdefiniowania homologii wystarczy najpierw słabszy warunek: obraz poprzedniego odwzorowania ma *mieścić się* w jądrze następnego. Homologia mierzy brak równości.

**Definicja 6.2.1** (Kompleks łańcuchowy)**.** *Kompleks łańcuchowy* $C_\bullet$ nad $R$ to moduły $C_n$, $n \in \mathbb{Z}$, i homomorfizmy $\partial_n : C_n \to C_{n-1}$ takie, że

$$\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0 \qquad \text{dla każdego } n. \tag{6.2.1}$$

Odwzorowanie $\partial_n$ nazywamy *różniczką* albo *brzegiem*. Dla kompleksów łańcuchowych będziemy używać symbolu $\partial$, a symbol $d$ pozostawimy różniczkom kołańcuchowym. Gdy $C_n = 0$ dla $n < 0$, mówimy o kompleksie w stopniach nieujemnych.

Warunek (6.2.1) należy czytać dosłownie: brzeg tego, co samo jest brzegiem, wynosi zero. Nie zakładamy, że wszystkie elementy o zerowym brzegu są brzegami.

**Definicja 6.2.2** (Cykle, brzegi i grupy homologii)**.** W stopniu $n$ określamy podmoduły

$$Z_n(C) := \ker(\partial_n : C_n \to C_{n-1}), \qquad B_n(C) := \operatorname{im}(\partial_{n+1} : C_{n+1} \to C_n).$$

Elementy $Z_n(C)$ to *cykle*, a elementy $B_n(C)$ to *brzegi*. Ponieważ $\partial_n \partial_{n+1} = 0$, mamy $B_n(C) \subseteq Z_n(C)$, więc można zdefiniować *homologię stopnia n*

$$H_n(C) := Z_n(C)/B_n(C) = \frac{\ker \partial_n}{\operatorname{im} \partial_{n+1}}. \tag{6.2.2}$$

Klasę cyklu $z$ oznaczamy $[z]$.

Dwa cykle $z, z'$ opisują tę samą klasę dokładnie wtedy, gdy $z - z' = \partial_{n+1} w$ dla pewnego $w \in C_{n+1}$. To jest algebraiczne znaczenie słowa *homologiczne*. Klasa $[z]$ znika dokładnie wtedy, gdy $z$ jest brzegiem. Z Definicji 6.1.1 otrzymujemy zatem

$$H_n(C) = 0 \iff \operatorname{im} \partial_{n+1} = \ker \partial_n \iff C_\bullet \text{ jest dokładny w } C_n.$$

Gdy znika homologia we wszystkich stopniach, kompleks nazywamy *acyklicznym*. Nie znaczy to, że same moduły $C_n$ są zerowe.

**Przykład 6.2.3** (Cztery rachunki)**.** 1. W kompleksie $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \to 0$, gdzie niezerowe moduły są w stopniach 1 i 0, mamy $Z_1 = 0$, $Z_0 = \mathbb{Z}$, $B_0 = 2\mathbb{Z}$. Stąd $H_1 = 0$ i $H_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

2. Jeżeli na tych samych dwóch modułach postawimy różniczkę zerową, każdy element jest cyklem, a jedynym brzegiem jest 0. Otrzymujemy $H_1 \cong H_0 \cong \mathbb{Z}$.

3. Dla $0 \to R \xrightarrow{\mathrm{id}} R \to 0$ odwzorowanie w stopniu 1 ma zerowe jądro, a w stopniu 0 jego obraz jest całym $R$. Wszystkie homologie są zerowe, choć dwa moduły kompleksu są niezerowe.

4. Torsja może powstać nawet z modułów wolnych. Weźmy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\partial_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \partial_2(t) = (0, 2t), \quad \partial_1(x, y) = x.$$

   Mamy $\partial_1 \partial_2 = 0$. Cykle w stopniu 1 to $(0, y)$, a brzegi to $(0, 2t)$, więc $H_1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Odwzorowanie $\partial_1$ jest surjektywne, więc $H_0 = 0$; odwzorowanie $\partial_2$ jest iniektywne, więc $H_2 = 0$.

**Definicja 6.2.4** (Odwzorowanie łańcuchowe)**.** Odwzorowanie $f : C_\bullet \to D_\bullet$ to rodzina homomorfizmów $f_n : C_n \to D_n$ zgodnych z różniczkami:

$$\partial^D_n f_n = f_{n-1} \partial^C_n. \tag{6.2.3}$$

Oznacza to, że najpierw zastosować $f$, a potem wziąć brzeg, daje ten sam wynik, co zrobić to w odwrotnej kolejności.

**Stwierdzenie 6.2.5** (Odwzorowanie indukowane na homologii)**.** *Odwzorowanie łańcuchowe $f$ wyznacza homomorfizmy $H_n(f) : H_n(C) \to H_n(D)$, $H_n(f)[z] = [f_n(z)]$. Zachodzą $H_n(\mathrm{id}_C) = \mathrm{id}_{H_n(C)}$ oraz $H_n(gf) = H_n(g)H_n(f)$.*

*Dowód.* Jeżeli $\partial^C_n z = 0$, to z (6.2.3) $\partial^D_n f_n z = f_{n-1}\partial^C_n z = 0$, czyli $f_n z$ jest cyklem. Jeżeli zmienimy $z$ na $z + \partial^C_{n+1} w$, jego obraz zmieni się o

$$f_n(\partial^C_{n+1} w) = \partial^D_{n+1}(f_{n+1} w),$$

czyli o brzeg. Odwzorowanie na klasach jest więc dobrze określone i liniowe. Równości dla identyczności i złożenia wynikają przez zastosowanie wzorów do dowolnej klasy $[z]$. □

## 6.3 Skąd bierze się długi ciąg dokładny homologii?


Niech $A_\bullet, B_\bullet, C_\bullet$ będą kompleksami, a $i : A_\bullet \to B_\bullet$, $p : B_\bullet \to C_\bullet$ odwzorowaniami łańcuchowymi. Mówimy, że

$$0 \longrightarrow A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet \xrightarrow{p} C_\bullet \longrightarrow 0$$

jest *krótkim ciągiem dokładnym kompleksów*, jeśli dla *każdego* $n$ ciąg modułów

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{i_n} B_n \xrightarrow{p_n} C_n \longrightarrow 0 \tag{6.3.1}$$

jest dokładny. Stopniowa dokładność nie mówi jeszcze, że ciąg powstałych homologii jest krótki i dokładny: cykl podniesiony z $C_n$ może przestać być cyklem w $B_n$. Jego brzeg mierzy właśnie tę przeszkodę.




Rysunek 6.1: Odwzorowanie łączące: podnosimy cykl $c$, bierzemy brzeg podniesienia $b$, po czym odczytujemy go w $A_{n-1}$. Odwrócenie $i_{n-1}$ dotyczy tylko jego obrazu $\ker p_{n-1}$; całego odwzorowania $i_{n-1}$ nie odwracamy.

**Twierdzenie 6.3.1** (Długi ciąg dokładny)**.** *Z krótkiego ciągu dokładnego kompleksów otrzymujemy naturalny długi ciąg dokładny*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(B) \xrightarrow{p_*} H_n(C) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots . \tag{6.3.2}$$

*Odwzorowanie* łączące $\delta_n$ *ma następujący konkretny wzór. Dla cyklu $c \in C_n$ wybieramy podniesienie $b \in B_n$ z $p_n(b) = c$. Wtedy $\partial_B b = i_{n-1}(a)$ dla dokładnie jednego $a \in A_{n-1}$, $a$*

$$\delta_n[c] = [a] \in H_{n-1}(A). \tag{6.3.3}$$

*Jeżeli kompleksy są zerowe w ujemnych stopniach, końcowy fragment ma postać $H_0(A) \to H_0(B) \to H_0(C) \to 0$.*

*Dowód. Konstrukcja i cykl.* Surjektywność $p_n$ daje podniesienie $b$. Ponieważ $p$ jest odwzorowaniem łańcuchowym,

$$p_{n-1}(\partial_B b) = \partial_C(p_n b) = \partial_C c = 0.$$

Z dokładności (6.3.1) w stopniu $n-1$ mamy $\partial_B b \in \ker p_{n-1} = \operatorname{im} i_{n-1}$, więc istnieje $a$ z $i_{n-1}a = \partial_B b$. Iniektywność $i_{n-1}$ daje jego jednoznaczność. Ponadto

$$i_{n-2}(\partial_A a) = \partial_B(i_{n-1}a) = \partial_B^2 b = 0.$$

Iniektywność $i_{n-2}$ wymusza $\partial_A a = 0$. Możemy więc wziąć klasę $[a]$.

*Niezależność od podniesienia.* Jeśli $b'$ też podnosi $c$, to $b' - b = i_n(u)$ dla pewnego $u \in A_n$. Wtedy

$$\partial_B b' = \partial_B b + \partial_B i_n u = i_{n-1}(a + \partial_A u).$$

Nowy cykl w $A$ różni się od $a$ o brzeg, więc wyznacza tę samą klasę.

*Niezależność od reprezentanta.* Niech $c' = c + \partial_C v$, $v \in C_{n+1}$. Wybierzmy podniesienie $w \in B_{n+1}$ elementu $v$. Wtedy $b + \partial_B w$ podnosi $c'$ i ma ten sam brzeg co $b$, bo $\partial_B^2 w = 0$. Każde inne podniesienie $c'$ różni się od tego o element $\operatorname{im} i_n$; właśnie sprawdzona niezależność od podniesienia kończy dowód niezależności od wyboru reprezentanta klasy $[c]$. Suma podniesień podnosi sumę cykli, a podniesienie $rb$ podnosi $rc$, więc $\delta_n$ jest homomorfizmem $R$-modułów.

*Dokładność przy $H_n(B)$.* Z $pi = 0$ mamy $p_* i_* = 0$. Jeśli $[b] \in H_n(B)$ spełnia $p_*[b] = 0$, to dla cyklu $b$ istnieje $v \in C_{n+1}$ z $p_n b = \partial_C v$. Wybierzmy podniesienie $w \in B_{n+1}$ elementu $v$. Wtedy $b' = b - \partial_B w$ nadal jest cyklem, $[b'] = [b]$ i $p_n b' = p_n b - \partial_C v = 0$. Z dokładności w stopniu $n$ mamy $b' = i_n a$. Ponieważ $\partial_B b' = i_{n-1}\partial_A a = 0$ i $i_{n-1}$ jest iniektywna, $a$ jest cyklem. Stąd $[b] = i_*[a]$.

*Dokładność przy $H_n(C)$.* Jeżeli $c = p_n b$ dla cyklu $b$, możemy w definicji $\delta_n$ wybrać to właśnie podniesienie: $\partial_B b = 0$, więc $\delta_n[c] = 0$. Odwrotnie, załóżmy $\delta_n[c] = 0$ i podnieśmy cykl $c$ do $b$. Jeśli $\partial_B b = i_{n-1}a$, to $[a] = 0$, czyli $a = \partial_A u$ dla pewnego $u \in A_n$. Element $b - i_n u$ jest cyklem, bo $\partial_B(b - i_n u) = i_{n-1}(a - \partial_A u) = 0$, a $p_n(b - i_n u) = c$. Zatem $[c] = p_*[b - i_n u]$.

*Dokładność przy $H_{n-1}(A)$.* Dla klasy $\delta_n[c] = [a]$ mamy $i_{n-1}a = \partial_B b$, czyli $i_*[a] = 0$. Odwrotnie, jeżeli $a \in Z_{n-1}(A)$ i $i_*[a] = 0$, istnieje $b \in B_n$ takie, że $i_{n-1}a = \partial_B b$. Wówczas $c = p_n b$ jest cyklem, bo $\partial_C c = p_{n-1}\partial_B b = p_{n-1} i_{n-1} a = 0$, a wzór (6.3.3) daje $\delta_n[c] = [a]$. Przesuwając indeks $n$ o jeden, obejmujemy tymi trzema sprawdzeniami każde miejsce całego ciągu (6.3.2). W końcu, przy założonej zerowości kompleksów w ujemnych stopniach mamy $A_{-1} = 0$, a więc $H_{-1}(A) = 0$, więc $H_0(B) \to H_0(C)$ jest surjekcją na mocy właśnie wykazanej dokładności. □

*Uwaga* 6.3.2 (Naturalność odwzorowania łączącego). Jeżeli mamy odwzorowanie między dwoma krótkimi ciągami kompleksów, zgodne z $i, p$ i różniczkami, to odwzorowania na homologiach komutują także z $\delta$. Dokładniej, są to odwzorowania łańcuchowe $f_A : A \to A'$, $f_B : B \to B'$, $f_C : C \to C'$ spełniające $f_B i = i' f_A$ oraz $p' f_B = f_C p$. Istotnie, podniesienie $b$ cyklu $c$ przechodzi w podniesienie obrazu $c$, jego brzeg przechodzi w obraz $\partial_B b$, a wstrzyknięcie $i$ pozwala odczytać obraz tego samego $a$. Równość na reprezentantach ma postać $\delta'_n(H_n(f_C)[c]) = H_{n-1}(f_A)(\delta_n[c])$.

**Przykład 6.3.3** (Niezerowe odwzorowanie łączące)**.** Niech $A_\bullet$ ma jedyny niezerowy moduł $A_0 = R$, a $C_\bullet$ jedyny niezerowy moduł $C_1 = R$. Niech $B_\bullet$ ma $B_1 = B_0 = R$ i różniczkę $\partial_B = \mathrm{id}_R : B_1 \to B_0$. W stopniu 0 odwzorowanie $i_0 : A_0 \to B_0$ jest identycznością, a w stopniu 1 odwzorowanie $p_1 : B_1 \to C_1$ jest identycznością; pozostałe odwzorowania to jedyne możliwe odwzorowania zerowe. W każdym stopniu otrzymujemy rozszczepiony krótki ciąg dokładny modułów, ale $H_n(B) = 0$ we wszystkich stopniach. Cykl $c = 1 \in C_1$ podnosimy do $b = 1 \in B_1$. Jego brzeg to $1 = i_0(1) \in B_0$, więc $\delta_1 : R \to R$ jest identycznością. Przykład pokazuje, że stopniowe rozszczepienie nie oznacza zgodnego z różniczkami rozszczepienia kompleksów.

## 6.4 Kohomologia algebraiczna i jej długi ciąg

W homologii różniczka obniża stopień. Kohomologia powstaje z równie prostej konstrukcji, w której różniczka stopień *podwyższa*. Gdy elementy kompleksu łańcuchowego są wektorami, ele-

menty kompleksu dualnego są funkcjonałami: zamiast brać brzeg wektora, oceniamy funkcjonał na brzegu.

**Definicja 6.4.1** (Kompleks kołańcuchowy i kohomologia)**.** *Kompleks kołańcuchowy* $K^\bullet$ to moduły $K^n$ i homomorfizmy $d^n : K^n \to K^{n+1}$ z $d^{n+1}d^n = 0$ dla $n \in \mathbb{Z}$. Jego *kohomologią stopnia* $n$ jest

$$H^n(K) := \frac{\ker(d^n : K^n \to K^{n+1})}{\operatorname{im}(d^{n-1} : K^{n-1} \to K^n)}. \tag{6.4.1}$$

Elementy jądra nazywamy *kocyklami*, a elementy obrazu *kobrzegami*. Odwzorowanie kołańcuchowe $F : K^\bullet \to L^\bullet$ składa się z $F^n : K^n \to L^n$ spełniających $d^n_L F^n = F^{n+1} d^n_K$.

Tak jak w dowodzie Stwierdzenia 6.2.5, odwzorowanie kołańcuchowe przenosi kocykle w kocykle i kobrzegi w kobrzegi: $d_L Fz = Fdz = 0$ oraz $F(d_K u) = d_L(Fu)$. Wobec tego definiuje $H^n(F)[z] = [F^n z]$. Równość $H^n(K) = 0$ mówi dokładnie, że $K^{n-1} \to K^n \to K^{n+1}$ jest dokładny w $K^n$.

**Przykład 6.4.2** (Kohomologia dwuwyrazowego kompleksu)**.** Dla $K^0 = K^1 = \mathbb{Z}$, $d^0 = \times 2$ i wszystkich innych modułów równych 0 otrzymujemy $H^0(K) = 0$ oraz $H^1(K) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. W stopniu 1 nie ma już różniczki wychodzącej, więc wszystkie elementy $\mathbb{Z}$ są kocyklami; kobrzegami są liczby parzyste.

**Stwierdzenie 6.4.3** (Kompleks dualny)**.** *Dla kompleksu łańcuchowego* $C_\bullet$ *i* $R$*-modułu* $G$ *połóżmy*

$$C^n(C; G) := \operatorname{Hom}_R(C_n, G), \qquad d^n\varphi := \varphi \circ \partial_{n+1}.$$

*Wtedy* $C^\bullet(C; G)$ *jest kompleksem kołańcuchowym. Odwzorowanie łańcuchowe* $f : C_\bullet \to D_\bullet$ *daje odwzorowanie kołańcuchowe w odwrotną stronę,* $f^* : C^\bullet(D; G) \to C^\bullet(C; G)$, $f^*(\varphi) = \varphi \circ f_n$.

*Dowód.* Dla $\varphi : C_n \to G$ mamy

$$d^{n+1}(d^n\varphi) = (\varphi \circ \partial_{n+1}) \circ \partial_{n+2} = \varphi \circ (\partial_{n+1}\partial_{n+2}) = 0.$$

Z kolei dla $\varphi : D_n \to G$ oraz $x \in C_{n+1}$ równość odwzorowań łańcuchowych z (6.2.3) daje

$$(df^*\varphi)(x) = \varphi(f_n(\partial_C x)) = \varphi(\partial_D(f_{n+1}x)) = (f^* d\varphi)(x).$$

To dowodzi zgodności z różniczką. □

Słowo *dualny* wymaga tu ostrożności: zastosowanie $\operatorname{Hom}_R(-, G)$ do krótkiego ciągu dokładnego modułów nie musi dać krótkiego ciągu dokładnego. Na przykład przy $G = \mathbb{Z}$ w ciągu $0 \to 2\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$ funkcjonał $2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $2k \mapsto k$, nie przedłuża się do homomorfizmu $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$: musiałby wysłać 1 na liczbę $t$ z $2t = 1$. Z tego powodu nie będziemy budować długiego ciągu kohomologii przez bezrefleksyjne dualizowanie Twierdzenia 6.3.1.

**Twierdzenie 6.4.4** (Długi ciąg kohomologii)**.** *Jeżeli w każdym stopniu dokładny jest krótki ciąg* kompleksów kołańcuchowych

$$0 \longrightarrow A^\bullet \xrightarrow{i} B^\bullet \xrightarrow{p} C^\bullet \longrightarrow 0,$$

*to istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \longrightarrow H^n(A) \xrightarrow{i_*} H^n(B) \xrightarrow{p_*} H^n(C) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(A) \xrightarrow{i_*} H^{n+1}(B) \longrightarrow \cdots. \tag{6.4.2}$$

*Dowód.* Dla kocyklu $c \in C^n$ wybierzmy podniesienie $b \in B^n$ z $p(b) = c$. Wtedy $p(d_B b) = d_C c = 0$, więc dokładność w stopniu $n+1$ i iniektywność $i$ dają dokładnie jedno $a \in A^{n+1}$ z $i(a) = d_B b$. Ponieważ $i(d_A a) = d_B^2 b = 0$, otrzymujemy kocykl $a$. Definiujemy $\delta^n[c] = [a]$. Jeśli podniesienie $b$ zastąpimy $b + i(u)$, to $a$ zmienia się na $a + d_A u$. Jeśli $c$ zastąpimy $c + d_C v$, to po wyborze podniesienia $w$ dla $v$ możemy zastąpić $b$ przez $b + d_B w$, co w ogóle nie zmienia $d_B b$. Oba wybory prowadzą zatem do tej samej klasy. Podniesienie sumy można wziąć jako sumę podniesień, a $rb$ podnosi $rc$ dla $r \in R$. Zatem $\delta^n$ jest $R$-liniowa.

Sprawdźmy każde z trzech rodzajów miejsc w (6.4.2). Przy $H^n(B)$ mamy $p_* i_* = 0$. Jeśli $b \in B^n$ jest kocyklem i $p_*[b] = 0$, to $p(b) = d_C v$ dla pewnego $v \in C^{n-1}$. Podnieśmy $v$ do $w \in B^{n-1}$. Wówczas $b - d_B w$ jest kocyklem z tą samą klasą co $b$, a jego obraz przez $p$ wynosi 0. Równa się więc $i(a)$ dla pewnego $a \in A^n$. Z $0 = d_B i(a) = i(d_A a)$ i iniektywności $i$ dostajemy $d_A a = 0$, a zatem $[b] = i_*[a]$.

Przy $H^n(C)$ inkluzja $\operatorname{im} p_* \subseteq \ker \delta^n$ wynika z wybrania jako podniesienia $c = p(b)$ samego kocyklu $b$: jego różniczka jest 0. Jeśli odwrotnie $\delta^n[c] = 0$, to dla podniesienia $b$ mamy $d_B b = i(a)$, gdzie $a = d_A u$ dla pewnego $u \in A^n$. Element $b - i(u)$ jest kocyklem, którego obraz to $c$, więc $[c] \in \operatorname{im} p_*$.

Przy $H^{n+1}(A)$ element $i_* \delta^n[c]$ reprezentuje $i(a) = d_B b$ i dlatego jest zerowy. Jeśli z drugiej strony $a \in A^{n+1}$ jest kocyklem i $i_*[a] = 0$, to $i(a) = d_B b$ dla pewnego $b \in B^n$. Obraz $c = p(b)$ jest kocyklem, gdyż $d_C c = p(d_B b) = p(i(a)) = 0$, a jego odwzorowanie łączące wynosi $[a]$. Zmiana $n$ daje dokładność także w pozostałych stopniach. Konstrukcja jest naturalna: dla zgodnych odwzorowań $f_A, f_B, f_C$ między krótkimi ciągami podniesieniem $f_C(c)$ jest $f_B(b)$, a jego różniczka to $f_B(d_B b) = f_B(i(a)) = i'(f_A(a))$. Stąd $\delta'^n H^n(f_C) = H^{n+1}(f_A)\delta^n$. □

**Twierdzenie 6.4.5** (Nad ciałem kohomologia jest dualna do homologii)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$, a $C^n = \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(C_n, \mathbb{K})$. Wtedy naturalne przypisanie*

$$H^n(C^\bullet) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(H_n(C_\bullet), \mathbb{K}), \qquad [\varphi] \longmapsto ([z] \longmapsto \varphi(z)) \tag{6.4.3}$$

*jest izomorfizmem. Zakładamy, że przestrzenie pozwalają na wybór dopełnień podprzestrzeni (w szczególności wystarcza skończony wymiar).*

*Dowód.* Jeżeli $\varphi \in C^n$ jest kocyklem, to $d^n \varphi = \varphi \partial_{n+1} = 0$. Zatem $\varphi$ znika na $B_n$, więc jej wartość na $z \in Z_n$ zależy tylko od klasy $[z] \in H_n$. Jeżeli zmienimy $\varphi$ na $\varphi + d^{n-1}\psi = \varphi + \psi\partial_n$, to dla cyklu $z$ mamy $\partial_n z = 0$, więc otrzymujemy ten sam funkcjonał na $H_n$. Odwzorowanie (6.4.3) jest dobrze określone i liniowe. Jest też naturalne: dla odwzorowania łańcuchowego $f : C \to D$, kocyklu $\varphi$ na $D$ i cyklu $z$ na $C$ mamy $(f^*\varphi)(z) = \varphi(fz)$. Zatem obie drogi, przez $H^n(f^*)$ lub przez prekompozycję z $H_n(f)$, dają ten sam funkcjonał.

Aby pokazać surjektywność, weźmy $\ell : H_n = Z_n/B_n \to \mathbb{K}$. Złożenie $Z_n \to H_n \xrightarrow{\ell} \mathbb{K}$ jest liniowe i znika na $B_n$. Wybieramy dopełnienie $Z_n$ w $C_n$ i przedłużamy funkcjonał liniowo na $C_n$, na przykład jako zero na tym dopełnieniu. Otrzymany $\varphi$ spełnia $\varphi\partial_{n+1} = 0$, bo $\operatorname{im} \partial_{n+1} = B_n$; jest kocyklem wysyłanym na $\ell$.

Jeżeli klasa $[\varphi]$ trafia na zero, to $\varphi$ znika na całym $Z_n$. Możemy więc zdefiniować funkcjonał $\eta$ na $B_{n-1} = \operatorname{im} \partial_n$ przez $\eta(\partial_n x) = \varphi(x)$. Jest dobrze określony: z $\partial_n x = \partial_n x'$ wynika $x - x' \in Z_n$, a tam $\varphi$ znika. Wybieramy dopełnienie $B_{n-1}$ w $C_{n-1}$ i przedłużamy $\eta$ do $\psi : C_{n-1} \to \mathbb{K}$. Wtedy $\varphi = \psi\partial_n = d^{n-1}\psi$ jest kobrzegiem. Jądro odwzorowania w (6.4.3) jest więc zerowe. □

*Uwaga* 6.4.6 (Dlaczego ważne są współczynniki?). Nad $\mathbb{Z}$ odpowiednik (6.4.3) może być fałszywy. Dla kompleksu $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$ z $\partial_1 = \times 2$ mamy $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$ i $H_1(C) = 0$, podczas gdy dla dualnego kompleksu $H^1(C^\bullet) = \mathbb{Z}/2$. Grupa $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_1(C), \mathbb{Z})$ jest zerowa. Ta dodatkowa klasa kohomologii wykrywa informację torsyjną z poprzedniego stopnia. Nie utożsamiamy więc homologii z kohomologią bez sprawdzenia założeń o współczynnikach.

## 6.5 Homotopia łańcuchowa i uproszczenia kompleksów

Jedna homologia może mieć bardzo różne opisy przez generatory i różniczki. Poniższe kryterium mówi, kiedy dwa odwzorowania kompleksów dają *dokładnie to samo* odwzorowanie na homologiach. Jest to algebraiczny mechanizm usuwania par generatorów, które wzajemnie się kasują.

**Definicja 6.5.1** (Homotopia łańcuchowa)**.** Dwa odwzorowania łańcuchowe $f, g : C_\bullet \to D_\bullet$ są *łańcuchowo homotopijne*, jeśli istnieją homomorfizmy $R$-modułów $h_n : C_n \to D_{n+1}$ takie, że

$$f_n - g_n = \partial^D_{n+1} h_n + h_{n-1}\partial^C_n \qquad \text{dla każdego } n. \tag{6.5.1}$$

Kompleks $C_\bullet$ jest *ściągalny*, jeśli $\mathrm{id}_C$ jest łańcuchowo homotopijna z odwzorowaniem zerowym.

Wzór (6.5.1) przypomina zasadę całkowania przez części: różnica odwzorowań składa się z dwóch operacji, w których $h$ i $\partial$ występują w przeciwnych kolejnościach. Na cyklach drugi składnik znika, a pierwszy jest brzegiem.

**Twierdzenie 6.5.2** (Homotopia nie zmienia homologii)**.** *Jeśli $f$ i $g$ są łańcuchowo homotopijne, to $H_n(f) = H_n(g)$ dla każdego $n$. W szczególności kompleks ściągalny jest acykliczny. Jeśli istnieją odwzorowania łańcuchowe $f : C_\bullet \to D_\bullet$ i $g : D_\bullet \to C_\bullet$ z $gf \simeq \mathrm{id}_C$ i $fg \simeq \mathrm{id}_D$, to $H_n(f)$ i $H_n(g)$ są wzajemnymi izomorfizmami.*

*Dowód.* Dla $z \in Z_n(C)$ równanie (6.5.1) redukuje się do

$$f_n(z) - g_n(z) = \partial^D_{n+1} h_n(z),$$

bo $\partial^C_n z = 0$. Różnica obrazów jest brzegiem, więc $[f_n(z)] = [g_n(z)]$. Gdy $f = \mathrm{id}_C$, $g = 0$, otrzymujemy $[z] = [0]$ dla każdej klasy, czyli $H_n(C) = 0$. Na koniec, dzięki Stwierdzeniu 6.2.5,

$$H_n(g)H_n(f) = H_n(gf) = H_n(\mathrm{id}_C) = \mathrm{id}, \qquad H_n(f)H_n(g) = \mathrm{id}.$$

Stąd oba odwzorowania na homologiach są odwrotne do siebie. □

**Przykład 6.5.3** (Najprostsze ściągnięcie)**.** Dla kompleksu $0 \to R \xrightarrow{\mathrm{id}} R \to 0$ z modułami w stopniach 1 i 0 połóżmy $h_0 : R = C_0 \to C_1 = R$ równe identyczności, a pozostałe $h_n = 0$. W stopniu 0 mamy $\partial_1 h_0 = \mathrm{id}_{C_0}$, a w stopniu 1 mamy $h_0\partial_1 = \mathrm{id}_{C_1}$. Wzór (6.5.1) daje $\mathrm{id}_C = \partial h + h\partial$.

**Twierdzenie 6.5.4** (Algebraiczne skasowanie pary generatorów)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem wolnych $R$-modułów z ustalonymi bazami, a $n \geq 1$. Załóżmy, że przy generatorze $f \in C_{n-1}$ we współrzędnych $\partial_n(e)$ dla pewnego generatora $e \in C_n$ stoi skalar odwracalny $u \in R$. Wtedy przez zmiany baz można rozłożyć $C_\bullet$ na sumę prostą podkompleksu i dwuwyrazowego kompleksu*

$$0 \longrightarrow Re \xrightarrow{\partial_n} R\,\partial_n(e) \longrightarrow 0,$$

*w którym $\partial_n$ jest izomorfizmem. Usunięcie tej pary nie zmienia homologii.*

*Dowód.* Zapiszmy $C_n = Re \oplus M$ oraz $C_{n-1} = Rf \oplus N$, gdzie $M, N$ są rozpięte przez pozostałe wybrane wektory bazowe. Z założenia $\partial_n(e) = uf + v$ z $v \in N$. Ponieważ $u$ jest odwracalny, $f' := \partial_n(e)$ może zastąpić $f$ w bazie $C_{n-1}$: $C_{n-1} = Rf' \oplus N$. Rzeczywiście, $f = u^{-1}(f' - v)$ pozwala przejść w obie strony między rozkładami.

Dla $x \in M$ zapiszmy $\partial_n(x) = a(x)f + w(x)$, gdzie $a(x) \in R$ i $w(x) \in N$. Zmieńmy też bazę w stopniu $n$, zastępując każdy bazowy $x \in M$ wektorem $x' := x - u^{-1}a(x)e$. Wtedy

$$\partial_n(x') = a(x)f + w(x) - u^{-1}a(x)(uf + v) = w(x) - u^{-1}a(x)v \in N.$$

Nowe wektory $x'$ razem z $e$ tworzą bazę $C_n$: możemy odzyskać $x = x' + u^{-1}a(x)e$. Oznaczmy ich rozpiętość przez $M'$. Mamy zatem $\partial_n(Re) = Rf'$ i $\partial_n(M') \subseteq N$.

Równość $\partial_{n-1}(f') = \partial_{n-1}\partial_n(e) = 0$ mówi, że z $Rf'$ nie wychodzi różniczka. Z kolei dla $y \in C_{n+1}$ zapiszmy $\partial_{n+1}(y) = te + x'$, $x' \in M'$. Po zastosowaniu $\partial_n$ dostajemy $0 = \partial_n\partial_{n+1}(y) = tf' + \partial_n(x')$. Pierwszy składnik należy do $Rf'$, drugi do $N$; rozkład jest prosty, więc $t = 0$. Żadna różniczka z wyższego stopnia nie trafia do $Re$. Pozostałe moduły wraz z $M'$ i $N$ tworzą więc podkompleks, a $Re \xrightarrow{\cong} Rf'$ jest jego prostym składnikiem w całym kompleksie.

Na tym dwuwyrazowym składniku homotopia $h_{n-1}(f') = e$, zerowa w innych stopniach, spełnia $\mathrm{id} = \partial h + h\partial$. Jest on ściągalny. Przedłużmy tę homotopię przez zero na pozostałym podkompleksie $D$. Dla rzutu $p : C \to D$ i włączenia $j : D \to C$ otrzymujemy $pj = \mathrm{id}_D$ oraz $\mathrm{id}_C - jp = \partial h + h\partial$. Rzut i włączenie wyznaczają odwrotne izomorfizmy na homologiach na mocy Twierdzenia 6.5.2. □

Nad $\mathbb{Z}$ jednostkami są tylko 1 i $-1$. Współczynnik 2 w różniczce $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ nie pozwala wykonać takiego skasowania: pozostała klasa $\mathbb{Z}/2$ z Przykładu 6.2.3 jest rzeczywistą przeszkodą.

**Stwierdzenie 6.5.5** (Acykliczny kompleks przestrzeni liniowych)**.** *Jeżeli $C_\bullet$ jest kompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$ i $H_n(C) = 0$ dla wszystkich $n$, to $C_\bullet$ jest ściągalny. Wystarczy, aby każda podprzestrzeń $Z_n(C) \subseteq C_n$ miała dopełnienie; warunek ten zachodzi zawsze przy skończonych wymiarach.*

*Dowód.* Acykliczność daje $Z_n = B_n$. Wybierzmy dopełnienie $S_n$ tak, aby $C_n = Z_n \oplus S_n$. Ograniczenie

$$\partial_n|_{S_n} : S_n \longrightarrow Z_{n-1}$$

jest iniektywne: element jego jądra należy do $S_n \cap Z_n = \{0\}$. Jest też surjektywne, bo $\partial_n(C_n) = B_{n-1} = Z_{n-1}$ i $\partial_n$ znika na $Z_n$. Ma więc odwrotność. Każde $x \in C_n$ zapiszmy jednoznacznie jako $x = z + s$ z $z \in Z_n$, $s \in S_n$, i połóżmy

$$h_n(z + s) := (\partial_{n+1}|_{S_{n+1}})^{-1}(z) \in S_{n+1}.$$

Wówczas $\partial_{n+1}h_n(z + s) = z$. Z drugiej strony $\partial_n(z + s) = \partial_n(s)$, więc $h_{n-1}\partial_n(z + s) = (\partial_n|_{S_n})^{-1}(\partial_n s) = s$. Zatem $(\partial h + h\partial)(x) = z + s = x$ w każdym stopniu. □

**Przykład 6.5.6** (Acykliczny, lecz nieściągalny nad $\mathbb{Z}$)**.** Potraktujmy dokładny ciąg z Przykładu 6.1.3 dla $m = 2$ jako kompleks w stopniach $2, 1, 0$:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Jego wszystkie homologie są zerowe, bo $\times 2$ jest iniekcją, $\ker \pi = 2\mathbb{Z}$, a $\pi$ jest surjekcją. Gdyby kompleks był ściągalny, to w stopniu 0 wzór $\mathrm{id} = \partial h + h\partial$ dałby $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}/2} = \pi h_0$. Odwzorowanie $h_0 : \mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Z}$ byłoby przekrojem $\pi$, którego nie ma według uwagi po Twierdzeniu 6.1.4. Zatem implikacja *acykliczny* $\Rightarrow$ *ściągalny* wymaga dodatkowych założeń. Implikacja odwrotna z Twierdzenia 6.5.2 działa nad każdym pierścieniem.

## 6.6 Ilorazy, ciągi względne i filtracje

Podkompleks $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ oznacza podmoduły $A_n \subseteq C_n$ we wszystkich stopniach, takie że $\partial_C(A_n) \subseteq A_{n-1}$. Definiujemy *kompleks ilorazowy* $(C/A)_n = C_n/A_n$ i $\partial_{C/A}[c] = [\partial_C c]$. Jeśli $[c] = [c + a]$ dla $a \in A_n$, to $[\partial_C c] = [\partial_C c + \partial_C a]$; różniczka ilorazowa jest dobrze określona i jej kwadrat wynosi zero.

**Stwierdzenie 6.6.1** (Długi ciąg ilorazu)**.** *Dla podkompleksu $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ ciąg*

$$0 \longrightarrow A_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow C_\bullet/A_\bullet \longrightarrow 0$$

*jest stopniowo dokładny. Dlatego istnieje długi ciąg*

$$\cdots \to H_n(A) \to H_n(C) \to H_n(C/A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \to \cdots . \tag{6.6.1}$$

*Jeśli $\xi \in H_n(C/A)$, to możemy reprezentować ją elementem $c \in C_n$ z $\partial_C c \in A_{n-1}$, a wtedy $\delta_n \xi = [\partial_C c]$. Tutaj $c$ najpierw wyznacza cykl $c + A_n$ w kompleksie ilorazowym, a dopiero jego klasa modulo brzegi jest elementem $\xi$; są to dwa różne przejścia do ilorazu.*

*Dowód.* W każdym stopniu włączenie $A_n \to C_n$ jest iniekcją, projekcja $C_n \to C_n/A_n$ jest surjekcją, a jej jądrem jest $A_n$. Oba odwzorowania komutują z różniczkami z definicji podkompleksu i ilorazu. Twierdzenie 6.3.1 stosuje się więc bez dodatkowych założeń. Warunek $\partial_{C/A}[c] = [0]$ jest równoważny $\partial_C c \in A_{n-1}$; w tej sytuacji konstrukcja (6.3.3) przy podniesieniu $c$ daje dokładnie klasę $[\partial_C c]$. □

Symbol $H_n(C, A) := H_n(C/A)$ będziemy nazywać *względną homologią algebraiczną* kompleksu $C$ względem podkompleksu $A$. Jest to definicja czysto algebraiczna. W przyszłych konstrukcjach topologicznych trzeba osobno sprawdzić, że odpowiednie łańcuchy tworzą podkompleks.

**Stwierdzenie 6.6.2** (Względna kohomologia nad ciałem)**.** *Jeśli $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ jest podkompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$, to wzięcie funkcjonałów daje krótki ciąg dokładny kompleksów kołańcuchowych*

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(C/A, \mathbb{K}) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(C, \mathbb{K}) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(A, \mathbb{K}) \to 0.$$

*Jeśli $H^n(C, A; \mathbb{K})$ oznacza kohomologię pierwszego z nich, to mamy długi ciąg*

$$\cdots \to H^n(C, A; \mathbb{K}) \to H^n(C; \mathbb{K}) \to H^n(A; \mathbb{K}) \to H^{n+1}(C, A; \mathbb{K}) \to \cdots .$$

*W tym zapisie $H^n(C; \mathbb{K})$ oznacza kohomologię kompleksu $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(C, \mathbb{K})$, a analogicznie dla $A$.*

*Dowód.* W stopniu $n$ pierwsze odwzorowanie składa funkcjonał $C_n/A_n \to \mathbb{K}$ z projekcją $C_n \to C_n/A_n$, więc jest iniektywne. Drugie ogranicza funkcjonał na $C_n$ do podprzestrzeni $A_n$. Jego jądrem są dokładnie funkcjonały znikające na $A_n$, czyli faktoryzujące się przez $C_n/A_n$; to obraz pierwszego odwzorowania. Każdy funkcjonał na $A_n$ przedłuża się do $C_n$: wybieramy dopełnienie $A_n$ i stawiamy na nim wartość 0. Drugie odwzorowanie jest zatem surjektywne. Odwzorowania komutują z różniczkami kołańcuchowymi, bo są zdefiniowane przez składanie z odwzorowaniami łańcuchowymi. Stosujemy Twierdzenie 6.4.4. □

**Stwierdzenie 6.6.3** (Trzy zagnieżdżone kompleksy)**.** *Jeśli $A_\bullet \subseteq B_\bullet \subseteq C_\bullet$, to istnieje krótki ciąg dokładny kompleksów*

$$0 \longrightarrow B_\bullet/A_\bullet \longrightarrow C_\bullet/A_\bullet \longrightarrow C_\bullet/B_\bullet \longrightarrow 0$$

*i wynikający z niego długi ciąg*

$$\cdots \to H_n(B, A) \to H_n(C, A) \to H_n(C, B) \to H_{n-1}(B, A) \to \cdots .$$

*Dowód.* W stopniu $n$ pierwsze odwzorowanie $[b]_A \mapsto [b]_A$ jest iniektywne: jeśli $[b]_A = 0$ w $C_n/A_n$, to $b \in A_n$, więc była już zerowa w $B_n/A_n$. Ostatnie odwzorowanie $[c]_A \mapsto [c]_B$ jest dobrze określone, bo $A_n \subseteq B_n$, i surjektywne, bo każda klasa modulo $B_n$ ma reprezentanta $c \in C_n$. Jej jądro składa się z klas $[c]_A$ z $c \in B_n$, czyli jest obrazem pierwszego odwzorowania. Różniczki zachowują wszystkie trzy podkompleksy, więc są to odwzorowania kompleksów. Stosujemy Twierdzenie 6.3.1. □

**Definicja 6.6.4** (Filtracja kompleksu)**.** Przez *skończoną filtrację rosnącą* rozumiemy tutaj ciąg podkompleksów

$$0 = F_{-1}C_\bullet \subseteq F_0C_\bullet \subseteq \cdots \subseteq F_NC_\bullet = C_\bullet.$$

Iloraz $F_pC/F_{p-1}C$ opisuje algebraicznie *nową warstwę* w kroku $p$. W każdym kroku mamy krótki ciąg dokładny $0 \to F_{p-1}C \to F_pC \to F_pC/F_{p-1}C \to 0$ i odpowiadający mu długi ciąg homologii.

**Wniosek 6.6.5** (Zmiana skoncentrowana w jednym stopniu)**.** *Niech $A \subseteq B$ będzie podkompleksem w nieujemnych stopniach i niech $H_j(B/A) = 0$ dla $j \neq q$, $q \geq 1$. Wówczas $H_j(A) \to H_j(B)$ jest izomorfizmem dla $j \notin \{q, q-1\}$, a pozostałe zmiany opisuje ciąg*

$$0 \to H_q(A) \to H_q(B) \to H_q(B/A) \xrightarrow{\delta_q} H_{q-1}(A) \to H_{q-1}(B) \to 0. \tag{6.6.2}$$

*Dowód.* Dla dowolnego $j$ wytnijmy z (6.6.1) fragment

$$H_{j+1}(B/A) \to H_j(A) \to H_j(B) \to H_j(B/A).$$

Jeśli oba zewnętrzne moduły są zerowe, środkowe odwzorowanie jest jednocześnie iniektywne i surjektywne. Tak jest, gdy $j \neq q, q-1$. Dla $j = q$ i $j = q-1$ zachowujemy pełen fragment długiego ciągu. Jego lewa skrajna strzałka wychodzi z $H_{q+1}(B/A) = 0$, a prawa wchodzi do $H_{q-1}(B/A) = 0$, co daje dokładnie (6.6.2). □

*Uwaga* 6.6.6 (Co mówi odwzorowanie łączące?). W (6.6.2) element nowej warstwy może zwiększyć $H_q(B)$, jeśli ma zerowy obraz przez $\delta_q$. Może też sprawić, że wcześniejsza klasa w $H_{q-1}(A)$ stanie się brzegiem: tak dzieje się, jeśli leży w $\operatorname{im}\delta_q$. Ten jeden fragment ciągu odróżnia *powstanie klasy* od *zabicia klasy*, bez odwoływania się do szczególnej realizacji geometrycznej kompleksu.

## 6.7 Suma podkompleksów i ciąg Mayera–Vietorisa

Przy rozbiciu obiektu na dwie części trzeba uwzględnić elementy wspólne: bez tego zliczylibyśmy je dwa razy. Poniższy wynik jest czysto algebraicznym źródłem późniejszych ciągów Mayera–Vietorisa. Nie wymaga jeszcze żadnej konstrukcji łańcuchów z przestrzeni topologicznej.

**Twierdzenie 6.7.1** (Algebraiczny Mayer–Vietoris)**.** *Niech $A_\bullet$ i $B_\bullet$ będą podkompleksami $C_\bullet$. Wtedy $A \cap B$ i $A + B$ też są podkompleksami, a ciąg*

$$0 \longrightarrow A \cap B \xrightarrow{\ j\ } A \oplus B \xrightarrow{\ q\ } A + B \longrightarrow 0, \quad j(x) = (x, -x), \quad q(a, b) = a + b \tag{6.7.1}$$

*jest krótkim ciągiem dokładnym kompleksów. W szczególności mamy długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H_n(A \cap B) \to H_n(A) \oplus H_n(B) \to H_n(A + B) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(A \cap B) \to \cdots. \tag{6.7.2}$$

*Jeśli cykl $c \in (A + B)_n$ zapiszemy $c = a + b$ z $a \in A_n$, $b \in B_n$, to $\delta[c] = [\partial a] = [-\partial b]$.*

*Dowód.* Jeśli $x \in A_n \cap B_n$, to $\partial x \in A_{n-1}$ i $\partial x \in B_{n-1}$, więc $\partial$ zachowuje przecięcie. Podobnie $\partial(a + b) = \partial a + \partial b$ należy do $A_{n-1} + B_{n-1}$, zatem suma też jest podkompleksem. Różniczka w $A \oplus B$ działa składowo, dlatego $\partial\, j(x) = (\partial x, -\partial x) = j(\partial x)$ i $\partial\, q(a, b) = \partial(a + b) = q(\partial a, \partial b)$. Są to odwzorowania łańcuchowe.

W każdym stopniu odwzorowanie $j$ jest iniektywne, bo $j(x) = (0, 0)$ implikuje $x = 0$. Odwzorowanie $q$ jest surjektywne na $A_n + B_n$ z samej definicji sumy. Jeśli $q(a, b) = 0$, to $a = -b$ należy jednocześnie do $A_n$ i do $B_n$, a para ma postać $(a, -a) = j(a)$. Stąd $\ker q = \operatorname{im} j$. Twierdzenie 6.3.1 daje (6.7.2). Używamy przy tym kanonicznego izomorfizmu $H_n(A \oplus B) \cong H_n(A) \oplus H_n(B)$:

różniczka działa składowo, więc cykle i brzegi są odpowiednio $Z_n(A)\oplus Z_n(B)$ i $B_n(A)\oplus B_n(B)$, a $[(a,b)]\mapsto([a],[b])$ jest izomorfizmem ich ilorazów.

Na koniec, jeśli $\partial(a+b)=0$, to $\partial a=-\partial b$. Lewa strona należy do $A_{n-1}$, prawa do $B_{n-1}$, więc obie są elementem $A\cap B$. W konstrukcji odwzorowania łączącego podniesienie cyklu $c$ jest parą $(a,b)$, a jej brzeg $(\partial a,\partial b)=(\partial a,-\partial a)$ jest obrazem $j(\partial a)$. To daje podany wzór i objaśnia znak. □

**Przykład 6.7.2** (Niezerowy brzeg z przecięcia)**.** Nad ciałem $\mathbb{K}$ weźmy kompleks z $C_1=\mathbb{K}u\oplus\mathbb{K}v$, $C_0=\mathbb{K}x\oplus\mathbb{K}y$, $\partial(u)=x-y$ i $\partial(v)=y-x$, zerowy w pozostałych stopniach. Niech $A_1=\mathbb{K}u$, $B_1=\mathbb{K}v$, ale $A_0=B_0=C_0$. Są to podkompleksy, $A+B=C$, zaś $A\cap B$ jest skoncentrowany w stopniu 0 i ma tam moduł $\mathbb{K}x\oplus\mathbb{K}y$. Element $u+v$ jest cyklem w $C_1$. Jego podniesienie do $A_1\oplus B_1$ to $(u,v)$, którego brzeg wynosi $(x-y,y-x)=j(x-y)$. Stąd

$$\delta[u+v]=[x-y]\in H_0(A\cap B)=\mathbb{K}x\oplus\mathbb{K}y,$$

klasa niezerowa. Widzimy, jak brzeg jednej części zostaje zniesiony przez brzeg drugiej i powstaje cykl w ich sumie.

## 6.8 Współczynniki, torsja i charakterystyka Eulera

Wybór pierścienia $R$ wpływa na wynik homologiczny. Kompleks wolnych grup abelowych można sprowadzić modulo $m$, lecz homologia po tej operacji nie polega zawsze wyłącznie na redukcji dawnej homologii: dochodzi torsja z poprzedniego stopnia.

**Twierdzenie 6.8.1** (Redukcja współczynników modulo $m$)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem wolnych grup abelowych, a $m\geq 2$. Różniczki wyznaczają kompleks $(C/mC)_n=C_n/mC_n$. Dla każdego $n$ istnieje krótki ciąg dokładny*

$$0\longrightarrow H_n(C)/mH_n(C)\longrightarrow H_n(C/mC)\longrightarrow H_{n-1}(C)[m]\longrightarrow 0, \tag{6.8.1}$$

*gdzie $H_{n-1}(C)[m]:=\{x\in H_{n-1}(C):mx=0\}$ to $m$-torsja z Definicji 5.3.2. Nie twierdzimy, że ten ciąg ma kanoniczne rozszczepienie.*

*Dowód.* Wolna grupa abelowa nie ma niezerowych elementów zabijanych przez $m$. W każdym stopniu mamy zatem dokładny ciąg

$$0\to C_n\xrightarrow{\times m}C_n\xrightarrow{\pi}C_n/mC_n\to 0.$$

Ponieważ $\partial(mx)=m\,\partial(x)$, odwzorowania $\times m$ i $\pi$ komutują z różniczkami. To krótki ciąg dokładny kompleksów, więc Twierdzenie 6.3.1 daje fragment

$$H_n(C)\xrightarrow{\times m}H_n(C)\xrightarrow{\pi_*}H_n(C/mC)\xrightarrow{\delta}H_{n-1}(C)\xrightarrow{\times m}H_{n-1}(C).$$

Dokładność mówi $\ker\pi_*=mH_n(C)$, a więc $\pi_*$ wyznacza iniekcję $H_n(C)/mH_n(C)\hookrightarrow H_n(C/mC)$ o obrazie $\ker\delta$. Mówi też $\operatorname{im}\delta=\ker(\times m:H_{n-1}(C)\to H_{n-1}(C))=H_{n-1}(C)[m]$. Odwzorowanie $\delta$ po ograniczeniu przeciwdziedziny do tego jądra jest więc surjektywne. To dokładnie trzy warunki ciągu (6.8.1). Warto zapisać ostatnią strzałkę jawnie. Jeśli $\bar c$ jest cyklem modulo $m$ i $c\in C_n$ jest jego przedstawicielem, to $\partial c=ma$ dla pewnego $a\in C_{n-1}$. Element $a$ jest jednoznaczny, bo mnożenie przez $m$ jest iniektywne. Ponadto $m\partial a=0$ wymusza $\partial a=0$, a $m[a]=[\partial c]=0$. Zatem strzałka wysyła $[\bar c]$ na $[a]$. Jest naturalna względem odwzorowań łańcuchowych, gdyż $\partial f(c)=mf(a)$; pierwsza strzałka wysyła klasę cyklu $[z]$ modulo $mH_n(C)$ na klasę $z$ modulo $m$. □

**Przykład 6.8.2** (Nowa homologia po redukcji)**.** Dla $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$ i $\partial_1 = \times 2$ otrzymaliśmy $H_1(C) = 0$ oraz $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$. Po redukcji modulo 2 różniczka $\times 2$ staje się zerowa, a więc $H_1(C/2C) \cong H_0(C/2C) \cong \mathbb{Z}/2$. Nowa klasa stopnia 1 pochodzi w (6.8.1) z $H_0(C)[2] = \mathbb{Z}/2$, choć wcześniejsze $H_1(C)$ było zerowe.

*Uwaga* 6.8.3 (Iloczyn tensorowy modułów i rozszerzenie skalarów). Konstrukcję $M \otimes_R N$, rozszerzenie skalarów i wpływ funktora $- \otimes_R N$ na surjekcje i iniekcje udowodniliśmy w Sekcji 5.4. Tutaj stosujemy ją do grup łańcuchów; w szczególności możemy pisać $C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}$ dla ciała $\mathbb{F}$ zawierającego $\mathbb{Q}$. Sama konstrukcja dopuszcza dowolną przemienną $\mathbb{Z}$-algebrę $S$, nie tylko ciało charakterystyki zero. Dla $S = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ izomorfizm (5.4.1), z zamianą czynników $c \otimes [a] \mapsto [a] \otimes c$, daje

$$C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong C_n/mC_n, \qquad c \otimes [a] \longmapsto ac + mC_n.$$

Komutuje on z różniczkami, bo $\partial(ac) = a\partial c$. Zatem wcześniejsze Twierdzenie 6.8.1 już opisuje szczególny przypadek iloczynu tensorowego kompleksu z pierścieniem $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Warunek charakterystyki zero w następnym twierdzeniu służy prostszemu porównaniu homologii przed zmianą współczynników i po niej.

**Definicja 6.8.4** (Homologia ze współczynnikami w $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$)**.** Niech $(C_\bullet, \partial)$ będzie kompleksem wolnych grup abelowych, na przykład kompleksem łańcuchów symplicjalnych. Dla $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ tworzymy

$$C_n(C; \mathbb{F}) := C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}, \qquad \partial_{\mathbb{F}}(c \otimes a) := (\partial c) \otimes a.$$

Jeśli $C_n$ ma bazę sympleksów, nowy kompleks ma tę samą bazę, lecz można przy nich stawiać współczynniki z $\mathbb{F}$ zamiast liczb całkowitych. Jego homologię oznaczamy $H_n(C; \mathbb{F})$; dla kompleksu przypisanego przestrzeni $X$ piszemy $H_n(X; \mathbb{F})$. Piszemy też $H_n(C; \mathbb{Z}) = H_n(C)$ dla pierwotnego kompleksu. Różniczka jest dobrze określona przez własność uniwersalną, a $\partial_{\mathbb{F}}^2 = 0$ sprawdzamy na tensorach prostych.

**Twierdzenie 6.8.5** (Co zmienia przejście do charakterystyki zero)**.** *Dla każdego kompleksu wolnych grup abelowych i $\mathbb{F} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ istnieje naturalny izomorfizm*

$$H_n(C; \mathbb{F}) \cong H_n(C; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}. \tag{6.8.2}$$

*Jeśli $H_n(C; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{b_n} \oplus T_n$, gdzie $T_n$ jest skończoną grupą torsyjną, to $H_n(C; \mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^{b_n}$. W szczególności w tych trzech ciałach pozostaje ta sama liczba $b_n$ niezależnych klas, a torsja znika.*

*Dowód.* Najpierw rozważmy $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$. Element $C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ jest skończoną sumą prostych tensorów; sprowadzając mianowniki do wspólnego, zapisujemy go jako $c/d$ z $c \in C_n$ i niezerowym $d \in \mathbb{Z}$. Ponieważ każda grupa $C_j$ jest wolna, odwzorowania $C_j \to C_j \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ są iniektywne. Jeśli $c/d$ jest cyklem, to $\partial c/d = 0$, a więc $\partial c = 0$. Każda klasa racjonalna pochodzi zatem całkowitego cyklu po dopuszczeniu mianownika: odwzorowanie

$$H_n(C; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow H_n(C; \mathbb{Q}), \qquad [c] \otimes q \longmapsto [c \otimes q]$$

jest surjektywne. Jest ono dobrze określone, bo cykl pozostaje cyklem, brzeg pozostaje brzegiem, a reguła jest dwuliniowa nad $\mathbb{Z}$. Każdy tensor w dziedzinie ma postać $[c] \otimes (1/d)$ po sprowadzeniu skończenie wielu ułamków do wspólnego mianownika.

Sprawdźmy, czy nie utożsamia zbyt wielu klas. Załóżmy, że cykl $c/d$ jest brzegiem w kompleksie racjonalnym. Istnieją $b \in C_{n+1}$ i $e \neq 0$ takie, że $c/d = \partial b/e$. Po pomnożeniu przez $de$ i użyciu iniektywności $C_n \to C_n \otimes \mathbb{Q}$ otrzymujemy $ec = d\,\partial b = \partial(db)$ już w $C_n$. To znaczy, że $e[c] = 0$ w $H_n(C; \mathbb{Z})$. Po przejściu do $\mathbb{Q}$ liczba $e$ jest odwracalna, więc $[c] \otimes (1/d) = 0$. Odwzorowanie jest również iniektywne i wzór został udowodniony dla $\mathbb{Q}$.

Teraz $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$. Są to przestrzenie liniowe nad $\mathbb{Q}$, a rozszerzenie skalarów daje izomorfizm kompleksów

$$C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F} \cong (C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{F}.$$

Jawnie, $(c \otimes q) \otimes a \mapsto c \otimes qa$, a odwrotnie $c \otimes a \mapsto (c \otimes 1) \otimes a$. Relacje tensorowe pokazują, że oba wzory są dobrze określone i wzajemnie odwrotne; komutują też z różniczkami. Wyjaśnijmy, dlaczego utworzenie iloczynu tensorowego kompleksu przestrzeni liniowych nad ciałem z $\mathbb{F}$ zachowuje homologię. Oznaczmy na chwilę $D_\bullet = C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, $Z_n^{\mathbb{Q}} = \ker(\partial : D_n \to D_{n-1})$ oraz $B_n^{\mathbb{Q}} = \operatorname{im}(\partial : D_{n+1} \to D_n)$. W każdym stopniu uzupełniamy bazy, aby zapisać $Z_n^{\mathbb{Q}} = B_n^{\mathbb{Q}} \oplus V_n$ i $D_n = Z_n^{\mathbb{Q}} \oplus L_n$. Wtedy $\partial : L_n \to B_{n-1}^{\mathbb{Q}}$ jest izomorfizmem: surjektywność wynika z definicji $B_{n-1}^{\mathbb{Q}}$, a jądro to $L_n \cap Z_n^{\mathbb{Q}} = 0$. Ponadto $V_n \cong Z_n^{\mathbb{Q}}/B_n^{\mathbb{Q}} = H_n(D)$. Po utworzeniu iloczynów tensorowych z $\mathbb{F}$ nad $\mathbb{Q}$ rozkłady nadal są sumami prostymi, a ograniczenie $\partial \otimes 1 : L_n \otimes \mathbb{F} \to B_{n-1}^{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{F}$ pozostaje izomorfizmem. Nowa homologia to więc $V_n \otimes \mathbb{F} \cong H_n(D) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{F}$. Łącząc to z przypadkiem $\mathbb{Q}$, otrzymujemy (6.8.2) dla $\mathbb{R}, \mathbb{C}$. Choć dopełnienia ułatwiły dowód bijektywności, sam izomorfizm jest kanoniczny: we wszystkich trzech przypadkach jest zadany przez $[z] \otimes a \mapsto [z \otimes a]$. Równość $f(z) \otimes a = (f \otimes \mathrm{id})(z \otimes a)$ dowodzi naturalności względem odwzorowań łańcuchowych.

Wreszcie $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F} \cong \mathbb{F}$. Jeśli $mx = 0$ w $T_n$, to $m(x \otimes a) = 0$; ponieważ $m \neq 0$ ma odwrotność w $\mathbb{F}$, $x \otimes a = 0$. Zatem $T_n \otimes \mathbb{F} = 0$, a $b_n$ generatorów części wolnej daje $\mathbb{F}^{b_n}$. □

Warto porównać to z Twierdzeniem 6.8.1. W ciele $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ każda niezerowa liczba całkowita staje się odwracalna. Przy współczynnikach modulo $p$ liczba $p$ staje się natomiast *zerem*; torsja może wtedy dać nowe klasy także w innym stopniu. Przejście do $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ po obliczeniu homologii nad $\mathbb{Q}$ jest już tylko rozszerzeniem skalarów:

$$H_n(C;\mathbb{R}) \cong H_n(C;\mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}, \qquad H_n(C;\mathbb{C}) \cong H_n(C;\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}.$$

**Twierdzenie 6.8.6** (Algebraiczna charakterystyka Eulera)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem skończenie wymiarowych przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$ i niech tylko skończenie wiele $C_n$ będzie niezerowych. Wtedy*

$$\sum_n (-1)^n \dim_{\mathbb{K}} C_n = \sum_n (-1)^n \dim_{\mathbb{K}} H_n(C). \tag{6.8.3}$$

*Lewą stronę nazywamy* charakterystyką Eulera kompleksu.

*Dowód.* Odwzorowanie $\partial_n : C_n \to B_{n-1}$ jest surjektywne z definicji obrazu, a jego jądro to $Z_n$. Wybór bazy $Z_n$ i jej uzupełnienie do bazy $C_n$ pokazują

$$\dim C_n = \dim Z_n + \dim B_{n-1}.$$

Podobnie projekcja $Z_n \to H_n = Z_n/B_n$ ma jądro $B_n$, więc $\dim Z_n = \dim B_n + \dim H_n$. Łącząc te równości, otrzymujemy

$$\dim C_n = \dim B_n + \dim H_n + \dim B_{n-1}.$$

Mnożymy przez $(-1)^n$ i sumujemy po $n$. Suma $\sum_n (-1)^n \dim B_n$ znosi się z $\sum_n (-1)^n \dim B_{n-1}$: po podstawieniu $j = n-1$ druga jest równa $-\sum_j (-1)^j \dim B_j$. Skończona liczba niezerowych wyrazów pozwala to wykonać bez kłopotów ze zbieżnością. Pozostaje (6.8.3). □

**Przykład 6.8.7** (Wykrywanie brakującego wymiaru)**.** Niech nad $\mathbb{K}$ mamy tylko $C_2 \cong \mathbb{K}^2$, $C_1 \cong \mathbb{K}^5$ i $C_0 \cong \mathbb{K}^4$. Niezależnie od szczegółów różniczek spełniających $\partial^2 = 0$, musi zachodzić

$$\dim H_0 - \dim H_1 + \dim H_2 = 4 - 5 + 2 = 1.$$

Nie można zatem uzyskać acyklicznego kompleksu z takimi wymiarami. Charakterystyka Eulera nie mówi, w którym stopniu leży niezerowa klasa; daje jednak szybki test każdego obliczenia.

## 6.9 Porównywanie długich ciągów

Czasem umiemy opisać cztery składniki dwóch długich ciągów, a piąty jest trudny. Następny lemat zamienia dane o odwzorowaniach sąsiednich w informację o odwzorowaniu środkowym. Przyda się do porównywania kompleksów i różnych modeli tej samej homologii.

**Lemat 6.9.1** (Lemat pięciu)**.** *Załóżmy, że mamy przemienny diagram homomorfizmów $R$-modułów o dokładnych wierszach*

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_4 & \longrightarrow & A_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 & \longrightarrow & B_4 & \longrightarrow & B_5. \end{array}$$

*Jeśli $f_1, f_2, f_4, f_5$ są izomorfizmami, to $f_3$ także jest izomorfizmem.*

*Dowód.* Oznaczmy kolejne poziome odwzorowania w górnym wierszu przez $u_1, u_2, u_3, u_4$, a w dolnym przez $v_1, v_2, v_3, v_4$. Przemienność oznacza $f_{j+1}u_j = v_j f_j$.

*Iniektywność.* Niech $x \in A_3$ spełnia $f_3 x = 0$. Wtedy $f_4(u_3 x) = v_3(f_3 x) = 0$; iniektywność $f_4$ daje $u_3 x = 0$. Z dokładności w $A_3$ mamy $x = u_2 y$ dla pewnego $y \in A_2$. Ponieważ $v_2 f_2 y = f_3 u_2 y = f_3 x = 0$, dokładność w $B_2$ daje $f_2 y = v_1 z$ dla pewnego $z \in B_1$. Surjektywność $f_1$ pozwala napisać $z = f_1 w$ dla $w \in A_1$. Stąd $f_2 y = v_1 f_1 w = f_2 u_1 w$. Iniektywność $f_2$ daje $y = u_1 w$, a więc $x = u_2 u_1 w = 0$.

*Surjektywność.* Weźmy $z \in B_3$. Surjektywność $f_4$ daje $a_4 \in A_4$ z $f_4 a_4 = v_3 z$. Teraz $f_5 u_4 a_4 = v_4 f_4 a_4 = v_4 v_3 z = 0$. Z iniektywności $f_5$ wynika $u_4 a_4 = 0$. Dokładność w $A_4$ daje $a_4 = u_3 x$ dla pewnego $x \in A_3$. Różnica $z - f_3 x$ leży w $\ker v_3$, bo $v_3(z - f_3 x) = v_3 z - f_4 u_3 x = 0$. Z dokładności w $B_3$ jest więc równa $v_2 y$ dla pewnego $y \in B_2$. Surjektywność $f_2$ daje $y = f_2 w$ dla $w \in A_2$, a wtedy $z = f_3 x + v_2 f_2 w = f_3(x + u_2 w)$. Otrzymaliśmy surjektywność $f_3$. □

*Dalsza lektura:* Algebraiczny długi ciąg homologii i kohomologii oraz homotopie kompleksów są opisane w *The Stacks Project*, rozdział *Homological Algebra*, https://stacks.math.columbia.edu/tag/010V. Zastosowania długich ciągów do geometrii topologicznej rozwija Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 2, https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf. Definicje potrzebne w obecnym rozdziale i dowody podstawowych twierdzeń podaliśmy bez używania jeszcze modeli symplicjalnych ani komórkowych.

# Rozdział 7

# Homotopia, nakrycia i komórkowe modele przestrzeni

W Rozdziale 6 kompleks łańcuchowy był ciągiem modułów i homomorfizmów. Aby zbudować taki kompleks z przestrzeni, nauczymy się rozkładać przestrzeń na proste części. Równolegle zapytamy, kiedy dwa odwzorowania można ciągle deformować jedno w drugie. Są to pytania topologiczne: gładkość nie jest tu potrzebna.

Zaczniemy od dróg i nakryć, następnie od sympleksów przejdziemy do CW-kompleksów. Homologia tych obiektów pojawi się w następnym rozdziale. Homotopii odwzorowań nie należy mylić z homotopią *łańcuchową* z Definicji 6.5.1; ta druga jest algebraicznym odpowiednikiem pierwszej.

## 7.1 Homotopie, drogi i grupa podstawowa

W całym rozdziale $I = [0,1]$. Parametr $t \in I$ można interpretować jako czas ciągłej deformacji. Obrazy pośrednie mogą być bardzo różne, lecz ciągłość wyklucza skoki i rozdarcia.

**Definicja 7.1.1** (Homotopia i równoważność homotopijna)**.** Dwa ciągłe odwzorowania $f, g : X \to Y$ są *homotopijne*, zapisujemy $f \simeq g$, jeśli istnieje ciągłe $H : X \times I \to Y$ z $H(x,0) = f(x)$ i $H(x,1) = g(x)$. Jeśli $f|_A = g|_A$ oraz $H(a,t) = f(a)$ dla $a \in A \subseteq X$ i $t \in I$, mówimy o homotopii *względem* $A$. Przestrzenie $X, Y$ są *homotopijnie równoważne*, gdy istnieją ciągłe $f : X \to Y$, $g : Y \to X$ z $gf \simeq \mathrm{id}_X$ i $fg \simeq \mathrm{id}_Y$.

Homeomorfizm ma prawdziwą odwrotność. Równoważność homotopijna dopuszcza odwrotność z dokładnością do deformacji. Dysk i punkt nie są homeomorficzne, ale są homotopijnie równoważne.

**Definicja 7.1.2** (Retrakt deformacyjny)**.** Podprzestrzeń $A \subseteq X$ jest *silnym retraktem deformacyjnym* $X$, jeśli istnieje ciągłe $H : X \times I \to X$ takie, że

$$H(x,0) = x, \qquad H(x,1) \in A, \qquad H(a,t) = a \quad (a \in A).$$

Odwzorowanie $r(x) := H(x,1)$ jest wówczas retrakcją $X \to A$. Przestrzeń homotopijnie równoważną punktowi nazywamy *ściągalną*.

**Przykład 7.1.3** (Promieniowa deformacja)**.** Dla $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ wzór

$$H(x,t) = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|}\right) x$$

daje silny retrakt deformacyjny $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ na $S^{n-1}$. Współczynnik jest dodatni, więc tor nie przechodzi przez usunięty początek. Dla $\|x\| = 1$ punkt pozostaje nieruchomy, a dla $t = 1$ otrzymujemy $x/\|x\|$. Każdy niepusty zbiór wypukły $C \subseteq \mathbb{R}^N$ jest ściągalny: dla wybranego $c_0 \in C$ stosujemy $H(x,t) = (1-t)x + tc_0$.


Do badania dziur potrzebujemy dróg, których końce pozostają nieruchome w czasie deformacji.

**Definicja 7.1.4** (Drogi, pętle i homotopia dróg)**.** *Droga* w $X$ to ciągłe $\alpha : I \to X$; jej początek i koniec to $\alpha(0)$ i $\alpha(1)$. Gdy oba są równe $x_0$, nazywamy ją *pętlą opartą w* $x_0$. Drogi $\alpha, \beta$ o tych samych końcach są homotopijne *względem końców*, jeśli łączy je homotopia $H : I \times I \to X$ z $H(0,t) = \alpha(0)$ i $H(1,t) = \alpha(1)$ dla każdego $t$. Gdy $\alpha(1) = \beta(0)$, określamy

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s), & 0 \le s \le \tfrac{1}{2}, \\ \beta(2s-1), & \tfrac{1}{2} \le s \le 1, \end{cases} \qquad \bar{\alpha}(s) = \alpha(1-s).$$

Symbol $\alpha * \beta$ oznacza: najpierw $\alpha$, potem $\beta$.

Homotopia względem końców jest relacją równoważności. Stała deformacja daje zwrotność, zamiana $t$ na $1-t$ daje symetrię, a sklejenie dwóch homotopii na połówkach przedziału czasu daje przechodniość; ciągłość wynika z lematu o sklejaniu.




Rysunek 7.1: Homotopia dróg przesuwa ich wnętrza, ale zachowuje oba punkty końcowe.

**Lemat 7.1.5** (Zmiana prędkości nie zmienia klasy)**.** *Jeśli $r : I \to I$ jest ciągła, niemalejąca i spełnia $r(0) = 0$, $r(1) = 1$, to $\alpha \circ r$ jest homotopijna z $\alpha$ względem końców.*

*Dowód.* Połóżmy $r_t(s) = (1-t)r(s) + ts$. Każde $r_t$ jest ciągłe, ma te same końce i wartości w $I$. Funkcja $H(s,t) = \alpha(r_t(s))$ jest ciągła. Dla $t = 0$ daje $\alpha \circ r$, dla $t = 1$ daje $\alpha$, a końce pozostają stałe. □

**Twierdzenie 7.1.6** (Grupa podstawowa)**.** *Klasy homotopii pętli opartych w $x_0$, z działaniem $[\alpha][\beta] = [\alpha * \beta]$, tworzą grupę $\pi_1(X, x_0)$. Element neutralny to stała pętla $c_{x_0}$, a odwrotnością $[\alpha]$ jest $[\bar{\alpha}]$.*

*Dowód.* Jeśli $H$ deformuje $\alpha$ w $\alpha'$, a $K$ deformuje $\beta$ w $\beta'$ względem końców, sklejenie

$$L(s,t) = \begin{cases} H(2s,t), & s \le \tfrac{1}{2}, \\ K(2s-1,t), & s \ge \tfrac{1}{2} \end{cases}$$

jest ciągłe, bo na wspólnej krawędzi obie części mają wartość $x_0$. Działanie nie zależy więc od reprezentantów.

Przy trzech pętlach $(\alpha * \beta) * \gamma$ przeznacza na $\alpha, \beta, \gamma$ odcinki czasu długości $1/4, 1/4, 1/2$, zaś $\alpha * (\beta * \gamma)$ długości $1/2, 1/4, 1/4$. Obie drogi przebiegają te same kawałki w tej samej kolejności i różnią się zmianą parametru. Lemat 7.1.5 daje łączność na klasach. Pętle $c_{x_0} * \alpha$ i $\alpha * c_{x_0}$ różnią się od $\alpha$ tylko chwilą postoju, więc $[c_{x_0}]$ jest neutralny.

Dla odwrotności określmy

$$H(s,t) = \begin{cases} \alpha(2(1-t)s), & 0 \le s \le \frac{1}{2}, \\ \alpha(2(1-t)(1-s)), & \frac{1}{2} \le s \le 1. \end{cases}$$

Przy $s = 1/2$ obie gałęzie są równe $\alpha(1-t)$, a przy $s = 0, 1$ mają wartość $x_0$. Jest to homotopia $\alpha * \bar{\alpha}$ do pętli stałej względem punktu bazowego. Zamiana $\alpha$ z $\bar{\alpha}$ daje też $[\bar{\alpha}][\alpha] = [c_{x_0}]$. □

**Stwierdzenie 7.1.7** (Odwzorowania indukowane i punkt bazowy)**.** *Odwzorowanie ciągłe $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ z $f(x_0) = y_0$ wyznacza homomorfizm*

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0), \qquad [\alpha] \mapsto [f \circ \alpha].$$

*Zachodzi $(gf)_* = g_* f_*$ i $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}$. Homotopia odwzorowań utrzymująca $x_0$ w $y_0$ daje równe homomorfizmy. Jeśli $u$ jest drogą od $x_0$ do $x_1$, to $b_u([\alpha]) = [\bar{u} * \alpha * u]$ jest izomorfizmem $\pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1)$.*

*Dowód.* Złożenie $f \circ H$ przenosi homotopię pętli w homotopię ich obrazów, a $f \circ (\alpha * \beta) = (f \circ \alpha) * (f \circ \beta)$. Równości dla złożeń wynikają stąd wprost. Jeśli $F$ jest homotopią odwzorowań utrzymującą punkt bazowy, $F(\alpha(s), t)$ jest homotopią pętli opartych w $y_0$. Wreszcie $b_u$ zachowuje iloczyn: w środku złożenia pojawia się $u * \bar{u}$, homotopijna z pętlą stałą. Odwrotność stanowi $b_{\bar{u}}$. □

**Wniosek 7.1.8** (Niezmienniczość grupy podstawowej)**.** *Jeśli $f \simeq g : X \to Y$ przez homotopię $H$, a $u(t) = H(x_0, t)$ prowadzi od $f(x_0)$ do $g(x_0)$, to $g_* = b_u \circ f_*$. Każda równoważność homotopijna $f : X \to Y$ daje więc izomorfizm grup podstawowych, po uwzględnieniu zmiany punktu bazowego.*

*Dowód.* Dla pętli $\alpha$ rozpatrzmy kwadrat $(s,t) \mapsto H(\alpha(s), t)$. Jego dolny i górny bok to $f\alpha$ i $g\alpha$, a oba pionowe boki to $u$. Brzeg kwadratu jest homotopijny do pętli stałej względem wybranego narożnika: w wypukłym kwadracie ściągamy jego parametryzację liniowo do tego narożnika, a następnie składamy z $H(\alpha(s), t)$. Zatem w grupie z punktem bazowym $g(x_0)$ mamy $[g\alpha] = [\bar{u} * (f\alpha) * u]$. To daje pierwszą równość.

Niech teraz $g$ będzie homotopijną odwrotnością $f$ i oznaczmy $y_0 = f(x_0)$. Homotopia $gf \simeq \mathrm{id}_X$ daje drogę $u$ od $gf(x_0)$ do $x_0$ i izomorfizm $b_u \circ (gf)_*$. Homotopia $fg \simeq \mathrm{id}_Y$ daje pewną drogę $v$ od $fg(y_0)$ do $y_0$ z $b_v \circ (fg)_* = \mathrm{id}$. Droga $fu$ ma te same końce, choć może nie być równa $v$. Ponieważ $b_{fu} \circ b_v^{-1}$ jest izomorfizmem, również $b_{fu} \circ (fg)_*$ jest izomorfizmem grupy $\pi_1(Y, y_0)$ na siebie (każda zmiana punktu bazowego jest izomorfizmem). Z naturalności konkatenacji $f_* \circ b_u = b_{fu} \circ f_*$ na odpowiednich grupach. Zatem dla $g'_* := b_u \circ g_*$ oba złożenia $g'_* f_*$ oraz $f_* g'_*$ są izomorfizmami. Pierwsze zapewnia iniektywność $f_*$, drugie jego surjektywność. □

Silna retrakcja deformacyjna z 7.1.2 daje izomorfizm grup podstawowych w punktach podprzestrzeni. Dla przestrzeni wypukłej każdą pętlę $\alpha$ można deformować wzorem $(1-t)\alpha(s) + tx_0$ do pętli stałej, nie ruszając punktu bazowego.

## 7.2 Nakrycia: lokalnie wiele kopii jednej przestrzeni

Nakrycie przypomina nałożenie kilku arkuszy na tę samą małą okolicę. Gdy idziemy po bazie, wybranie początkowego arkusza jednoznacznie ustala przebieg drogi na nakryciu. Po zamkniętej drodze możemy wrócić na inny arkusz.

**Definicja 7.2.1** (Nakrycie i arkusze)**.** Surjekcja ciągła $p : E \to X$ jest *nakryciem*, jeśli każdy $x \in X$ ma otwarte otoczenie $U$ takie, że


$$p^{-1}(U) = \coprod_{\lambda\in\Lambda} V_\lambda, \qquad p|_{V_\lambda} : V_\lambda \xrightarrow{\cong} U,$$

gdzie $V_\lambda$ są parami rozłącznymi otwartymi podzbiorami $E$, a ograniczenia $p|_{V_\lambda}$ są homeomorfizmami. Takie $U$ nazywamy *równomiernie nakrytym*, a $V_\lambda$ *arkuszami*. Włókno $p^{-1}(x)$ jest dyskretne.

**Przykład 7.2.2** (Prosta nad okręgiem)**.** Odwzorowanie

$$p : \mathbb{R} \to S^1, \qquad p(t) = e^{2\pi i t},$$

jest nakryciem. Jeśli $U$ jest krótkim, otwartym łukiem okręgu, wybierzmy przedział $J$ długości mniejszej niż 1, na którym $p|_J$ jest homeomorfizmem na $U$. Wtedy $p^{-1}(U) = \coprod_{k\in\mathbb{Z}}(J + k)$. Włókno nad 1 to $\mathbb{Z}$. Podobnie $q_m : S^1 \to S^1$, $q_m(z) = z^m$, jest $m$-krotnym nakryciem dla $m \geq 1$. Dwukrotne nakrycie $\mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$ pojawiło się już w Twierdzeniu 4.5.3.




Rysunek 7.2: Nakrycie $p : \mathbb{R} \to S^1$, $p(t) = e^{2\pi i t}$, przedstawione jako linia śrubowa nad okręgiem. Rzut pionowy odpowiada $p$. Punkty linii śrubowej oznaczone $t = 0, 1, 2$ leżą nad tym samym punktem $1 \in S^1$. Pokazano fragment linii śrubowej, która biegnie dalej w obie strony.

W poniższych dowodach użyjemy *liczby Lebesgue'a*: dla otwartego pokrycia zwartej przestrzeni metrycznej istnieje $\delta > 0$ takie, że każdy niepusty zbiór o średnicy mniejszej niż $\delta$ leży w jednym elemencie pokrycia. Oto uzasadnienie. Dla każdego $x$ wybierzmy $\varepsilon_x > 0$ tak, aby $B(x, 2\varepsilon_x)$ mieściła się w elemencie pokrycia. Ze zwartości skończenie wiele kul $B(x_i, \varepsilon_{x_i})$ pokrywa przestrzeń. Wystarczy $\delta = \min_i \varepsilon_{x_i}$: jeśli $y$ należy do jednej z tych mniejszych kul, wszystkie punkty zbioru zawierającego $y$ i o średnicy $< \delta$ leżą w odpowiadającej jej większej kuli. Stosujemy ten fakt do odcinka i kwadratu z ich zwykłą metryką.

**Twierdzenie 7.2.3** (Podnoszenie drogi i homotopii)**.** *Niech $p : E \to X$ będzie nakryciem.*

*(a) Każda droga $\gamma : I \to X$ i wybór $e_0 \in p^{-1}(\gamma(0))$ wyznaczają dokładnie jedną drogę $\widetilde{\gamma} : I \to E$ z $\widetilde{\gamma}(0) = e_0$ i $p\widetilde{\gamma} = \gamma$.*

*(b) Jeśli $H : I \times I \to X$ jest homotopią dróg, a $\widetilde{H}(s, 0)$ jest zadanym podniesieniem $H(s, 0)$, to istnieje dokładnie jedno ciągłe podniesienie $\widetilde{H}$ całego $H$. Gdy $H$ zachowuje końce dróg, podniesione końce również są stałe.*

*Dowód. Droga.* Przeciwobrazy równomiernie nakrytych otwartych $U$ tworzą otwarte pokrycie odcinka $I$. Z liczby Lebesgue'a tego pokrycia wybieramy podział $0 = t_0 < \cdots < t_N = 1$ tak

drobny, aby każdy obraz $\gamma([t_{j-1}, t_j])$ mieścił się w jednym $U_j$. Arkusz nad $U_1$ zawierający $e_0$ określa na pierwszym przedziale wzór

$$\widetilde{\gamma}(t) = (p|_{V_1})^{-1}(\gamma(t)).$$

W punkcie $t_1$ wybieramy arkusz nad $U_2$ zawierający uzyskany punkt włókna i powtarzamy. Wzory zgadzają się na końcach przedziałów, więc sklejają się w drogę ciągłą. Jeśli dwa podniesienia zgadzają się w pewnej chwili, to lokalnie leżą w tym samym arkuszu i są identyczne. Gdy w pewnej chwili się różnią, leżą nad tym samym punktem w różnych arkuszach, więc również w małej okolicy chwili pozostają różne. Zbiór chwil zgodności jest zatem otwarty i domknięty w spójnym $I$ oraz zawiera 0, co daje jednoznaczność.

*Homotopia.* Pokrycie $I^2$ zbiorami $H^{-1}(U)$ ma liczbę Lebesgue'a. Dzielimy kwadrat na skończoną siatkę małych prostokątów, z których każdy ma obraz w jednym równomiernie nakrytym $U$. Na dolnej krawędzi mamy zadaną drogę. Podnosimy prostokąty kolejno od dołu i od lewej: na każdym wybieramy arkusz zawierający już ustalony obraz jego narożnika i stosujemy $(p|_V)^{-1} \circ H$. Na wspólnej krawędzi oba wzory są podniesieniami tej samej drogi i zgadzają się w narożniku, więc na mocy (a) są równe. Skończone sklejanie daje ciągłą $\widetilde{H}$; lokalna jednoznaczność na spójnym $I^2$ daje jej jedyność. Jeśli $H(0,t)$ albo $H(1,t)$ jest stała, jej podniesienie leży w dyskretnym włóknie, więc też jest stałe. □

Stąd $p_* : \pi_1(E, e_0) \to \pi_1(X, p(e_0))$ jest iniektywny. Jeśli obraz pętli jest homotopijny do stałej pętli względem bazy, podnosimy homotopię od danej pętli w $E$. Końcowa podniesiona pętla leży w dyskretnym włóknie i jest stała.

**Twierdzenie 7.2.4** (Kryterium podnoszenia odwzorowań)**.** *Niech $Y$ będzie łukowo spójna i lokalnie łukowo spójna, $f : Y \to X$ ciągła, $p : E \to X$ nakryciem, a $p(e_0) = f(y_0)$. Istnieje ciągła $\widetilde{f} : Y \to E$ z $p\widetilde{f} = f$ i $\widetilde{f}(y_0) = e_0$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$f_*\pi_1(Y, y_0) \subseteq p_*\pi_1(E, e_0).$$

*Takie podniesienie jest jedyne.*

*Dowód.* Gdy $\widetilde{f}$ istnieje, $f = p\widetilde{f}$, zatem $f_* = p_*\widetilde{f}_*$, co daje konieczność. Załóżmy inkluzję. Dla $y \in Y$ wybierzmy drogę $\gamma$ od $y_0$ do $y$ i zdefiniujmy $\widetilde{f}(y)$ jako koniec podniesienia $f \circ \gamma$ z początkiem $e_0$. Gdy $\gamma'$ jest innym wyborem, pętla $f \circ (\gamma' * \bar{\gamma})$ ma klasę w obrazie $p_*$. Jest więc homotopijna względem punktu bazowego do obrazu pewnej pętli w $E$ o początku $e_0$. Podnosząc tę homotopię za pomocą Twierdzenia 7.2.3, otrzymujemy, że podniesienie $f \circ (\gamma' * \bar{\gamma})$ wraca do $e_0$. Druga część tego zamkniętego podniesienia jest podniesieniem $f \circ \bar{\gamma}$ kończącym się w $e_0$. Po odwróceniu jest, z jednoznaczności, podniesieniem $f \circ \gamma$ zaczynającym się w $e_0$. Podniesienia $f \circ \gamma$ i $f \circ \gamma'$ mają więc ten sam koniec.

Sprawdźmy ciągłość, której nie daje sama definicja punkt po punkcie. Wybierzmy równomiernie nakryte $U$ zawierające $f(y)$ oraz łukowo spójne otwarte $W \ni y$ z $f(W) \subseteq U$. Niech $V$ będzie arkuszem nad $U$ zawierającym $\widetilde{f}(y)$. Dla $z \in W$ połączmy $y$ z $z$ drogą w $W$ i dopiszmy ją do drogi od $y_0$ do $y$. Definicja i podnoszenie drogi pokazują wtedy, że $\widetilde{f}(z) = (p|_V)^{-1}(f(z))$. Na $W$ odwzorowanie jest więc ciągłe. Jedyność wynika z jedyności podniesienia każdej drogi od $y_0$. □

**Twierdzenie 7.2.5** (Grupa podstawowa okręgu)**.** *Podnoszenie względem $p : \mathbb{R} \to S^1$ z Przykładu 7.2.2 daje izomorfizm*

$$\mathrm{wind} : \pi_1(S^1, 1) \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}, \qquad [\gamma] \longmapsto \widetilde{\gamma}(1), \quad \widetilde{\gamma}(0) = 0.$$

*Liczba po prawej to* liczba owinięć.

*Dowód.* Ponieważ $\gamma(1) = 1$, koniec podniesienia leży w $p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$. Homotopijne pętle dają homotopię podniesień z nieruchomymi końcami, więc liczba zależy tylko od klasy. Jeśli podniesienie $\alpha$ kończy się w $k$, to podniesienie następnej pętli $\beta$ zaczynające się w $k$ jest przesunięciem o $k$ podniesienia zaczynającego się w 0. Stąd $\mathrm{wind}([\alpha * \beta]) = \mathrm{wind}([\alpha]) + \mathrm{wind}([\beta])$. Pętla $\gamma_k(s) = e^{2\pi iks}$ ma podniesienie $ks$, więc homomorfizm jest surjektywny. Gdy podniesienie $\widetilde{\gamma}$ wraca do 0, wzór $(s,t) \mapsto (1-t)\widetilde{\gamma}(s)$ deformuje ją w $\mathbb{R}$ do stałej drogi z zachowaniem końców. Projekcja tej homotopii do $S^1$ deformuje $\gamma$ do pętli stałej. Jądro jest zerowe. □

Z Przykładu 7.1.3 otrzymujemy $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$. W szczególności okrąg i punkt nie są homotopijnie równoważne. Obliczenie $\pi_1(S^n) = 0$ dla $n \geq 2$ wyniknie niżej z twierdzenia van Kampena.

**Definicja 7.2.6** (Lokalna spójność i warunek półlokalny)**.** Przestrzeń $X$ jest *lokalnie łukowo spójna*, gdy każdy punkt ma bazę otoczeń otwartych, które są łukowo spójne. Jest *półlokalnie jednospójna*, gdy każdy $x \in X$ ma otoczenie $U$, w którym każda pętla oparta w $x$ jest homotopijna do stałej względem punktu bazowego *w całym* $X$. Nie wymagamy, aby ta homotopia mieściła się w $U$. Przestrzeń łukowo spójna z $\pi_1(X, x_0) = 0$ jest *jednospójna*.

Każda rozmaitość topologiczna spełnia lokalne warunki z tej definicji, gdyż w otwartej mapie współrzędnych można wybrać małą kulę. Warunek półlokalny jest ważny: bez niego nakrycie uniwersalne może w ogóle nie istnieć.

**Twierdzenie 7.2.7** (Konstrukcja nakrycia uniwersalnego)**.** *Jeśli $X$ jest łukowo spójna, lokalnie łukowo spójna i półlokalnie jednospójna, to ma nakrycie $q : \widetilde{X} \to X$ z jednospójną przestrzenią $\widetilde{X}$.*

*Dowód.* Ustalmy $x_0 \in X$. Punktem $\widetilde{X}$ niech będzie klasa $[\gamma]$ drogi w $X$ zaczynającej się w $x_0$, przy czym homotopie zachowują oba końce. Definiujemy $q([\gamma]) = \gamma(1)$. Istnieje baza otwartych łukowo spójnych zbiorów $U \subseteq X$, w których każda pętla jest zerowa po włączeniu do $X$: najpierw wybieramy otoczenie z warunku półlokalnego, następnie w nim małe łukowo spójne otoczenie z lokalnej łukowej spójności. Każdą pętlę opartą w innym punkcie takiego $U$ przenosimy do jego wyróżnionego punktu drogą w $U$; izomorfizm zmiany punktu bazowego pokazuje, że ona też jest zerowa w $X$.

Dla drogi $\gamma$ kończącej się w $x \in U$ niech $W([\gamma], U)$ składa się z klas $[\gamma * \eta]$, gdzie $\eta$ jest drogą w $U$ od $x$ do dowolnego $y \in U$. Jeśli dwie takie drogi $\eta, \eta'$ mają ten sam koniec, to $\eta * \bar{\eta}'$ jest pętlą w $U$, zerową w $X$. Zatem $[\gamma * \eta] = [\gamma * \eta']$. Otrzymujemy bijekcję $q : W([\gamma], U) \to U$. Bierzemy wszystkie te zbiory jako bazę topologii. Sprawdźmy warunek przecięć: jeśli $[\beta] \in W([\gamma], U) \cap W([\gamma'], U')$, wybieramy otwarte łukowo spójne $O$ z naszej bazy, zawierające $\beta(1)$ i zawarte w $U \cap U'$. Wtedy $W([\beta], O)$ zawiera $[\beta]$ i mieści się w obu zbiorach: do drogi kończącej się w $\beta(1)$ dopisujemy tylko drogę w $O$. To dowodzi, że rzeczywiście otrzymujemy bazę. Ograniczenie $q$ do każdego $W$ jest ciągłe, ponieważ przeciwobrazy otwartych podzbiorów $U$ są sumami takich mniejszych zbiorów bazowych; jest też otwarte, bo mniejsze $W([\beta], O)$ przechodzą na otwarte $O$. Wcześniej wykazana bijekcja jest więc homeomorfizmem. Jeśli dwa $W$ nad tym samym $U$ mają wspólny punkt, ich drogi początkowe różnią się drogą w $U$ z dokładnością do homotopii w $X$, więc zbiory $W$ są równe. Dla mniejszych otoczeń używamy ograniczenia tych samych odwzorowań. Stąd $q^{-1}(U)$ jest rozłączną sumą arkuszy $W([\gamma], U)$: $q$ jest nakryciem.

Jest ono łukowo spójne. Drogę od klasy stałej $[c_{x_0}]$ do $[\gamma]$ otrzymujemy, biorąc po kolei klasy odcinków $\gamma|_{[0,t]}$ po przeparametryzowaniu na $I$; lokalnie leżą one w jednym $W$, więc tworzą ciągłą drogę. Jeśli pętla $\lambda$ w $\widetilde{X}$ jest oparta w $[c_{x_0}]$, jej rzut $\gamma = q\lambda$ ma podniesienie $\lambda$ i kończy się w tej samej klasie drogi. Konstrukcja podniesienia pokazuje, że ta klasa jest $[\gamma]$, więc $\gamma$ jest homotopijna do stałej pętli względem bazowego końca. Podnosimy tę homotopię, zaczynając od $\lambda$, za pomocą Twierdzenia 7.2.3. Na końcu dostajemy stałą pętlę w dyskretnym włóknie. Zatem $\pi_1(\widetilde{X}) = 0$. □

*Uwaga* 7.2.8 (Skąd podgrupy grupy podstawowej?). Dla spójnego nakrycia $p : (E, e_0) \to (X, x_0)$ iniekcja $p_*$ wyróżnia podgrupę $H = p_*\pi_1(E, e_0) \leq \pi_1(X, x_0)$. W warunkach Twierdzenia 7.2.7 każda taka podgrupa daje nakrycie: na klasach dróg w $\widetilde{X}$ grupa $\pi_1(X, x_0)$ działa przez $[\omega]\cdot[\gamma] = [\omega * \gamma]$, a iloraz $H\backslash\widetilde{X}$ jest nakryciem $X$. Istotnie, działanie przenosi $W([\gamma], U)$ na $W([\omega * \gamma], U)$, więc jest działaniem przez homeomorfizmy. Jest wolne: z $[\omega * \gamma] = [\gamma]$ po dopisaniu $\bar{\gamma}$ wynika $[\omega] = 1$. Co więcej, jeśli $hW \cap W \neq \varnothing$, to $hW = W$, bo są to arkusze nad tym samym $U$. Ponieważ $q$ jest iniektywne na $W$ i $q(hz) = q(z)$, element $h$ ustala punkt $z \in W$; stąd $h = 1$. Różne przesunięcia jednego arkusza są więc rozłączne. Projekcja na orbity jest otwarta: przeciwobraz obrazu zbioru otwartego $O$ jest sumą otwartych zbiorów $hO$. Obrazy arkuszy w ilorazie są zatem otwarte i każdy odwzorowuje się homeomorficznie na $U$. To uzasadnia własność nakrycia. Przestrzeń ilorazowa jest łukowo spójna jako obraz $\widetilde{X}$. Podniesienie pętli $\gamma$ z $x_0$ kończy się w orbicie $[\gamma]$; wraca do orbity drogi stałej dokładnie wtedy, gdy $[\gamma] \in H$. Ponieważ obraz homomorfizmu indukowanego przez nakrycie składa się właśnie z klas mających zamknięte podniesienie, skonstruowane nakrycie realizuje dokładnie podgrupę $H$. Z drugiej strony kryterium 7.2.4 podnosi $q : \widetilde{X} \to X$ do $E$, z ustaloną wartością $e_0$. Przy obecnych założeniach $E$ jest lokalnie łukowo spójna, więc jej spójność daje łukową spójność: składowe łukowe są otwarte. Każdy punkt $E$ można połączyć z $e_0$ drogą; rzut tej drogi pokazuje, że podniesione odwzorowanie $\widetilde{X} \to E$ jest surjektywne. Dwa punkty $[\gamma], [\gamma']$ nad tym samym punktem $X$ trafiają w ten sam punkt $E$ dokładnie wtedy, gdy $[\gamma' * \bar{\gamma}] \in H$. W jedną stronę składamy podniesione drogi o wspólnym końcu, otrzymując pętlę w $E$; w drugą używamy podnoszenia homotopii jak w dowodzie kryterium podnoszenia. Ten warunek jest też równoważny przynależności do jednej orbity, gdyż $[\gamma' * \bar{\gamma}]\cdot[\gamma] = [\gamma']$. Lokalnie obie projekcje są homeomorfizmami na $U$, co daje $E \cong H\backslash\widetilde{X}$ nad $X$. Zmiana wybranego punktu $e_0$ sprzęga podgrupę $H$: droga w $E$ między dwoma punktami nad $x_0$ rzutuje się na pętlę $u$, a zmiana bazy zastępuje $H$ podgrupą $[\bar{u}]H[u]$. Odwrotnie, dowolną pętlę $u$ w $X$ można podnieść z $e_0$; jej koniec wybiera punkt włókna realizujący właśnie to sprzężenie. Tak powstaje klasyfikacja spójnych nakryć przez klasy sprzężoności podgrup $\pi_1(X, x_0)$.

## 7.3 Twierdzenie van Kampena i pierwsze obliczenia

Nakrycie okręgu mierzy jedną liczbę owinięć. Gdy przestrzeń składa się z kilku części, potrzebujemy sposobu łączenia informacji o pętlach w tych częściach.

**Twierdzenie 7.3.1** (van Kampen: dwa otwarte zbiory). *Niech $X = U \cup V$, gdzie $U, V$ są otwarte, łukowo spójne, a $U \cap V$ jest łukowo spójne i zawiera $x_0$. Jeśli $G_U = \pi_1(U, x_0)$, $G_V = \pi_1(V, x_0)$ oraz $G_0 = \pi_1(U \cap V, x_0)$, a $i_U : U \cap V \hookrightarrow U$ i $i_V : U \cap V \hookrightarrow V$ są inkluzjami, to*

$$\pi_1(X, x_0) \cong (G_U * G_V)/\left\langle\!\left\langle (i_U)_*(h)(i_V)_*(h)^{-1} : h \in G_0 \right\rangle\!\right\rangle .$$

*Iloczyn wolny wprowadziliśmy w Definicji 5.1.4; postać normalną i własność uniwersalną uzasadnia Stwierdzenie 5.1.8. Zapis $\langle\langle\cdot\rangle\rangle$ oznacza domknięcie normalne z Definicji 5.1.2.*

*Dowód.* Inkluzje $U, V \hookrightarrow X$, przez własność uniwersalną iloczynu wolnego, określają homomorfizm $\Phi : G_U * G_V \to \pi_1(X, x_0)$. Pętla w $U \cap V$ daje ten sam obraz niezależnie od wyboru strony. Zatem wszystkie relacje z tezy leżą w $\ker\Phi$.

*Surjektywność.* Dla pętli $\alpha : I \to X$ przeciwobrazy $U, V$ pokrywają zwarty odcinek. Dzielimy go na tyle małych przedziałów, aby obraz każdego leżał w $U$ albo $V$. Sąsiednie kawałki przypisane temu samemu zbiorowi łączymy. Każdy punkt przejścia między kawałkiem w $U$ i kawałkiem w $V$ leży w $U \cap V$. Łączymy go z $x_0$ pomocniczą drogą w $U \cap V$. Jeśli $\lambda_j$ prowadzi od $x_0$ do $j$-tego punktu przejścia, to z kawałka $\alpha_j$ budujemy pętlę $\lambda_{j-1} * \alpha_j * \bar{\lambda}_j$ całkowicie w $U$ albo w $V$. Iloczyn tych pętli odtwarza $\alpha$: sąsiednie $\bar{\lambda}_j * \lambda_j$ kasują się na mocy Twierdzenia 7.1.6.

Zmiana drogi $\lambda_j$ na $\lambda'_j$ wyznacza pętlę $h = \lambda'_j * \bar{\lambda}_j$ w $U \cap V$ *opartą w* $x_0$. Poprzedni czynnik słowa mnożymy z prawej przez $h^{-1}$, a następny z lewej przez $h$. Oba zapisy $h$ są równe w ilorazie z tezy, więc się skracają. Również dopisanie podziału wewnątrz jednego otwartego zbioru nie zmienia otrzymanej klasy słowa.

*Jądro.* Przypuśćmy, że słowo z $G_U * G_V$ daje pętlę homotopijną do stałej w $X$. Wypełnijmy ją homotopią $F : I^2 \to X$, stałą na pozostałych trzech bokach. Zwartość kwadratu pozwala wybrać siatkę tak drobną, by obraz każdego małego prostokąta leżał w całości w $U$ lub w $V$. Podział dolnego boku dobieramy także tak, aby zawierał końce pętli reprezentujących litery wyjściowego słowa. Dla każdego wierzchołka $z$ siatki wybierzmy drogę $\mu_z$ od $x_0$ do $F(z)$. Jeśli $F(z) \in U \cap V$, wybieramy ją w przecięciu; jeśli $F(z)$ należy tylko do jednego zbioru, wybieramy drogę w tym zbiorze. Jest to możliwe dzięki założeniom o łukowej spójności. Przy $F(z) = x_0$ wybieramy drogę stałą.

Zorientowanej krawędzi $e : z \to w$ przypisujemy klasę $[\mu_z * (F|_e) * \bar{\mu}_w]$ w grupie zbioru zawierającego obraz sąsiedniego prostokąta. Obie drogi pomocnicze leżą w tym zbiorze. Jeżeli dwa sąsiednie prostokąty mają różne oznaczenia, ich wspólna krawędź i obie drogi pomocnicze leżą w $U \cap V$, więc przypisania dają ten sam element ilorazu z tezy. Odwrócenie krawędzi daje element odwrotny.

Iloczyn czterech elementów wokół jednego prostokąta jest jedynką: drogi pomocnicze skracają się parami, a jego brzeg jest homotopijny do stałej we właściwym $U$ lub $V$, przez mapę $F$ na tym prostokącie. Możemy zatem zastępować dwa kolejne boki prostokąta pozostałymi dwoma, z tymi samymi końcami, bez zmiany elementu ilorazu. Przesuwając tak łamaną po kolejnych prostokątach, wiersz po wierszu, zamieniamy dolny bok kwadratu na drogę wzdłuż pozostałych trzech boków. Te trzy boki są stałe. Na dolnym boku drogi pomocnicze wewnątrz każdej pierwotnej litery skracają się w jej grupie, a przy końcach liter są stałe. Odtwarzamy więc dokładnie wyjściowe słowo, które okazało się jedynką w ilorazie. Każdy krok używał tylko relacji wewnątrz obu grup i relacji pochodzących z przecięcia. Stąd $\ker \Phi$ zawiera się we wskazanym domknięciu normalnym relacji $N$; przeciwna inkluzja wynika z pierwszego kroku, bo jądro jest podgrupą normalną. Wzór $gN \mapsto \Phi(g)$ jest więc dobrze określonym homomorfizmem na ilorazie. Jest surjektywny, a jego jądro jest trywialne, ponieważ $\Phi(g) = 1$ zachodzi dokładnie dla $g \in N$. Daje to żądany izomorfizm. □

**Przykład 7.3.2** (Dwa okręgi złączone w punkcie)**.** Niech $X = S^1_a \vee S^1_b$. Wybierzmy na każdym okręgu po jednym punkcie różnym od punktu sklejenia $x_0$. Usuwając punkt z drugiego okręgu, otrzymujemy otwarty $U$ retrakcyjny na $S^1_a$; analogicznie $V$ retrakcyjny na $S^1_b$. Przecięcie $U \cap V$ jest ściągalne (to dwa otwarte łuki spotykające się w $x_0$). Wobec tego

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} =: F(a, b).$$

Słowa $ab$ i $ba$ są różne: grupa podstawowa nie musi być przemienna.

**Przykład 7.3.3** (Sfera wymiaru co najmniej dwa)**.** Niech $n \geq 2$. Zbiory $U = S^n \setminus \{N\}$ i $V = S^n \setminus \{S\}$, gdzie $N, S$ są biegunami, są homeomorficzne z $\mathbb{R}^n$, więc mają trywialne grupy podstawowe. Ich przecięcie jest łukowo spójne: deformuje się na równik $S^{n-1}$, który jest łukowo spójny dla $n - 1 \geq 1$. Twierdzenie 7.3.1 daje $\pi_1(S^n) = 0$. Stąd $\pi_1(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = 0$ dla $n \geq 2$, co odróżnia ten przypadek od płaszczyzny.

## 7.4 Sympleksy i triangulacje


Sympleks jest najprostszym wielowymiarowym klockiem: odcinek w wymiarze 1, trójkąt w wymiarze 2, czworościan w wymiarze 3. Współrzędne barycentryczne opisują zarazem punkt i to, na której ścianie leży.

**Definicja 7.4.1** (Sympleks standardowy i ściany)**.** Dla $n \geq 0$ *standardowy $n$-sympleks* to

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \ldots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{n} t_i = 1 \right\}.$$

Jego wierzchołki to wektory $e_0, \ldots, e_n$. *Wnętrze* oznacza $t_i > 0$ dla wszystkich $i$ (względem afinicznej otoczki sympleksu). Dla $n \geq 1$ *ściana kowymiaru jeden* naprzeciw $e_i$ jest zadana równaniem $t_i = 0$ i jest kopią $\Delta^{n-1}$. Ogólniej ścianę wyznacza dowolny niepusty podzbiór wierzchołków; jest właściwa, gdy pomija choć jeden z nich. Suma wszystkich właściwych ścian to $\partial\Delta^n$. Przy $n = 0$ nie ma niepustych właściwych ścian i $\partial\Delta^0 = \varnothing$. Punkty $v_0, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^N$ są *afinicznie niezależne*, jeśli $v_1 - v_0, \ldots, v_n - v_0$ są liniowo niezależne. Ich otoczka wypukła $[v_0, \ldots, v_n]$ jest *geometrycznym $n$-sympleksem*.

Każdy punkt sympleksu ma postać $x = \sum_i t_i v_i$. Współczynniki $t_i$ są jednoznaczne: jeśli $\sum_i (t_i - s_i)v_i = 0$ i obie sumy współczynników są równe 1, to $\sum_{i=1}^{n}(t_i - s_i)(v_i - v_0) = 0$; afiniczna niezależność wymusza $t_i = s_i$ dla wszystkich $i$. W szczególności usunięcie jednego wierzchołka daje ścianę o wymiarze $n - 1$.




Rysunek 7.3: Sympleksy wymiarów $0, 1, 2$: punkt, odcinek i wypełniony trójkąt. Wymiar $n$ odpowiada $n + 1$ afinicznie niezależnym wierzchołkom; ściany powstają przez ich usunięcie.

**Stwierdzenie 7.4.2** (Brzeg sympleksu jest sferą)**.** *Dla $n \geq 1$ przestrzeń $\Delta^n$ jest homeomorficzna z dyskiem $D^n$, a $\partial\Delta^n$ z $S^{n-1}$.*

*Dowód.* Pracujemy w $n$-wymiarowej płaszczyźnie afinicznej $P = \{\sum t_i = 1\}$. Środek $c = (1/(n+1), \ldots, 1/(n+1))$ leży we wnętrzu. Każdy promień z $c$ w $P$ przecina brzeg dokładnie raz: nierówności $t_i \geq 0$ wyznaczają na nim odcinek od $c$ do pierwszej ściany, na której pewna współrzędna staje się zerem. Przypisanie punktowi brzegowemu $x$ kierunku $(x - c)/\|x - c\|$ jest ciągłą bijekcją $\partial\Delta^n \to S^{n-1}$ po utożsamieniu $P - c \cong \mathbb{R}^n$. Dziedzina jest zwarta, a sfera Hausdorffa, więc odwrotność jest ciągła. Jeśli $b(u)$ jest tą odwrotnością dla kierunku $u \in S^{n-1}$, wzór $ru \mapsto c + r(b(u) - c)$, $0 < r \leq 1$, z wartością $c$ w zerze daje ciągłą bijekcję z $D^n$ na $\Delta^n$. Ciągłość w zerze wynika z ograniczoności $b(u) - c$. Ponownie zwartość i własność Hausdorffa dają homeomorfizm, który na brzegu jest poprzednią identyfikacją. Dla $n = 1$ brzeg składa się z dwóch punktów, czyli jest $S^0$. □

**Definicja 7.4.3** (Skończony kompleks symplicjalny)**.** Niech $V$ będzie skończonym zbiorem wierzchołków. *Kompleks symplicjalny $K$* to rodzina niepustych skończonych podzbiorów $V$ taka, że jeśli $\sigma \in K$ i $\varnothing \neq \tau \subseteq \sigma$, to $\tau \in K$. Zbiór o $n+1$ wierzchołkach nazywamy *$n$-sympleksem $K$*. Jego *realizacja geometryczna* to

$$|K| = \left\{ \sum_{v \in V} t_v e_v : t_v \geq 0,\ \sum_v t_v = 1,\ \{v : t_v > 0\} \in K \right\} \subseteq \mathbb{R}^V.$$

Kompleks $L \subseteq K$ zamknięty na przechodzenie do ścian jest *podkompleksem*. *Skończona triangulacja* przestrzeni $X$ to homeomorfizm $|K| \to X$. W tej sekcji ograniczamy się do skończonych kompleksów; ich realizacje są zwarte. Triangulacje przestrzeni niezwartych wymagają dopuszczenia nieskończenie wielu sympleksów.

W tej definicji dwie różne ściany mają dokładnie to wspólne, co wynika ze wspólnych wierzchołków. Na przykład trzy krawędzie $[v_0, v_1]$, $[v_1, v_2]$, $[v_2, v_0]$, bez wnętrza trójkąta, realizują okrąg. Po dodaniu $[v_0, v_1, v_2]$ otrzymujemy dysk. Słowo *podkompleks* jest ważniejsze niż dowolny podzbiór: zawiera wraz z sympleksem wszystkie jego ściany.

*Uwaga* 7.4.4 (Nie każdy podział na trójkąty jest kompleksem symplicjalnym). Kwadrat z utożsamionymi przeciwległymi bokami przedstawia torus. Gdy podzielimy go jedną przekątną, po sklejeniu wszystkie cztery narożniki stają się jednym wierzchołkiem, a każda z dwóch trójkątnych części nadal ma sens. Nie jest to *kompleks symplicjalny* z jednym wierzchołkiem: trójkąt potrzebuje trzech różnych wierzchołków. Wygodniejszym opisem są $\Delta$-kompleksy.

**Definicja 7.4.5** ($\Delta$-kompleks)**.** *$\Delta$-kompleks* $X$ jest przestrzenią Hausdorffa z rodziną ciągłych odwzorowań charakterystycznych $\sigma_\alpha : \Delta^{n_\alpha} \to X$:

(i) ograniczenie $\sigma_\alpha$ do wnętrza jest iniektywne, a obrazy wnętrz różnych sympleksów są rozłączne i pokrywają $X$;

(ii) ograniczenie $\sigma_\alpha$ do każdej ściany jest jednym z odwzorowań charakterystycznych niższego wymiaru po standardowym afinicznym utożsamieniu tej ściany z sympleksem, zachowującym kolejność pozostałych wierzchołków;

(iii) $A \subseteq X$ jest domknięty dokładnie wtedy, gdy $\sigma_\alpha^{-1}(A)$ jest domknięty w każdym $\Delta^{n_\alpha}$.


Różne ściany tego samego sympleksu mogą być tu sklejone, o ile zgodne są odwzorowania na ich dalszych ścianach.

Ostatni warunek to *topologia słaba* względem odwzorowań charakterystycznych: odwzorowanie z $X$ do innej przestrzeni jest ciągłe dokładnie wtedy, gdy jego złożenia z każdą $\sigma_\alpha$ są ciągłe. Jest to topologia ilorazowa z Definicji 1.1.5 na rozłącznej sumie wszystkich sympleksów.

**Przykład 7.4.6** (Okrąg i torus jako $\Delta$-kompleksy)**.** Okrąg ma jeden 0-sympleks $v$ i jeden 1-sympleks, którego oba końce przechodzą w $v$. Dla torusa podzielmy kwadrat $[0,1]^2$ przekątną i sklejmy $(0,t) \sim (1,t)$ oraz $(s,0) \sim (s,1)$. Otrzymujemy jeden wierzchołek, trzy krawędzie (poziomą $a$, pionową $b$ i przekątną $c$) oraz dwa 2-sympleksy. Porządkujemy ich wierzchołki jako $((0,0),(0,1),(1,1))$ i $((0,0),(1,0),(1,1))$. Oba porządki nadają krawędziom poziomym kierunek w prawo, pionowym w górę, a przekątnej kierunek od $(0,0)$ do $(1,1)$. Mapy ścian są zatem zgodne także z porządkiem wierzchołków. Iloraz jest homeomorficzny z $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$: odwzorowanie $(s,t) \mapsto ([s],[t])$ identyfikuje dokładnie wskazane punkty brzegowe, jest ciągłe i przechodzi na bijekcję między przestrzenią zwartą a przestrzenią Hausdorffa.

## 7.5 Grafy i drzewa

Graf $\Gamma = (V, E)$ składa się ze zbioru *wierzchołków* $V$ i zbioru *krawędzi* $E$, z których każda łączy dwa różne wierzchołki. Ciąg kolejnych krawędzi to *droga*; jest *prosta*, gdy nie powtarza wierzchołków. *Cykl* jest zamkniętą drogą bez powtórzeń poza wspólnym początkiem i końcem. Graf jest *spójny*, jeśli każde dwa wierzchołki łączy droga.




Rysunek 7.4: Torus z dwóch sympleksów: boki o tych samych kolorach i kierunkach sklejamy ze sobą. Przekątna pozostaje trzecią krawędzią. Wszystkie cztery narożniki reprezentują ten sam wierzchołek torusa.

**Definicja 7.5.1** (Drzewo, las i korzeń)**.** *Drzewo* to spójny graf bez cykli. *Las* to graf bez cykli, czyli rozłączna suma drzew. W *drzewie zakorzenionym* wyróżniamy wierzchołek zwany korzeniem; odległość od niego, liczona liczbą krawędzi jedynej drogi, jest poziomem wierzchołka. Wierzchołek o jednej krawędzi nazywamy *liściem*, gdy nie jest korzeniem.

Na przykład droga z czterech wierzchołków jest drzewem o trzech krawędziach, a trójkąt nie jest drzewem, bo zawiera cykl. W drzewie między dwoma wierzchołkami istnieje dokładnie jedna droga prosta: spójność daje istnienie, a dwie różne drogi utworzyłyby cykl. Jeśli skończone drzewo ma $v$ wierzchołków, ma $v-1$ krawędzi. Dla $v>1$ koniec najdłuższej drogi jest liściem; po usunięciu tego liścia i jego krawędzi pozostaje drzewo, więc wzór wynika przez indukcję. Dla lasu o $c$ składowych ten sam rachunek daje $|E| = |V| - c$. W drzewach nieskończonych użyjemy tylko jedyności skończonych dróg; wzór na liczby wierzchołków i krawędzi dotyczy grafów skończonych.

## 7.6 CW-kompleksy i dołączanie komórek

Trójkąty są wygodne do obliczeń, lecz potrafią wymagać wielu wierzchołków. Komórka pozwala dołączyć naraz cały otwarty dysk, przy czym jego brzeg może biec po starszej części przestrzeni w sposób nietrywialny.

**Definicja 7.6.1** (Dołączenie komórki)**.** Niech $Y$ będzie przestrzenią i $\varphi : S^{n-1} = \partial D^n \to Y$ odwzorowaniem ciągłym, $n \geq 1$. *Dołączeniem $n$-komórki* jest przestrzeń ilorazowa

$$Y \cup_\varphi D^n := (Y \sqcup D^n)/(z \sim \varphi(z) \text{ dla } z \in S^{n-1}).$$


Obraz wnętrza dysku oznaczamy $e^n$. Odwzorowanie z dysku do ilorazu jest *odwzorowaniem charakterystycznym* tej komórki; $\varphi$ nazywamy *odwzorowaniem dołączającym*. W wymiarze 0 po prostu dołączamy izolowany punkt, gdyż $S^{-1} = \varnothing$.

Naturalna inkluzja $Y$ w przestrzeń dołączoną jest homeomorfizmem na domknięty obraz. Dla każdego domkniętego $F \subseteq Y$ przeciwobraz jego obrazu w $Y \sqcup D^n$ jest równy $F \sqcup \varphi^{-1}(F)$ i jest domknięty; dotyczy to również $F = Y$. Ponieważ na punktach $Y$ nie wprowadzamy nowych utożsamień, otrzymujemy to stwierdzenie. Wnętrze $D^n$ jest natomiast otwartym zbiorem nasyconym, bez żadnych utożsamień, więc przechodzi homeomorficznie na otwartą komórkę $e^n$.

Topologia ilorazowa z Definicji 1.1.5 ma tu konkretne znaczenie. Jeśli $F : Y \cup_\varphi D^n \to Z$ ma być ciągła, wystarczy podać ciągłe $F_Y : Y \to Z$ i $F_D : D^n \to Z$ zgodne na brzegu:

$F_D(z) = F_Y(\varphi(z))$. Istotnie, takie odwzorowania dają ciągłe odwzorowanie na rozłącznej sumie, stałe na każdej klasie sklejenia; uniwersalna własność ilorazu przenosi je na iloraz. To jest praktyczny sposób konstruowania odwzorowań na przestrzeniach sklejonych.

**Definicja 7.6.2** (CW-kompleks)**.** *CW-kompleks* $X$ jest przestrzenią Hausdorffa budowaną ze szkieletów $X^0 \subseteq X^1 \subseteq X^2 \subseteq \cdots$: $X^0$ jest dyskretnym zbiorem punktów, a $X^n$ powstaje z $X^{n-1}$ przez dołączenie rodziny $n$-dysków odwzorowaniami $S^{n-1} \to X^{n-1}$. Przestrzeń $X = \bigcup_n X^n$ ma *topologię słabą*: $A \subseteq X$ jest domknięty, dokładnie wtedy, gdy przeciwobraz $A$ pod każdym odwzorowaniem charakterystycznym $D^n \to X$ jest domknięty. Wymagamy ponadto *skończoności domknięć komórek*: domknięcie każdej komórki spotyka tylko skończenie wiele komórek. Litery CW przypominają te dwa warunki (*closure-finite*, *weak topology*). *Podkompleks CW* to suma komórek domknięta w $X$; jeśli zawiera komórkę, zawiera także całe jej domknięcie.




Rysunek 7.5: Przykłady kolejnych wymiarów CW: punkt $X^0 = \{v\}$, okrąg $X^1 \cong S^1$ otrzymany przez sklejenie obu końców 1-komórki z $v$, oraz dysk $X^2 \cong D^2$ po dołączeniu 2-komórki wzdłuż całego okręgu. Czerwony punkt, niebieski łuk i zielone wnętrze oznaczają odpowiednio otwarte komórki wymiarów $0, 1, 2$.

W kompleksie skończonym warunki topologiczne łatwo sprawdzić bez osobnej teorii granic: topologia słaba jest ilorazową topologią sklejania skończenie wielu dysków, a domknięcie każdej komórki spotyka tylko skończenie wiele innych. Przy nieskończenie wielu komórkach topologia słaba jest konieczna, aby ciągłość dało się sprawdzać na wszystkich domkniętych komórkach.

**Stwierdzenie 7.6.3** (Sympleksy dają komórki)**.** *Skończony kompleks symplicjalny i skończony $\Delta$-kompleks są CW-kompleksami: ich otwarte komórki to obrazy wnętrz sympleksów.*

*Dowód.* Indukujemy po wymiarze. Szkielet zerowy składa się z wierzchołków. Wnętrze każdego $n$-sympleksu jest rozłączne z obrazami innych wnętrz, a brzeg jest sumą ścian zawartych w poprzednim szkielecie. Stwierdzenie 7.4.2 pozwala traktować sympleks jako dysk $D^n$, którego odwzorowanie na brzegu jest odwzorowaniem dołączającym. Warunek o topologii jest w Definicji 7.4.5 podany wprost, a dla skończonej realizacji symplicjalnej wynika z topologii skończonej sumy zwartych sympleksów: ciągła surjekcja z tej sumy na $|K| \subseteq \mathbb{R}^V$ jest domknięta, gdyż obrazy zbiorów domkniętych są zwarte w przestrzeni Hausdorffa. Jest więc odwzorowaniem ilorazowym, co daje właśnie wymaganą topologię. Skończona liczba sympleksów zapewnia skończoność domknięć komórek. □


**Przykład 7.6.4** (Minimalne struktury komórkowe)**.** (1) Dla $n \geq 1$ sfera $S^n$ ma jedną 0-komórkę i jedną $n$-komórkę: $D^n/S^{n-1} \cong S^n$. Jawny homeomorfizm opisujemy poniżej. Dla $S^0$ używamy dwóch 0-komórek.

(2) Torus ma jedną 0-komórkę, dwie 1-komórki $a, b$ oraz jedną 2-komórkę. Obchodząc brzeg kwadratu z Rysunku 7.4, otrzymujemy słowo $aba^{-1}b^{-1}$ w $S^1 \vee S^1$. Dwa trójkąty realizacji $\Delta$-kompleksowej zostały zastąpione jednym dyskiem, którego odwzorowanie dołączające zapamiętuje sklejanie.

**Przykład 7.6.5** (Sfera $S^2$ bez 1-komórek)**.** Weźmy $X^0 = \{v\}$ i nie dołączajmy żadnej 1-komórki, więc $X^1 = X^0$. Niech odwzorowanie dołączające $\varphi : \partial D^2 = S^1 \to \{v\}$ będzie stałe. Wtedy

$$X^2 = X^1 \cup_\varphi D^2 \cong D^2/\partial D^2 \cong S^2.$$

Cały brzeg dysku staje się *jednym* punktem $v$; obraz jego wnętrza jest jedną otwartą 2-komórką $e^2 = S^2 \setminus \{v\} \cong \mathbb{R}^2$. Rysunek 7.6 pokazuje to sklejenie. W szczególności $X^1$ nie jest okręgiem: okrąg po lewej stronie rysunku to brzeg *dołączanego dysku*, a nie komórka przestrzeni wynikowej.




Rysunek 7.6: Struktura CW sfery: $D^2$ dołączamy do punktu $v$ odwzorowaniem stałym na całym brzegu; $q : D^2 \to D^2/\partial D^2$ jest mapą ilorazową. W powstałej sferze czerwony punkt to jedyne $e^0$, a cała pozostała powierzchnia to jedna otwarta komórka $e^2$. Nie występują komórki wymiaru 1.

*Uwaga* 7.6.6 (Uwaga o ilorazie dysku). W punkcie (1) nie potrzebujemy identyfikować półkuli z ilorazem za pomocą niejawnego rysunku. Istnieje jawne ciągłe odwzorowanie $D^n \to S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$,

$$x \longmapsto (\sin(\pi\|x\|)\, x/\|x\|, \cos(\pi\|x\|)) \quad (x \neq 0),$$

z wartością $(0, \ldots, 0, 1)$ w $x = 0$. Cały brzeg $\|x\| = 1$ przechodzi w biegun południowy, a na wnętrzu odwzorowanie jest iniektywne i pokrywa sferę bez tego bieguna. Przechodzi więc na ciągłą bijekcję $D^n/S^{n-1} \to S^n$, która jest homeomorfizmem przez zwartość dziedziny i własność Hausdorffa sfery.

**Twierdzenie 7.6.7** (Co robi dołączenie komórki z $\pi_1$?)**.** *Niech $Y$ będzie łukowo spójna, a $X = Y \cup_\varphi D^n$. Jeśli $n = 2$, po wyborze drogi od punktu bazowego do $\varphi(S^1)$ grupa $\pi_1(X)$ jest ilorazem $\pi_1(Y)$ przez domknięcie normalne klasy pętli $\varphi$. Jeśli $n \geq 3$, włączenie $Y \hookrightarrow X$ wyznacza izomorfizm na $\pi_1$.*

*Dowód.* W dysku wybierzmy promień $r = \|x\|$. Otwarty w $X$ zbiór $U$ złożony z $Y$ i pasa $r > 1/3$ deformuje się na $Y$: przesuwamy punkty pasa promieniowo do $r = 1$, a punkty $Y$ zostawiamy. Na części dyskowej homotopia ma wzór $ru \mapsto ((1-t)r + t)u$, gdzie $u \in S^{n-1}$. Wyjaśnijmy ciągłość przy sklejanym $Y$. Dla otwartego otoczenia $O$ punktu $y \in Y$ zmniejszamy jego część dyskową do punktów $ru$, dla których $\varphi(u) \in O \cap Y$ i cały odcinek $\{\rho u : r \leq \rho \leq 1\}$ leży w przeciwobrazie $O$. Ta część jest otwarta: zawieranie zwartego odcinka w zbiorze otwartym zachowuje się przy małej zmianie $r, u$. Wraz z $O \cap Y$ tworzy otwarte otoczenie $y$ w ilorazie, którego obraz przez homotopię pozostaje w $O$ dla wszystkich $t$. Dowodzi to ciągłości przy $Y$; na wnętrzu dysku wynika ona z podanego wzoru. Drugi otwarty zbiór $V$ jest obrazem $r < 2/3$; jest to ściągalne wnętrze dysku. Przecięcie $U \cap V$ to pierścień $1/3 < r < 2/3$, homotopijnie równoważny $S^{n-1}$. Jest łukowo spójne dla $n \geq 2$. Otwartość obu zbiorów sprawdzamy przed sklejeniem: przeciwobrazy $U$ to całe $Y$ i otwarty w $D^n$ pas $r > 1/3$, a przeciwobraz $V$ to $r < 2/3$, bez punktów $Y$.

Twierdzenie 7.3.1 z $G_V = 1$ mówi, że $\pi_1(X)$ jest ilorazem $\pi_1(U) \cong \pi_1(Y)$ przez domknięcie normalne obrazu $\pi_1(U \cap V)$. Przy $n = 2$ generator $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ po przejściu przez retrakcję

$U \to Y$ staje się pętlą $\varphi$ (z uwzględnieniem drogi do punktu bazowego). Przy $n \geq 3$ mamy $\pi_1(S^{n-1}) = 0$ z Przykładu 7.3.3, więc nie pojawia się żadna relacja ani nowy generator. □

**Przykład 7.6.8** (Torus i powierzchnia rzutowa)**.** Dla torusa część jednowymiarowa jest $S^1 \vee S^1$, z grupą $F(a, b)$ z Przykładu 7.3.2. Dołączona 2-komórka wymusza $aba^{-1}b^{-1} = 1$, czyli

$$\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid ab = ba \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Rachunek tej prezentacji przeprowadziliśmy w Przykładzie 5.1.10; dołączenie komórki uzasadnia teraz topologicznie pochodzenie relacji. Drugim przykładem jest $\mathbb{R}P^2$: dysk będący górną półkulą $S^2$ ma na brzegu antypody utożsamione, więc $\mathbb{R}P^2$ ma 0-komórkę, 1-komórkę i 2-komórkę dołączoną do $S^1 \cong \mathbb{R}P^1$ odwzorowaniem odpowiadającym $z \mapsto z^2$ (liczba owinięć wynosi 2). Istotnie, $S^1/(z \sim -z) \to S^1$, $[z] \mapsto z^2$, jest homeomorfizmem jako ciągła bijekcja ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa; odwzorowanie dołączające przechodzi przez ten iloraz. Pełny obieg brzegu daje zatem dwa obiegi 1-szkieletu, co wyjaśnia relację $a^2 = 1$. Zatem

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong \langle a \mid a^2 = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

W obu przykładach relacja grupowa pochodzi bezpośrednio z przebiegu brzegu dołączanej 2-komórki.

*Uwaga* 7.6.9 (Granica obecnego rozdziału). Sympleksy i komórki dają konkretne przestrzenie, a ich odwzorowania dołączające kodują sposób sklejenia. W następnym rozdziale zorientowanym sympleksom przypiszemy generatory łańcuchów, a ich ścianom operator brzegu $\partial$. Sprawdzimy $\partial^2 = 0$, porównamy homologię symplicjalną, singularną i komórkową oraz wykorzystamy długie ciągi z Rozdziału 6. Wyższe grupy homotopii i twierdzenie Hurewicza wymagają już tak zbudowanej homologii przestrzeni.

*Dalsza lektura:* Pełne rozwinięcie teorii homotopii, nakryć, kompleksów CW i $\Delta$-kompleksów podaje Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdziały 0 i 1 oraz początek rozdziału 2, `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf`. W tym rozdziale wyprowadziliśmy podstawowe własności, które wykorzystamy do budowania homologii.

# Rozdział 8

# Homologia przestrzeni

W Rozdziale 6 homologia była niezmiennikiem *kompleksu łańcuchowego*. Teraz przypiszemy taki kompleks przestrzeni. Najpierw użyjemy sympleksów z Rozdziału 7; potem zastąpimy je wszystkimi ciągłymi obrazami sympleksów, aby móc badać przestrzenie bez wybranej triangulacji. Na końcu zobaczymy, dlaczego do obliczeń zwykle wystarczy kilka komórek CW.

Intuicja jest jedna: cykl to suma zorientowanych kawałków bez brzegu, a brzeg to cykl, który ogranicza kawałek o wymiar wyższy. Iloraz

$$H_n(X;\mathbb{Z}) = \frac{\{n\text{-cykle w } X\}}{\{\text{brzegi } (n+1)\text{-łańcuchów w } X\}}$$

odróżnia na przykład pętlę będącą brzegiem na tarczy od pętli obiegającej dziurę. Pracujemy nad $\mathbb{Z}$; zmianę współczynników omawia Twierdzenie 6.8.5, a konkretny rachunek znajduje się poniżej.

## 8.1 Łańcuchy symplicjalne: orientacja i brzeg

**Definicja 8.1.1** (Kompleks łańcuchów symplicjalnych)**.** Niech $K$ będzie skończonym kompleksem symplicjalnym z Definicji 7.4.3. Ustalmy porządek jego wierzchołków. Grupa $C_n^{\Delta}(K)$ jest wolną grupą abelową z bazą wszystkich $n$-sympleksów zapisanych w porządku $[v_0,\dots,v_n]$. Jeśli wierzchołki wypiszemy w innej kolejności, przyjmujemy zasadę

$$[v_{\pi(0)},\dots,v_{\pi(n)}] = \operatorname{sgn}(\pi)[v_0,\dots,v_n].$$

Zatem odwrócenie orientacji zmienia znak, a dwa różne sympleksy nadal dają niezależne generatory. Dla $n \geq 1$ określamy


$$\partial_n[v_0,\dots,v_n] = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i[v_0,\dots,\widehat{v_i},\dots,v_n], \qquad \partial_0 = 0. \tag{8.1.1}$$

Rozszerzamy $\partial$ liniowo na sumy o całkowitych współczynnikach. Dla $n < 0$ przyjmujemy $C_n^{\Delta}(K) = 0$.

Znak ściany nie jest ozdobą: kierunek odziedziczony przez brzeg wypełnionego trójkąta musi być spójny. Dla $e = [v_0, v_1]$ i $t = [v_0, v_1, v_2]$ dostajemy

$$\partial e = [v_1] - [v_0], \qquad \partial t = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Drugą równość można zapisać $\partial t = [v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0]$. Jest to obieg brzegu trójkąta.




$\partial t = e_{01} + e_{12} + e_{20}$
zewnętrzna pętla jest brzegiem, gdy wnętrze $t$ należy do przestrzeni

Rysunek 8.1: Zorientowany brzeg trójkąta. Usunięcie jego wnętrza pozostawia cykl, który w samym okręgu nie jest już brzegiem żadnego 2-łańcucha.

**Twierdzenie 8.1.2** (Brzeg brzegu znika)**.** *Odwzorowania* (8.1.1) *spełniają* $\partial_{n-1}\partial_n = 0$. *Wobec tego*

$$H_n^\Delta(K) := \ker(\partial_n : C_n^\Delta(K) \to C_{n-1}^\Delta(K))/\operatorname{im}(\partial_{n+1})$$

*jest dobrze określoną grupą. Licznik składa się z* cykli*, mianownik z* brzegów*.*

*Dowód.* Dla $n = 1$ wynika to z $\partial_0 = 0$. Niech $n \geq 2$ i weźmy generator $[v_0, \ldots, v_n]$. Każda jego ściana o wymiarze $n-2$ powstaje po usunięciu pewnych dwóch wierzchołków $v_i, v_j$, $i < j$, dokładnie na dwa sposoby. Usunięcie najpierw $v_i$, a następnie $v_j$ (ma on już pozycję $j-1$) daje współczynnik $(-1)^i(-1)^{j-1}$. W przeciwnej kolejności współczynnik wynosi $(-1)^j(-1)^i$. Ich suma to $(-1)^{i+j-1} + (-1)^{i+j} = 0$. Dotyczy to każdej ściany z osobna, więc $\partial^2$ znika na bazie, a przez liniowość na całej grupie. Stąd $\operatorname{im}\partial_{n+1} \subseteq \ker\partial_n$, co pozwala utworzyć podany iloraz. □

**Przykład 8.1.3** (Odcinek, okrąg, tarcza)**.** Odcinek ma dwa wierzchołki $v_0, v_1$ i jedną krawędź $e$. Odwzorowanie $\partial_1 : \mathbb{Z}e \to \mathbb{Z}v_0 \oplus \mathbb{Z}v_1$ przypisuje $me \mapsto m(v_1 - v_0)$. Ma zerowe jądro, więc $H_1^\Delta = 0$, a w ilorazie $H_0^\Delta$ obie klasy wierzchołków są równe. Otrzymujemy $\mathbb{Z}$.

Teraz weźmy obwód trójkąta, bez wnętrza, i ustawmy kierunki $e_{01}, e_{12}, e_{20}$. Każdy 1-łańcuch $ae_{01} + be_{12} + ce_{20}$ jest cyklem dokładnie wtedy, gdy $a = b = c$ (współczynnik przy każdym wierzchołku w jej brzegu musi być zerem). Nie ma tu 2-sympleksów, a więc $H_1^\Delta \cong \mathbb{Z}$ z generatorem $e_{01} + e_{12} + e_{20}$. Jeśli wstawimy wnętrze $t$, ten sam cykl staje się $\partial t$ i $H_1^\Delta$ znika. Rysunek 8.1 pokazuje dokładnie tę zmianę.

W $\Delta$-kompleksie z Definicji 7.4.5 postępujemy podobnie: każdy *sympleks charakterystyczny* jest osobnym generatorem, nawet jeżeli jego różne ściany mają ten sam obraz. Brzeg jest sumą obrazów ścian z ich znakami; po identyfikacji mogą się one wzajemnie skasować. Tak właśnie sklejony odcinek z jednym wierzchołkiem ma $\partial e = v - v = 0$.

**Stwierdzenie 8.1.4** (Składowe i $H_0$)**.** *Jeżeli $K$ ma $c$ składowych łukowych, to $H_0^\Delta(K) \cong \mathbb{Z}^c$.*

*Dowód.* Ponieważ $\partial_0 = 0$, grupa $H_0$ to wolna grupa na wierzchołkach modulo relacje $v_j - v_i = \partial[v_i, v_j]$ dla krawędzi. Idąc po drodze krawędziowej, utożsamiamy klasy wszystkich wierzchołków jej składowej. Dwa wierzchołki tej samej składowej $|K|$ można połączyć taką drogą: wszystkie wierzchołki jednego sympleksu należą do tej samej składowej grafu krawędzi. Sympleksy przypisane jednej takiej składowej tworzą podkompleks. Jego realizacja i jej dopełnienie są domknięte jako skończone sumy domkniętych sympleksów, więc są też otwarte. Droga nie może przejść między tymi zbiorami. Każdy punkt sympleksu można natomiast połączyć odcinkiem z wierzchołkiem. Składowe grafu odpowiadają zatem dokładnie składowym łukowym $|K|$. Wreszcie żadna relacja nie łączy różnych składowych, bo obie końcówki każdej krawędzi leżą w jednej. W każdej składowej pozostaje więc jeden wolny generator. □


## 8.2 Łańcuchy singularne i niezmienniczość homotopijna

Triangulacja bywa trudna do znalezienia. W konstrukcji singularnej sam wybór *ciągłego* odwzorowania standardowego sympleksu do przestrzeni tworzy generator; nie żądamy różnowartościowości ani ładnego kształtu jego obrazu.

**Definicja 8.2.1** (Homologia singularna)**.** *Singularny $n$-sympleks* w $X$ to dowolne ciągłe odwzorowanie $\sigma : \Delta^n \to X$. Niech $C_n(X)$ będzie wolną grupą abelową na wszystkich takich odwzorowaniach; dla $n < 0$ przyjmujemy $C_n(X) = 0$. W szczególności dwa różne odwzorowania o tym samym obrazie są różnymi generatorami. Niech $\iota_i : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ będzie afinicznym włączeniem ściany naprzeciw $i$-tego wierzchołka. Kładziemy

$$\partial\sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma \circ \iota_i \quad (n \geq 1), \qquad \partial : C_0(X) \to 0, \qquad H_n(X) := H_n(C_\bullet(X), \partial). \tag{8.2.1}$$

Obliczenie $\partial^2 = 0$ jest słowo w słowo rachunkiem dwóch usuwanych wierzchołków z dowodu Twierdzenia 8.1.2. Teraz pojawia się nawet singularny sympleks stały: nie odrzucamy go na poziomie łańcuchów, gdyż później jego wkład może być brzegiem.




Rysunek 8.2: Singularny sympleks jest odwzorowaniem do $X$, niekoniecznie płaskim trójkątem. Jego brzeg liczymy z ograniczeń odwzorowania $\sigma$ do trzech ścian.

**Stwierdzenie 8.2.2** (Ciągłe odwzorowania działają na homologii)**.** *Jeśli $f : X \to Y$ jest ciągłe, to $f_\# : C_n(X) \to C_n(Y)$, $f_\#(\sigma) = f \circ \sigma$, jest odwzorowaniem łańcuchowym. Wyznacza homomorfizm $f_* : H_n(X) \to H_n(Y)$, przy czym $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ oraz $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}_{H_n(X)}$.*

*Dowód.* Na pojedynczym generatorze

$$\partial(f \circ \sigma) = \sum_i (-1)^i f \circ \sigma \circ \iota_i = f_\#(\partial\sigma).$$

Równość na sumach wynika z liniowości. Zatem obraz cyklu jest cyklem, a obraz brzegu brzegiem, więc $f_*$ jest dobrze określony na ilorazie. Równości dotyczące składania sprawdzamy już na $\sigma$: $g_\# f_\#(\sigma) = g \circ f \circ \sigma$. □

**Przykład 8.2.3** (Punkt)**.** Dla $X = \{*\}$ w każdym stopniu jest dokładnie jeden singularny sympleks stały $c_n$, więc $C_n(X) \cong \mathbb{Z}$. Jego brzeg to $\partial c_n = (\sum_{i=0}^{n} (-1)^i) c_{n-1}$: dla $n$ nieparzystego współczynnik jest 0, dla dodatniego parzystego 1. Kompleks ma więc postać

$$\cdots \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

gdzie prawy skraj to $C_0$; precyzyjnie $\partial_1 = 0$, $\partial_2 = 1$. Stąd $H_0(*) = \mathbb{Z}$ i $H_n(*) = 0$ dla $n > 0$.

**Stwierdzenie 8.2.4** (Składowe łukowe)**.** *Grupa $H_0(X)$ jest wolna na składowych łukowych $X$. W szczególności dla przestrzeni niepustej łukowo spójnej $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.*

*Dowód.* Każdy punkt $x$ jest singularnym 0-sympleksem, więc $C_0(X)$ jest wolną grupą na punktach. Dla drogi $\gamma : [0,1] = \Delta^1 \to X$ mamy $\partial\gamma = [\gamma(1)] - [\gamma(0)]$. Punkty w jednej składowej łukowej mają zatem tę samą klasę. Z drugiej strony każdy składnik brzegu dowolnego 1-łańcucha jest różnicą punktów połączonych drogą: nie może utożsamić dwóch różnych składowych. Sumowanie współczynników punktów osobno w każdej składowej daje odwrotny homomorfizm do wolnej grupy na składowych. □

**Twierdzenie 8.2.5** (Niezmienniczość homotopijna)**.** *Jeśli $f, g : X \to Y$ są homotopijne, to $f_* = g_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ w każdym stopniu. Jeśli $X$ i $Y$ są homotopijnie równoważne, ich grupy homologii są izomorficzne.*

*Dowód.* Niech $F : X \times [0,1] \to Y$ będzie homotopią, $F(x,0) = f(x)$, $F(x,1) = g(x)$. Graniastosłup $\Delta^n \times [0,1]$ dzielimy na $n+1$ zorientowanych $(n+1)$-sympleksów. Dla $i = 0, \ldots, n$ ich uporządkowane wierzchołki to

$$(e_0, 0), \ldots, (e_i, 0), (e_i, 1), \ldots, (e_n, 1).$$

Niech $T_i : \Delta^{n+1} \to \Delta^n \times [0,1]$ będzie odwzorowaniem afinicznym posyłającym kolejne wierzchołki właśnie na tę listę. Określmy

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \, F \circ (\sigma \times \mathrm{id}_{[0,1]}) \circ T_i \in C_{n+1}(Y).$$

Rozpiszmy brzeg sumy. Wewnętrzne $n$-ściany, na których spotykają się sąsiednie części graniastosłupa, pojawiają się z przeciwnymi znakami. Ściany boczne nad każdą ścianą $\Delta^n$ tworzą dokładnie $-P_{n-1}(\partial\sigma)$: jeśli $j < i$, usuwamy dolny wierzchołek $(e_j, 0)$ z $T_i$, z łącznym znakiem $(-1)^{i+j}$. Na pryzmacie ściany naprzeciw $e_j$ punkt podziału ma indeks $i-1$, więc znak w $-P_{n-1}\partial$ wynosi $-(-1)^j(-1)^{i-1} = (-1)^{i+j}$. Jeśli $j > i$, usuwamy górny wierzchołek $(e_j, 1)$, na pozycji $j+1$; oba rachunki dają $(-1)^{i+j+1}$. Wewnętrzna ściana między $T_{i-1}$ i $T_i$ powstaje przez usunięcie odpowiednio $(e_{i-1}, 1)$ i $(e_i, 0)$, ze znakami $-1$ i $+1$. Pozostałe dwie ściany to górna $g \circ \sigma$ ze znakiem $+1$ oraz dolna $f \circ \sigma$ ze znakiem $-1$. Zatem

$$\partial P_n + P_{n-1}\partial = g_\# - f_\#. \tag{8.2.2}$$

Przyjmujemy $P_{-1} = 0$. Dla $n = 0$ jest to znana równość „koniec drogi minus początek”; powyższe parowanie ścian dowodzi jej w każdym wymiarze. W świetle Twierdzenia 6.5.2 oba odwzorowania indukują to samo na homologii. Jeśli $u : X \to Y$, $v : Y \to X$ są odwrotne z dokładnością do homotopii, to $(vu)_* = \mathrm{id}$ i $(uv)_* = \mathrm{id}$, więc $u_*$ i $v_*$ są odwrotne. □

W szczególności przestrzeń ściągalna ma homologię punktu. Jeśli $A \subseteq X$ jest retraktem deformacyjnym, to $H_n(A) \cong H_n(X)$.

## 8.3 Pary przestrzeni i homologia zredukowana

**Definicja 8.3.1** (Grupy względne i zredukowane)**.** Dla $A \subseteq X$ włączenie daje podkompleks $C_\bullet(A) \subseteq C_\bullet(X)$. Kładziemy

$$C_n(X, A) = C_n(X)/C_n(A), \qquad H_n(X, A) = H_n(C_\bullet(X, A)).$$

*Augmentacja* $\varepsilon : C_0(X) \to \mathbb{Z}$ sumuje współczynniki punktów. Dołączamy stopień $C_{-1} = \mathbb{Z}$, z różniczką $\partial_0 = \varepsilon$; niższe grupy są zerowe. Ponieważ $\varepsilon\partial_1 = 0$, otrzymujemy kompleks, którego homologie oznaczamy $\widetilde{H}_n(X)$. Dla niepustego $X$ mamy $\widetilde{H}_0(X) = \ker(\varepsilon : H_0(X) \to \mathbb{Z})$, $\widetilde{H}_n(X) = H_n(X)$ dla $n > 0$ i $\widetilde{H}_n(X) = 0$ dla $n < 0$. Dla $X = \varnothing$ wszystkie grupy łańcuchów w stopniach nieujemnych są zerowe, więc $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing) = \mathbb{Z}$ i pozostałe grupy zredukowane są zerowe.

Względny cykl może mieć brzeg w $A$: to, co w $X$ jest otwartą powierzchnią, po „pominięciu $A$" staje się cyklem. Na przykład zorientowany dysk reprezentuje klasę względną względem swojego okręgu brzegowego. Jeżeli $X$ ma skończoną liczbę $c > 0$ składowych łukowych, to $\widetilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{c-1}$. Ogólnie, po wyborze jednej składowej $P_0$, bazę jądra augmentacji tworzą różnice $[P] - [P_0]$ dla $P \neq P_0$: jest to suma prosta kopii $\mathbb{Z}$, także dla nieskończenie wielu składowych.

**Twierdzenie 8.3.2** (Długi ciąg pary)**.** *Każda para $(X, A)$ daje naturalny długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{j_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(A) \to H_{n-1}(X) \to \cdots . \tag{8.3.1}$$

*Jeśli $\partial c \in C_{n-1}(A)$, to $\delta[c] = [\partial c]$.*

*Dowód.* W każdej grupie łańcuchów mamy krótki ciąg dokładny $0 \to C_n(A) \to C_n(X) \to C_n(X, A) \to 0$. Jest zgodny z brzegami, więc Stwierdzenie 6.6.1 daje długi ciąg i wzór na $\delta$. Naturalność pochodzi z przemienności odwzorowań łańcuchów dla odwzorowań par $(X, A) \to (Y, B)$. □

Jeśli $A \neq \varnothing$, możemy w tym ciągu zastąpić homologie $A$ i $X$ zredukowanymi, pozostawiając zwykłą homologię względną. Istotnie, w stopniu $-1$ włączenie kompleksów augmentowanych jest identycznością $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, więc ich iloraz ma tam zero i jest właśnie kompleksem $C_\bullet(X, A)$.

Homotopia par (w każdym czasie obraz $A$ leży w $B$) daje te same odwzorowania na $H_n(X, A)$: pryzmat z dowodu Twierdzenia 8.2.5 przenosi $C_\bullet(A)$ do $C_{\bullet+1}(B)$, więc wzór (8.2.2) schodzi na kompleksy ilorazowe.

## 8.4 Podział barycentryczny, wycinanie i sklejanie

Homologia singularna ma nieskończenie wiele generatorów nawet dla prostych przestrzeni. Podział dużego sympleksu na małe części pozwala jednak sprowadzić rachunek do lokalnych fragmentów. Z tego mechanizmu wynika wycinanie.

**Lemat 8.4.1** (Małe łańcuchy)**.** *Niech $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ będzie otwartym pokryciem $X$. Podkompleks $C_n^{\mathcal{U}}(X) \subseteq C_n(X)$ generowany przez sympleksy, których obrazy leżą w jednym $U_\alpha$, ma te same grupy homologii co $C_\bullet(X)$. Włączenie indukuje izomorfizmy w każdym stopniu.*

*Dowód.* Podamy konstrukcję potrzebną w obu kierunkach. Podzielmy liniowo $\Delta^n$ na sympleksy barycentryczne: wierzchołkami małego sympleksu są barycentra łańcucha niepustych ścian $F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n$, zapisane w tej właśnie kolejności. Każdy taki łańcuch odpowiada permutacji $\pi$ wierzchołków: $F_j = [e_{\pi(0)}, \ldots, e_{\pi(j)}]$. Niech $a_\pi : \Delta^n \to \Delta^n$ będzie afinicznym odwzorowaniem na uporządkowany mały sympleks. Określamy

$$S_n(\sigma) = \sum_{\pi \in S_{n+1}} \operatorname{sgn}(\pi)\, \sigma \circ a_\pi .$$

Znak pochodzi z orientacji: dla permutacji identycznościowej macierz kolejnych barycentrów ma dodatni wyznacznik w otoczce afinicznej, a permutacja wierzchołków zmienia go o $\operatorname{sgn}(\pi)$. Kolejność barycentrów jest ważna: w kompleksie singularnym odwrócenie parametryzacji nie jest z definicji ujemnym generatorem. Ściany wewnętrzne dwóch części występują z przeciwnymi znakami, a ich ściany na zewnątrz dają podział odpowiedniej ściany $\sigma$. Dokładniej, wewnętrzną ścianę uzyskujemy, pomijając barycentrum $F_j$ dla $j < n$. Dwie odpowiadające jej permutacje zamieniają miejscami pozycje $j, j+1$, więc mają przeciwne znaki, a pozostałe uporządkowane barycentra są identyczne. Dla $j = n$ otrzymujemy sympleks podziału ściany naprzeciw $e_{\pi(n)}$. Jeśli $\rho$ jest permutacją pozostałych wierzchołków w ich odziedziczonej kolejności, to $(-1)^n \operatorname{sgn}(\pi) = (-1)^{\pi(n)} \operatorname{sgn}(\rho)$. To właśnie znak tej ściany w $S\partial$; stąd $\partial S = S\partial$.

Wyjaśnijmy też, dlaczego $S$ nie zmienia klasy homologii. Na standardowym sympleksie oznaczmy jego identycznościowe odwzorowanie przez $u_n$ i indukcyjnie zbudujmy łańcuchy $t_n$ tak, aby dla $n \geq 1$

$$\partial t_n + \sum_{i=0}^{n} (-1)^i (\iota_i)_\# t_{n-1} = S(u_n) - u_n. \qquad (*)$$

W stopniu 0 obie strony są zerowe, więc $t_0 = 0$. Jeśli mamy już konstrukcję na wszystkich ścianach, to oznaczmy ich sumę $b_n = \sum_i (-1)^i (\iota_i)_\# t_{n-1}$. Łańcuch $z = S(u_n) - u_n - b_n$ jest cyklem: stosując $\partial$, używamy $\partial S = S\partial$, równości (*) na ścianach i $\partial^2 = 0$. W wypukłym $\Delta^n$ taki cykl jest brzegiem: z barycentrum $b$ łączymy każdy jego singularny sympleks prostym stożkiem. Dla $\tau : \Delta^k \to \Delta^n$ stożek $b * \tau$ ma wzór

$$(b * \tau)(s_0, \ldots, s_{k+1}) = s_0 b + (1 - s_0)\tau\left(\frac{s_1}{1-s_0}, \ldots, \frac{s_{k+1}}{1-s_0}\right) \quad (s_0 < 1),$$

z wartością $b$ dla $s_0 = 1$. Jest ciągły także w tym wierzchołku, bo obraz $\tau$ jest ograniczony. Brzeg tego stożka to $\tau - b * (\partial\tau)$ (dla 0-sympleksu dodatkowo odejmujemy punkt $b$); po zsumowaniu nad cyklem składniki stożkowe się kasują. Daje to $t_n$. Przenosząc $t_n$ przez dowolne $\sigma : \Delta^n \to X$, otrzymujemy operator $T_n(\sigma) = \sigma_\# t_n$ o nośniku zawartym w $\sigma(\Delta^n)$, który spełnia

$$\partial T + T\partial = S - \mathrm{id}.$$

Zatem $S^r - \mathrm{id} = \partial T^{(r)} + T^{(r)}\partial$, gdzie $T^{(r)} = T + ST + \cdots + S^{r-1}T$.

Średnice części po kolejnych podziałach barycentrycznych dążą do zera: dla $n$-sympleksu każdy nowy wierzchołek jest średnią wierzchołków pewnej ściany, a nowa krawędź łączy barycentra zagnieżdżonych ścian. Jeśli mają one $p < q \leq n+1$ wierzchołków, to $b_G = (p/q)b_F + ((q-p)/q)b_{G\setminus F}$. Zatem $\|b_G - b_F\| \leq (q-p)\operatorname{diam}(\Delta)/q \leq n\operatorname{diam}(\Delta)/(n+1)$. Średnica wypukłego sympleksu jest największą odległością jego wierzchołków, więc dla $n \geq 1$ otrzymujemy geometryczny spadek średnic (także na ścianach). Dla $n = 0$ sympleks jest już punktem. Dla danego $\sigma$ przeciwobrazy $U_\alpha$ tworzą otwarte pokrycie zwartego $\Delta^n$; jego liczba Lebesgue'a jest dodatnia. Po dostatecznie wielu podziałach każda część trafia przez $\sigma$ do jednego $U_\alpha$. Każdy łańcuch jest skończoną sumą, więc można wybrać wspólne $r$ dla wszystkich jego sympleksów.

Jeśli $z$ jest cyklem, $S^r z$ jest mały i różni się od $z$ o $\partial T^{(r)} z$; to dowodzi surjektywności na homologii. Jeśli mały cykl $z$ jest brzegiem $c$ w pełnym kompleksie, podzielmy $c$ tak wiele razy, by $S^r c$ był mały. Łańcuch $T^{(r)} z$ też jest mały, ponieważ każda jego część leży w obrazie jednego pierwotnego, małego sympleksu. Równości $\partial c = z$ i $\partial T^{(r)} z = S^r z - z$ dają

$$\partial\big(S^r c - T^{(r)} z\big) = z.$$

Zatem $z$ jest brzegiem już w podkompleksie małych łańcuchów: otrzymujemy iniektywność. □

Stożkowanie wypełnia każdy cykl dodatniego stopnia w wypukłym sympleksie, a w stopniu zero tylko cykl o sumie współczynników zero. W konstrukcji $T$ stopień zero załatwiamy przez $t_0 = 0$, bo $S_0 = \mathrm{id}$. Lokalność $T$ jest istotna dla dowodu iniektywności.

**Twierdzenie 8.4.2** (Wycinanie)**.** *Jeżeli $Z \subseteq A \subseteq X$ oraz $\overline{Z} \subseteq \operatorname{int}_X A$, to włączenie par*

$$(X \setminus Z, A \setminus Z) \longrightarrow (X, A)$$

*indukuje izomorfizm na wszystkich grupach homologii względnej.*

*Dowód.* Oznaczmy $U = X \setminus \overline{Z}$ oraz $V = \operatorname{int}_X A$. To otwarte pokrycie $X$; po ograniczeniu do $X \setminus Z$ otrzymujemy pokrycie $\{U, V \setminus Z\}$. Lemat 8.4.1 działa także po wzięciu ilorazu przez łańcuchy w $A$: izomorfizmy dla $A$ i $X$, zestawione z długimi ciągami par, dają izomorfizm dla odpowiadających kompleksów względnych (Lemat 6.9.1).

Policzmy teraz te małe kompleksy. Ponieważ $V \subseteq A$,

$$C_\bullet^{\{U,V\}}(X) = C_\bullet(U) + C_\bullet(V), \qquad C_\bullet^{\{U,V\}}(A) = C_\bullet(U \cap A) + C_\bullet(V).$$

Ich iloraz jest kanonicznie $C_\bullet(U)/C_\bullet(U\cap A)$: sympleks należący jednocześnie do $U$ i $V$ należy do $U\cap A$, więc jądro tej identyfikacji jest dokładnie wskazanym podkompleksem. Analogiczny iloraz dla $(X \setminus Z, A \setminus Z)$ i jego pokrycia jest *tym samym* kompleksem $C_\bullet(U)/C_\bullet(U \cap A)$. Włączenie par staje się na tych modelach identycznością, co kończy dowód. □

Wycinanie mówi, że usunięcie części leżącej głęboko we wnętrzu $A$ nie zmienia tego, co para $(X, A)$ mierzy *poza* $A$. Warunek o domknięciu ma znaczenie: zapewnia otwarte pokrycia użyte w dowodzie.

**Twierdzenie 8.4.3** (Ciąg Mayera–Vietorisa)**.** *Jeśli $X = U \cup V$, gdzie $U, V$ są otwarte w $X$, to istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H_n(U \cap V) \xrightarrow{(i_*,-j_*)} H_n(U) \oplus H_n(V) \xrightarrow{k_*+\ell_*} H_n(X) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(U \cap V) \to \cdots . \tag{8.4.1}$$

*Tak samo działają grupy zredukowane.*

*Dowód.* Wewnątrz $C_\bullet(X)$ rozważmy $B_\bullet = C_\bullet(U) + C_\bullet(V)$. Mamy krótki ciąg kompleksów

$$0 \to C_\bullet(U \cap V) \xrightarrow{c\mapsto(c,-c)} C_\bullet(U) \oplus C_\bullet(V) \xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b} B_\bullet \to 0.$$

Iniektywność pierwszego odwzorowania jest jasna; jądro drugiej składa się z par $(c, -c)$, w których każdy singularny sympleks występujący w $c$ należy zarazem do $U$ i do $V$. Surjektywność wynika z definicji sumy. Ponadto $B_\bullet = C_\bullet^{\{U,V\}}(X)$, więc Lemat 8.4.1 identyfikuje $H_*(B)$ z $H_*(X)$. Zastosowanie Twierdzenia 6.3.1 daje (8.4.1). W wersji zredukowanej dołączamy do każdego kompleksu stopień $-1$ równy $\mathbb{Z}$ i różniczkę $\varepsilon : C_0 \to \mathbb{Z}$. Na stopniu $-1$ ten sam krótki ciąg ma postać $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{c\mapsto(c,-c)} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b} \mathbb{Z} \to 0$, nadal dokładną. W stopniach nieujemnych obowiązuje poprzedni rachunek. Homologie tych powiększonych kompleksów są właśnie homologiami zredukowanymi; dotyczy to również pustego przecięcia, dla którego $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing) = \mathbb{Z}$. □

Jeśli $c = a + b \in B_n$ jest cyklem, gdzie $a \in C_n(U)$ i $b \in C_n(V)$, to $\partial a = -\partial b$ jest łańcuchem w $U \cap V$, a $\delta[c] = [\partial a]$ z wyborem znaku zgodnym z pierwszym odwzorowaniem. To praktyczna recepta na odwzorowanie łączące.

**Przykład 8.4.4** (Okrąg z dwóch łuków)**.** Pokryjmy $S^1$ dwoma otwartymi, ściągalnymi łukami $U, V$, których przecięcie składa się z dwóch łuków. Mamy $\widetilde{H}_0(U) = \widetilde{H}_0(V) = 0$, a $\widetilde{H}_0(U\cap V) \cong \mathbb{Z}$ generuje różnica klas punktów z dwóch składowych. Zredukowany ciąg Mayera–Vietorisa daje

$$0 = \widetilde{H}_1(U) \oplus \widetilde{H}_1(V) \to \widetilde{H}_1(S^1) \xrightarrow[\cong]{\delta} \widetilde{H}_0(U \cap V) \to 0.$$

Zatem $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Geometria odwzorowania $\delta$ jest prosta: rozcinając cykl okręgu na łuki leżące w $U$ i $V$, otrzymujemy dwa końce w różnych składowych ich przecięcia.

**Twierdzenie 8.4.5** (Homologia sfer)**.** *Dla $n \geq 0$:*

$$\widetilde{H}_k(S^n;\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

*Ponadto dla $n \geq 1$*

$$H_k(D^n, S^{n-1};\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

*Dowód.* $S^0$ ma dwie składowe punktowe: $H_0(S^0) = \mathbb{Z}^2$ oraz $\widetilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}$. Wyższa homologia znika, bo jest to suma dwóch kopii homologii punktu z Przykładu 8.2.3.

Dla $n \geq 1$ weźmy lekko powiększone otwarte półkule $U, V \subset S^n$. Każda jest ściągalna, a $U \cap V$ deformacyjnie zwija się na sferę równikową $S^{n-1}$. Zredukowany ciąg Mayera–Vietorisa, wraz z zerowaniem homologii $U, V$, daje dla każdego $k$ izomorfizm

$$\widetilde{H}_k(S^n) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1}).$$

W stopniu $k = 1$ używa się właśnie zredukowanego $H_0$; gdy $n = 1$, obie składowe przecięcia są niezbędne. Indukcja od $S^0$ daje pierwszy wzór.

Dysk $D^n$ jest ściągalny. W ciągu zredukowanym pary $(D^n, S^{n-1})$ grupy dysku są zerowe, a odwzorowanie łączące daje $H_k(D^n, S^{n-1}) \cong \widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$ dla $k \geq 1$. Dla $k = 0$ odwzorowanie $H_0(S^{n-1}) \to H_0(D^n)$ jest surjekcją, więc grupa względna również znika. To daje drugi wzór. □

*Uwaga* 8.4.6 (Klasa fundamentalna i orientacja). Generator $H_n(D^n, S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ nazywamy *klasą orientacji dysku*. Wybór jednego z jego dwóch znaków określa orientację; w długim ciągu pary $\delta$ posyła ją na generator $\widetilde{H}_{n-1}(S^{n-1})$. Różniczkowe ujęcie orientacji i całkowania pozostawiamy osobnemu rozdziałowi.

## 8.5 Od triangulacji do homologii przestrzeni

Dla kompleksu symplicjalnego zachowujemy ustalony porządek wierzchołków, a dla $\Delta$-kompleksu porządki jego map charakterystycznych. Każdy bazowy sympleks $\sigma : \Delta^n \to |K|$ jest wtedy jednocześnie singularnym sympleksem. Daje to odwzorowanie łańcuchowe

$$I : C_\bullet^\Delta(K) \longrightarrow C_\bullet(|K|), \qquad [\sigma] \longmapsto \sigma,$$

bo oba operatory $\partial$ sumują te same ściany z tymi samymi znakami. Mapę $I$ rozszerzamy liniowo: na przykład $I(-[\sigma]) = -\sigma$. Nie zastępujemy prawej strony osobnym generatorem otrzymanym przez odwrócenie parametryzacji. Nie jest to izomorfizm grup łańcuchów: po prawej są wszystkie odwzorowania ciągłe, po lewej tylko wybrane sympleksy. Niezwykłe jest to, że po przejściu do homologii różnica znika.

Potrzebny będzie prosty sposób traktowania komórki z całym brzegiem zwiniętym do punktu.

**Lemat 8.5.1** (Iloraz pary komórkowej)**.** *Niech $A \neq \varnothing$ będzie podkompleksem skończonego kompleksu CW $X$. Jeśli istnieje otwarte otoczenie $N$ zbioru $A$, które silnie deformacyjnie retrahuje się na $A$, to odwzorowanie ilorazowe indukuje izomorfizm*

$$H_k(X, A) \xrightarrow{\cong} H_k(X/A, \{*\}) = \widetilde{H}_k(X/A) \quad (k \geq 0).$$

*Takie otoczenie istnieje, gdy $A = X^{n-1} \neq \varnothing$ i $X = X^n$ jest skończonym szkieletem CW dla $n \geq 1$, a także gdy do skończonego $A$ dołączamy pojedynczą komórkę dodatniego wymiaru.*

*Dowód.* Włączenie $A \hookrightarrow N$ jest równoważnością homotopijną. Porównując długie ciągi par $(X, A)$ i $(X, N)$ za pomocą Lematu 6.9.1, dostajemy $H_k(X, A) \cong H_k(X, N)$. Po zwinięciu $A$ do punktu homotopia schodzi na $N/A$. Uzasadnijmy jej ciągłość również względem czasu. Skończony kompleks CW jest zwarty, bo jest obrazem skończonej sumy zwartych dysków; domknięty $A$ też jest zwarty. Projekcja $q : N \to N/A$ jest domknięta: dla domkniętego $F \subseteq N$ zbiór $q^{-1}q(F)$ jest równy $F$ lub $F \cup A$. Ma zwarte włókna, więc $q \times \mathrm{id}_I$ jest również domknięta. Istotnie, jeśli domknięty zbiór omija włókno nad $(y, t)$, skończone pokrycie tego włókna prostokątami otwartymi daje otoczenia $O \supseteq q^{-1}(y)$ i $J \ni t$ z $O \times J$ rozłącznym z tym zbiorem; domkniętość $q$ daje otoczenie $W \ni y$ takie, że $q^{-1}(W) \subseteq O$. Stąd $(q \times \mathrm{id}_I)$ jest odwzorowaniem

ilorazowym, co pozwala przenieść homotopię. Zatem $N/A$ silnie zwija się do $\{*\}$, więc tak samo $H_k(X/A, \{*\}) \cong H_k(X/A, N/A)$.

Porównajmy środkowe grupy. Zbiór $A$ jest domknięty (dla skończonego CW wynika to z topologii słabej), zatem $\{X \setminus A, N\}$ jest otwartym pokryciem $X$. W ilorazie mamy pokrycie $\{(X/A) \setminus \{*\}, N/A\}$. Lemat o małych łańcuchach, zastosowany również do $N$, pozwala obliczać homologie tych dwóch par odpowiednio za pomocą kompleksów

$$\frac{C_\bullet(X \setminus A)}{C_\bullet(N \setminus A)} \quad \text{oraz} \quad \frac{C_\bullet((X/A) \setminus \{*\})}{C_\bullet((N/A) \setminus \{*\})}.$$

Poza $A$ odwzorowanie ilorazowe jest homeomorfizmem, więc te dwa kompleksy są izomorficzne. Składając trzy izomorfizmy, otrzymujemy tezę.

Dla $A = X^{n-1} \subset X^n$ weźmy $N$ złożony z $A$ oraz, w każdej dołączonej $n$-komórce, obrazu pierścienia $\{x \in D^n : \|x\| > 1/2\}$. Jest otwarty w topologii nadanej przez odwzorowania dołączające. W każdym pierścieniu promieniowo przesuwamy $r$ od wartości $r > 1/2$ do 1, pozostawiając brzeg i cały $A$ nieruchome. Na częściach dyskowych używamy wzoru $ru \mapsto ((1-t)r + t)u$. Ciągłość przy $A$ sprawdzamy jak w dowodzie Twierdzenia 7.6.7: w każdym otoczeniu zachowujemy tylko te punkty pasa, których cały odcinek radialny do brzegu mieści się w tym otoczeniu. Te mniejsze zbiory są otwarte i pozostają w pierwotnym otoczeniu przez cały czas homotopii. Daje to silną retrakcję $N \to A$. Ten sam argument działa przy dołączeniu pojedynczej komórki. □

**Lemat 8.5.2** (Generator pojedynczego sympleksu)**.** *Identycznościowe odwzorowanie singularne $u_n : \Delta^n \to \Delta^n$ określa generator $H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \cong \mathbb{Z}$ dla $n \geq 1$.*

*Dowód.* Jest cyklem względnym, bo jego brzeg leży w $\partial\Delta^n$. Brzeg sympleksu jest sferą (Stwierdzenie 7.4.2), a jej homologię policzyliśmy w Twierdzeniu 8.4.5. Wynika stąd, że odwzorowanie łączące

$$\delta : H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \longrightarrow \widetilde{H}_{n-1}(\partial\Delta^n)$$

jest izomorfizmem i posyła $[u_n]$ na klasę cyklu $\partial u_n$. Pokażemy indukcyjnie, że ten cykl jest generatorem. Dla $n = 1$ jest to różnica końców, generator $\widetilde{H}_0(S^0)$. W wyższym wymiarze rozdzielmy $\partial\Delta^n$ na jedną ścianę $F \cong \Delta^{n-1}$ i sumę $B$ pozostałych ścian. $F$ i $B$ są ściągalne: $B$ jest stożkiem z przeciwległego wierzchołka nad $\partial F$; ich przecięciem jest $\partial F$. W ciągu Mayera–Vietorisa odwzorowanie łączące $\widetilde{H}_{n-1}(\partial\Delta^n) \to \widetilde{H}_{n-2}(\partial F)$ jest izomorfizmem. Aby zastosować wersję dla zbiorów otwartych, przedstawmy oba dyski $F, B$ jako stożki nad ich wspólnym brzegiem $\partial F$. Niech $r \in [0,1]$ oznacza w każdym z nich parametr radialny, z $r = 1$ na $\partial F$. Zbiory $U = F \cup \{x \in B : r(x) > 1/2\}$ oraz $V = B \cup \{x \in F : r(x) > 1/2\}$ są otwarte w $F \cup B$: na każdej z dwóch części ich przeciwobrazy są otwarte. Przesuwając dodatkowe pasy do $r = 1$, retrahujemy je na $F, B$, a ich przecięcie na $\partial F$. Cykl $\partial u_n$ jest sumą $\pm u_F$ na $F$ i pozostałych ścian na $B$; jego obrazem przez odwzorowanie łączące jest $\pm[\partial u_F]$. To generator na mocy założenia indukcyjnego. Zatem $\partial u_n$, a więc również $u_n$ względnie, jest generatorem. □

**Twierdzenie 8.5.3** (Porównanie homologii)**.** *Dla skończonego kompleksu symplicjalnego $K$ naturalne odwzorowanie indukuje*

$$I_* : H_n^\Delta(K) \xrightarrow{\cong} H_n(|K|; \mathbb{Z}) \qquad (n \geq 0).$$

*To samo zachodzi dla skończonego $\Delta$-kompleksu, jeśli generatory po lewej to jego sympleksy charakterystyczne z ich ścianami.*

*Dowód.* Uporządkujmy sympleksy tak, aby każdy pojawiał się po wszystkich swoich ścianach. Budujemy kompleks po jednym sympleksie: $L \subset K = L \cup_\varphi \Delta^n$. Załóżmy indukcyjnie, że porównanie jest izomorfizmem dla $L$. Iloraz kompleksów symplicjalnych $C^\Delta(K)/C^\Delta(L)$ ma

jeden generator w stopniu $n$ i zero w pozostałych stopniach, więc jego homologia jest $\mathbb{Z}$ tylko w stopniu $n$.

Jeśli $n \geq 1$, po zwinięciu $L$ do punktu przestrzeń $|K|/|L|$ jest $\Delta^n/\partial\Delta^n \cong S^n$; analogiczny opis działa dla $\Delta$-kompleksu, nawet gdy jego ściany były między sobą utożsamione. Lemat 8.5.1 i Twierdzenie 8.4.5 dają $H_q(|K|,|L|) = \mathbb{Z}$ dla $q = n$ i zero w innych stopniach. Odwzorowanie względne przenosi jedyny generator na klasę charakterystycznego sympleksu. Mapa par $(\Delta^n, \partial\Delta^n) \to (|K|,|L|)$ indukuje homeomorfizm ich ilorazów: jest ciągłą bijekcją ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa. Naturalność map do ilorazów w Lemacie 8.5.1 pokazuje, że także na homologii względnej jest izomorfizmem. Na mocy Lematu 8.5.2 przenosi więc generator na generator, a nie na jego dowolną wielokrotność. Dla $n = 0$ nowy wierzchołek jest osobną składową i odpowiednie odwzorowanie względne jest izomorfizmem $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ w stopniu 0.

Mamy teraz przemienny diagram długich ciągów par dla kompleksów symplicjalnych i singularnych. Na wyrazach dotyczących $L$ odwzorowania pionowe są izomorfizmami z założenia indukcyjnego, a na względnych właśnie to pokazaliśmy. Lemat 6.9.1 zastosowany do kolejnych pięciu wyrazów daje izomorfizm dla $K$. Zaczynamy od kompleksu pustego, dla którego wszystkie zwykłe grupy homologii są zerowe. □

W praktyce wolno zatem obliczać homologię przestrzeni z jednej wygodnej triangulacji: otrzymany wynik nie zależy od wyboru triangulacji. Podziały sympleksów zmieniają grupy łańcuchów, ale nie grupy homologii.

## 8.6 Homologia komórkowa

W triangulacji torusa potrzeba trójkątów i ich ścian. Struktura CW z Sekcji 7.6 może opisywać go jednym punktem, dwoma pętlami i jedną 2-komórką. Homologia komórkowa zachowuje tę oszczędność.

**Twierdzenie 8.6.1** (Względna homologia warstwy komórek)**.** *Niech $X$ będzie skończonym kompleksem CW, $X^n$ jego $n$-szkieletem i $X^{-1} = \varnothing$. Dla $n \geq 1$:*

$$H_k(X^n, X^{n-1}) \cong \begin{cases} \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e^n_\alpha], & k = n, \\ 0, & k \neq n, \end{cases}$$

*gdzie $I_n$ oznacza zbiór $n$-komórek. Dla $n = 0$ mamy $H_0(X^0) = \bigoplus_{\alpha \in I_0} \mathbb{Z}[e^0_\alpha]$ i $H_k(X^0) = 0$ dla $k \neq 0$.*

*Dowód.* Jeśli $X^{n-1} = \varnothing$ i $n \geq 1$, to również $X^n = \varnothing$: nie można dołączyć dysku o niepustym brzegu do pustej przestrzeni. Teza jest wtedy oczywista. W pozostałych przypadkach w ilorazie $X^n/X^{n-1}$ brzeg każdej dołączonej kopii $D^n$ staje się jednym punktem, a wnętrza komórek pozostają rozłączne. Z definicji topologii CW otrzymujemy bukiet $\bigvee_{\alpha \in I_n} (D^n/\partial D^n) \cong \bigvee_{\alpha \in I_n} S^n$. Lemat 8.5.1 zamienia homologię względną na zredukowaną homologię bukietu. Dla skończonego bukietu zredukowana homologia jest sumą zredukowanych homologii składników: dołączamy kolejne sfery. Dla bukietu $Y \vee S^n$ bierzemy $U = Y \cup B$ i $V = S^n \cup N$, gdzie $B$ jest małą otwartą kulą wokół punktu wspólnego w nowej sferze, a $N$ jest sumą takich kul w dotychczasowych sferach. Te zbiory są otwarte w topologii ilorazowej bukietu, retrahują się na $Y, S^n$, a $U \cap V = N \vee B$ jest ściągalne. Ciąg Mayera–Vietorisa daje izomorfizm indukowany włączeniami składników, a więc właśnie ich sumę prostą. Twierdzenie 8.4.5 daje wskazane grupy. Znaki generatorów zależą od wyboru orientacji komórek. Dla $n = 0$ mamy skończony zbiór punktów; rachunek wynika z homologii punktu. □

**Definicja 8.6.2** (Kompleks komórkowy)**.** Kładziemy $C_n^{\mathrm{CW}}(X) = H_n(X^n, X^{n-1})$. Dla $n \geq 1$ jego operator brzegu jest złożeniem

$$H_n(X^n, X^{n-1}) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(X^{n-1}) \xrightarrow{j_{n-1}} H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}), \tag{8.6.1}$$

gdzie $\delta_n$ pochodzi z długiego ciągu pary, a $j_{n-1}$ z ilorazu łańcuchów. Przyjmujemy $\partial_0^{\mathrm{CW}} = 0$.

**Twierdzenie 8.6.3** (Komórki obliczają homologię)**.** *Operator* (8.6.1) *spełnia* $(\partial^{\mathrm{CW}})^2 = 0$. *Dla skończonego CW istnieją izomorfizmy*

$$H_n(C_\bullet^{\mathrm{CW}}(X), \partial^{\mathrm{CW}}) \cong H_n(X; \mathbb{Z}) \qquad \textit{dla każdego } n \geq 0.$$

*Dowód.* Dla $n = 1$ równość brzegu brzegu wynika z $\partial_0^{\mathrm{CW}} = 0$. Dla $n \geq 2$ z dokładności długiego ciągu pary $(X^{n-1}, X^{n-2})$ wynika $\delta_{n-1} j_{n-1} = 0$. Stąd

$$\partial_{n-1}^{\mathrm{CW}} \partial_n^{\mathrm{CW}} = j_{n-2}\delta_{n-1} j_{n-1}\delta_n = 0.$$

Rozpiszmy porównanie homologii. Indukcja po szkieletach, z użyciem długiego ciągu pary i Twierdzenia 8.6.1, daje $H_k(X^m) = 0$ dla $k > m$. Włączenie $X^{m-1} \hookrightarrow X^m$ indukuje ponadto izomorfizm na $H_k$ dla $k < m-1$: dwa sąsiednie wyrazy względne o stopniach $k+1$ i $k$ są wtedy zerowe. W szczególności komórki wymiaru $\geq n+2$ nie zmieniają $H_n$.

Dla $n \geq 1$ w ciągu pary $(X^n, X^{n-1})$ mamy odcinek

$$0 = H_n(X^{n-1}) \longrightarrow H_n(X^n) \xrightarrow{j_n} C_n^{\mathrm{CW}} \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(X^{n-1}).$$

Odwzorowanie $j_{n-1} : H_{n-1}(X^{n-1}) \to C_{n-1}^{\mathrm{CW}}$ jest iniektywne: jego jądro jest obrazem $H_{n-1}(X^{n-2}) = 0$. Dla $n = 1$ używamy $X^{-1} = \varnothing$, co daje ten sam wniosek. Zatem $\ker \partial_n^{\mathrm{CW}} = \ker \delta_n = \operatorname{im} j_n$ i $j_n$ identyfikuje cykle komórkowe z $H_n(X^n)$.

W następnym długim ciągu, dla $(X^{n+1}, X^n)$,

$$C_{n+1}^{\mathrm{CW}} \xrightarrow{\delta_{n+1}} H_n(X^n) \longrightarrow H_n(X^{n+1}) \longrightarrow H_n(X^{n+1}, X^n) = 0.$$

Jądro przejścia do $H_n(X^{n+1})$ jest więc $\operatorname{im}\delta_{n+1}$. Po włożeniu w $C_n^{\mathrm{CW}}$ przez $j_n$ jest to dokładnie $\operatorname{im}\partial_{n+1}^{\mathrm{CW}}$. Otrzymujemy $H_n^{\mathrm{CW}}(X) \cong H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X)$. Dla $n = 0$ ten sam argument działa z $H_0(X^0) = C_0^{\mathrm{CW}}$: $H_0(X^1)$ jest ilorazem przez obrazy brzegów 1-komórek, a wyższe komórki już nie zmieniają $H_0$. □

## 8.7 Odwzorowania dołączające i konkretne obliczenia

**Definicja 8.7.1** (Stopień odwzorowania sfer)**.** Dla $m \geq 1$ każde ciągłe odwzorowanie $h : S^m \to S^m$ indukuje endomorfizm $H_m(S^m) \cong \mathbb{Z}$. Istnieje więc dokładnie jedna liczba całkowita $\deg h$ taka, że $h_*([S^m]) = (\deg h)[S^m]$. Nazywamy ją *stopniem* $h$.

Z definicji i funktorialności $\deg(\mathrm{id}) = 1$ oraz $\deg(h \circ g) = \deg h \deg g$. Homotopijne odwzorowania mają ten sam stopień. Na $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ odwzorowanie $z \mapsto z^r$ ma stopień $r \in \mathbb{Z}$. Uzasadnijmy przejście od liczby obiegów do homologii. Pętla $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$ reprezentuje generator $H_1(S^1)$: po podziale na łuki jej obraz przez izomorfizm Mayera–Vietorisa z Przykładu 8.4.4 jest różnicą punktów dwóch składowych przecięcia. Dla dowolnych dwóch pętli $\alpha, \beta$ opartych w tym samym punkcie mamy $[\alpha * \beta] = [\alpha] + [\beta]$ w $H_1$. Istotnie, złożenie $\alpha * \beta$ z afinicznym odwzorowaniem $\Delta^2 \to [0,1]$ o wartościach $0, 1/2, 1$ w kolejnych wierzchołkach jest singularnym 2-sympleksem o brzegu $\beta - (\alpha * \beta) + \alpha$. Ponadto homotopia pętli względem końców daje homologiczne cykle przez wzór pryzmatyczny; pętla stała jest brzegiem stałego 2-sympleksu. Stąd $[\bar\alpha] = -[\alpha]$, bo $\alpha * \bar\alpha$ jest homotopijna do stałej. Pętla $t \mapsto e^{2\pi i r t}$ jest, z dokładnością do zmiany parametryzacji, złożeniem $r$ obiegów dla $r > 0$, $|r|$ obiegów przeciwnych dla $r < 0$ i jest stała dla $r = 0$. Jej klasa to zatem $r[\gamma]$.

**Twierdzenie 8.7.2** (Współczynniki brzegu komórkowego)**.** *Niech $\varphi_\alpha : S^{n-1} \to X^{n-1}$ będzie odwzorowaniem dołączającym zorientowanej $n$-komórki $e^n_\alpha$, gdzie $n \geq 2$. Dla każdej zorientowanej $(n-1)$-komórki $e^{n-1}_\beta$ zwińmy w $X^{n-1}$ do punktu dopełnienie jej otwartego wnętrza. Otrzymamy odwzorowanie*

$$q_\beta : X^{n-1} \longrightarrow X^{n-1}/(X^{n-1} \setminus e^{n-1}_\beta) \cong S^{n-1}.$$


*Sferę docelową orientujemy zgodnie z komórką $e^{n-1}_\beta$, a dziedzinę $\varphi_\alpha$ jako brzeg zorientowanej komórki $e^n_\alpha$. Wówczas*

$$\partial^{\mathrm{CW}}_n(e^n_\alpha) = \sum_\beta \deg(q_\beta \circ \varphi_\alpha) e^{n-1}_\beta. \tag{8.7.1}$$

*W stopniu 1 brzeg zorientowanej komórki od początku $v_-$ do końca $v_+$ wynosi $\partial_1 e = v_+ - v_-$.*

*Dowód.* Generator $e^n_\alpha$ jest obrazem klasy orientacji $(D^n, S^{n-1})$ w parze $(X^n, X^{n-1})$. Pierwsza strzałka (8.6.1) zwraca klasę obrazu zorientowanego brzegu $S^{n-1}$ przez $\varphi_\alpha$: tak działa odwzorowanie łączące, bo na łańcuchach bierze dosłowny brzeg podniesionego cyklu względnego. Druga strzałka przenosi tę klasę do $H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2})$. Według Twierdzenia 8.6.1 jest to suma kopii $\mathbb{Z}$, po jednej dla każdego $\beta$. Rzutowanie na składnik $\beta$ jest, poprzez iloraz z Lematu 8.5.1, tym samym co $q_{\beta *}$. Zatem współczynnik przy $e^{n-1}_\beta$ to liczba, przez którą $(q_\beta \circ \varphi_\alpha)_*$ mnoży generator homologii $S^{n-1}$: z definicji jest to jego stopień. Dla $n = 1$ używamy bezpośrednio $\partial[0,1] = [1] - [0]$; oba końce mogą w $X^0$ oznaczać ten sam wierzchołek. □

Warto przeczytać wzór geometrycznie: liczymy, ile razy, z jakimi znakami, brzeg wyższej komórki przechodzi przez daną komórkę niższą. Komórka z niezerowym współczynnikiem brzegu może zabić klasę homologii.




Rysunek 8.3: Kompleks komórkowy torusa. Ma trzy niezerowe grupy łańcuchów, a oba odwzorowania brzegu znikają: pętle kończą się w tym samym punkcie, a słowo dołączające komórkę 2-wymiarową jest komutatorem.

**Przykład 8.7.3** (Sfera z dwóch komórek)**.** W modelu z Przykładu 7.6.5 jest jedna komórka $e^0 = v$ i jedna $e^2$, bez 1-komórek. Kompleks komórkowy to

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}e^2 \xrightarrow{0} 0 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}v \longrightarrow 0.$$

Stąd $H_2(S^2) = \mathbb{Z}$, $H_1(S^2) = 0$, $H_0(S^2) = \mathbb{Z}$. Ogólniej $S^n = D^n/\partial D^n$ ma jedną komórkę w stopniu 0 i jedną w stopniu $n$ ($n \geq 2$). Dla $S^1$ jedna 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. W ten sposób odzyskujemy Twierdzenie 8.4.5.

**Przykład 8.7.4** (Torus)**.** Model CW z Przykładu 7.6.8 ma komórki $v$, $a, b$ oraz $e^2$. Krawędzie są pętlami, więc $\partial_1 a = \partial_1 b = 0$. Brzeg $e^2$ jest dołączony według słowa $aba^{-1}b^{-1}$. Współczynnik przy $a$ to $1 - 1 = 0$, a przy $b$ to $1 - 1 = 0$; jest to szczególny przypadek Wzoru (8.7.1). Zatem $\partial_2 = 0$ i

$$H_0(T^2) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(T^2) = \mathbb{Z}^2, \qquad H_2(T^2) = \mathbb{Z}, \qquad H_k(T^2) = 0 \quad (k > 2).$$

Rysunek 8.3 pokazuje cały rachunek. Grupa $\mathbb{Z}^2$ rozpoznaje dwa niezależne kierunki pętli.

**Przykład 8.7.5** (Płaszczyzna rzutowa i torsja)**.** Przestrzeń $\mathbb{RP}^2$ ma po jednej komórce $e^0, e^1, e^2$. Jedyna 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. Odwzorowanie dołączające $e^2$ okrąża $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ dwa razy, co było widoczne w Przykładzie 7.6.8. Ma stopień 2 po ustaleniu orientacji, zatem

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Jądro mnożenia przez 2 jest zerowe, a iloraz $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ma element niezerowy, który po dwukrotnym dodaniu znika. Otrzymujemy

$$H_0(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad H_2(\mathbb{RP}^2) = 0.$$

To konkretny przykład *torsji* zdefiniowanej w Sekcji 6.8.

*Uwaga* 8.7.6 (Homologia ze współczynnikami). Uzasadnijmy zmianę współczynników także w dodatniej charakterystyce. Dla przemiennego pierścienia $R$ z jedynką definiujemy $C_n(X; R)$ jako wolny $R$-moduł na singularnych sympleksach, z tym samym wzorem brzegu. Równoważnie jest to $C_n(X;\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} R$. Homotopie pryzmatyczne i podział barycentryczny mają całkowite współczynniki, więc wszystkie ich tożsamości pozostają prawdziwe nad $R$. Ciągi łańcuchów par oraz małych łańcuchów Mayera–Vietorisa są rozszczepione w każdym stopniu na wybranych bazach, więc są dokładne także nad $R$. Rachunek punktu, sfer i kolejnych szkieletów przebiega wtedy tak samo: $C_n^{\mathrm{CW}}(X; R)$ ma po jednej kopii $R$ na komórkę. Naturalność odwzorowań łączących względem $\mathbb{Z} \to R$ pokazuje, że całkowity współczynnik brzegu $d$ staje się $d \cdot 1_R$. To uzasadnia obliczenia komórkowe nad $R$; nie zakładamy, że utworzenie iloczynu tensorowego dowolnego ciągu dokładnego z $R$ zawsze zachowuje dokładność.

**Przykład 8.7.7** (Te same przestrzenie nad różnymi ciałami)**.** Wstawmy teraz do powyższych kompleksów komórkowych w miejsce $\mathbb{Z}$ dowolne $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Dla płaszczyzny rzutowej dostajemy

$$0 \longrightarrow \mathbb{F} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{F} \xrightarrow{0} \mathbb{F} \longrightarrow 0.$$

Ponieważ 2 ma w $\mathbb{F}$ odwrotność $1/2$, środkowe odwzorowanie jest izomorfizmem. Zatem

$$H_0(\mathbb{RP}^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}, \qquad H_k(\mathbb{RP}^2; \mathbb{F}) = 0 \quad (k > 0).$$

Klasa $\mathbb{Z}/2$ zniknęła. Dla torusa oba operatory brzegu nadal są zerowe, więc

$$H_0(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}, \qquad H_1(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}^2, \qquad H_2(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

Wymiary tych przestrzeni, odpowiednio $1, 2, 1$, to liczby Betti'ego torusa. Tak działa ogólny Wzór (6.8.2). Dla porównania nad $\mathbb{Z}/2$ strzałka $\times 2$ w kompleksie $\mathbb{RP}^2$ staje się zerowa. Wtedy oprócz $H_0$ otrzymujemy również $H_1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$ oraz $H_2(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$.

**Przykład 8.7.8** (Bukiet okręgów i charakterystyka Eulera)**.** Bukiet $r$ okręgów ma jeden wierzchołek i $r$ pętli, bez komórek wyższych: $C_1^{\mathrm{CW}} = \mathbb{Z}^r$, $C_0^{\mathrm{CW}} = \mathbb{Z}$ i $\partial_1 = 0$. Stąd $H_1 = \mathbb{Z}^r$, $H_0 = \mathbb{Z}$, a wyższe homologie znikają. Dla skończonego CW z $c_n$ komórkami w wymiarze $n$ równanie Eulera z Twierdzenia 6.8.6 przyjmuje postać

$$\sum_n (-1)^n c_n = \sum_n (-1)^n \operatorname{rank}_{\mathbb{Z}} H_n(X; \mathbb{Z}).$$

W szczególności dla torusa $1 - 2 + 1 = 0$, a dla $\mathbb{RP}^2$ mamy $1 - 1 + 1 = 1$; torsja $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ma rangę zero.

## 8.8 Lokalna homologia i dalsza droga

**Stwierdzenie 8.8.1** (Lokalna homologia rozmaitości)**.** *Jeśli $M$ jest topologiczną rozmaitością wymiaru $m$ bez brzegu i $p \in M$, to*

$$H_k(M, M \setminus \{p\}; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

*Wybór generatora grupy w stopniu $m$ jest* lokalną orientacją *w punkcie $p$.*

*Dowód.* Wybierzmy otwarte otoczenie $U \subseteq M$ i mapę $\psi : U \to B^m$ na otwartą kulę jednostkową, z $\psi(p) = 0$. Zbiór $Z = M \setminus U$ jest domknięty i leży we wnętrzu $M \setminus \{p\}$, więc wycinanie (Twierdzenie 8.4.2) daje

$$H_k(M, M \setminus \{p\}) \cong H_k(U, U \setminus \{p\}) \cong H_k(B^m, B^m \setminus \{0\}).$$

Dla $m \geq 1$ kula jest ściągalna, a kula pozbawiona środka silnie deformacyjnie retrahuje się na sferę o promieniu $1/2$, homeomorficzną z $S^{m-1}$: używamy $ru \mapsto ((1-t)r + t/2)u$, co pozostaje w $0 < r < 1$. Długi ciąg pary i Twierdzenie 8.4.5 dają wynik. Dla $m = 0$ punkt jest otwartą składową mapy lokalnej, a grupa $H_0(\{p\}, \varnothing) = \mathbb{Z}$. □

Istnienie lokalnego generatora nie oznacza jeszcze, że można wybrać generatory *spójnie* na całej rozmaitości. To będzie treść pojęcia orientowalności. Na obecnym etapie mamy już narzędzia do dalszej nauki: kompleksy łańcuchowe i długie ciągi, homotopijną niezmienniczość, wycinanie, Mayera–Vietorisa oraz model komórkowy, w którym odwzorowania dołączające kontrolują operator brzegu. Pozwalają one później opisać, jak dołączenie uchwytu zmienia homologię, bez wprowadzania tutaj teorii Morse'a i chirurgii.

*Dalsza lektura:* Pełne rozwinięcie homologii symplicjalnej, singularnej i komórkowej, wraz ze szczegółami technicznymi dotyczącymi podziału barycentrycznego, znajduje się w Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 2, `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf`.

# Rozdział 9

# Wyższe grupy homotopii i związek z homologią

Grupa podstawowa z Rozdziału 7 rejestruje pętle. Wyższe grupy homotopii mierzą, czy można ściągnąć do punktu odwzorowania całej sfery $S^n$. Homologia z Rozdziału 8 bierze z kolei zorientowane cykle i zapomina część informacji o sposobie ich odwzorowania. Twierdzenie Hurewicza wskazuje dokładnie sytuację, w której te dwa opisy mają ten sam pierwszy niezerowy wynik. Twierdzenie Whiteheada mówi, kiedy wszystkie grupy homotopii rozstrzygają typ homotopijny kompleksu CW.

W tym rozdziale pracujemy z przestrzeniami z wybranym punktem bazowym, przede wszystkim z kompleksami CW. W argumentach komórkowych wybieramy punkt bazowy będący wierzchołkiem. Gdy piszemy $\pi_n(X)$ bez punktu bazowego, zakładamy spójność łukową i wybieramy punkt bazowy; jego zmiana wzdłuż drogi daje izomorfizm, ale sam wybór drogi może mieć znaczenie.

## 9.1 Od pętli do odwzorowań sfer

**Definicja 9.1.1** (Grupa $\pi_n$ i punkt bazowy)**.** Niech $I = [0,1]$, $I^n = I \times \cdots \times I$, a $\partial I^n$ niech oznacza sumę wszystkich jego ścian. Dla przestrzeni z wybranym punktem $x_0$ kładziemy

$$\pi_n(X, x_0) = \big[(I^n, \partial I^n), (X, x_0)\big]_* = \big[(S^n, *), (X, x_0)\big]_* \qquad (n \geq 1).$$

Nawias oznacza klasy homotopii, w których *przez cały czas* brzeg kostki lub wyróżniony punkt sfery jest wysyłany do $x_0$. Utożsamienie pochodzi z $I^n/\partial I^n \cong S^n$. Dla $n = 1$ otrzymujemy $\pi_1(X, x_0)$ z Definicji 7.1.4. Symbol $\pi_0(X)$ oznacza jedynie zbiór składowych łukowych, zwykle bez działania grupowego.

Obraz odwzorowania $S^2 \to X$ można sobie wyobrażać jako elastyczną powłokę rozpiętą w przestrzeni; jej ściągalność do punktu wymaga ciągłej deformacji *całego odwzorowania*, nie tylko zniknięcia klasy homologii reprezentowanej przez to odwzorowanie. Sfera $S^n$ jest brzegiem dysku $D^{n+1}$, a także jest homeomorficzna z brzegiem kostki $I^{n+1}$.

**Twierdzenie 9.1.2** (Działanie i przemienność)**.** *Dla $n \geq 1$ klasy w $\pi_n(X, x_0)$ tworzą grupę. Dla $n \geq 2$ grupa ta jest abelowa.*

*Dowód.* Jeśli $f, g : (I^n, \partial I^n) \to (X, x_0)$, przedstawmy ich sumę sklejeniem w pierwszej współrzędnej:

$$(f +_1 g)(s_1, \ldots, s_n) = \begin{cases} f(2s_1, s_2, \ldots, s_n), & 0 \leq s_1 \leq \tfrac{1}{2}, \\ g(2s_1 - 1, s_2, \ldots, s_n), & \tfrac{1}{2} \leq s_1 \leq 1. \end{cases}$$

Na płaszczyźnie sklejenia oba wzory dają $x_0$; tak samo jest na zewnętrznym brzegu. Homotopie $f$ lub $g$ zachowujące brzeg sklejają się tym samym wzorem, więc działanie nie zależy od reprezentantów. Łączność wynika z liniowej zmiany podziału pierwszej współrzędnej na trzy odcinki, dokładnie jak w dowodzie Twierdzenia 7.1.6. Stałe odwzorowanie jest elementem neutralnym: dodatkową połowę, na której odwzorowanie jest stałe, można stopniowo zwęzić. Odbicie $s_1 \mapsto 1 - s_1$ reprezentuje odwrotność, bo dwie przeciwne połówki ściągamy równocześnie do punktu.

Gdy $n \geq 2$, możemy niezależnie zdefiniować drugie działanie $+_2$, sklejając w kierunku $s_2$. Ma ono ten sam element neutralny i tę samą konstrukcję homotopii. Podział kwadratu $(s_1, s_2)$ na cztery ćwiartki daje *równość odwzorowań*, a nie tylko klas:

$$(a +_1 b) +_2 (c +_1 d) = (a +_2 c) +_1 (b +_2 d).$$


Teraz przechodzimy do klas homotopii i oznaczamy klasę stałą przez 0. Korzystając z neutralności 0, otrzymujemy

$$a +_1 b = (a +_2 0) +_1 (0 +_2 b) = (a +_1 0) +_2 (0 +_1 b) = a +_2 b.$$

Z kolei

$$a +_1 b = (0 +_2 a) +_1 (b +_2 0) = (0 +_1 b) +_2 (a +_1 0) = b +_2 a = b +_1 a.$$

Te ostatnie równości dotyczą klas; samo usuwanie stałych połówek zmienia parametryzację odwzorowania. To argument Eckmanna–Hiltona: dwa zgodne sposoby sklejania wymuszają przemienność. Użycie drugiej współrzędnej jest niemożliwe dla $n = 1$, dlatego $\pi_1$ może być nieabelowa. □




Puste pola są odwzorowaniem stałym. Oba kierunki sklejania opisują to samo odwzorowanie czterech ćwiartek; zamiana kolejności daje $[f] + [g] = [g] + [f]$.

Rysunek 9.1: Dwa niezależne kierunki sklejania w $\pi_2$. W $\pi_n$ dla $n \geq 2$ pozostałe współrzędne traktujemy jako parametry.

**Stwierdzenie 9.1.3** (Odwzorowania, iloczyny i homotopie)**.** *Ciągłe odwzorowanie oparte* $F : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ *wyznacza homomorfizm* $F_* : \pi_n(X, x_0) \to \pi_n(Y, y_0)$ *przez* $[f] \mapsto [F \circ f]$. *Odwzorowania homotopijne* przez odwzorowania oparte *indukują ten sam homomorfizm. Dla* $n \geq 1$ *i przestrzeni opartych* $X, Y$*:*

$$\pi_n(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_n(X, x_0) \times \pi_n(Y, y_0).$$

*Dowód.* Złożenie $F \circ f$ nadal wysyła $\partial I^n$ do $y_0$, a homotopia $f_t$ daje homotopię $F \circ f_t$. Ponieważ $F$ działa po sklejaniu obu połówek dokładnie tak samo jak przed nim, $F_*([f] + [g]) = F_*[f] + F_*[g]$. Homotopia oparta $F_t$ daje homotopię $F_t \circ f$ z nieruchomym obrazem brzegu. Wreszcie odwzorowanie $I^n \to X \times Y$ to dokładnie para odwzorowań do $X$ i $Y$; to samo dotyczy homotopii. Projekcje i składanie pary stanowią wzajemne odwrotności podanego izomorfizmu. □

*Uwaga* 9.1.4 (Zmiana punktu bazowego). Droga $\gamma$ od $x_0$ do $x_1$ pozwala umieścić odwzorowanie oparte w $x_1$ w mniejszej kostce i w otaczającym ją pasie doprowadzić wartości wzdłuż $\gamma$ do $x_0$. Otrzymujemy izomorfizm grup $\pi_n(X, x_1) \to \pi_n(X, x_0)$ z odwrotnością od drogi przebytej w przeciwną stronę. Dwie różne drogi mogą dać różne izomorfizmy; dla zamkniętej drogi dostajemy *działanie* $\pi_1(X, x_0)$ na $\pi_n(X, x_0)$. Konstrukcja zależy tylko od klasy homotopii drogi względem końców: homotopię drogi stosujemy na tym samym pasie. Złożenie dwóch pasów odpowiada złożeniu dróg, a droga i jej odwrotność dają pas ściągalny. To uzasadnia zarówno izomorfizm, jak i działanie grupy. W przypadku przestrzeni jednospójnej wybór drogi nie powoduje tej niejednoznaczności. Jeśli $F_t : X \to Y$ jest homotopią bez warunku oparcia i $\gamma(t) = F_t(x_0)$, to po zmianie punktu bazowego wzdłuż $\gamma$ homomorfizm $(F_1)_*$ staje się $(F_0)_*$: pas odwzorowania $F_t \circ f$ jest właśnie pasem tej zmiany bazy. W szczególności zwykła równoważność homotopijna indukuje izomorfizmy wszystkich grup homotopii, z odpowiednio dobranymi bazami.

## 9.2 Grupy względne i długi ciąg homotopii


Tak jak $H_n(X, A)$ mierzy cykle, których brzeg może trafić do $A$, tak względna homotopia mierzy dyski w $X$ z brzegiem w $A$. Brzeg dysku może się przy tym przesuwać w $A$ podczas homotopii.

**Definicja 9.2.1** (Względne grupy homotopii)**.** Niech $x_0 \in A \subseteq X$. W kostce $I^n$ wyróżnijmy dolną ścianę $B = I^{n-1} \times \{0\}$, a przez $J$ oznaczmy sumę pozostałych ścian kostki $I^n$. Klasa względna jest klasą odwzorowań

$$F : (I^n, \partial I^n, J) \longrightarrow (X, A, x_0);$$

zatem $F(\partial I^n) \subseteq A$ i $F(J) = x_0$. Homotopie spełniają te same warunki. Ich zbiór oznaczamy $\pi_n(X, A, x_0)$. W równoważnym modelu są to oparte odwzorowania trójek $(D^n, S^{n-1}, *) \to (X, A, x_0)$. Dla $n \geq 2$ składanie w pierwszej współrzędnej daje grupę; dla $n \geq 3$ jest ona abelowa. Dla $n = 1$ pozostaje *zbiór z wyróżnionym elementem*, ponieważ nie ma wolnej współrzędnej do składania.

W przeciwieństwie do $\pi_n(X)$, względna $\pi_2(X, A)$ może być nieprzemienna. Drugi kierunek sklejania zajmuje wówczas rolę wyróżnionej ściany, a argument z Rysunku 9.1 nie ma zastosowania.




Rysunek 9.2: Przykład odwzorowania względnego $(D^2, S^1, *) \to (X, A, x_0)$. Czerwony obraz brzegu leży w zielonym pasie $A$, podczas gdy obraz wnętrza dysku może wyjść poza $A$. W ogólnej definicji nie wymaga się różnowartościowości $F$.

**Twierdzenie 9.2.2** (Długi ciąg homotopii pary)**.** *Dla $x_0 \in A \subseteq X$ otrzymujemy naturalny ciąg*

$$\cdots \to \pi_n(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{j_*} \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_{n-1}(X, x_0) \to \cdots . \quad (9.2.1)$$

*Jest on dokładny: obraz każdej strzałki to jądro następnej. Odwzorowanie $\partial$ ogranicza reprezentujący dysk do jego wyróżnionej ściany $B$. Na końcu ciągu występują zbiory $\pi_1(X, A, x_0)$ i $\pi_0(A), \pi_0(X)$; dokładność oznacza tam przeciwobraz wyróżnionego elementu.*

*Dowód.* W modelu kostkowym $i_*$ jest włączeniem $A \to X$, a $j_*$ traktuje odwzorowanie z całym brzegiem w $x_0$ jako odwzorowanie względne. Wzór $\partial[F] = [F|_B]$ jest poprawny, ponieważ $\partial B \subset J$ i $F(J) = x_0$. Homotopia względna ogranicza się do homotopii opartych odwzorowań na $B$, więc $\partial$ nie zależy od reprezentanta.

Sprawdźmy trzy kolejne miejsca. *W* $\pi_n(X)$. Jeśli $f$ ma cały obraz w $A$, homotopia $f_t(s', r) = f(s', (1-t)r + t)$ jest względną homotopią do stałej; tutaj $s' \in I^{n-1}$, a $r$ jest ostatnią współrzędną. Odwrotnie, niech $H(s', r, t)$ będzie względną homotopią od $f$ do stałej. Ściana $g(s', t) = H(s', 0, t)$ leży w $A$ i ma cały brzeg w $x_0$, więc reprezentuje element $\pi_n(A)$. W kwadracie $(r, t)$ porównujemy drogi od $(0, 0)$ do $(1, 1)$: dolny, a potem prawy bok oraz lewy, a potem górny bok. Są homotopijne względem końców przez liniową interpolację w kwadracie. Po złożeniu z $H$ dają odpowiednio $f$ i $g$ ze stałym dodatkowym odcinkiem; na brzegu współrzędnych $s'$ wszystko pozostaje w $x_0$. Stąd $[f] = i_*[g]$.

*W* $\pi_n(X, A)$. Dysk pochodzący z $\pi_n(X)$ ma stały brzeg, więc jego $\partial$ jest zerem. Jeśli natomiast brzeg $F|_B : S^{n-1} \to A$ jest zerowy w $\pi_{n-1}(A)$, wybieramy jego wypełnienie przez $D^n \to A$. Sklejenie tego wypełnienia z $F$ wzdłuż wspólnego brzegu daje oparte odwzorowanie $S^n = D^n \cup_{S^{n-1}} D^n \to X$. Po zapomnieniu drugiego dysku jego obraz względny jest klasą $[F]$.

*W* $\pi_{n-1}(A)$. Brzeg dysku względnego wypełnia się w $X$, więc ginie po włączeniu do $X$. Jeśli oparte odwzorowanie $S^{n-1} \to A$ jest zerowe w $\pi_{n-1}(X)$, jego homotopia do odwzorowania stałego wyznacza wypełnienie $D^n \to X$ i tym samym klasę względną, której brzeg jest daną klasą. Te trzy rachunki powtarzają się w sąsiednich stopniach. Na końcu ciągu element $\pi_1(X, A, x_0)$ jest drogą od pewnego $a \in A$ do $x_0$, a $\partial$ przypisuje mu składową $a$ w $A$. Trafia ona do wyróżnionej składowej $X$. Odwrotnie, punkt tej składowej można połączyć drogą z $x_0$. Jeśli $a$ leży w składowej $x_0$ już w $A$, dopinamy drogę z $x_0$ do $a$ w $A$ i otrzymujemy pętlę w $X$ reprezentującą daną klasę względną. To dowodzi dokładności także dla zbiorów wskazanych. Wszystkie konstrukcje zachowują się przy składaniu z odwzorowaniem par, co daje naturalność ciągu. □

**Definicja 9.2.3** (Spójność homotopijna)**.** Przestrzeń $X$ jest *$r$-spójna* ($r \geq 0$), jeśli jest łukowo spójna i $\pi_i(X) = 0$ dla $1 \leq i \leq r$. W szczególności 1-spójna oznacza jednospójną. Para $(X, A)$ jest *$r$-spójna*, jeśli każda składowa łukowa $X$ spotyka $A$ oraz $\pi_i(X, A) = 0$ dla $1 \leq i \leq r$ przy każdym wyborze punktu bazowego w $A$ (w stopniu 1 jest to trywialność zbioru z wyróżnioną klasą).

Dokładność (9.2.1) pokazuje, że dla $r$-spójnej pary włączenie $A \hookrightarrow X$ jest izomorfizmem na $\pi_i$ dla $i < r$ oraz surjekcją na $\pi_r$. Wymiar komórek CW pozwoli za chwilę uzyskać takie zanikanie bez liczenia odwzorowań pojedynczo.

## 9.3 Homotopie na komórkach CW

W rozdziale o homologii komórki dawały generatory grup łańcuchów. W homotopii ich wymiary pozwalają *usuwać przeszkody do deformacji*. Żeby deformować jedną komórkę bez psucia tego, co zrobiliśmy na jej brzegu, potrzebujemy przedłużania homotopii.

**Lemat 9.3.1** (Zwarte obrazy i homotopie w CW)**.** *Każdy zwarty podzbiór kompleksu CW leży w skończonym podkompleksie. Ponadto odwzorowanie $H : X \times I \to Y$ jest ciągłe, jeśli jego złożenia z każdym $\chi_\alpha \times \mathrm{id}_I : D^{d_\alpha} \times I \to X \times I$ są ciągłe, gdzie $\chi_\alpha$ są odwzorowaniami charakterystycznymi komórek.*

*Dowód.* Gdyby zwarty zbiór $C$ spotykał nieskończenie wiele otwartych komórek, wybralibyśmy z każdej z nich jeden punkt $c_\alpha \in C$. Każda domknięta komórka spotyka tylko skończenie wiele spośród tych punktów. Każdy podzbiór $E$ zbioru wybranych punktów ma więc domknięty przeciwobraz przez każde odwzorowanie charakterystyczne: jest to skończona suma przeciwobrazów

punktów w przestrzeni Hausdorffa. Topologia słaba mówi, że $E$ jest domknięty w $X$. Zatem zbiór wszystkich $c_\alpha$ jest domkniętym, dyskretnym podzbiorem zwartego $C$, co jest niemożliwe, jeśli jest nieskończony. Do skończenie wielu spotkanych komórek dołączamy ich ściany; warunek skończoności domknięć i malejące wymiary dają skończony podkompleks.

Topologia słaba oznacza, że surjekcja $q : \bigsqcup_\alpha D^{d_\alpha} \to X$ jest ilorazowa. Iloczyn dowolnego odwzorowania ilorazowego $q : E \to X$ z $\mathrm{id}_I$ też jest ilorazowy. Aby to sprawdzić, niech przeciwobraz $W \subseteq X \times I$ będzie otwarty. Dla $(x,t) \in W$ wybieramy zwarte otoczenie $J$ punktu $t$ w $I$ takie, że $\{x\} \times J \subset W$. Zbiór $V = \{y : \{y\} \times J \subset W\}$ ma otwarty przeciwobraz przez $q$: dla każdego $e$ nad $V$ skończone pokrycie zwartego $J$ prostokątami zawartymi w przeciwobrazie $W$ daje otoczenie $e$ o tej samej własności. Stąd $V$ jest otwarty i $V \times \mathrm{int}_I J \subseteq W$ jest otoczeniem $(x,t)$. To dowodzi tezy o iloczynie, a więc także kryterium ciągłości $H$. □

Z lematu wynika również rozszerzenie homologii komórkowej z Rozdziału 8 na dowolne CW i pary CW. Dla pary skończonych CW definiujemy najpierw $C_\bullet^{\mathrm{CW}}(X,A) = C_\bullet^{\mathrm{CW}}(X)/C_\bullet^{\mathrm{CW}}(A)$: jest to kompleks wolny na komórkach spoza $A$, z brzegiem modulo komórki $A$. Krótki ciąg tych kompleksów daje długi ciąg homologii. Naturalne porównanie ze zwykłym ciągiem pary i lemat pięciu przenoszą izomorfizmy dla $A, X$ na grupy względne. Każdy singularny łańcuch, jego brzeg oraz świadectwo homologiczności są skończonymi sumami odwzorowań zwartych sympleksów, więc mieszczą się w skończonym podkompleksie. Cykl pochodzi z takiego podkompleksu, a relacja między cyklami jest już prawdziwa w pewnym większym, również skończonym. Tak samo jest dla skończonych sum komórek i dla par: przecięcie skończonego podkompleksu z podkompleksem $A$ jest skończonym podkompleksem. Izomorfizmy dla modeli skończonych są zgodne z włączeniami, bo pochodzą z naturalnych ciągów par. Przechodzą więc na izomorfizmy dla całego CW. Grupy łańcuchów komórkowych są przy tym *sumami prostymi*, a nie iloczynami: każda kombinacja nadal ma skończony nośnik.

**Lemat 9.3.2** (Przedłużanie homotopii dla par CW)**.** *Niech $A \subseteq X$ będzie podkompleksem CW. Jeśli $f : X \to Y$ i homotopia $h : A \times I \to Y$ spełniają $h(a,0) = f(a)$, to istnieje $H : X \times I \to Y$ takie, że $H(x,0) = f(x)$ oraz $H|_{A\times I} = h$. W szczególności homotopię zadaną na brzegu dołączonego dysku można przedłużyć do całego dysku.*

*Dowód.* Najpierw rozważmy jedną komórkę $D^k$, której brzeg $S^{k-1}$ leży w już zbudowanej części. Na

$$(D^k \times \{0\}) \cup (S^{k-1} \times I) \subset D^k \times I$$

mamy dane: $f$ na dole i homotopię $h$ na boku. Ta podprzestrzeń jest retraktem całego cylindra. Można to zobaczyć jawnie: pisząc $r = \|x\|$ i

$$\lambda(x,t) = \min\left\{\frac{1}{r}, \frac{2}{2-t}\right\}, \qquad R(x,t) = (\lambda x,\, 2 - \lambda(2-t)),$$

przy $r = 0$ przyjmujemy $1/r = +\infty$. Dla $r \le 1/2$ minimum wynosi $2/(2-t)$, więc wzór jest ciągły także przy $r = 0$. Wartość $R(x,t)$ leży albo na boku $\|\lambda x\| = 1$, albo na dole z drugą współrzędną równą 0. Jeśli $t = 0$ lub $r = 1$, mamy $\lambda = 1$, więc $R$ pozostawia dane punkty nieruchome. Złożenie danych z $R$ przedłuża homotopię na $D^k \times I$.

Dołączajmy teraz komórki $X \setminus A$ według wymiarów. Na każdym kroku stosujemy poprzednią konstrukcję na wszystkich dyskach danego wymiaru; na ich brzegach odwzorowania już się zgadzają. Ponieważ topologia CW jest zadana przez odwzorowania charakterystyczne, sklejone homotopie są ciągłe. Dla nieskończenie wielu komórek uzasadnieniem ciągłości z parametrem czasu jest Lemat 9.3.1, zastosowany do wszystkich odwzorowań $D^k \times I \to Y$. Dla 0-komórek wybieramy homotopię stałą równą wartości $f$; wzór na $R$ jest potrzebny dla $k \ge 1$. □

**Twierdzenie 9.3.3** (Przybliżenie komórkowe)**.** *Każde odwzorowanie $f : X \to Y$ kompleksów CW jest homotopijne z odwzorowaniem* komórkowym*, czyli takim, które spełnia $f(X^k) \subseteq Y^k$*

*dla każdego $k$. Jeśli na podkompleksie $A \subseteq X$ odwzorowanie już jest komórkowe, homotopię można wybrać stałą na $A$.*

*Dowód.* Wyjaśnijmy lokalny krok geometryczny. Niech $u : D^k \to Y^m$ wysyła brzeg do $Y^{k-1}$, gdzie $m > k$. Obraz jest zawarty w skończonym podkompleksie na mocy Lematu 9.3.1. W jednej otwartej $m$-komórce używamy współrzędnych $\operatorname{int} D^m$ i oznaczamy przez $v$ współrzędnościowy zapis $u$ na otwartym przeciwobrazie tej komórki. Wybierzmy $0 < a < b < c < 1$. Zbiór $K = v^{-1}(\overline{B}_b)$ jest zwarty i leży we wnętrzu $D^k$: obraz $\overline{B}_b$ jest zwarty i domknięty w przestrzeni Hausdorffa $Y$. Wybieramy skończone otoczenie wielościenne $P$ zbioru $K$ takie, że $K \subset \operatorname{int} P \subset P \subset v^{-1}(B_c)$. Można je uzyskać jako sumę domkniętych kostek dostatecznie drobnej siatki spotykających $K$. Triangulujemy $P$ i przez interpolację wartości $v$ w wierzchołkach dostajemy odcinkowo afiniczne $w$ z $\|w - v\| < \varepsilon$, gdzie $\varepsilon < \min(b - a, 1 - c)$. Istnienie takiego przybliżenia wynika z jednostajnej ciągłości $v$ na $P$: na każdym małym sympleksie interpolujemy wartości różniące się o mniej niż $\varepsilon$.

Niech $\eta : D^k \to [0, 1]$ będzie ciągła, równa 1 na $K$ i 0 poza $\operatorname{int} P$. Na $P$ stosujemy homotopię $v_t = v + t\eta(w - v)$, a poza $P$ nic nie zmieniamy. Wszystkie wartości pozostają we wnętrzu komórki i homotopia nie rusza brzegu dysku. Poza $K$ mamy $\|v\| > b$, więc $\|v_t\| > a$. W $K$ końcowe odwzorowanie jest równe $w$. Jego obraz jest zawarty w skończonej sumie podprzestrzeni afinicznych wymiaru co najwyżej $k < m$, która nie zawiera otwartej kuli $B_a$. Istnieje więc $z \in B_a$ pominięty przez całe nowe odwzorowanie.

Promieniowa retrakcja $D^m \setminus \{z\}$ na $\partial D^m$ zostawia brzeg nieruchomy, więc po sklejeniu komórki daje homotopię usuwającą jej wnętrze z obrazu $u$. Ciągłość z parametrem czasu wynika z ilorazowego kryterium z poprzedniego lematu. Usuwamy kolejno komórki najwyższego wymiaru i schodzimy z wymiarem do $k$. Pracujemy w skończonym podkompleksie zawierającym obraz i domknięcia spotkanych komórek, zatem proces kończy się po skończenie wielu krokach.

Zaczynamy od $X^0$: obraz każdego wierzchołka przesuwamy do odpowiedniego wierzchołka w jego składowej $Y$, a na $A$ niczego nie zmieniamy. Załóżmy indukcyjnie, że $f(X^{k-1}) \subseteq Y^{k-1}$. Dla każdej $k$-komórki stosujemy lokalny krok do jej odwzorowania charakterystycznego: usuwamy po kolei obrazy komórek celu o wymiarach $m > k$, zachowując jej brzeg. Dostajemy odwzorowanie tej komórki do $Y^k$. Dzięki Lematowi 9.3.2 homotopię na dotychczas zbudowanej części przedłużamy na całe $X$ i przechodzimy do następnego wymiaru. Podane kroki wykonuje się względnie $A$. Etapowi wymiaru $k$ przydzielamy przedział $[1 - 2^{-k}, 1 - 2^{-k-1}]$, a w chwili 1 bierzemy odwzorowanie końcowe. Każdy ustalony szkielet pozostaje nieruchomy po zakończeniu swojego etapu. Na każdym $D^k \times I$ mamy więc skończenie wiele sklejonych homotopii i stały odcinek końcowy. Lemat 9.3.1 zapewnia ciągłość całej homotopii, także w chwili 1. □

*Uwaga* 9.3.4 (Przybliżenie w równych wymiarach). Ta sama lokalna konstrukcja dla $k = m$ pozwala wybrać $z \in B_a$ poza obrazami ścian triangulacji $P$ i tych $m$-sympleksów, na których $w$ ma rząd mniejszy od $m$. Jest to skończona suma zbiorów o wymiarze mniejszym od $m$. Każdy przeciwobraz $z$ leży wtedy we wnętrzu jednego sympleksu, gdzie $w$ jest afinicznym homeomorfizmem. Przeciwobrazów jest skończenie wiele, a każdy ma znak wyznacznika $+1$ lub $-1$. Możemy wokół $z$ wybrać małą kulę, której przeciwobrazy są rozłącznymi dyskami, odwzorowanymi homeomorficznie na tę kulę. To wynika również ze zwartości: poza małymi otoczeniami znalezionych przeciwobrazów obraz omija całe dostatecznie małe otoczenie $z$. Ten wariant będzie użyty w dowodzie o pierwszych komórkach.

**Wniosek 9.3.5** (Szkielet widziany przez $\pi_i$)**.** *Dla kompleksu CW $X$ para $(X, X^n)$ jest $n$-spójna. Włączenie $X^n \hookrightarrow X$ daje więc izomorfizm na $\pi_i$ dla $i < n$ i surjekcję dla $i = n$. Jeśli $1 \le i < k$, to $\pi_i(S^k) = 0$.*

*Dowód.* Reprezentant klasy $\pi_i(X, X^n)$ jest odwzorowaniem $(D^i, \partial D^i) \to (X, X^n)$, gdzie $i \le n$. Najpierw przybliżamy komórkowo odwzorowanie brzegu do $X^n$, zachowując punkt bazowy, i

przedłużamy tę homotopię na dysk Lematem 9.3.2. Dopiero teraz brzeg jest komórkowy, więc względne przybliżenie na dysku przesuwa cały obraz do $X^i \subseteq X^n$. Klasa względna znika. Każda składowa $X$ zawiera wierzchołek: punkt komórki można połączyć z jej brzegiem i powtarzać to w malejących wymiarach. To daje także stwierdzenie o składowych i przypadek $n = 0$. Długi ciąg (9.2.1) daje twierdzenie o włączeniu szkieletu. Sfera $S^k$ ma strukturę CW z jednym wierzchołkiem i jedną $k$-komórką, więc jej $i$-szkielet jest punktem dla $0 \le i < k$. Każde oparte odwzorowanie $S^i \to S^k$ jest homotopijne do odwzorowania komórkowego i wtedy jego obraz jest punktem. □

**Stwierdzenie 9.3.6** (Wyższe grupy i nakrycia)**.** *Jeśli $p : \widetilde{X} \to X$ jest nakryciem, $\widetilde{x}_0$ leży nad $x_0$, to*

$$p_* : \pi_n(\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x_0) \qquad (n \ge 2).$$

*Dowód.* Sfera $S^n$ dla $n \ge 2$ jest jednospójna na mocy Wniosku 9.3.5 (dla $n = 2$ znika $\pi_1$, a dla większych wymiarów również). Każde oparte odwzorowanie $S^n \to X$ podnosi się więc jednoznacznie po wskazaniu obrazu punktu bazowego, zgodnie z kryterium z Twierdzenia 7.2.4. Daje to surjektywność $p_*$. Jeśli dwa podniesienia po zrzutowaniu są homotopijne przez odwzorowania oparte, ich homotopię $S^n \times I \to X$ podnosimy z kryterium podnoszenia: $S^n \times I$ jest łukowo i lokalnie łukowo spójna oraz jednospójna, bo retrahuje się na $S^n$. Ustalamy obraz $(*, 0)$. Ścieżka punktu bazowego leży w dyskretnym włóknie, więc jest stała, a ograniczenie do $S^n \times \{0\}$ jest zadanym podniesieniem. Jednoznaczność podnoszenia sprawia, że na końcu otrzymujemy drugie podniesienie, ponieważ oba zgadzają się w punkcie bazowym. To daje iniektywność. □

**Przykład 9.3.7** (Okrąg i torus nie mają wyższych $\pi_n$)**.** Nakrycia $\mathbb{R} \to S^1$ i $\mathbb{R}^2 \to T^2 = S^1 \times S^1$ mają ściągalne przestrzenie całkowite. Zatem dla $n \ge 2$

$$\pi_n(S^1) = 0, \qquad \pi_n(T^2) = 0.$$

Jednocześnie $H_2(T^2) = \mathbb{Z}$ z Przykładu 8.7.4. Już tu widać, że w przestrzeni z nietrywialną $\pi_1$ wyższa homologia nie musi być obrazem wyższej grupy homotopii.

## 9.4 Pierwsze odwzorowanie Hurewicza: od pętli do cykli

**Twierdzenie 9.4.1** (Hurewicz w stopniu pierwszym)**.** *Dla przestrzeni łukowo spójnej $X$ odwzorowanie przypisujące opartej pętli jej klasę singularnego 1-cyklu indukuje naturalny izomorfizm*

$$h_1 : \pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}} = \pi_1(X, x_0)/[\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)] \xrightarrow{\cong} H_1(X; \mathbb{Z}).$$

*Dowód.* Pętla $\ell : I \to X$ ma $\partial \ell = [x_0] - [x_0] = 0$. Złożenie dwóch pętli ma tę samą klasę homologii co suma ich łańcuchów: singularny 2-sympleks, którego boki przebiegają $\ell_1$, $\ell_2$ i ich złożenie, ma brzeg $\ell_1 + \ell_2 - (\ell_1 * \ell_2)$ (z odpowiednią parametryzacją boków). Homotopia oparta pętli daje homologiczne cykle przez operator pryzmatyczny z Twierdzenia 8.2.5. Zatem $[\ell] \mapsto [\ell]_{H_1}$ jest homomorfizmem do grupy abelowej i zabija komutatory.

Skonstruujemy odwrotność. Dla każdego $x \in X$ wybierzmy drogę $u_x$ od $x_0$ do $x$, przy czym $u_{x_0}$ jest drogą stałą. Singularnej krawędzi $\sigma : x \to y$ przypiszmy w $\pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}}$ klasę pętli

$$L(\sigma) = [u_x * \sigma * \bar{u}_y].$$

Niech $\tau : \Delta^2 \to X$, a $x_0', x_1', x_2'$ będą obrazami jej wierzchołków. Pętla złożona z boków $\tau_{01} * \tau_{12} * \bar{\tau}_{02}$ jest zerowa w $\pi_1(X, x_0')$, gdyż wypełnia ją sam trójkąt $\tau$. Po doprowadzeniu jej do bazy drogami $u_{x_i'}$ otrzymujemy

$$L(\partial \tau) = L(\tau_{12}) - L(\tau_{02}) + L(\tau_{01}) = 0 \quad \text{w } \pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}}.$$

Przez liniowość $L$ zeruje więc wszystkie singularne brzegi 2-wymiarowe. Na cyklach $z \in C_1(X)$ daje homomorfizm $\bar{L} : H_1(X) \to \pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}}$.

Dla opartej pętli $\ell$ mamy $L(\ell) = [\ell]$, więc $\bar{L}h_1 = \mathrm{id}$. W drugą stronę, w homologii obraz cyklu $z = \sum m_\sigma \sigma$ rozwija się na sumę łańcuchów $u_x$, samych krawędzi i $-u_y$, z dokładnością do brzegów 2-łańcuchów. Pojedyncze $u_x$ zwykle nie są cyklami, więc nie przypisujemy im osobnych klas w $H_1$. Rachunek przeprowadzamy w $C_1(X)/\operatorname{im}\partial_2$. Tożsamość dla złożenia dróg wynika z trójkąta użytego na początku, także gdy ich końce są różne; droga odwrotna daje ujemny łańcuch modulo brzegi, bo droga złożona z własną odwrotnością jest homotopijna do stałej. Współczynnik przy każdej pomocniczej drodze $u_x$ jest równy minus współczynnikowi przy $[x]$ w $\partial z$, a zatem zerowy. Pozostaje klasa samego $z$ w $H_1(X)$; formalnie używamy homologii złożenia dróg udowodnionej na początku. Stąd $h_1\bar{L} = \mathrm{id}$ i oba odwzorowania są odwrotne. □

**Przykład 9.4.2** (Od wolnej grupy do liczby pętli)**.** Bukiet $r$ okręgów ma grupę podstawową $F_r$ z Przykładu 7.3.2 (dla $r = 2$ rachunek podano tam wprost). Po narzuceniu przemienności generatorów $F_r^{\mathrm{ab}} \cong \mathbb{Z}^r$, zgodnie z Przykładem 8.7.8. Homologia pamięta tu liczbę niezależnych kierunków, ale nie kolejność, w jakiej przebywamy pętle.

## 9.5 Twierdzenie Whiteheada

Równość wszystkich grup $\pi_n$ nie oznacza automatycznie, że dowolne odwzorowanie przestrzeni topologicznych ma homotopijną odwrotność. Dla kompleksów CW komórki pozwalają jednak przekształcić informację o sferach w deformację całej przestrzeni.

**Definicja 9.5.1** (Słaba równoważność homotopijna)**.** Odwzorowanie $f : X \to Y$ jest *słabą równoważnością homotopijną*, jeśli daje bijekcję $\pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ i dla wszystkich punktów bazowych $x \in X$ oraz wszystkich $n \geq 1$ izomorfizmy $f_* : \pi_n(X, x) \to \pi_n(Y, f(x))$.

**Lemat 9.5.2** (Ściskanie komórek)**.** *Niech $(K, L)$ będzie parą CW, a $B \subseteq Y$ niepustą podprzestrzenią. Załóżmy, że każda składowa łukowa $Y$ spotyka $B$ oraz wszystkie grupy $\pi_k(Y, B, b)$ dla $k \geq 1$ i $b \in B$ są trywialne (dla $k = 1$ chodzi o zbiór z wyróżnioną klasą). Wówczas każde odwzorowanie par $F : (K, L) \to (Y, B)$ jest homotopijne* względem $L$ *z odwzorowaniem o obrazie w $B$.*

*Dowód.* Dla 0-komórek $K \setminus L$ wybieramy drogi z ich obrazów do $B$. Homotopia przesuwa te obrazy do $B$ i jest stała na $L$.

Załóżmy, że tak zrobiliśmy na wszystkich komórkach o wymiarze mniejszym od $k$. Dla dołączonej $k$-komórki odwzorowanie charakterystyczne daje parę $(D^k, S^{k-1}) \to (Y, B)$. Przy $k \geq 1$ jej klasa w $\pi_k(Y, B)$ jest zerowa. Znaczy to, że można deformować dysk do $B$, pozwalając początkowo brzegowi poruszać się w $B$. Wyjaśnijmy, jak unieruchomić brzeg. Niech $G : D^k \times I \to Y$ będzie względną homotopią do stałej, z $G_0 = F$ i $G_t(S^{k-1}) \subset B$. Połóżmy $a_t = 1 - t/2$ i dla $x = ru$ określmy

$$K_t(ru) = \begin{cases} G_t(ru/a_t), & r \leq a_t, \\ G_{2(1-r)}(u), & a_t \leq r \leq 1. \end{cases}$$

Na $r = a_t$ oba wzory dają $G_t(u)$, na $r = 1$ mamy stale $F(u)$, a dla $t = 0$ otrzymujemy $F$. Ciągłość przy zanikającym kołnierzu wynika z ciągłości $G$; dla $t = 1$ cały obraz leży w $B$. Tak dostajemy deformację względem całego brzegu, a nie jedynie homotopię, która pozwala mu przesuwać się w $B$. Wykonujemy je na wszystkich $k$-komórkach równocześnie. Lemat 9.3.2 przedłuża otrzymaną homotopię do reszty $K$, bez ruszania $L$. Indukcja usuwa obrazy wszystkich komórek spoza $L$ z $Y \setminus B$. Dla nieskończonego CW przeznaczamy na etap $k$ coraz krótszy przedział czasu kończący się w 1. Każdy ustalony szkielet staje się w końcu nieruchomy. Ograniczenie

do każdej domkniętej komórki, wraz z całym przedziałem czasu, jest skończonym sklejeniem ciągłych homotopii i stałego końca. Lemat 9.3.1 daje ciągłość także w chwili 1. □

**Twierdzenie 9.5.3** (Whitehead)**.** *Słaba równoważność homotopijna $f : X \to Y$ między kompleksami CW jest równoważnością homotopijną. Jeśli $i : X \hookrightarrow Y$ jest włączeniem podkompleksu i indukuje izomorfizmy wszystkich $\pi_n$ oraz bijekcję na $\pi_0$, to $X$ jest silnym retraktem deformacyjnym $Y$.*

*Dowód.* Jeśli $X = \varnothing$, bijekcja na składowych wymusza $Y = \varnothing$ i teza jest natychmiastowa. Dalej zakładamy $X \neq \varnothing$. Zacznijmy od włączenia. W długim ciągu (9.2.1) pary $(Y, X)$ znajdują się fragmenty


$$\pi_n(X) \xrightarrow[\cong]{i_*} \pi_n(Y) \longrightarrow \pi_n(Y, X) \longrightarrow \pi_{n-1}(X) \xrightarrow[\cong]{i_*} \pi_{n-1}(Y).$$

Dokładność wymusza $\pi_n(Y, X) = 0$ dla wszystkich $n \geq 2$. Dla stopnia 1 warto użyć dróg, ponieważ nie jest to już ciąg grup. Droga względna od $a \in X$ do $x_0$ ma oba końce w jednej składowej $X$, gdyż $\pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ jest injekcją. Dopinamy drogę od $x_0$ do $a$ w $X$, otrzymując pętlę w $Y$. Surjektywność $\pi_1(X) \to \pi_1(Y)$ pozwala zastąpić ją pętlą w $X$. Każda taka droga jest trywialna względnie $X$, więc $\pi_1(Y, X)$ ma tylko wyróżniony element. Każda składowa $Y$ spotyka $X$, bo odwzorowanie na $\pi_0$ jest także surjekcją. Lemat 9.5.2 zastosowany do $F = \mathrm{id}_Y : (Y, X) \to (Y, X)$ daje homotopię nieruchomą na $X$, prowadzącą od $\mathrm{id}_Y$ do odwzorowania $r : Y \to X$. Ponieważ $r|_X = \mathrm{id}_X$, jest to silna retrakcja deformacyjna.

Niech teraz $f$ będzie dowolną słabą równoważnością CW. Twierdzenie 9.3.3 pozwala zastąpić ją odwzorowaniem komórkowym $f' \simeq f$. Zmiana punktu bazowego wzdłuż tej homotopii pokazuje, że $f'$ nadal jest słabą równoważnością. Utwórzmy jego *cylinder odwzorowania*

$$M_{f'} = (X \times I) \sqcup Y / \big((x, 1) \sim f'(x)\big).$$

Cylinder ma strukturę CW: poza komórkami $Y$ bierzemy dolne komórki $e^k \times \{0\}$ i komórki $e^k \times (0, 1)$ wymiaru $k+1$. Brzeg każdej z tych ostatnich składa się z dołu, boków nad brzegiem $e^k$ i góry odwzorowanej przez $f'$ do $Y^k$. Komórkowość $f'$ zapewnia zgodność wymiarów, a topologia ilorazowa i Lemat 9.3.1 dają topologię słabą. Dolna kopia $X = X \times \{0\}$ jest więc podkompleksem $M_{f'}$. Zwijając każdy odcinek $\{x\} \times I$ do $f'(x) \in Y$, otrzymujemy retrakcyjną deformację $M_{f'} \to Y$. Złożenie włączenia $X \hookrightarrow M_{f'}$ z tą retrakcją to $f'$. Ponieważ $f'_*$ i retrakcyjne odwzorowanie na $Y$ indukują izomorfizmy na $\pi_n$, również włączenie $X \hookrightarrow M_{f'}$ je indukuje. Pierwsza część dowodu ściska więc $M_{f'}$ do $X$. Oznaczmy dolne włączenie przez $j$, włączenie $Y$ do cylindra przez $i$, a retrakcje na $X, Y$ odpowiednio przez $s, r$. Wtedy $f' = rj$, a odwrotnością homotopijną jest $g = si$: $gf' = sirj \simeq sj = \mathrm{id}_X$ oraz $f'g = rjsi \simeq ri = \mathrm{id}_Y$. Ponieważ $f \simeq f'$, to samo $g$ jest odwrotnością homotopijną $f$. □




Cylinder zwija się na $Y$. Gdy $f'$ jest słabą równoważnością, poprzednia część dowodu zwija go również na dolną kopię $X$.

Rysunek 9.3: Cylinder odwzorowania zamienia odwzorowanie $f' : X \to Y$ na włączenie podkompleksu $X \hookrightarrow M_{f'}$. Rysunek pokazuje mechanizm dowodu twierdzenia Whiteheada.

*Uwaga* 9.5.4 (Zakres twierdzenia). Sprawdzenie tylko $\pi_1$ i kilku pierwszych grup $\pi_n$ nie wystarcza do zastosowania Whiteheada: założenie dotyczy *każdego* $n$. Również samo podobieństwo grup homologii dwóch przestrzeni nie wskazuje jeszcze odwzorowania, które mogłoby być równoważnością. Niżej wyprowadzimy użyteczne kryterium homologiczne przy dodatkowej jednospójności.

## 9.6 Odwzorowanie Hurewicza i pierwszy niezerowy wymiar

**Definicja 9.6.1** (Odwzorowanie Hurewicza)**.** Homologia $H_n(S^n;\mathbb{Z})$ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}$ na mocy Twierdzenia 8.4.5. Wybierzmy generatory zgodnie z orientacjami dysków i ich brzegów, tak aby $\delta[D^n, S^{n-1}] = [S^{n-1}]$. Dla $n \geq 2$ określamy

$$h_n : \pi_n(X, x_0) \longrightarrow H_n(X;\mathbb{Z}), \qquad h_n([f]) = f_*[S^n].$$

Dla pary $(X, A)$ bierzemy analogicznie generator $[D^n, S^{n-1}] \in H_n(D^n, S^{n-1})$ i kładziemy

$$h_n^{\mathrm{rel}}([F]) = F_*[D^n, S^{n-1}] \in H_n(X, A).$$

W stopniu 1 dla przestrzeni używamy homomorfizmu $\pi_1(X) \to \pi_1(X)_{\mathrm{ab}} \xrightarrow{h_1} H_1(X)$. Względny homomorfizm określamy tutaj dla $n \geq 2$; zbiór $\pi_1(X, A)$ nie jest w ogólności grupą.

Homotopie oparte są w szczególności zwykłymi homotopiami odwzorowań, więc $h_n$ jest dobrze określone dzięki Twierdzeniu 8.2.5. Odwzorowanie jest homomorfizmem: sklejanie dwóch połówek sfery odpowiada sumie ich klas fundamentalnych. Dokładniej, sklejanie jest złożeniem odwzorowania ściskającego równik $S^n \to S^n \vee S^n$ z $f \vee g$. Odwzorowanie ściskające posyła generator na sumę dwóch generatorów: rzut na każdy składnik ma stopień $+1$, co widać z klasy orientacji odpowiedniej półkuli i naturalności odwzorowania łączącego dla dysku i brzegu. Względnie używamy kostki podzielonej na dwie połowy w pierwszej współrzędnej. Po zorientowaniu obu połówek zgodnie z całą kostką ich wewnętrzne ściany kasują się; obraz łańcucha fundamentalnego jest sumą obu obrazów. To daje również homomorfizm względny. Naturalność wynika od razu ze składania odwzorowań.

Do dowodu potrzebujemy przeliczyć grupy homotopii prostych modeli komórkowych. Najważniejszy jest następujący krok: w pierwszym nowym wymiarze komórki są niezależne, a komórki o wymiar wyższym wprowadzają relacje.

**Lemat 9.6.2** (Pierwsze komórki i ich relacje)**.** *Niech $A$ będzie jednospójnym podkompleksem CW kompleksu $Z$. Załóżmy, że wszystkie komórki $Z \setminus A$ mają wymiar co najmniej $n \geq 2$. Oznaczmy przez $I_n$ zbiór nowych $n$-komórek. Wtedy*

$$\pi_n(Z^n \cup A, A) \cong \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e_\alpha^n] \xrightarrow[\cong]{h_n^{\mathrm{rel}}} H_n(Z^n \cup A, A).$$

*Po dołączeniu $(n+1)$-komórek obie grupy otrzymujemy z tej wolnej grupy przez te* same *relacje: obraz brzegu odwzorowania dołączającego $S^n \to Z^n \cup A$. Komórki o wymiarach co najmniej $n+2$ nie zmieniają tych grup.*

*Dowód.* Niech $W = Z^n \cup A$ oraz $W' = Z^{n+1} \cup A$. Przestrzeń $W$ jest jednospójna: do jednospójnego $A$ dołączamy tylko komórki wymiaru co najmniej 2, co nie tworzy nowych pętli (lokalny krok przybliżenia komórkowego przesuwa pętlę do $A$). W szczególności także $\pi_2(W, A)$ jest abelowa, bo z ciągu pary jest ilorazem abelowej $\pi_2(W)$ przy $\pi_1(A) = 0$. Możemy więc mówić o homomorfizmie z wolnej grupy abelowej również w przypadku $n = 2$. Po zwinięciu $A$ otrzymujemy bukiet $\bigvee_{\alpha \in I_n} S^n$. Względna homologia $H_n(W, A)$ jest wolna na komórkach na mocy Twierdzenia 8.6.1 i rozszerzenia na pary CW po Lemacie 9.3.1; to jeszcze nie jest argument o homotopii, więc rozpiszmy go osobno.

Każde odwzorowanie charakterystyczne nowej komórki opieramy w $x_0$ przez dołączenie drogi w $A$ do obrazu wybranego punktu jej brzegu. Wybór drogi nie zmienia klasy, bo $A$ jest jednospójna. Tak rozumiemy symbole $[e^n_\alpha]$ po stronie homotopii. Weźmy teraz odwzorowanie względne $F : (D^n, S^{n-1}, *) \to (W, A, x_0)$. Zwarty obraz spotyka tylko skończenie wiele otwartych komórek. W każdej z nowych $n$-komórek stosujemy przybliżenie z Uwagi 9.3.4, nieruchome przy $S^{n-1}$. Wybieramy regularny punkt $z_\alpha$ poza obrazami ścian triangulacji. Ma on skończenie wiele przeciwobrazów; na małych otoczeniach $F$ jest afinicznym homeomorfizmem o znaku $+1$ lub $-1$. Wybierzmy wokół $z_\alpha$ małą kulę. Jej przeciwobrazy są rozłącznymi dyskami $D_j$, a poza nimi $F$ omija tę kulę. Parametryzując $D_j$ przez odwrotność lokalnego odwzorowania afinicznego, otrzymujemy dokładnie lokalny fragment odwzorowania charakterystycznego; ujemny znak odpowiada odbiciu pierwszej współrzędnej, czyli odwrotności w grupie. Po usunięciu środków każda komórka promieniowo zwija się na swój brzeg w $A$; zatem odwzorowanie na dopełnieniu małych dysków możemy przesunąć do $A$. Przedłużamy tę deformację na $D_j$ przez rozszerzanie ich obrazów od małej kuli do całej komórki, zostawiając zgodność na wspólnych brzegach. Połączmy małe dyski i punkt bazowy drzewem łuków w ich dopełnieniu. Rozcinając wzdłuż cienkich pasów tego drzewa, przedstawiamy dysk jako sumę dysków z doprowadzeniem do bazy; pozostałe części mają obraz w $A$ i reprezentują zero względne. Takie rozcięcie realizuje kolejno kostkowe dodawanie z Definicji 9.2.1: wewnętrzny pas ma obraz w $A$ i można go przesuwać podczas homotopii względnej. Zmiana drogi doprowadzającej modyfikuje składnik przez pętlę w $A$. Ponieważ $\pi_1(A) = 0$, te zmiany nie wpływają na klasę. Ostatecznie $[F]$ jest sumą klas charakterystycznych dysków $e^n_\alpha$, z ich znakami. Każda suma jest skończona. To dowodzi surjektywności odwzorowania od wolnej grupy na nowych komórkach do $\pi_n(W, A)$. Obrazy tych generatorów przez $h^{\mathrm{rel}}_n$ tworzą bazę $H_n(W, A)$. Gdyby ich kombinacja dawała zerową klasę względnej homotopii, jej obraz homologiczny również byłby zerowy; niezależność bazy wymusza wszystkie współczynniki równe 0. Mamy więc izomorfizm.

Niech teraz dołączamy dyski $D^{n+1}_\beta$, otrzymując $W'$. Każde odwzorowanie $D^n \to W'$ względnie $A$ przesuwamy do $W$ przez lokalne usuwanie punktów w komórkach wymiaru $n+1$. Włączenie indukuje więc surjekcję na $\pi_n$. Relację od $\varphi_\beta : S^n \to W$ rozumiemy jako jej obraz przez $\pi_n(W) \to \pi_n(W, A)$. Ich odwzorowania charakterystyczne dają oczywiste relacje: brzeg każdego takiego dysku staje się zerem w $\pi_n(W', A)$. Dlaczego nie pojawiają się inne relacje? Homotopię względną między dwoma sumami $n$-dysków przedstawiamy na $D^n \times I$. Uwaga 9.3.4, zastosowana do cylindra triangulowanego jako $(n+1)$-dysk i nieruchomo na całym jego brzegu, zapewnia, że przeciwobrazy wybranych punktów $(n+1)$-komórek są skończonym zbiorem we wnętrzu $(n+1)$-wymiarowego cylindra. Usuwamy małe otoczenia tych punktów. Pozostała część odwzorowania omija środki i promieniowo przesuwa się do $W$. Na brzegu każdego usuniętego otoczenia otrzymujemy, ze znakiem, odwzorowanie dołączające odpowiedniej komórki. Łączymy te otoczenia z brzegiem cylindra drzewem łuków. Po rozcięciu wzdłuż drzewa zorientowany brzeg pozostałego obszaru daje różnicę końcowych $n$-dysków oraz sumę nowych sfer brzegowych. Jego wypełnienie leży w $W$, a pozostałe ściany w $A$, więc w $\pi_n(W, A)$ otrzymujemy równość różnicy klas z sumą obrazów $[\varphi_\beta]$, ze znakami lokalnych homeomorfizmów. Drogi doprowadzające leżą teraz w $W$; nie zmieniają klas, ponieważ $W$ jest jednospójna. To wyjaśnia, dlaczego dostajemy zwykłe całkowite kombinacje, bez dodatkowych sprzężeń. Każda relacja w $\pi_n(W', A)$ jest więc kombinacją brzegów dołączonych komórek. W homologii to samo stwierdza wzór na brzeg komórkowy (8.7.1): stopnie odwzorowań dołączających są dokładnie współczynnikami tych relacji.

Wreszcie dla $k \geq n+2$ homotopię dysku $D^n$ można przybliżyć komórkowo, zachowując brzeg w $A$: jej obraz nie musi wchodzić do nowych $k$-komórek. To samo dotyczy $(n+1)$-wymiarowej homotopii, bo $n+1 < k$. Zatem grupy $\pi_n$ nie zmieniają się. Również względny kompleks komórkowy nie zmienia swoich grup i brzegów w stopniach $n$ i $n+1$. □

**Wniosek 9.6.3** (Zabijanie wybranych klas)**.** *Niech $Y$ będzie jednospójnym CW i $k \geq 2$. Dołączenie $(k+1)$-komórek wzdłuż klas $a_\beta \in \pi_k(Y)$ zmienia $\pi_k(Y)$ na iloraz przez podgrupę generowaną*

*przez $a_\beta$, a nie zmienia $\pi_i$ dla $i < k$.*

*Dowód.* Oznaczmy nową przestrzeń przez $V$. Poprzedni lemat z bazą $A = Y$ i pierwszym nowym wymiarem $k+1$ mówi, że $\pi_{k+1}(V, Y)$ jest wolna na dołączonych komórkach. Odwzorowanie brzegowe do $\pi_k(Y)$ posyła ich generatory na $a_\beta$. Niższe grupy względne znikają przez lokalny krok przybliżenia komórkowego, ponieważ dyski tych wymiarów można przesunąć do $Y$. Długi ciąg pary daje dokładnie podany iloraz i izomorfizmy w niższych stopniach. □

*Uwaga* 9.6.4 (O przybliżeniu w lemacie). Warunek $\pi_1(A) = 0$ ma konkretną rolę: pozwala jednoznacznie przenosić lokalne dyski do bazy. Gdy $A$ nie jest jednospójna, powstają przesunięte przez pętle kopie generatorów. Wersja względnego twierdzenia Hurewicza bez tego warunku wymaga ilorazu przez działanie $\pi_1(A)$; nie utożsamiamy wtedy bezpośrednio całej $\pi_n(X, A)$ z $H_n(X, A)$.

**Lemat 9.6.5** (Model bez niższych komórek)**.** *Jeśli kompleks CW $X$ jest $(n-1)$-spójny, $n \geq 2$, to jest homotopijnie równoważny kompleksowi $Z$ z jedną 0-komórką i bez komórek wymiarów $1, \ldots, n-1$. Odwzorowanie $Z \to X$ można dobrać tak, by przenosiło wyróżniony punkt na $x_0$.*

*Dowód.* Zaczynamy od jednej 0-komórki $Z^0 = \{*\}$ wysłanej do $x_0$. Ponieważ $\pi_i(X) = 0$ dla $i < n$, odwzorowanie to jest już izomorfizmem na tych grupach. Dołączamy do punktu po jednej $n$-komórce dla wybranego zbioru generatorów $\pi_n(X)$. Każda taka komórka z brzegiem sklejonym do punktu jest $S^n$; odwzorowanie do $X$ definiujemy na niej reprezentantem wybranej klasy. Uzyskujemy surjekcję na $\pi_n(X)$.

Teraz dla każdego generatora jądra $\pi_n(Z^n) \to \pi_n(X)$ dołączamy $(n+1)$-komórkę wzdłuż reprezentującego go odwzorowania $S^n \to Z^n$. Jej obraz w $X$ jest zerowy w $\pi_n(X)$, więc wybieramy wypełnienie $D^{n+1} \to X$ i przedłużamy odwzorowanie $Z \to X$. Wniosek 9.6.3, zastosowany do $Y = Z^n$, mówi, że dokładnie te relacje zabijają wybrane jądro; w stopniu $n$ odwzorowanie staje się izomorfizmem. Dołączone komórki nie zmieniają niższych grup dzięki Wnioskowi 9.3.5.

Powtarzamy procedurę w stopniu $k = n+1, n+2, \ldots$: komórki $k$-wymiarowe dołączone do punktu realizują brakujące elementy $\pi_k(X)$, a komórki $(k+1)$-wymiarowe dołączone wzdłuż klas z jądra zabijają dokładnie te klasy. Dołączenie sfer $S^k$ do punktu daje surjekcję na brakujące klasy i nie narusza już ustalonych niższych grup: nowy bukiet ma retrakcję na poprzedni etap, a względne dyski wymiaru $< k$ można przesunąć do niego. Do zabijania jądra w każdym stopniu stosujemy Wniosek 9.6.3 z bazą równą *całemu bieżącemu etapowi*. Nie wolno tu ponownie traktować punktu jako jedynej bazy pierwszych komórek, bo wcześniej dołączono już komórki niższych wymiarów. Odwzorowania dołączające przybliżamy komórkowo, dzięki czemu otrzymujemy strukturę CW; homotopia takiego odwzorowania nie zmienia jej klasy ani możliwości wypełnienia w $X$. Wszystkie odwzorowania do $X$ przedłużają się, bo obrazy odwzorowań dołączających z jądra są zerowe w $\pi_k(X)$. Komórki późniejszego wymiaru nie naruszają ustalonych już izomorfizmów w niższych stopniach. Po wykonaniu wszystkich etapów otrzymujemy CW $Z$. Odwzorowania sfer i homotopie mają zwarte dziedziny, więc z Lematu 9.3.1 każda klasa i każda relacja pojawiają się już w skończonym etapie. Stabilizacja grup oznacza zatem, że odwzorowanie $Z \to X$ indukuje izomorfizmy na wszystkich $\pi_k$ oraz na $\pi_0$. Twierdzenie 9.5.3 zamienia tę słabą równoważność CW w równoważność homotopijną. □

**Twierdzenie 9.6.6** (Hurewicz: pierwszy niezerowy wymiar)**.** *Jeżeli $X$ jest $(n-1)$-spójnym kompleksem CW, $n \geq 2$, to*

$$\widetilde{H}_i(X; \mathbb{Z}) = 0 \quad \text{dla } i < n, \qquad h_n : \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X; \mathbb{Z}).$$

*Izomorfizm jest naturalny: dla odwzorowania opartego $f : X \to Y$ odpowiedni kwadrat z $f_*$ na homotopii i homologii jest przemienny.*

*Dowód.* Lemat 9.6.5 pozwala zastąpić $X$ homotopijnie równoważnym $Z$ z $Z^{n-1} = \{*\}$. Homologia i homotopia nie zmieniają się przy tej operacji (Twierdzenia 8.2.5 i 9.5.3). W kompleksie komórkowym $Z$ nie ma grup łańcuchów w stopniach $1, \dots, n-1$, więc $\widetilde{H}_i(Z) = 0$ dla $i < n$.

Niech $E_n = \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e^n_\alpha]$. Z Lematu 9.6.2 dla $A = \{*\}$ mamy $\pi_n(Z^n) \cong E_n$. Włączenie $Z^n \hookrightarrow Z$ jest surjekcją na $\pi_n$, a jądrem są relacje narzucone przez $(n+1)$-komórki. Po lewej otrzymujemy zatem

$$\pi_n(Z) \cong E_n / \langle [\varphi_\beta] : \varphi_\beta : S^n \to Z^n \text{ dołącza } e^{n+1}_\beta \rangle.$$

Po prawej $\partial^{\mathrm{CW}}_n = 0$, bo $C^{\mathrm{CW}}_{n-1} = 0$, więc

$$H_n(Z) \cong E_n / \operatorname{im} \partial^{\mathrm{CW}}_{n+1}.$$

Obraz $[\varphi_\beta]$ przez $h_n$ jest klasą brzegową $(n+1)$-komórki: jej współczynniki w bazie $E_n$ to te same stopnie odwzorowań dołączających z Twierdzenia 8.7.2. Oba ilorazy są więc ilorazami *tej samej* wolnej grupy przez *ten sam* podmoduł. Ponieważ $h_n$ na generatorach $[e^n_\alpha]$ przypisuje im klasy komórkowe $[e^n_\alpha]$, jest izomorfizmem.

Na koniec $h_n(f_*[u]) = (f \circ u)_*[S^n] = f_*(u_*[S^n])$, co dowodzi naturalności. □

**Twierdzenie 9.6.7** (Hurewicz względny dla par jednospójnych)**.** *Niech $(X, A)$ będzie parą CW, $A \neq \varnothing$ i $A$ jednospójna. Jeśli para jest $(n-1)$-spójna, $n \geq 2$, to*

$$H_i(X, A; \mathbb{Z}) = 0 \quad (i < n), \qquad h^{\mathrm{rel}}_n : \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathbb{Z}).$$

*Dowód.* Zbudujemy najpierw model pary bez nowych komórek poniżej wymiaru $n$. Długi ciąg (9.2.1) oraz $\pi_i(X, A) = 0$ dają izomorfizmy $\pi_i(A) \to \pi_i(X)$ dla $i < n-1$ i surjekcję dla $i = n-1$. Zaczynamy od identyczności $A \to A$ oraz włączenia $A \to X$. Dołączamy $n$-komórki wzdłuż reprezentantów jądra $\pi_{n-1}(A) \to \pi_{n-1}(X)$. Każdy taki reprezentant wypełnia się w $X$, więc odwzorowanie do $X$ przedłuża się na nową komórkę. W długim ciągu pary nowych komórek odwzorowanie brzegowe $\pi_n(Z^n, A) \to \pi_{n-1}(A)$ posyła każdą charakterystyczną $n$-komórkę na klasę jej odwzorowania dołączającego. Lemat 9.6.2, zastosowany do jednospójnego $A$, pokazuje, że te dołączenia zabijają dokładnie podgrupę przez nie generowaną, czyli wybrane jądro. W stopniach niższych niczego nie zmieniają. Gdy $n = 2$, wyjściowe $\pi_1(A)$ jest już zerowe i ten krok nie wymaga komórek.

Teraz dla $k = n, n+1, \dots$ postępujemy jak w dowodzie Lematu 9.6.5: dołączamy $k$-komórki z brzegiem wysłanym do $x_0$, aby otrzymać surjekcję na $\pi_k(X)$, a potem $(k+1)$-komórki wzdłuż generatorów jądra, aby otrzymać izomorfizm. Nigdy nie dołączamy komórek wymiaru mniejszego od $n$. W każdym kroku wniosek o zabijaniu klas stosujemy z bieżącym, jednospójnym etapem jako bazą. Przybliżamy komórkowo odwzorowania dołączające. Powstaje odwzorowanie par $F : (Z, A) \to (X, A)$ równe identyczności na $A$, które indukuje izomorfizmy wszystkich grup homotopii przestrzeni oraz składowych. Twierdzenie 9.5.3 zapewnia równoważność homotopijną $Z \simeq X$. Porównując długie ciągi homotopii i homologii obu par, widzimy ponadto, że $F$ indukuje izomorfizmy grup *względnych*: odwzorowania na wyrazach dotyczących $A$ są identycznością, a na wyrazach dotyczących $Z, X$ izomorfizmami. Dla stopni co najmniej 3 stosujemy lemat pięciu do grup abelowych. W stopniu 2 względne grupy są ilorazami $\pi_2(Z)$ i $\pi_2(X)$ przez obrazy $\pi_2(A)$, ponieważ $\pi_1(A) = 0$; to daje izomorfizm bez stosowania lematu pięciu do zbiorów. Stopień 1 jest trywialny po obu stronach, bo wszystkie trzy przestrzenie są jednospójne. Dla homologii stosujemy zwykły lemat pięciu.

W modelu $(Z, A)$ nie ma względnych łańcuchów komórkowych w wymiarach $< n$, więc $H_i(Z, A) = 0$ dla $i < n$. Lemat 9.6.2 oblicza zarówno $\pi_n(Z, A)$, jak i $H_n(Z, A)$ jako tę samą wolną grupę na $n$-komórkach modulo te same relacje od $(n+1)$-komórek. Na generatorach odwzorowanie $h^{\mathrm{rel}}_n$ przypisuje dyskowi jego klasę orientacji, więc jest izomorfizmem. Naturalność $h^{\mathrm{rel}}_n$ przenosi ten wynik przez $F$ na parę $(X, A)$. □

**Przykład 9.6.8** (Dysk względem brzegu)**.** Dla pary $(D^{n+1}, S^n)$ długi ciąg homotopii i ściągalność dysku dają w szczególności

$$\partial : \pi_{n+1}(D^{n+1}, S^n) \xrightarrow{\cong} \pi_n(S^n) \qquad (n \geq 1).$$

Generator po lewej jest reprezentowany przez dysk tożsamościowy, a jego brzegiem jest tożsamość sfery. W homologii dzieje się to samo na mocy Twierdzenia 8.4.5; oba ciągi łączy odwzorowanie Hurewicza.

**Wniosek 9.6.9** (Homologiczne kryterium Whiteheada)**.** *Niech $f : X \to Y$ będzie odwzorowaniem między jednospójnymi kompleksami CW. Jeśli $f_* : H_i(X;\mathbb{Z}) \to H_i(Y;\mathbb{Z})$ jest izomorfizmem dla wszystkich $i$, to $f$ jest równoważnością homotopijną.*

*Dowód.* Zastępujemy $f$ odwzorowaniem komórkowym homotopijnym z nim i tworzymy cylinder $M_f$ z dowodu Twierdzenia 9.5.3. Włączenie $i : X \hookrightarrow M_f$ ma te same odwzorowania na homologii co $f$ po złożeniu z retrakcyjną deformacją $M_f \to Y$. Zatem w długim ciągu homologii pary $(M_f, X)$ wszystkie grupy $H_i(M_f, X)$ są zerowe. Ponieważ $X$ i $M_f \simeq Y$ są jednospójne, długi ciąg homotopii daje $\pi_1(M_f, X) = 0$.

Załóżmy, że pewna wyższa względna grupa homotopii nie znika, i weźmy najmniejsze $n \geq 2$ z $\pi_n(M_f, X) \neq 0$. Para jest wtedy $(n-1)$-spójna, a $X$ jednospójna. Twierdzenie 9.6.7 dałoby $H_n(M_f, X) \cong \pi_n(M_f, X) \neq 0$, sprzeczność. Wszystkie względne $\pi_n$ są więc zerowe, a długi ciąg homotopii pokazuje, że $i$, a zatem $f$, indukuje izomorfizmy wszystkich $\pi_n$. Twierdzenie 9.5.3 kończy dowód. □

## 9.7 Obliczenia i ograniczenia twierdzeń

**Przykład 9.7.1** (Pierwsza grupa homotopii sfery)**.** Z Wniosku 9.3.5 wiemy, że $S^n$ jest $(n-1)$-spójna. Twierdzenia 9.6.6 i 8.4.5 dają dla $n \geq 2$

$$\pi_i(S^n) = 0 \quad (1 \leq i < n), \qquad \pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}.$$

Tożsamość $S^n \to S^n$ odpowiada generatorowi, a odwzorowanie $g : S^n \to S^n$ odpowiada liczbie $\deg g$ z Definicji 8.7.1. Zatem oparte $g$ jest homotopijne do tożsamości lub do ustalonego odbicia sfery zachowującego punkt bazowy odpowiednio wtedy, gdy stopień wynosi $+1$ lub $-1$. Odbicie ma stopień $-1$, bo odwraca orientację dysku i jego brzegu. Dla nieopartego $g$ najpierw przesuwamy obraz wyróżnionego punktu do bazy i przedłużamy tę homotopię na sferę przez własność HEP. Jednospójność sfery sprawia, że wybór drogi nie wpływa na wynik. W szczególności odwzorowanie sfery stopnia $\pm 1$ jest równoważnością homotopijną: wywołuje izomorfizm na $H_n$ i $H_0$, a inne grupy homologii sfery są zerowe, więc można użyć Wniosku 9.6.9.

**Przykład 9.7.2** (Kompleks Moore'a)**.** Niech $n \geq 2$ i $m \geq 2$. Do $S^n$ dołączmy jedną $(n+1)$-komórkę odwzorowaniem stopnia $m$. Powstała przestrzeń $M(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, n)$ ma kompleks komórkowy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

w dodatnich stopniach $n+1$ i $n$; ponadto $C_0 = \mathbb{Z}$, a pozostałe grupy łańcuchów są zerowe. Zatem $H_n(M) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $H_{n+1}(M) = 0$. Ponieważ przestrzeń jest $(n-1)$-spójna, Hurewicz daje $\pi_n(M) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Intuicja jest dosłowna: dołączony dysk czyni $m$-krotne owinięcie sfery zerem w pierwszej niezerowej grupie.

**Przykład 9.7.3** (Dlaczego potrzeba jednospójności)**.** Nakrycie antypodalne $p : S^2 \to \mathbb{RP}^2$ indukuje izomorfizm $\pi_2(S^2) \cong \pi_2(\mathbb{RP}^2)$ na mocy Stwierdzenia 9.3.6. Zatem $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$. Tymczasem $H_2(\mathbb{RP}^2) = 0$ z Przykładu 8.7.5, więc tutaj $h_2 : \mathbb{Z} \to 0$ nie jest izomorfizmem. Przestrzeń rzutowa nie jest jednospójna: $\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. To konkretna granica Twierdzenia 9.6.6.


**Przykład 9.7.4** (Bukiet $S^1 \vee S^2$)**.** Przestrzeń $X = S^1 \vee S^2$ ma $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$. Jej nakrycie uniwersalne składa się z prostej z kopią $S^2$ w każdym punkcie całkowitym. Pokrycie otrzymujemy przez przesunięcia prostej o liczby całkowite, przenoszące jednocześnie $S^2_k$ na $S^2_{k+1}$. Jego przestrzeń jest jednospójna: każda pętla ma obraz w skończonym odcinku z dołączonymi skończenie wieloma sferami, a taka przestrzeń jest jednospójna z van Kampena. Można obliczyć homologię bez zwijania całej prostej: mamy wierzchołki w punktach całkowitych, krawędzie między nimi i po jednej 2-komórce każdej sfery, dołączonej stale do jej wierzchołka. Z homologii komórkowej

$$H_2(\widetilde{X}) \cong \bigoplus_{k\in\mathbb{Z}} \mathbb{Z}.$$

Nakrycie nie zmienia $\pi_2$, a $\widetilde{X}$ jest jednospójna, więc Hurewicz daje

$$\pi_2(X) \cong \pi_2(\widetilde{X}) \cong \bigoplus_{k\in\mathbb{Z}} \mathbb{Z}, \qquad H_2(X) \cong \mathbb{Z}.$$

Każda podniesiona sfera $S^2_k$ rzutuje się na tę samą sferę wewnątrz $X$. W tych bazach odwzorowanie Hurewicza sumuje współczynniki: $(a_k)_{k\in\mathbb{Z}} \mapsto \sum_k a_k$. Homologia traci informację, którą z podniesionych sfer reprezentuje dana klasa.




Rysunek 9.4: Fragment nakrycia uniwersalnego $S^1 \vee S^2$: kopia sfery w każdym punkcie całkowitym nad pętlą okręgu. Każda sfera daje inny generator $\pi_2(X)$, ale wszystkie mają ten sam obraz w $H_2(X)$.

*Uwaga* 9.7.5 (Który Whitehead?). Twierdzenie 9.5.3 dotyczy słabych równoważności homotopijnych CW. *Torsja Whiteheada* jest innym, późniejszym niezmiennikiem używanym przy prostej homotopii i ogólniejszych twierdzeniach o kobordyzmach; sama nazwa nie czyni jej częścią tego twierdzenia.

## Dalsza droga

Następny naturalny blok to formy różniczkowe, orientacja, całkowanie, twierdzenie Stokesa i kohomologia de Rhama. Po nich rozwiniemy geometrię riemannowską: tensor metryczny, koneksję, symbole Christoffela, transport równoległy, geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze, twierdzenie Hopfa–Rinowa, krzywiznę i tensory krzywizny, pola Jacobiego, twierdzenia porównawcze oraz twierdzenie Gaussa–Bonneta. *Dopiero po tym bloku* przejdziemy do teorii Morse'a, uchwytów, twierdzenia Smale'a i chirurgii. Nie wprowadzamy tych późniejszych teorii w obecnym rozdziale.

*Dalsza lektura:* Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 4, §§4.1–4.2, `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATch4.pdf`, zawiera pełne rozwinięcie grup względnych, przybliżenia komórkowego, twierdzeń Whiteheada i Hurewicza.

# Rozdział 10

# Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rhama

W Rozdziale 3 zbudowaliśmy algebrę zewnętrzną jednej przestrzeni wektorowej. Teraz wykonamy tę konstrukcję w każdym punkcie rozmaitości i pozwolimy, by jej współczynniki zmieniały się gładko. Otrzymamy formy różniczkowe. Różniczkowanie form, ich całkowanie i twierdzenie Stokesa połączą rachunek różniczkowy z homologią przestrzeni z Rozdziału 8. Na końcu porównamy obie teorie kohomologii. Nadal nie potrzebujemy metryki, koneksji ani krzywizny; tym pojęciom poświęcimy późniejszy blok.

## 10.1 Czym jest forma różniczkowa?

**Definicja 10.1.1** (Formy i ich wartości)**.** Niech $M$ będzie gładką rozmaitością wymiaru $n$. *Formą różniczkową stopnia $k$* na $M$ nazywamy gładkie pole naprzemiennych form $k$-liniowych:

$$\omega_p \in \Lambda^k T_p^* M, \qquad \omega \in \Omega^k(M) := \Gamma(\Lambda^k T^* M).$$

Przy $k = 0$ jest to funkcja gładka, $\Omega^0(M) = C^\infty(M)$; dla $k > n$ otrzymujemy $\Omega^k(M) = 0$. Przyjmujemy też $\Omega^k(M) = 0$ dla $k < 0$. Na rozmaitości z brzegiem gładkość oznacza lokalne przedłużenie współczynników do otwartego otoczenia w $\mathbb{R}^n$.

Forma 1-stopnia mierzy wektor styczny i zwraca liczbę. Forma 2-stopnia mierzy *zorientowane pole* zadane parą wektorów; zamiana wektorów zmienia znak. Jeśli $(U, x)$ jest mapą $x = (x^1, \dots, x^n)$, to


$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} \, \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}, \qquad a_I \in C^\infty(U). \tag{10.1.1}$$

Tutaj $\mathrm{d}x^i|_p(v) = v(x^i)$ jest kowektorem z Rozdziału 1. Jedyność współczynników wynika z bazy algebry zewnętrznej (Twierdzenie 3.6.1). Zmiana mapy zmienia współczynniki, lecz nie samą formę.

**Przykład 10.1.2** (Dwie formy na płaszczyźnie)**.** Na $\mathbb{R}^2$ forma $\alpha = x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$ przypisuje wektorowi $(u, v)$ liczbę $xv - yu$. Forma $\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ spełnia

$$\omega((u_1, v_1), (u_2, v_2)) = u_1 v_2 - v_1 u_2.$$

Jest to wyznacznik: wartość bezwzględna daje pole równoległoboku, znak zaś jego orientację.




$(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)(u,v) = \det(u,v) > 0$.
Po zamianie $u$ i $v$ ten sam obszar dostaje przeciwny znak.

Rysunek 10.1: Forma $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ daje pole ze znakiem w standardowych współrzędnych płaszczyzny. Ogólna 2-forma przypisuje liczbę parze wektorów bez wyboru metryki; nie musi być euklidesowym polem ich równoległoboku.

## 10.2 Iloczyn zewnętrzny, cofnięcie i różniczka

**Stwierdzenie 10.2.1** (Działania punkt po punkcie)**.** *Dla $\alpha \in \Omega^k(M)$ i $\beta \in \Omega^\ell(M)$ iloczyn $\alpha \wedge \beta \in \Omega^{k+\ell}(M)$ otrzymujemy, biorąc iloczyn zewnętrzny w każdym $T_p^*M$. Zachodzi $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell}\beta \wedge \alpha$. Jeżeli $F : M \to N$ jest gładkie, to* cofnięcie $F^* : \Omega^k(N) \to \Omega^k(M)$ *ma wzór*

$$(F^*\omega)_p(v_1,\dots,v_k) = \omega_{F(p)}(\mathrm{d}F_p v_1,\dots,\mathrm{d}F_p v_k). \tag{10.2.1}$$

*Spełnia $(G\circ F)^* = F^*G^*$ i $F^*(\alpha\wedge\beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$.*

*Dowód.* Gładkość iloczynu w mapie wynika z faktu, że jego współczynniki są sumami iloczynów gładkich $a_I, b_J$; przemienność z odpowiednim znakiem jest własnością algebry zewnętrznej z Rozdziału 3. Wzór (10.2.1) jest wieloliniowy i naprzemienny, a w mapach używa pochodnych współrzędnych $F$, więc wyznacza formę gładką. Reguła łańcucha $\mathrm{d}(G\circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p$ daje własność złożenia. Iloczyn zewnętrzny definiuje się sumą wartości na przestawionych argumentach; podstawienie do niej tych samych $\mathrm{d}F_p v_i$ dowodzi ostatniej równości. □

W szczególności $F^*(\mathrm{d}y^j) = \mathrm{d}(y^j \circ F)$. Jeżeli $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $F(u,v) = (u^2, v+u)$, to $F^*(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = \mathrm{d}(u^2) \wedge \mathrm{d}(v+u) = 2u\,\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$. Współczynnik $2u$ jest wyznacznikiem macierzy Jacobiego i rejestruje także odwrócenie orientacji przy $u < 0$.

**Twierdzenie 10.2.2** (Różniczka zewnętrzna)**.** *Istnieje dokładnie jedna rodzina $\mathbb{R}$-liniowych operatorów $\mathrm{d} : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$ o następujących własnościach:*

1. *dla funkcji $f$ forma $\mathrm{d}f$ jest jej różniczką;*
2. *$\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta) = \mathrm{d}\alpha\wedge\beta + (-1)^k\alpha\wedge\mathrm{d}\beta$, gdy $\deg\alpha = k$;*
3. *$\mathrm{d}^2 = 0$.*

*W mapie jej wzór jest szczególnie prosty:*

$$\mathrm{d}\left(\sum_I a_I\,\mathrm{d}x^I\right) = \sum_I\sum_j \frac{\partial a_I}{\partial x^j}\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^I, \qquad \mathrm{d}x^I = \mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}. \tag{10.2.2}$$

*Dla każdego gładkiego $F : M \to N$ zachodzi $F^*\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}(F^*\omega)$.*

*Dowód.* Najpierw sprawdźmy lokalność dowolnego operatora spełniającego podane warunki. Jeśli $\omega$ znika w otoczeniu $p$, wybierzmy gładką funkcję $\chi$, równą 1 blisko $p$, z nośnikiem w tym otoczeniu. Taką pojedynczą funkcję buduje się w mapie z $e^{-1/t}$, jak w dowodzie Twierdzenia 10.4.1; nie wymaga to różniczki form. Ponieważ $\chi\omega = 0$, reguła Leibniza daje w $p$ $0 = \mathrm{d}(\chi\omega)_p = (\mathrm{d}\omega)_p$. Operator zależy więc tylko od formy w otoczeniu punktu. Lokalne funkcje i formy możemy

pomnożyć przez taką funkcję odcinającą i przedłużyć przez zero; wynik różniczkowania blisko $p$ nie zależy od przedłużenia.

Każda forma lokalnie jest sumą wyrazów $a_I \mathrm{d}x^I$. Możemy już stosować warunki do lokalnych współrzędnych. Ponieważ $\mathrm{d}(\mathrm{d}x^i) = \mathrm{d}^2 x^i = 0$, reguła Leibniza *wymusza* wzór (10.2.2); mamy więc jednoznaczność. Zdefiniujmy operator tym wzorem. Po powtórnym użyciu otrzymujemy współczynniki $(\partial_{x^j}\partial_{x^h} a_I)\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^h \wedge \mathrm{d}x^I$. Wyrazy z $(j,h)$ i $(h,j)$ znoszą się, gdyż pochodne mieszane są równe, a iloczyn zewnętrzny zmienia znak. Stąd $\mathrm{d}^2 = 0$.

Dla dwóch wyrazów $a\mathrm{d}x^I$ i $b\mathrm{d}x^J$ zwykła reguła iloczynu $\mathrm{d}(ab) = a\mathrm{d}b + b\mathrm{d}a$ oraz przestawienie $\mathrm{d}b$ przez $k$ czynników $\mathrm{d}x^I$ dają dokładnie znak $(-1)^k$. Liniowość rozszerza to na sumy. Sprawdźmy zgodność na przecięciu map. Cofnięcie przez zmianę współrzędnych zachowuje $\mathrm{d}f$ dzięki regule łańcucha i zachowuje $\wedge$ z poprzedniego stwierdzenia. Zatem dwa lokalne wzory, obliczone po obu stronach zmiany współrzędnych, są równe na generatorach $f, \mathrm{d}x^i$, a przez regułę Leibniza na wszystkich formach. Wzory sklejają się w globalny operator. Ten sam argument dla dowolnego $F$ daje $F^*\mathrm{d} = \mathrm{d}F^*$. □

**Przykład 10.2.3** (Rachunek na $\mathbb{R}^3$)**.** Jeżeli $\alpha = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$, to

$$\mathrm{d}\alpha = (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + (R_x - P_z)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z + (R_y - Q_z)\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

Dla $\beta = P\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ otrzymujemy $\mathrm{d}\beta = (P_x + Q_y + R_z)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Są to wyrażenia występujące w klasycznych wzorach na rotację i dywergencję. Utożsamianie tu pól wektorowych z formami korzysta ze standardowej struktury euklidesowej $\mathbb{R}^3$; sama różniczka zewnętrzna na $M$ nie wymaga metryki.

**Definicja 10.2.4** (Kontrakcja i pochodna Liego)**.** Dla pola wektorowego $X$ operator $\iota_X : \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$ określamy przez

$$(\iota_X \omega)_p(v_1, \ldots, v_{k-1}) = \omega_p(X_p, v_1, \ldots, v_{k-1}), \qquad \iota_X f = 0.$$

Jeśli $M$ ma brzeg, w definicji przez dwustronny przepływ zakładamy, że $X$ jest styczne do $\partial M$. Jeśli $\Phi_t$ jest lokalnym przepływem $X$ z Rozdziału 2, kładziemy $\mathcal{L}_X \omega = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} \Phi_t^* \omega$.

**Twierdzenie 10.2.5** (Wzór Cartana)**.** *Dla każdej formy $\omega$ mamy*

$$\boxed{\mathcal{L}_X \omega = \mathrm{d}(\iota_X \omega) + \iota_X(\mathrm{d}\omega)}. \tag{10.2.3}$$

*Ponadto $\mathcal{L}_X \mathrm{d} = \mathrm{d}\mathcal{L}_X$ oraz $\iota_X(\alpha \wedge \beta) = (\iota_X \alpha) \wedge \beta + (-1)^{\deg \alpha} \alpha \wedge \iota_X \beta$.*

Dla pola niestycznego do brzegu prawa strona wzoru Cartana nadal określa gładką formę. Możemy nią zdefiniować $\mathcal{L}_X \omega$ na brzegu: jest to przedłużenie pochodnej Liego z wnętrza, niezależne od przedłużeń w mapach. Nie zakładamy wówczas istnienia dwustronnego przepływu w $M$.

*Dowód.* Ostatnia równość wynika wprost z definicji iloczynu zewnętrznego: po wstawieniu $X$ w pierwsze miejsce może on wejść do pierwszej grupy argumentów lub, po przejściu przez $\deg \alpha$ argumentów, do drugiej. Ponieważ $\Phi_t^*$ zachowuje iloczyn zewnętrzny, $\mathcal{L}_X$ jest derywacją stopnia 0 algebry form. Prawa strona (10.2.3) również nią jest: rozwijamy oba składniki na $\alpha \wedge \beta$ regułami dla $\mathrm{d}$ i $\iota_X$; wyrazy mieszane mają przeciwne znaki i znoszą się.

Wystarczy zatem porównać obie strony na lokalnych generatorach $f, \mathrm{d}x^i$. Dla funkcji lewa strona to $Xf$, a prawa to $\iota_X \mathrm{d}f = \mathrm{d}f(X) = Xf$. Dla $\mathrm{d}x^i$ lewa strona wynosi $\mathrm{d}(\mathcal{L}_X x^i) = \mathrm{d}(Xx^i)$, gdyż cofnięcie komutuje z $\mathrm{d}$; prawa wynosi $\mathrm{d}(\iota_X \mathrm{d}x^i) + \iota_X \mathrm{d}^2 x^i = \mathrm{d}(Xx^i)$. Wzór obowiązuje więc dla każdej sumy wyrazów $f\,\mathrm{d}x^I$ i globalnie. Wreszcie, z $\mathrm{d}^2 = 0$ dostajemy $\mathrm{d}\mathcal{L}_X = \mathrm{d}\iota_X \mathrm{d} = \mathcal{L}_X \mathrm{d}$. □

**Przykład 10.2.6** (Pochodna Liego formy)**.** Na $\mathbb{R}^2$ weźmy $X = \partial_x$ i $\omega = x\,\mathrm{d}y$. Przepływ przesuwa punkty poziomo, więc $\Phi_t^* \omega = (x+t)\mathrm{d}y$ oraz $\mathcal{L}_X \omega = \mathrm{d}y$. Ze wzoru Cartana: $\iota_X \omega = 0$, $\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ i $\iota_X \mathrm{d}\omega = \mathrm{d}y$. Oba obliczenia są zgodne.

## 10.3 Lokalne istnienie funkcji pierwotnej

Równość $\mathrm{d}^2 = 0$ mówi, że każda forma postaci $\mathrm{d}\eta$ jest *zamknięta*. Odwrotność nie zachodzi globalnie: przeszkodę może stanowić topologia. Lokalnie przeszkoda znika, co wyjaśnia następujący rachunek. Dla zamkniętej 1-formy $\omega$ szukamy *funkcji pierwotnej* $f$ spełniającej $\omega = \mathrm{d}f$. Dla formy stopnia $k > 1$ jej odpowiednikiem jest *forma pierwotna* $\eta$ stopnia $k-1$ z $\omega = \mathrm{d}\eta$. Lemat Poincarégo obejmuje oba przypadki.

**Lemat 10.3.1** (Homotopia form)**.** *Niech $H : [0,1] \times M \to N$ będzie gładką homotopią odwzorowań $H_0, H_1$. Przy końcach przedziału, a także przy narożach iloczynu, gdy $M$ ma brzeg, gładkość rozumiemy jako gładkie przedłużanie składowych w mapach. Istnieje operator liniowy $K : \Omega^k(N) \to \Omega^{k-1}(M)$ taki, że*

$$H_1^*\omega - H_0^*\omega = \mathrm{d}(K\omega) + K(\mathrm{d}\omega). \tag{10.3.1}$$

*Dowód.* Dla $k = 0$ przyjmujemy $K\omega = 0$; poniższy rachunek obejmuje ten przypadek z $a = 0$. Każdą formę na $[0,1] \times M$ zapisujemy jednoznacznie w postaci $H^*\omega = \mathrm{d}t \wedge a(t) + b(t)$, gdzie $a(t)$ jest rodziną form stopnia $k-1$ na $M$, a $b(t)$ rodziną form stopnia $k$. Położenie $K\omega := \int_0^1 a(t)\,\mathrm{d}t$ oznacza całkowanie *współczynników* formy po parametrze; można je wykonać w każdej mapie, a zgodność na przecięciach wynika z liniowości zmiany współrzędnych. Obliczenie różniczki daje

$$\mathrm{d}(H^*\omega) = \mathrm{d}t \wedge (\partial_t b - \mathrm{d}_M a) + \mathrm{d}_M b.$$

Ponieważ $H^*\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}H^*\omega$, współczynniki przy $\mathrm{d}t$ mówią, że $a_{\mathrm{d}\omega}(t) = \partial_t b(t) - \mathrm{d}_M a(t)$. Po scałkowaniu od 0 do 1 otrzymujemy $K\mathrm{d}\omega = b(1) - b(0) - \mathrm{d}_M K\omega$. Ale $b(i) = H_i^*\omega$ dla $i = 0, 1$, więc jest to dokładnie (10.3.1). □

**Twierdzenie 10.3.2** (Lemat Poincarégo)**.** *Niech $U \subset \mathbb{R}^n$ będzie otwarty i gwiaździsty względem 0. Jeżeli $k \geq 1$ i $\omega \in \Omega^k(U)$ spełnia $\mathrm{d}\omega = 0$, to istnieje $\eta \in \Omega^{k-1}(U)$ z $\omega = \mathrm{d}\eta$. Każda zamknięta forma stopnia 0 jest stała na $U$.*

*Dowód.* W Lemacie 10.3.1 bierzemy $H(t,x) = tx$. Dla $k \geq 1$ odwzorowanie $H_0$ jest stałe, więc $H_0^*\omega = 0$; dla zamkniętej $\omega$ drugi składnik po prawej stronie (10.3.1) także znika. Dostajemy $\omega = \mathrm{d}(K\omega)$. Jeśli chcemy *obliczyć* formę pierwotną (dla $k = 1$: funkcję pierwotną), to

$$(K\omega)_x(v_1, \ldots, v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1}\omega_{tx}(x, v_1, \ldots, v_{k-1})\,\mathrm{d}t. \tag{10.3.2}$$

Istotnie, $\mathrm{d}H(\partial_t) = x$, podczas gdy $\mathrm{d}H(v_i) = tv_i$, skąd $k-1$ czynników $t$. Gwiaździstość zapewnia, że cały odcinek $tx$ leży w $U$. Dla $k = 0$ warunek $\mathrm{d}f = 0$ mówi, że wszystkie pochodne kierunkowe znikają. Zatem pochodna $t \mapsto f(tx)$ jest zerowa i $f(x) = f(0)$. □

**Przykład 10.3.3** (Obliczenie funkcji pierwotnej)**.** Na $\mathbb{R}^2$ forma $\omega = 2xy\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y$ jest zamknięta, bo $\mathrm{d}\omega = (2x - 2x)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = 0$. Wzór (10.3.2) dla $k = 1$ daje

$$(K\omega)(x,y) = \int_0^1 \omega_{(tx,ty)}(x,y)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 3t^2x^2y\,\mathrm{d}t = x^2y.$$

Zatem $f(x,y) = x^2y$ jest funkcją pierwotną 1-formy $\omega$, ponieważ $\omega = \mathrm{d}f$. Obliczenie pokazuje mechanizm lematu.

**Wniosek 10.3.4** (Niezmienniczość przez homotopię)**.** *Odwzorowania gładko homotopijne indukują tę samą operację cofnięcia na kohomologii de Rhama z Definicji 10.8.1.*

*Dowód.* Jeśli $\mathrm{d}\omega = 0$, wzór (10.3.1) mówi, że $H_1^*\omega - H_0^*\omega = \mathrm{d}(K\omega)$. Różnica jest więc dokładna i obie klasy są równe. □

## 10.4 Podział jedności

Przy całkowaniu trzeba scalać dane z wielu map. Służy do tego wynik, który wyjaśnia także wcześniejsze użycia funkcji odcinających w skrypcie.

**Twierdzenie 10.4.1** (Gładki podział jedności)**.** *Niech $(U_\alpha)$ będzie otwartym pokryciem rozmaitości $M$ Hausdorffa i o przeliczalnej bazie. Istnieją nieujemne funkcje gładkie $(\rho_j)$ o lokalnie skończonej rodzinie nośników (każdy punkt ma otoczenie spotykające tylko skończenie wiele nośników) oraz indeksy $\alpha(j)$ takie, że*

$$\operatorname{supp}\rho_j \subset U_{\alpha(j)}, \qquad \sum_j \rho_j(p) = 1 \quad (p \in M).$$

*Każdą $\rho_j$ można wybrać o nośniku zwartym w jednej dziedzinie mapy zawartej w $U_{\alpha(j)}$.*

*Dowód.* Najpierw budujemy jedną funkcję odcinającą. Jeśli w mapie kula domknięta $\overline{B}_r$ leży w większej kuli $B_R$, przy czym $0 < r < R$ i $\overline{B}_R$ zawiera się w obrazie mapy, wybierzmy gładką funkcję $\chi$ zależną tylko od $\|x\|^2$, równą 1 na $\overline{B}_r$, dodatnią między $r$ i $R$, a zerową poza $B_R$. Można ją złożyć z funkcji $h(t) = e^{-1/t}$ dla $t > 0$ i $h(t) = 0$ dla $t \le 0$; jej gładkość w $t = 0$ wynika z zanikania wszystkich pochodnych $t^{-a}e^{-1/t}$. Przedłużenie $\chi$ przez 0 na resztę $M$ jest gładkie, bo nośnik ma zwartą domkniętą otoczkę wewnątrz mapy. Przy brzegu bierzemy przecięcia tych kul z półprzestrzenią i ograniczamy do nich te same funkcje. Wszystkie wnętrza i domknięcia poniżej rozumiemy w topologii $M$, także przy brzegu.

Z lokalnej zwartości i przeliczalności bazy konstruujemy wyczerpanie zwartymi zbiorami $K_1 \subset \operatorname{int} K_2 \subset \cdots$, $\bigcup_j K_j = M$ (weźmy kolejno skończone sumy domkniętych, stosunkowo zwartych kul obejmujące pierwsze elementy przeliczalnego pokrycia i powiększmy je przy każdym kroku). Ustalmy $K_j = \varnothing$ dla $j \le 0$. Zwarty pas $K_j \setminus \operatorname{int} K_{j-1}$ można pokryć skończenie wieloma małymi kulami w mapach o domknięciach zawartych jednocześnie w którymś $U_\alpha$ i w $\operatorname{int} K_{j+1} \setminus K_{j-2}$. Wybieramy funkcje odcinające dodatnie na mniejszych kulach pokrywających pas. Rodzina tych kul dla wszystkich $j$ jest lokalnie skończona: otoczenie punktu wewnątrz pewnego $K_N$ nie spotyka kul pochodzących z pasów o dostatecznie dużym indeksie.

Niech $\chi_j$ oznaczają wszystkie otrzymane funkcje. Suma $S = \sum_j \chi_j$ jest lokalnie skończona, gładka i wszędzie dodatnia, bo każdy punkt należy do któregoś pasa. Kładziemy $\rho_j = \chi_j/S$. Wtedy nośniki pozostają w wybranych kulach i $\sum_j \rho_j = S/S = 1$. Gdy potrzebujemy funkcji indeksowanych samymi zbiorami pokrycia, sumujemy $\rho_j$ o tym samym $\alpha(j)$. Nośnik takiej sumy nadal leży w $U_\alpha$: lokalnie skończona suma zamkniętych nośników jest zbiorem domkniętym zawartym w $U_\alpha$. □

## 10.5 Orientowalność i orientacje indukowane

**Definicja 10.5.1** (Orientacja)**.** Dwie uporządkowane bazy $m$-wymiarowej przestrzeni rzeczywistej $V$, dla $m \ge 1$, mają tę samą orientację, jeśli macierz przejścia ma dodatni wyznacznik. Powstają dwie klasy baz. Na rozmaitości $M^m$ *orientacja* to gładki wybór takiej klasy w każdym $T_pM$. Równoważnie jest to klasa nigdzie niezerowych form $m$-stopnia: formy $\mu, \nu$ wyznaczają tę samą orientację, jeśli $\nu = f\mu$ dla gładkiej funkcji $f > 0$. Rozmaitość dopuszczająca taki wybór jest *orientowalna*; wraz z wyborem orientacji jest *zorientowana*.

W wymiarze 0 stosujemy opis przez formy najwyższego stopnia: $\Lambda^0 V^* = \mathbb{R}$, a orientacja jest wyborem jednej z dwóch półprostych, czyli znaku $+1$ lub $-1$. Każdemu punktowi rozmaitości dyskretnej przypisujemy taki znak. Opis przez dwie klasy baz dotyczy tylko $m \ge 1$, gdyż przestrzeń zerowa ma tylko jedną bazę pustą.

Dla $m \geq 1$ forma $\mu_p$ określa bazę dodatnią $(v_1, \ldots, v_m)$ przez nierówność $\mu_p(v_1, \ldots, v_m) > 0$. To definicja *znaku*, a nie długości ani pola: zamiana $\mu$ na $2\mu$ nie zmienia orientacji. Na każdej spójnej orientowalnej rozmaitości istnieją dwa wybory globalne, wzajemnie przeciwne.

**Twierdzenie 10.5.2** (Trzy opisy orientowalności)**.** *Dla rozmaitości gładkiej $M^m$ równoważne są poniższe warunki. W mapach przy brzegu dopuszczamy obie półprzestrzenie $x^m \geq 0$ i $x^m \leq 0$; jest to ta sama struktura gładka, a pozwala stosować odbicie współrzędnej także w wymiarze* 1*.*

1. *orientowalność $M$;*
2. *istnienie atlasu, w którym wszystkie wyznaczniki odwzorowań przejścia są dodatnie;*
3. *istnienie globalnej nigdzie niezerowej formy $\mu \in \Omega^m(M)$.*

*Dowód.* Dla $m = 0$ wszystkie trzy warunki są spełnione: rozmaitość jest dyskretna, dowolny wybór znaków jest gładki, a funkcja 1 jest nigdzie niezerową 0-formą. Atlas zerowymiarowy sam nie zapisuje wyboru znaków. Załóżmy więc $m \geq 1$. Forma $\mu$ wybiera dodatnie bazy w każdym punkcie, więc (3) daje (1). Jeśli wybór (1) jest ustalony, zmniejszamy dziedziny map do spójnych otoczeń. Każdą mapę można w razie potrzeby złożyć z odbiciem jednej współrzędnej, aby jej standardowa baza była dodatnia. W nowym atlasie dwie bazy lokalne opisują tę samą orientację, zatem ich wyznacznik przejścia jest dodatni: (1) daje (2).

Załóżmy (2). W każdej mapie z tego atlasu lokalna forma $\mu_j = \mathrm{d}x_j^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_j^m$ jest dodatnia. Wybierzmy podział jedności $(\rho_j)$ z Twierdzenia 10.4.1, o nośnikach w dziedzinach tych map, i przedłużmy $\rho_j\mu_j$ przez zero. Suma $\mu = \sum_j \rho_j\mu_j$ jest lokalnie skończona. W dowolnym punkcie co najmniej jedno $\rho_j$ jest dodatnie; wszystkie występujące $\mu_j$ są dodatnimi wielokrotnościami jednej z nich, bo przejścia mają dodatni wyznacznik. Suma nie może się wyzerować. Tak dostajemy (3). □

**Stwierdzenie 10.5.3** (Dwa podstawowe sposoby przenoszenia orientacji)**.** *Jeżeli $F : M \to N$ jest dyfeomorfizmem i $N$ ma orientację $[\nu]$, to $F^*\nu$ orientuje $M$; $F$ zachowuje orientację wtedy, gdy zgadza się ona z uprzednio wybraną orientacją $M$. Jeśli $M^m, N^n$ są zorientowane, orientację $M \times N$ wyznacza $\mathrm{pr}_M^*\,\mu \wedge \mathrm{pr}_N^*\,\nu$. Po zamianie kolejności czynników znak zmienia się o $(-1)^{mn}$.*


*Dowód.* Różniczka dyfeomorfizmu jest izomorfizmem, więc cofnięcie nigdzie niezerowej formy najwyższego stopnia pozostaje nigdzie niezerowe. Na iloczynie wartości $\mu \wedge \nu$ na bazie najpierw $TM$, potem $TN$ są dodatnie. Przestawienie $m$ wektorów z pierwszego czynnika z $n$ wektorami drugiego wymaga $mn$ zamian; każda zmienia znak formy. □

Orientacja brzegu i orientacja regularnego zbioru poziomicowego są dwiema wersjami tej samej zasady: *najpierw kierunki normalne, potem styczne.*

**Definicja 10.5.4** (Orientacja brzegu: normalna na zewnątrz)**.** Niech $M^m$ będzie zorientowaną rozmaitością z brzegiem. Dla $m \geq 2$ baza $(v_1, \ldots, v_{m-1})$ przestrzeni $T_p\partial M$ jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy $(n, v_1, \ldots, v_{m-1})$ jest dodatnią bazą $T_pM$ dla dowolnego wektora $n$ skierowanego na zewnątrz. Wymóg nie zależy od konkretnego $n$: dwa takie wektory mają dodatnio proporcjonalne składowe poprzeczne, a dodanie wektora stycznego nie zmienia wyznacznika. Równoważnie, dla formy $\mu$ reprezentującej orientację, brzeg orientuje $\iota_n\mu$ ograniczona do $T\partial M$. Ten opis działa również dla $m = 1$: znak w punkcie brzegu jest znakiem liczby $\mu_p(n)$.

**Stwierdzenie 10.5.5** (Brzeg jest orientowalny)**.** *Powyższa reguła nadaje $\partial M$ gładką orientację. Dla standardowej orientacji $[a, b]$ końcowy punkt $b$ ma znak $+1$, a początkowy $a$ ma znak $-1$. Dla dysku $D^2$ ze standardową orientacją płaszczyzny brzeg biegnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.*

*Dowód.* W mapie półprzestrzeni $\{x^m \geq 0\}$ kierunek na zewnątrz to $-\partial_{x^m}$; reguła daje stały wybór znaku baz współrzędnych stycznych. Zmiany map zachowują orientację $M$ i wysyłają kierunek na zewnątrz na kierunek na zewnątrz, więc uzyskane wybory na przecięciach są zgodne. W wymiarze 1 przy $b$ wektor zewnętrzny $+\partial_t$ jest dodatni, a przy $a$ wektor $-\partial_t$ ujemny. W dysku przy $(1,0)$ wektor zewnętrzny jest $(1,0)$; aby para była dodatnia, wektor styczny musi wskazywać $(0,1)$. Ciągłość przenosi ten kierunek na cały okrąg. □




Para $(n, v)$ ma dodatni wyznacznik. Dodatni kierunek na $\partial D^2$ biegnie przeciwnie do wskazówek zegara.

Rysunek 10.2: Orientację brzegu wyznacza reguła „normalna na zewnątrz jako pierwszy wektor".

**Twierdzenie 10.5.6** (Orientacja regularnego przeciwobrazu)**.** *Niech $F : M^m \to N^q$ będzie gładkie, $M, N$ zorientowane, $N$ bez brzegu, a $y \in N$ wartością regularną. Jeśli $M$ ma brzeg, zakładamy ponadto, że $y$ jest wartością regularną $F|_{\partial M}$. Wtedy $S = F^{-1}(y)$ jest orientowalną podrozmaitością wymiaru $m-q$ (o ile nie jest pusta). Orientację można określić dla wszystkich wymiarów następująco. Dla dodatnich form objętości $\mu_p$ na $T_pM$ i $\nu_y$ na $T_yN$, dowolnej bazy $(e_1, \ldots, e_q)$ oraz podniesień $\mathrm{d}F_p w_i = e_i$ kładziemy*

$$\eta_p(v_1, \ldots, v_{m-q}) = \frac{\mu_p(w_1, \ldots, w_q, v_1, \ldots, v_{m-q})}{\nu_y(e_1, \ldots, e_q)}.$$

*Puste listy argumentów oznaczają wartości form stopnia 0. Forma $\eta$ określa orientację $S$. Gdy $q \geq 1$ i $m - q \geq 1$, jest to reguła: $(v_1, \ldots, v_{m-q})$ w $T_pS = \ker \mathrm{d}F_p$ jest dodatnia, jeśli dla wektorów $w_1, \ldots, w_q \in T_pM$, których obrazy $(\mathrm{d}F_p w_1, \ldots, \mathrm{d}F_p w_q)$ tworzą dodatnią bazę $T_yN$, ciąg $(w_1, \ldots, w_q, v_1, \ldots, v_{m-q})$ jest dodatni w $T_pM$. Gdy $m = q$, punktowi $p \in S$ przypisujemy znak izomorfizmu $\mathrm{d}F_p$ między zorientowanymi przestrzeniami. Przy brzegu $\partial S = S \cap \partial M$.*

*Dowód.* Regularność znaczy, że $\mathrm{d}F_p$ jest surjekcją, więc takie $w_i$ istnieją. Przy $\partial M$ dodatkowa surjekcja na przestrzeni stycznej do brzegu pozwala wybrać $q$ współrzędnych stycznych, w których pochodne $F$ są niezależne. Twierdzenie o funkcji odwrotnej zastosowane do $F$ wraz z pozostałymi współrzędnymi, w tym współrzędną normalną $s \geq 0$, daje lokalną postać poziomicy $\mathbb{R}^{m-q-1} \times [0, \infty)$. Stąd podana formuła brzegu. Bez założenia o $F|_{\partial M}$ wniosek mógłby zawieść: dla $F(x, s) = x^2 + s$ na $s \geq 0$ wartość 0 jest regularna dla $F$, lecz przeciwobraz jest pojedynczym punktem, a nie oczekiwaną jednowymiarową podrozmaitością z brzegiem. Zastąpienie $w_i$ innymi podniesieniami zmienia je o elementy $\ker \mathrm{d}F_p$; macierz zmiany bazy ma wówczas blok trójkątny z jednostką na przekątnej w części normalnej, zatem nie zmienia znaku. Zmiana dodatniej bazy w $T_yN$ ma dodatni wyznacznik i także zachowuje znak. Reguła jest więc jednoznaczna. W ilorazowym wzorze na $\eta_p$ zmiana dowolnej bazy $(e_i)$ mnoży licznik i mianownik przez ten sam niezerowy wyznacznik; zmiana dodatnich form $\mu_p, \nu_y$ mnoży wynik przez liczbę dodatnią. W lokalnej postaci submersji z Wniosku 1.11.13 wybory normalnych i stycznych są gładkie; znaki są zgodne na przecięciach. To dowodzi orientowalności $S$ i wzoru. □

Ta konstrukcja działa też dla zorientowanej *wiązki normalnej* podrozmaitości $S \subset M$: jej baza dodatnia, a następnie baza $TS$ mają razem dawać bazę dodatnią $TM$. Wybór orientacji normalnej nazywamy *koorientacją*. Bez takiego wyboru sama orientacja $M$ nie zawsze orientuje $S$.

**Przykład 10.5.7** (Okrąg jako poziomica)**.** W $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}$ wybierzmy orientacje standardowe i weźmy $F(x,y) = x^2 + y^2$. Na $S^1 = F^{-1}(1)$ różniczka ma wartość dodatnią na wektorze skierowanym promieniowo na zewnątrz. Twierdzenie 10.5.6 daje więc orientację przeciwną do ruchu wskazówek zegara, taką samą jak orientacja brzegu $D^2$.

**Przykład 10.5.8** (Co zawodzi na wstędze i przestrzeni rzutowej)**.** Wstęga Möbiusa z Przykładu 1.9.7 po jednym okrążeniu odwraca kierunek poprzeczny, zachowując kierunek wzdłuż okręgu. Orientacja płaszczyzny stycznej musiałaby więc zmienić znak i nie może być globalna. Jej brzeg jest jednak okręgiem, a zatem orientowalnym.

Dla $n \geq 1$ przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ jest orientowalna dokładnie wtedy, gdy $n$ jest nieparzyste. Istotnie, nakrycie $S^n \to \mathbb{RP}^n$ identyfikuje $x$ z $-x$. Antypodalne $A(x) = -x$ zmienia orientację $S^n$ o znak $(-1)^{n+1}$: dodatnią bazę przestrzeni otaczającej otrzymujemy z $(x, v_1, \ldots, v_n)$ w $\mathbb{R}^{n+1}$, a $A$ mnoży wszystkie $n+1$ wektorów przez $-1$. Orientacja na ilorazie istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy to utożsamienie zachowuje orientację sfery: jeśli zachowuje, orientacja schodzi przez lokalne dyfeomorfizmy; jeśli odwraca, jej podniesienie z ilorazu byłoby zarazem zachowane i odwrócone, co jest niemożliwe na spójnej sferze.

## 10.6 Całkowanie form na rozmaitości

Na zorientowanej rozmaitości $M^m$ całkujemy formy stopnia $m$: mają dokładnie tyle argumentów, ile niezależnych kierunków ma $M$. Bez orientacji można całkować *gęstości*, ale wymagają osobnej definicji; całka z formy najwyższego stopnia potrzebuje znaku.

**Definicja 10.6.1** (Całka z formy o zwartym nośniku)**.** Niech $M^m$ będzie zorientowana i $\omega \in \Omega^m_c(M)$, gdzie dolny indeks $c$ oznacza zwarty nośnik. W mapie $(U, x)$ zgodnej z orientacją, jeśli $\operatorname{supp}\omega \subset U$ i $\omega = f\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$, definiujemy

$$\int_M \omega := \int_{x(U)} f(x^{-1}(u))\,\mathrm{d}u^1 \cdots \mathrm{d}u^m. \tag{10.6.1}$$

Dla dowolnego zwartego nośnika bierzemy podział jedności $(\rho_j)$ z Twierdzenia 10.4.1, w mapach zgodnych z orientacją, i kładziemy

$$\int_M \omega := \sum_j \int_M \rho_j \omega. \tag{10.6.2}$$

Tylko skończenie wiele składników może być niezerowych: lokalnie skończona rodzina nośników spotyka zwarty $\operatorname{supp}\omega$ tylko dla skończenie wielu indeksów. W wymiarze 0 definicję zastępuje suma $\int_M f = \sum_{p \in M} \varepsilon_p f(p)$, gdzie $\varepsilon_p \in \{1, -1\}$ jest orientacją punktu. Zwarty nośnik w przestrzeni dyskretnej jest skończony.

**Twierdzenie 10.6.2** (Niezależność od map i podziału)**.** *Definicja 10.6.1 nie zależy od wybranego dodatniego atlasu ani podziału jedności. Jeżeli $F : M \to N$ jest dyfeomorfizmem zachowującym orientację, to dla $\omega \in \Omega^m_c(N)$ zachodzi $\int_M F^*\omega = \int_N \omega$; gdy $F$ odwraca orientację i $M, N$ są spójne, po prawej pojawia się znak minus.*

*Dowód.* W wymiarze 0 teza wynika z sumy ze znakami i z tego, że dyfeomorfizm jest bijekcją punktów. Dla $m \geq 1$ najpierw niech nośnik leży w dwóch dodatnich mapach $x$ i $y$. Z równości

$$\mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^m = \det D(y \circ x^{-1})\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$$

wynika, że współczynniki opisujące tę samą formę w obu mapach różnią się o wyznacznik Jacobiego. Jest on dodatni. Twierdzenie o zmianie zmiennych w całce na otwartych podzbiorach

$\mathbb{R}^m$ pokazuje, że oba wzory (10.6.1) dają tę samą liczbę. Dla mapy odwracającej orientację wyznacznik jest ujemny, a zwykły wzór na zmianę zmiennych zawiera jego wartość bezwzględną; stąd minus.


Jeśli $(\rho_j)$ i $(\sigma_k)$ są dwoma podziałami, to na nośniku $\omega$ możemy wstawić $1 = \sum_k \sigma_k$ do każdej całki $\rho_j\omega$. Otrzymujemy sumę $\sum_{j,k} \int_M \rho_j\sigma_k\omega$. Każdy składnik ma nośnik w przecięciu dwóch map. Rozcinamy go w razie potrzeby na mniejsze mapy, stosujemy poprzedni rachunek i zamieniamy kolejność obu skończonych sum. Wynik jest taki sam, gdy zaczniemy od $(\sigma_k)$. Wzór dla $F$ sprawdzamy na składnikach lokalnych przez $y \circ F \circ x^{-1}$ i sumujemy. □

Na zwartej rozmaitości każda gładka forma ma zwarty nośnik. Dla zorientowanej krzywej parametryzowanej $\gamma : [a,b] \to M$ całka z 1-formy jest $\int_\gamma \alpha := \int_a^b \gamma^*\alpha$; przeparametryzowanie zachowujące kierunek nie zmienia jej wartości. Dla parametryzowanej powierzchni analogicznie cofamy formę 2-stopnia.

**Przykład 10.6.3** (Całka po okręgu)**.** Dla $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \le t \le 2\pi$, zorientowanej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, forma $\alpha = x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$ daje $\gamma^*\alpha = (\cos^2 t + \sin^2 t)\mathrm{d}t = \mathrm{d}t$. Stąd $\int_{S^1} \alpha = 2\pi$. Nie jest to długość łuku wyprowadzona z metryki: całkujemy 1-formę wybraną w otaczającej płaszczyźnie.

## 10.7 Twierdzenie Stokesa

Intuicja jest jedna: gdy zsumujemy brzegi małych, zgodnie zorientowanych fragmentów, ich wewnętrzne krawędzie wystąpią po dwa razy z przeciwnymi znakami. Pozostanie brzeg całości. Rachunek na formach pozwala zapisać tę zasadę bez ograniczania się do konkretnych wymiarów.




Wspólna krawędź jest brzegiem $P_1$ i $P_2$ z przeciwnymi kierunkami. W sumie znika; zostaje tylko brzeg zewnętrzny.

Rysunek 10.3: Znak orientacji usuwa wewnętrzną krawędź przy składaniu dwóch fragmentów.

**Twierdzenie 10.7.1** (Stokes dla form)**.** *Niech $M^m$ będzie zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem, $m \ge 1$, a $\omega \in \Omega_c^{m-1}(M)$. Brzeg ma orientację z Definicji 10.5.4, a $i : \partial M \hookrightarrow M$ jest* inkluzją. *Wtedy*

$$\boxed{\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} i^*\omega.} \tag{10.7.1}$$

*Gdy $\partial M = \varnothing$, prawa strona wynosi* 0.

Zapis $i^*\omega$ oznacza *cofnięcie formy* przez inkluzję $i$, a nie nową pochodną czy ograniczenie samego współczynnika. Z definicji cofnięcia (10.2.1), dla $p \in \partial M$ i $v_j \in T_p\partial M$,

$$(i^*\omega)_p(v_1,\dots,v_{m-1}) = \omega_p(\mathrm{d}i_p v_1,\dots,\mathrm{d}i_p v_{m-1}). \tag{10.7.2}$$

Różniczka $\mathrm{d}i_p$ po prostu traktuje wektor styczny do brzegu jako wektor styczny do $M$. W mapie przybrzegowej $x^m \ge 0$ mamy $i(x^1,\dots,x^{m-1}) = (x^1,\dots,x^{m-1},0)$, więc $i^*(\mathrm{d}x^j) = \mathrm{d}x^j$ dla $j < m$, natomiast $i^*(\mathrm{d}x^m) = 0$. Współczynniki formy podstawiamy przy $x^m = 0$; składniki zawierające $\mathrm{d}x^m$ znikają. Znak orientacji brzegu rozpatrujemy *osobno*: nie jest częścią operacji $i^*$.

*Dowód. Przypadek mapy wewnętrznej.* Załóżmy najpierw, że nośnik $\omega$ jest zwarty i zawarty w dziedzinie mapy, która nie spotyka $\partial M$. We współrzędnych jej obraz jest otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^m$. Ponieważ nośnik leży wewnątrz obrazu, przedłużenie współczynników przez zero na całą $\mathbb{R}^m$ jest gładkie i ma zwarty nośnik. Dla standardowej orientacji piszemy

$$\omega = \sum_{i=1}^{m} f_i \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m.$$

Symbol daszka oznacza opuszczenie jednego czynnika. Ze wzoru na różniczkę zewnętrzną wyraz $\partial_j f_i \, \mathrm{d}x^j$ mnożymy przez wszystkie $\mathrm{d}x^r$ z $r \neq i$. Jeśli $j \neq i$, występuje dwukrotnie $\mathrm{d}x^j$ i wyraz znika. Jeśli $j = i$, przestawiamy $\mathrm{d}x^i$ przez $i-1$ czynników, co daje znak $(-1)^{i-1}$. Zatem

$$\mathrm{d}\omega = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i-1} (\partial_i f_i) \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m.$$

Ustalmy wszystkie współrzędne poza $x^i$. Funkcja $x^i \mapsto f_i(x)$ znika przy $x^i \to \pm\infty$. Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego daje

$$\int_{-\infty}^{\infty} \partial_i f_i(x) \, \mathrm{d}x^i = \lim_{b\to\infty} f_i(x^1, \ldots, b, \ldots, x^m) - \lim_{a\to-\infty} f_i(x^1, \ldots, a, \ldots, x^m) = 0.$$

Zamieniamy kolejność całkowania dzięki zwartemu nośnikowi i sumujemy po $i$. Wychodzi $\int_M \mathrm{d}\omega = 0$. Także $i^*\omega = 0$, ponieważ nośnik $\omega$ nie spotyka brzegu, więc równość Stokesa zachodzi.

*Przypadek mapy przybrzegowej.* Teraz niech nośnik leży w mapie na otwarty podzbiór półprzestrzeni $\mathbb{H}^m = \{(x', s) : x' \in \mathbb{R}^{m-1},\ s \geq 0\}$, gdzie $s = x^m$. Na razie używamy standardowej orientacji $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$. Przedłużamy $f_i$ przez zero w obrębie $\mathbb{H}^m$ poza obraz mapy; zwarty nośnik sprawia, że to przedłużenie jest gładkie. Nie przedłużamy funkcji przez $s = 0$ na $s < 0$: wartość na brzegu może przecież być niezerowa. Wzór na $\mathrm{d}\omega$ jest taki sam jak wyżej. Jeśli $i < m$, to po ustaleniu $s$ oraz pozostałych współrzędnych stycznych całka z $\partial_i f_i$ po całej prostej $x^i$ wynosi zero. Pozostaje wyraz $i = m$. Dla każdego $x'$ funkcja $s \mapsto f_m(x', s)$ znika dla dostatecznie dużego $s$. Stąd

$$\int_0^{\infty} \partial_s f_m(x', s) \, \mathrm{d}s = \lim_{s\to\infty} f_m(x', s) - f_m(x', 0) = -f_m(x', 0).$$

Po uwzględnieniu znaku $(-1)^{m-1}$ we wzorze na $\mathrm{d}\omega$ otrzymujemy

$$\int_{\mathbb{H}^m} \mathrm{d}\omega = (-1)^{m-1} \int_{\mathbb{R}^{m-1}} \left( \int_0^{\infty} \partial_s f_m(x', s) \, \mathrm{d}s \right) \mathrm{d}x' = (-1)^m \int_{\mathbb{R}^{m-1}} f_m(x', 0) \, \mathrm{d}x'.$$

Dlaczego jest to całka po *zorientowanym* brzegu? Na $s = 0$ normalna na zewnątrz to $n = -\partial_s$. Dla standardowej formy objętościowej $\mu = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$ liczymy bez skrótu

$$\mu(-\partial_s, \partial_1, \ldots, \partial_{m-1}) = -(-1)^{m-1} = (-1)^m.$$

Zasada „normalna na zewnątrz jako pierwsza” z Definicji 10.5.4 mówi więc, że orientacja brzegu względem standardowego $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{m-1}$ ma znak $(-1)^m$. Jednocześnie wzór (10.7.2) daje

$$i^*\omega = f_m(x', 0) \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{m-1},$$

bo tylko wyraz z opuszczonym $\mathrm{d}x^m$ nie zawiera różniczki normalnej. Całka tej formy z orientacją brzegu jest zatem równa obliczonej całce z $\mathrm{d}\omega$. Dla $m = 1$ rozumiemy $x'$ jako pusty układ współrzędnych: brzeg w tym modelu składa się z punktu $s = 0$ o znaku $-1$, a wzór nadal działa. Gdy wybrana mapa odwraca orientację $M$, całka po mapie i indukowana orientacja jej brzegu zmieniają znaki jednocześnie, więc równość pozostaje prawdziwa.

*Przejście do całej rozmaitości.* Wybierzmy podział jedności $(\rho_j)$ podporządkowany mapom wewnętrznym i przybrzegowym, tak że każdy $\rho_j$ ma zwarty nośnik w swojej mapie (Twierdzenie 10.4.1). Ponieważ rodzina jest lokalnie skończona, a $\operatorname{supp}\omega$ zwarty, tylko skończenie wiele iloczynów $\rho_j\omega$ jest niezerowych. Każdy ma nośnik zwarty w odpowiedniej mapie, więc należy do jednego z dwóch powyższych przypadków. Mamy $\sum_j \rho_j\omega = \omega$; stosując liniowość d do tej *skończonej* sumy, dostajemy $\sum_j \mathrm{d}(\rho_j\omega) = \mathrm{d}\omega$. Z drugiej strony cofnięcie przez inkluzję jest liniowe, a $i^*(\rho_j\omega) = (\rho_j|_{\partial M})\, i^*\omega$. Sumując lokalne równości Stokesa, otrzymujemy

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \sum_j \int_M \mathrm{d}(\rho_j\omega) = \sum_j \int_{\partial M} i^*(\rho_j\omega) = \int_{\partial M} i^*\omega,$$

ponieważ $\sum_j \rho_j|_{\partial M} = 1$. □

**Przykład 10.7.2** (Cofnięcie 1-formy na brzeg dysku)**.** Niech $M = D^2$, $\omega = P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ i niech $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ parametryzuje dodatnio zorientowany brzeg. Ponieważ $\mathrm{d}x(\gamma'(t)) = -\sin t$ oraz $\mathrm{d}y(\gamma'(t)) = \cos t$, dostajemy

$$\gamma^*(i^*\omega) = (i\circ\gamma)^*\omega = \big[-P(\cos t, \sin t)\sin t + Q(\cos t, \sin t)\cos t\big]\,\mathrm{d}t.$$

Tak obliczamy prawą stronę twierdzenia Stokesa jako zwykłą całkę po $t \in [0, 2\pi]$.

**Wniosek 10.7.3** (Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego)**.** *Jeśli $f$ jest gładka na $[a,b]$, to*

$$\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t = f(b) - f(a).$$

*Dowód.* Na zorientowanym przedziale $[a,b]$ forma $\mathrm{d}f$ ma postać $f'(t)\mathrm{d}t$. Jego brzeg ma orientację $\partial[a,b] = \{b\} - \{a\}$, co sprawdziliśmy w Stwierdzeniu 10.5.5. Całka 0-formy $f$ po tym zorientowanym zbiorze punktów jest z definicji $f(b) - f(a)$. Wzór (10.7.1) daje tezę. □

To identyfikacja jednowymiarowego przypadku Stokesa. Podstawowego twierdzenia rachunku całkowego użyliśmy już w jego dowodzie lokalnym, więc powyższy rachunek nie stanowi niezależnego dowodu tego faktu analizy.

**Wniosek 10.7.4** (Twierdzenie Greena)**.** *Niech $D \subset \mathbb{R}^2$ będzie zwartym obszarem o gładkim brzegu, z orientacją $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, a $P, Q$ niech będą gładkie w otoczeniu $D$. Wtedy*

$$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

*Orientacja $\partial D$ jest dodatnia, czyli podczas obiegania każdej składowej brzegu wnętrze $D$ pozostaje po lewej stronie.*

*Dowód.* Dla $\alpha = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ reguła Leibniza i $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}y = 0$ dają

$$\mathrm{d}\alpha = P_y\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x + Q_x\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Lewa strona wzoru Greena jest całką z $i^*\alpha$ po brzegu; cofnięcie ogranicza $\alpha$ do kierunków stycznych do krzywej, jak w powyższym przykładzie z dyskiem. Podstawiamy $\alpha$ do Twierdzenia 10.7.1. Znak orientacji sprawdzamy w punkcie $(1,0)$ brzegu dodatnio zorientowanego dysku: normalna zewnętrzna wskazuje w prawo, więc dodatni wektor styczny wskazuje w górę. Ta sama reguła działa na każdej składowej brzegu, także na brzegu otworu. □

**Wniosek 10.7.5** (Klasyczne twierdzenie Stokesa o rotacji)**.** *Niech $S \subset \mathbb{R}^3$ będzie zwartą gładką zorientowaną powierzchnią z brzegiem, $n$ jej dodatnią normalną jednostkową, a $\mathbf{F} = (P,Q,R)$ gładkim polem w otoczeniu $S$. Dla dodatniego kierunku $\partial S$ mamy*

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r} = \iint_S (\nabla\times\mathbf{F})\cdot n\,\mathrm{d}A.$$

*Dowód.* Bierzemy 1-formę $\alpha = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$. Bezpośredni rachunek pochodnych daje

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\alpha = {} & (R_y - Q_z)\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z \\ & + (P_z - R_x)\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Wektor współczynników przy trzech formach bazowych to dokładnie $\nabla \times \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$. Dla dodatniej parametryzacji $r(u,v)$ fragmentu $S$ podstawmy $a = r_u$, $b = r_v$. Z definicji iloczynu zewnętrznego

$$(\mathrm{d}\alpha)(a,b) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (a \times b) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot n\,\|a \times b\|.$$

Po scałkowaniu po $(u,v)$ otrzymujemy prawą stronę tezy. Na krzywej brzegowej $\alpha(\gamma') = \mathbf{F}(\gamma)\cdot\gamma'$, więc całka z $i^*\alpha$ jest lewą stroną. Twierdzenie 10.7.1 utożsamia te dwie całki. Kierunek brzegu jest indukowany przez orientację $S$; na płaskim dysku z normalną w górę jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. □

**Wniosek 10.7.6** (Twierdzenie Gaussa–Ostrogradskiego)**.** *Niech $D \subset \mathbb{R}^3$ będzie zwartym obszarem o gładkim brzegu, a $\mathbf{F} = (P,Q,R)$ gładkim polem w otoczeniu $D$. Jeśli $n$ oznacza normalną jednostkową na zewnątrz, to*

$$\iint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot n\,\mathrm{d}A = \iiint_D \operatorname{div}\mathbf{F}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

*Dowód.* Strumieniowi $\mathbf{F}$ odpowiada 2-forma

$$\beta = P\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Różniczkując trzy składniki, dostajemy

$$\mathrm{d}\beta = (P_x + Q_y + R_z)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z = (\operatorname{div}\mathbf{F})\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

Dla dodatnio zorientowanej pary stycznych wektorów $a, b \in T_p\partial D$ mamy

$$(i^*\beta)_p(a,b) = \mathbf{F}(p) \cdot (a \times b).$$

Z reguły orientowania brzegu wynika, że $a \times b$ wskazuje na zewnątrz; dla ortonormalnej pary jest równy $n$. Ogólnie jego długość dostarcza czynnika elementu pola $\mathrm{d}A$. Całka z $i^*\beta$ jest więc strumieniem przez brzeg, a całka z $\mathrm{d}\beta$ całką z dywergencji po $D$. Równość daje Twierdzenie 10.7.1. □

**Wniosek 10.7.7** (Zerowanie całki form zamkniętych i dokładnych)**.** *Jeśli $M^m$ jest zwartą zorientowaną rozmaitością z brzegiem, a $\eta \in \Omega^{m-1}(M)$ jest zamknięta, to $\int_{\partial M} i^*\eta = 0$. Jeżeli $M$ jest zwartą zorientowaną rozmaitością bez brzegu i $\omega = \mathrm{d}\eta \in \Omega^m(M)$, to $\int_M \omega = 0$. W szczególności forma najwyższego stopnia o całce niezerowej nie jest dokładna.*

*Dowód.* W pierwszej sytuacji $\int_{\partial M} i^*\eta = \int_M \mathrm{d}\eta = 0$. W drugiej $\int_M \omega = \int_{\partial M} i^*\eta = 0$, bo brzeg jest pusty. Oba kroki są bezpośrednimi zastosowaniami (10.7.1). □

## 10.8 Kohomologia de Rhama i ciąg Mayera–Vietorisa

**Definicja 10.8.1** (Kohomologia de Rhama)**.** *Kompleks de Rhama* to ciąg

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1(M) \xrightarrow{\mathrm{d}} \cdots \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^m(M) \longrightarrow 0.$$

Jest kompleksem kołańcuchowym, bo $\mathrm{d}^2 = 0$. Formę z $\ker \mathrm{d}$ nazywamy *zamkniętą*, a formę z $\operatorname{im}\mathrm{d}$ *dokładną*. Definiujemy

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) := \ker(\mathrm{d} : \Omega^k \to \Omega^{k+1}) / \operatorname{im}(\mathrm{d} : \Omega^{k-1} \to \Omega^k).$$

W stopniu 0 jest to przestrzeń funkcji lokalnie stałych. Z uwagi na brak form ujemnego stopnia zerowa funkcja jest jedyną dokładną 0-formą.

Iloczyn zewnętrzny przechodzi na klasy: jeśli $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\beta = 0$ i $\alpha$ zastąpimy przez $\alpha + \mathrm{d}\eta$, to różnica iloczynów wynosi $(\mathrm{d}\eta)\wedge\beta = \mathrm{d}(\eta\wedge\beta)$. Otrzymujemy *pierścień kohomologii de Rhama* $H^*_{\mathrm{dR}}(M)$ z przemiennością $[\alpha][\beta] = (-1)^{k\ell}[\beta][\alpha]$. Cofnięcie $F^*$ daje homomorfizm pierścieni $H^*_{\mathrm{dR}}(N) \to H^*_{\mathrm{dR}}(M)$; Wniosek 10.3.4 pokazuje, że gładkie homotopie dają tę samą operację.

**Twierdzenie 10.8.2** (Mayer–Vietoris dla form)**.** *Jeśli $M = U \cup V$ dla zbiorów otwartych, to w każdym stopniu krótki ciąg*

$$\begin{gathered} 0 \to \Omega^k(M) \xrightarrow{r} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xrightarrow{s} \Omega^k(U\cap V) \to 0, \\ r(\omega) = (\omega|_U, \omega|_V), \qquad s(\alpha,\beta) = \beta|_{U\cap V} - \alpha|_{U\cap V}. \end{gathered} \tag{10.8.1}$$

*jest dokładny i zgodny z* d*. W konsekwencji istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H^{k-1}_{\mathrm{dR}}(U\cap V) \xrightarrow{\delta} H^k_{\mathrm{dR}}(M) \to H^k_{\mathrm{dR}}(U) \oplus H^k_{\mathrm{dR}}(V) \to H^k_{\mathrm{dR}}(U\cap V) \xrightarrow{\delta} H^{k+1}_{\mathrm{dR}}(M) \to \cdots .$$

*Dowód.* Jeżeli $r(\omega) = 0$, forma znika na $U$ i $V$, więc znika na $M$: $r$ jest iniektywne. Para $(\alpha,\beta)$ należy do $\ker s$ dokładnie wtedy, gdy jej składniki zgadzają się na przecięciu; wówczas sklejają się w jedną gładką formę na $M$. To dowodzi $\operatorname{im} r = \ker s$.


Aby dowieść surjektywności $s$, weźmy $\gamma \in \Omega^k(U\cap V)$ i podział jedności $\rho_U + \rho_V = 1$ podporządkowany $(U,V)$. Na $U$ kładziemy $\alpha = -\rho_V\gamma$ na $U\cap V$ i przedłużamy przez 0 na $U\setminus V$; na $V$ kładziemy $\beta = \rho_U\gamma$ i podobnie przedłużamy przez 0. Przedłużenia są gładkie: nośnik $\rho_V$ nie dochodzi lokalnie do punktów poza $V$, a nośnik $\rho_U$ do punktów poza $U$. Na przecięciu $s(\alpha,\beta) = (\rho_U+\rho_V)\gamma = \gamma$. Ponieważ obcięcie komutuje z d, otrzymujemy krótki ciąg dokładny *kompleksów*. Twierdzenie 6.4.4 z Rozdziału 6 tworzy z niego długi ciąg. Konkretnie, dla zamkniętej $\gamma$ wybieramy powyższe $(\alpha,\beta)$; formy $\mathrm{d}\alpha$ i $\mathrm{d}\beta$ zgadzają się na przecięciu, bo $\mathrm{d}\gamma = 0$. Sklejona forma $\eta$ na $M$ jest zamknięta i $\delta[\gamma] = [\eta]$. Zmiana podniesienia lub reprezentanta $[\gamma]$ zmienia $\eta$ o formę dokładną, dokładnie jak w dowodzie długiego ciągu kohomologii. □

**Przykład 10.8.3** (Okrąg i forma kąta)**.** Na $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ forma

$$\vartheta = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

jest zamknięta: po zastosowaniu wzoru na d otrzymujemy $\mathrm{d}\vartheta = 0$. Na okręgu $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ mamy $\gamma^*\vartheta = \mathrm{d}t$ i $\int_{S^1}\vartheta = 2\pi$. Gdyby $\vartheta$ była dokładna, Stokes na zamkniętej krzywej dałby 0, sprzeczność. Lokalnie możemy pisać $\vartheta = \mathrm{d}\theta$, ale funkcja kąta po pełnym obrocie zmienia się o $2\pi$ i nie jest globalną funkcją rzeczywistą.

W istocie $H^1_{\mathrm{dR}}(S^1) \cong \mathbb{R}$, z izomorfizmem $[\alpha] \mapsto \int_{S^1}\alpha$. Dowód surjektywności daje $c\vartheta$. Jeśli całka z $\alpha$ znika, zapiszmy $\gamma^*\alpha = g(t)\mathrm{d}t$ dla funkcji $2\pi$-okresowej $g$ i połóżmy $h(t) = \int_0^t g(s)\,\mathrm{d}s$. Wtedy $h(t+2\pi) - h(t) = \int_t^{t+2\pi} g(s)\,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} g(s)\,\mathrm{d}s = 0$ dla każdego $t$. Funkcja $h$ jest zatem gładka i okresowa, więc schodzi do gładkiej funkcji na $S^1$, której różniczka jest $\alpha$. To dowodzi iniektywności. Ponadto $H^0_{\mathrm{dR}}(S^1) = \mathbb{R}$ i wyższe grupy znikają.



$d\vartheta = 0$ poza środkiem, ale $\int_{S^1} \vartheta = 2\pi$. Funkcja kąta jest pierwotną tylko lokalnie: po obejściu dziury zmienia się o $2\pi$.

Rysunek 10.4: Zamknięta 1-forma na płaszczyźnie bez początku może nie mieć globalnej funkcji pierwotnej. Krzyżykiem zaznaczono jedyny usunięty punkt; niebieski dysk przedstawia fragment dziedziny.

**Przykład 10.8.4** (Sfery i torus)**.** Dwie dziedziny map na $S^n$ otrzymane przez usunięcie przeciwnych biegunów są ściągalne, a ich przecięcie zwija się na $S^{n-1}$. Długi ciąg z Twierdzenia 10.8.2, zaczynając od obliczenia dla $S^1$, daje indukcyjnie

$$H^k_{\mathrm{dR}}(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, n, \\ 0, & \text{w pozostałych stopniach,} \end{cases} \qquad n \geq 1.$$

Dla $n \geq 2$ dokładność w stopniu 0 mówi, że $H^0(S^n) = \mathbb{R}$ i $H^1(S^n) = 0$: przecięcie jest spójne, a mapa $H^0(U) \oplus H^0(V) = \mathbb{R}^2 \to H^0(U \cap V) = \mathbb{R}$ ma postać $(a, b) \mapsto b - a$, więc jest surjektywna; w stopniach $k \geq 2$ odwzorowanie łączące przenosi $H^{k-1}(S^{n-1})$ na $H^k(S^n)$. Jedyny niezerowy stopień dodatni to $k = n$.

Na $T^2 = S^1 \times S^1$ niech $\alpha = \mathrm{pr}_1^* \vartheta$ i $\beta = \mathrm{pr}_2^* \vartheta$. Ich całki po dwóch podstawowych okręgach wynoszą odpowiednio $(2\pi, 0)$ i $(0, 2\pi)$; $\int_{T^2} \alpha \wedge \beta = (2\pi)^2$. Klasy $[\alpha], [\beta]$ są liniowo niezależne w stopniu 1, a $[\alpha \wedge \beta]$ jest niezerowa w stopniu 2. W obu przypadkach wynika to ze Stokesa: forma dokładna ma zerową całkę po każdym z tych cykli. Twierdzenie de Rhama poniżej i kompleks komórkowy torusa z Przykładu 8.7.4 pokazują, że dają całe $H^1_{\mathrm{dR}}(T^2) \cong \mathbb{R}^2$ oraz $H^2_{\mathrm{dR}}(T^2) \cong \mathbb{R}$.

## 10.9 Dlaczego formy obliczają kohomologię przestrzeni?

Forma zamknięta może nie mieć pierwotnej właśnie wtedy, gdy wykrywa globalny „otwór”. Aby porównać ten język z homologią singularną z Rozdziału 8, całkujemy formę po zorientowanych sympleksach. Używamy tu współczynników rzeczywistych: całka przyjmuje wartości w $\mathbb{R}$, a torsja całkowitoliczbowa znika po przejściu do tych współczynników.

**Definicja 10.9.1** (Kohomologia singularna z wartościami w $\mathbb{R}$)**.** Jeżeli $C_k(M; \mathbb{R})$ jest przestrzenią skończonych $\mathbb{R}$-liniowych kombinacji ciągłych sympleksów $\sigma : \Delta^k \to M$, to $C^k(M; \mathbb{R}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(C_k(M; \mathbb{R}), \mathbb{R})$. Kobrzeg $\delta : C^k \to C^{k+1}$ określa wzór $(\delta c)(\sigma) = c(\partial \sigma)$. Z $\partial^2 = 0$ wynika $\delta^2 = 0$; iloraz $\ker \delta / \operatorname{im} \delta$ oznaczamy przez $H^k_{\mathrm{sing}}(M; \mathbb{R})$.

Sympleks $\sigma : \Delta^k \to M$ nazywamy *gładkim*, gdy w mapach jego składowe mają gładkie przedłużenia do otoczeń punktów $\Delta^k$ w jego otoczce afinicznej. Przy brzegu $M$ przedłużamy składowe do $\mathbb{R}^m$; nie wymagamy, aby przedłużenie poza sympleks przyjmowało wartości w półprzestrzeni modelującej $M$. Na przykład $t \mapsto t$ z $[0, 1]$ do $[0, \infty)$ jest w tym sensie gładkie. Dla takiego $\sigma$ definiujemy $I(\omega)(\sigma) = \int_{\Delta^k} \sigma^* \omega$. Znak orientacji $\Delta^k$ jest określony przez kolejność jego wierz-

chołków. Na sympleksie $\Delta^{k+1}$ twierdzenie Stokesa daje

$$\begin{aligned}(\delta I\omega)(\sigma) = I\omega(\partial\sigma) &= \sum_{j=0}^{k+1}(-1)^j \int_{[v_0,\dots,\widehat{v_j},\dots,v_{k+1}]} \sigma^*\omega \\ &= \int_{\Delta^{k+1}} \mathrm{d}(\sigma^*\omega) = \int_{\Delta^{k+1}} \sigma^*(\mathrm{d}\omega) = I(\mathrm{d}\omega)(\sigma).\end{aligned} \tag{10.9.1}$$

Uzasadnijmy użycie Stokesa na sympleksie, który ma naroża. W otoczeniu punktu należącego do $r$ ścian jego dziedzinę opisują współrzędne $[0,\infty)^r \times \mathbb{R}^{k+1-r}$: równania przecinających się ścian są niezależne. Rozkładamy formę podziałem jedności i stosujemy lokalny dowód Stokesa do każdego składnika o zwartym nośniku. Dla składnika z pominiętym $\mathrm{d}x^i$ całkowanie po $x^i$ daje zero, gdy $x^i \in \mathbb{R}$, a gdy $x^i \geq 0$, daje ujemną wartość współczynnika na $x^i = 0$. Są to dokładnie wkłady ścian z orientacją „normalna na zewnątrz najpierw". Przecięcia dwóch ścian mają miarę zero w każdej ścianie i nie tworzą dodatkowych całek. Dla orientacji sympleksu zadanej kolejnością wierzchołków orientacja ściany naprzeciw $v_j$ jest $(-1)^j$ razy orientacja pozostałych wierzchołków: przesunięcie pominiętego wierzchołka na pierwsze miejsce wymaga $j$ zamian, a przypadek $j = 0$ daje orientację brzegową dodatnią. Otrzymujemy więc dokładnie znaki w (10.9.1), bez zastępowania naroży brzegiem gładkim. Równanie mówi, że „całka po brzegu" i „różniczka formy" opisują ten sam rachunek.

**Twierdzenie 10.9.2** (de Rham)**.** *Dla każdej gładkiej rozmaitości $M$ (również z brzegiem) całkowanie po gładkich sympleksach indukuje naturalny izomorfizm przestrzeni wektorowych*

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) \xrightarrow{\cong} H^k_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}), \qquad [\omega] \longmapsto \big[\sigma \longmapsto \textstyle\int_\sigma \omega\big]. \tag{10.9.2}$$

*Zapis po prawej najpierw określa kołańcuch na* gładkich *sympleksach. Przenosimy jego klasę do zwykłej kohomologii singularnej przez odwrotność kanonicznego izomorfizmu ograniczenia kołańcuchów, którego istnienie udowodnimy poniżej. Nie wybieramy niezależnie wygładzenia każdego ciągłego sympleksu: takie wybory nie musiałyby być zgodne z jego ścianami.*

*Dowód.* Dowód rozdzielimy na rachunek lokalny i precyzyjną zasadę sklejania kompleksów. Równocześnie uzasadnimy, dlaczego wystarczają gładkie sympleksy. Nie będziemy potrzebować ani triangulacji $M$, ani metryki.

*1. Trzy kompleksy i prostokąty wypukłe.* Niech $C^\infty_*(U;\mathbb{R})$ oznacza podkompleks generowany przez gładkie sympleksy, a $C^*_\infty(U;\mathbb{R}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(C^\infty_*(U;\mathbb{R}),\mathbb{R})$ jego kompleks dualny. Ograniczenie kołańcuchów i całkowanie dają naturalne odwzorowania kompleksów

$$C^*(U;\mathbb{R}) \xrightarrow{r} C^*_\infty(U;\mathbb{R}) \xleftarrow{I} \Omega^*(U).$$

Pierwsze komutuje z kobrzegiem, ponieważ ściany gładkiego sympleksu są gładkie; drugie dzięki (10.9.1).

Gdy $U$ jest niepustym wypukłym zbiorem otwartym w $\mathbb{R}^m$ lub względnie otwartym w $\mathbb{H}^m = \{x^m \geq 0\}$, wybierzmy $a \in U$. Homotopia $H(t,x) = (1-t)a + tx$ pozostaje w $U$. Lemat 10.3.1 oblicza kohomologię form, a operator pryzmatowy z Twierdzenia 8.2.5 oblicza obie kohomologie singularne. Pryzmat i jego triangulacja są określone afinicznie w dziedzinie, więc zachowują gładkość sympleksów w przyjętym sensie. Każdy z trzech kompleksów ma zatem kohomologię $\mathbb{R}$ w stopniu 0 i zero w stopniach dodatnich. W stopniu 0 oba odwzorowania są identycznością na funkcjach stałych. W szczególności $r$ i $I$ indukują izomorfizmy.

*2. Algebraiczna zasada sklejania.* Dla otwartego pokrycia $(U_i)$ rozważmy trzy tabele

$$A^{p,q} = \prod_{i_0<\cdots<i_p} \Omega^q(U_{i_0\cdots i_p}),$$
$$B^{p,q} = \prod_{i_0<\cdots<i_p} C^q_\infty(U_{i_0\cdots i_p};\mathbb{R}),$$
$$E^{p,q} = \prod_{i_0<\cdots<i_p} C^q(U_{i_0\cdots i_p};\mathbb{R}), \qquad U_{i_0\cdots i_p} = U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_p}.$$

Puste przecięcia wnoszą zera. W poziomie działa naprzemienna suma ograniczeń $\delta_{\mathcal{U}}$, np. $(\delta_{\mathcal{U}}a)_{ij} = a_j|_{U_{ij}} - a_i|_{U_{ij}}$. W pionie działa odpowiednio d lub kobrzeg singularny $d_v$. Kompleks całkowity ma w stopniu $n$ sumę składników $p+q=n$ i różniczkę $D = \delta_{\mathcal{U}} + (-1)^p d_v$ na kolumnie $p$. Ograniczenia komutują z $d_v$, więc $D^2 = 0$.

Użyjemy dwóch elementarnych własności takich tabel. Jeśli wszystkie kolumny są dokładne, kompleks całkowity jest dokładny. Istotnie, dla kocyklu $z$ jego składnik w kolumnie o najmniejszym indeksie $p$ jest pionowo zamknięty. Z dokładności wybieramy jego pionową pierwotną, uwzględniając znak $(-1)^p$, i odejmujemy jej $D$. Usuwamy tę kolumnę, ewentualnie zmieniając następną. Powtarzamy to, aż usuniemy wszystkie składniki. Procedura kończy się: w danym stopniu całkowitym jest skończenie wiele par $(p,q)$. W najniższym pionowym stopniu dokładność oznacza zerowe jądro, jeśli brak już stopnia na pierwotną. Ten sam argument, z zamianą ról indeksów, działa dla dokładnych wierszy.

Wynika stąd również zasada porównania: odwzorowanie tabel, które indukuje izomorfizm kohomologii w każdej kolumnie, indukuje izomorfizm kohomologii całkowitej. Aby to sprawdzić, tworzymy stożek odwzorowania $f$. Dla kompleksów $P, Q$ ma on składniki $Q^n \oplus P^{n+1}$ i różniczkę $(b,a) \mapsto (d_Q b + f(a), -d_P a)$. Z krótkiego ciągu dokładnego $0 \to Q \to \mathrm{Cone}(f) \to P[1] \to 0$ i jego ciągu kohomologii wynika, że stożek jest dokładny wtedy i tylko wtedy, gdy $f$ indukuje izomorfizmy kohomologii. Dla odwzorowania tabel $f : P \to Q$ bierzemy w pozycji $(p,q)$ przestrzeń $Q^{p,q} \oplus P^{p,q+1}$, z różniczką pionową $(b,a) \mapsto (d_v b + (-1)^p f(a), -d_v a)$ i poziomą $(b,a) \mapsto (\delta_{\mathcal{U}} b, -\delta_{\mathcal{U}} a)$. Te różniczki komutują, a po zastosowaniu znaku $(-1)^p$ w totalizacji otrzymujemy dokładnie stożek odwzorowania kompleksów całkowitych. Kolumna $p$ jest stożkiem $(-1)^p f$, więc jest dokładna na mocy założenia. Stosujemy teraz poprzedni argument usuwania kolumn. Dopuszczony dodatkowy stopień pionowy $-1$ nie przeszkadza: przekątne nadal mają skończoną długość. Analogicznie, jeśli do dokładnych wierszy dopiszemy w kolumnie $-1$ kompleks globalny $P$, to jego odwzorowanie do kompleksu całkowitego $Q$ jest izomorfizmem kohomologii. Rozszerzona tabela w stopniu całkowitym $n$ ma składniki $Q^n \oplus P^{n+1}$. W kolumnie $-1$ pionowa różniczka ma znak minus, a pozioma jest augmentacją $f$; różniczka całkowita to zatem $(b,a) \mapsto (D_Q b + f(a), -d_P a)$. Jest to dokładnie stożek tego odwzorowania, a jego dokładne wiersze pozwalają zastosować ten sam argument.

*3. Dlaczego wiersze obliczają kompleksy globalne.* W przypadku $A$ dopisujemy $\Omega^q(M)$ na początku wiersza. Wybierzmy gładki podział jedności $\sum_j \rho_j = 1$ podporządkowany pokryciu. Dla rodziny naprzemiennej określamy

$$(ha)_{i_0\cdots i_{p-1}} = \sum_j \rho_j a_{j i_0\cdots i_{p-1}}.$$

Składniki przedłużamy przez zero; lokalna skończoność nośników zapewnia gładkość sumy. Dla $p=0$ otrzymujemy globalną formę $\sum_j \rho_j a_j$. Rozwinięcie sumy daje $h\delta_{\mathcal{U}} + \delta_{\mathcal{U}} h = \mathrm{id}$: wyrazy z pominiętym $i_r$ znoszą się parami, a pozostałe dają $(\sum_j \rho_j)a$. Na formach globalnych złożenie ograniczenia i $h$ także jest identycznością. Rozszerzone wiersze są więc dokładne.

Dla $B$ oraz $E$ dopisujemy na początku kołańcuchy na *małych* sympleksach, czyli na sympleksach o obrazie zawartym w jednym z $U_i$. Dla konkretnego sympleksu $\sigma$ zbiór $J_\sigma = \{i : \sigma(\Delta^q) \subset U_i\}$

jest niepusty. Poziomy ciąg jego wartości to rozszerzony kompleks kołańcuchów pełnego sympleksu o wierzchołkach $J_\sigma$. Wybranie $i(\sigma) \in J_\sigma$ i wstawienie go na początek indeksów daje homotopię $h$ spełniającą tę samą tożsamość. Wiersz jest iloczynem takich ciągów po wszystkich małych sympleksach; pozostaje dokładny, ponieważ pierwotne wybieramy współrzędna po współrzędnej.

Lemat 8.4.1 mówi, że włączenie małych łańcuchów indukuje izomorfizm homologii. Jego dowód działa też dla gładkich łańcuchów: podziały i homotopie podziału są złożeniami z odwzorowaniami afinicznymi. Nad $\mathbb{R}$ ograniczenie dualnych kołańcuchów indukuje zatem izomorfizm kohomologii. Uzasadnienie algebraiczne nie wymaga skończonego wymiaru: wybieramy dopełnienia brzegów w cyklach i cykli w łańcuchach; kompleks jest sumą części o zerowej różniczce (homologii) i par, na których różniczka jest izomorfizmem. Dualizacja zachowuje ten rozkład i dokładność części z parami. W konsekwencji tabele $A, B, E$ obliczają odpowiednio $H^*_{\mathrm{dR}}(M)$, $H^*(C^*_\infty(M;\mathbb{R}))$ i $H^*_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R})$. Wszystkie ograniczenia i augmentacje komutują z $I$ i $r$.

*4. Dwa zastosowania sklejania.* Najpierw niech $W$ będzie otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^m$ lub względnie otwartym podzbiorem $\mathbb{H}^m$. Pokrywamy go prostokątami otwartymi, odpowiednio przeciętymi z $\mathbb{H}^m$, i zawartymi w $W$. Możemy wybrać pokrycie lokalnie skończone: w konstrukcji wyczerpania zwartymi zbiorami z dowodu Twierdzenia 10.4.1 zastępujemy małe kule małymi prostokątami. Każde niepuste skończone przecięcie jest wypukłe. Krok 1 pokazuje, że $I : A \to B$ oraz $r : E \to B$ indukują izomorfizmy w każdej kolumnie. Iloczyny przestrzeni wektorowych zachowują tu jądra, obrazy i dokładność, więc także iloczyn lokalnych izomorfizmów jest izomorfizmem. Kroki 2 i 3 dowodzą obu porównań dla *każdego* takiego $W$, nie tylko dla zbioru wypukłego.

Teraz pokryjmy dowolną rozmaitość $M$ lokalnie skończoną rodziną dziedzin map. Każde ich skończone przecięcie jest otwartym podzbiorem jednej z tych dziedzin, a więc jest dyfeomorficzne z pewnym $W$ rozpatrzonym w poprzednim akapicie. Nie musi być ściągalne ani spójne. Porównania $I$ i $r$ są na nim już udowodnione. Ponowne zastosowanie kroków 2 i 3 daje izomorfizmy

$$H^*_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}) \xrightarrow{H(r)} H^*(C^*_\infty(M;\mathbb{R})) \xleftarrow{H(I)} H^*_{\mathrm{dR}}(M).$$


Szukany izomorfizm to $H(r)^{-1}H(I)$. Oba odwzorowania komutują z przenoszeniem sympleksów i cofnięciem form przez gładkie odwzorowania, więc izomorfizm jest naturalny. Cały argument obejmuje rozmaitości z brzegiem dzięki modelom w $\mathbb{H}^m$.

Warto też wyjaśnić interpretację przez cykle. Nad ciałem dualność kompleksów opisana w kroku 3 identyfikuje kohomologię z dualną przestrzenią homologii. Z izomorfizmu $H(r)$ wynika zatem, że włączenie $C^\infty_*(M;\mathbb{R}) \to C_*(M;\mathbb{R})$ indukuje izomorfizm homologii: odwzorowanie liniowe, którego dualne jest izomorfizmem, samo jest izomorfizmem (niezerowe jądro lub niezerowy iloraz wykryłby funkcjonał liniowy). Każda klasa cyklu ma więc gładkiego reprezentanta, a dwaj tacy reprezentanci tej samej klasy różnią się brzegiem gładkiego łańcucha. Dla formy zamkniętej ich całki są równe przez (10.9.1). To uzasadnia niezależność okresów od reprezentantów bez dokonywania niezgodnych wyborów na ścianach. □

**Przykład 10.9.3** (Co widzą okresy, a czego nie widzą)**.** Jeżeli $\omega$ jest zamkniętą $k$-formą, jej *okres* na cyklu $z$ to $\int_z \omega$. Jest niezależny od wyboru reprezentanta klasy homologii: jeżeli $z$ zmienimy o $\partial c$, różnica całek to $\int_c \mathrm{d}\omega = 0$. Zmiana $\omega$ o formę dokładną także nie zmienia okresu, bo $\int_z \mathrm{d}\eta = \int_{\partial z} \eta = 0$. Na okręgu forma $\vartheta/(2\pi)$ z Przykładu 10.8.3 ma okres 1 na podstawowym cyklu. W $\mathbb{RP}^2$ grupa $H_1(-;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$ ma torsję, lecz $H^1_{\mathrm{dR}}(\mathbb{RP}^2) = 0$: homomorfizm z $\mathbb{Z}/2$ do $\mathbb{R}$ musi wysłać generator na liczbę $a$ z $2a = 0$, zatem $a = 0$. Twierdzenie de Rhama wykrywa kohomologię rzeczywistą; nie zastępuje informacji o torsji.

## 10.10 Porównanie homologii, kohomologii de Rhama i homotopii

Pierwsza różnica dotyczy *przestrzeni, na których można zbudować daną teorię*. Homologię symplicjalną definiujemy dla kompleksu symplicjalnego $K$: sklejamy wierzchołki, odcinki, trójkąty i sympleksy wyższych wymiarów wzdłuż ich ścian. Taki kompleks *nie musi być rozmaitością*. Na przykład dwa wypełnione trójkąty stykające się tylko w jednym wierzchołku tworzą kompleks, ale otoczenie wspólnego wierzchołka nie przypomina dysku ani półdysku: po usunięciu tego wierzchołka ma dwie składowe, podczas gdy dysk oraz półdysk po usunięciu punktu środkowego, odpowiednio punktu na prostym brzegu, pozostają spójne. Mimo to łańcuchy, operator brzegu $\partial$ i grupy $H_k^{\mathrm{simp}}(K;\mathbb{Z})$ są określone.




Rysunek 10.5: Dwa trójkąty ze wspólnym wierzchołkiem $p$. To kompleks symplicjalny, ale w $p$ nie jest powierzchnią gładką, nawet z brzegiem.

Homologia singularna idzie jeszcze dalej: jej sympleksy są *ciągłymi odwzorowaniami* $\Delta^k \to X$, dlatego definiuje się ją dla dowolnej przestrzeni topologicznej $X$, również bez wybranej triangulacji. Kohomologia de Rhama wymaga natomiast *gładkiej rozmaitości* $M$: żeby pisać formy i ich różniczkę d, potrzebujemy przestrzeni stycznych i gładkich odwzorowań. Dla kompleksu z Rysunku 10.5 zwykła kohomologia de Rhama w sensie Definicji 10.8.1 nie jest zdefiniowana. Grupy homotopii można z kolei definiować dla przestrzeni topologicznych z wybranym punktem bazowym.

Do czego służą te niezmienniki, jeśli słowo „dziura” nie daje jeszcze ścisłej odpowiedzi? Pozwalają rozstrzygać, czy cykl jest brzegiem, czy zamknięta forma jest różniczką innej formy, czy pętlę albo odwzorowanie sfery można ściągnąć do punktu. Pomagają też odróżnić przestrzenie oraz badać odwzorowania między nimi. Istotny jest zarówno obiekt, od którego zaczynamy, jak i relacja uznająca dwa takie obiekty za równoważne:

| Typ | Na czym konstruowana | Co wykrywa i o czym mówi |
|---|---|---|
| $H_k^{\mathrm{simp}}(K;\mathbb{Z})$, homologia symplicjalna | Zorientowane sympleksy kompleksu $K$, całkowite łańcuchy, operator brzegu $\partial$; cykle modulo brzegi. | Rozpoznaje składowe ($H_0$), klasy cykli, które nie są brzegami, ich liczbę niezależnych generatorów i torsję. Na zamkniętej spójnej rozmaitości jej najwyższa homologia z $\mathbb{Z}$ pomaga rozpoznać orientowalność. |
| $H_k^{\mathrm{sing}}(X;\mathbb{Z})$, homologia singularna | Wszystkie ciągłe odwzorowania $\Delta^k \to X$ jako generatory łańcuchów; ten sam operator $\partial$ i iloraz cykli przez brzegi. | Daje homologiczne informacje bez wybierania triangulacji, dla dowolnej przestrzeni topologicznej. Ciągłe $f : X \to Y$ wyznacza $f_* : H_k(X) \to H_k(Y)$; można nim badać, jak odwzorowanie przenosi klasy cykli. |
| $H^k_{\mathrm{dR}}(M)$, kohomologia de Rhama | Gładkie formy różniczkowe na rozmaitości $M$, różniczka d; formy zamknięte modulo dokładne. | Mówi, czy zamknięta forma ma *globalnie* formę pierwotną. Całki po cyklach mierzą jej okresy; iloczyn zewnętrzny form pozwala badać iloczyny klas. Zwykła wersja ma wartości rzeczywiste, więc nie wykrywa torsji. |
| $\pi_1(X,p)$, grupa podstawowa | Pętle o początku i końcu w $p$; utożsamiamy pętle homotopijne, a działaniem jest ich składanie. | Mówi, których pętli nie można ściągnąć do punktu. Zawiera informację o nakryciach i może być nieprzemienna; przez to odróżnia przestrzenie o tym samym $H_1$. |
| $\pi_k(X,p)$, $k \geq 2$, wyższe grupy homotopii | Odwzorowania sfer $S^k \to X$ z punktem bazowym, modulo homotopia zachowująca ten punkt. | Mówią, czy odwzorowanie sfery można ściągnąć do punktu (równoważnie: przedłużyć na dysk $D^{k+1}$). Mogą być niezerowe, nawet gdy $H_k(X;\mathbb{Z}) = 0$. |

Na przykład $H_1$ pozwala wykazać, że nie istnieje retrakcja dysku $D^2$ na jego brzeg $S^1$: gdyby $r : D^2 \to S^1$ i inkluzja $i : S^1 \to D^2$ spełniały $r \circ i = \mathrm{id}$, to na homologii byłoby $r_* \circ i_* = \mathrm{id}$ na $H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Jest to niemożliwe, bo $H_1(D^2;\mathbb{Z}) = 0$. Kohomologia de Rhama rozstrzyga, czy da się zbudować globalny potencjał dla zamkniętej formy, a $\pi_1$ pomaga opisać nakrycia. „Dziury" są więc tylko jednym z obrazowych skrótów dla tych konkretnych pytań.

Różni się też koszt rachunku. Bez triangulacji kompleks łańcuchów singularnych ma ogromnie wiele generatorów. Skończona triangulacja sprowadza homologię symplicjalną do macierzy operatorów brzegu, lecz znalezienie odpowiedniej triangulacji i obliczenie jąder oraz obrazów bywa trudne. Formy pozwalają czasem wykorzystać współrzędne i symetrie rozmaitości, choć ustalenie, czy forma ma *globalną* formę pierwotną, także wymaga pracy. Nie ma jednej metody zawsze najłatwiejszej.

## Od sympleksów do całek

W tej części $H_k^{\mathrm{simp}}$ oznacza tę samą homologię, którą wcześniej zapisywaliśmy $H_k^{\Delta}$, a $H_k^{\mathrm{sing}}$ to wcześniejsze $H_k$ przestrzeni. Indeksy służą tylko odróżnieniu konstrukcji w porównaniu. Dla triangulacji $K$ Twierdzenie 8.5.3 utożsamia $H_k^{\mathrm{simp}}(K;\mathbb{Z})$ z $H_k^{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{Z})$: wynik nie zależy od wyboru triangulacji, chociaż liczba i kształt sympleksów od niej zależą. Dla nieskończonej, lokalnie skończonej triangulacji stosujemy ten sam wynik do skończonych podkompleksów: skończony łańcuch symplicjalny ma skończony nośnik, a obraz każdego łańcucha singularnego jest zwarty, więc spotyka tylko skończenie wiele sympleksów. To dotyczy także łańcuchów wypełniających; izomorfizmy na skończonych podkompleksach dają więc zarówno surjektywność, jak i iniektywność porównania globalnego. Cyklem jest łańcuch $z$ z $\partial z = 0$. Jeżeli $z = \partial c$, to reprezentuje zero w homologii. W najprostszym przykładzie trzy krawędzie obwodu trójkąta tworzą 1-cykl. Jeśli pozostawimy sam obwód, nie ma 2-sympleksu, którego ten cykl byłby brzegiem, i $H_1 \cong \mathbb{Z}$.

Jeśli dodamy wypełniony trójkąt, ten sam cykl staje się jego brzegiem:

$$\partial[v_0v_1v_2] = [v_1v_2] - [v_0v_2] + [v_0v_1].$$

Wtedy $H_1 = 0$. To dosłowny sens „wykrycia dziury" przez homologię. Na okręgu jedno pełne obejście daje generator $H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$; na $S^2$ cała zorientowana powierzchnia daje generator $H_2(S^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$.

Klasa zamkniętej formy przypisuje liczby klasom cykli: całkujemy formę po cyklu. Wybieramy przy tym gładkiego reprezentanta całej klasy cyklu, co uzasadniono w dowodzie Twierdzenia 10.9.2. Taką liniową regułę przypisującą wektorom liczby nazywamy *funkcjonałem liniowym*. Właśnie w tym sensie kohomologia de Rhama wiąże się z homologią. Jeśli $\mathrm{d}\omega = 0$ i $\partial z = 0$, definiujemy

$$\langle [\omega], [z] \rangle := \int_z \omega. \tag{10.10.1}$$

Zmiana $\omega$ o $\mathrm{d}\eta$ zmienia całkę o $\int_{\partial z} \eta = 0$; zmiana $z$ o $\partial c$ zmienia ją o $\int_c \mathrm{d}\omega = 0$. Jest więc dobrze określona na klasach po obu stronach. To dokładnie rachunek Stokesa (10.9.1).

Czy *każdą* funkcję liniową przypisującą klasom homologii liczby rzeczywiste można otrzymać przez całkowanie zamkniętej formy? Twierdzenie de Rhama daje odpowiedź twierdzącą. Aby zobaczyć, skąd bierze się ta odpowiedź, pokażmy najpierw krok algebraiczny. Dla kompleksu łańcuchowego przestrzeni wektorowych nad $\mathbb{R}$ kołańcuch $c : C_k \to \mathbb{R}$ jest kocyklem ($\delta c = 0$) dokładnie wtedy, gdy znika na $B_k = \partial C_{k+1}$. Jego ograniczenie do $Z_k = \ker(\partial : C_k \to C_{k-1})$ zależy więc tylko od klasy w $H_k = Z_k/B_k$. Jeżeli ten funkcjonał na $H_k$ jest zerowy, to $c$ znika na całym $Z_k$. Definiujemy na $B_{k-1} = \partial C_k$ funkcjonał $b(\partial a) := c(a)$. Jest dobrze określony: z $\partial a = \partial a'$ wynika $a - a' \in Z_k$, a zatem $c(a) = c(a')$. Rozszerzamy $b$ liniowo na $C_{k-1}$. Wtedy $(\delta b)(a) = b(\partial a) = c(a)$, czyli $c$ był kobrzegiem. Odwrotnie, każdy funkcjonał $\lambda : H_k \to \mathbb{R}$ definiuje funkcjonał na $Z_k$, który można liniowo przedłużyć na $C_k$; ponieważ znika na $B_k$, przedłużenie jest kocyklem. Dowiedliśmy zatem

$$H^k_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k^{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}),\mathbb{R}).$$

Symbol $\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(V,\mathbb{R})$ oznacza przestrzeń *wszystkich* funkcjonałów liniowych $V \to \mathbb{R}$: każdy przypisuje wektorowi z $V$ liczbę rzeczywistą i zachowuje dodawanie oraz mnożenie przez skalar. Łącząc to z Twierdzeniem 10.9.2 i porównaniem symplicjalnym, otrzymujemy dla triangulowanej rozmaitości

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k^{\mathrm{simp}}(K;\mathbb{R}),\mathbb{R}), \tag{10.10.2}$$

przy czym izomorfizm jest dany przez całkę z (10.10.1). Jeśli grupy homologii są skończenie generowane, wymiar $H^k_{\mathrm{dR}}$ to $k$-ta liczba Betti'ego, czyli liczba swobodnych generatorów $H_k(M;\mathbb{Z})$. Forma nie zobaczy torsji: gdy $nz = \partial c$ dla $n \neq 0$, to dla zamkniętej $\omega$ mamy $n\int_z \omega = \int_c \mathrm{d}\omega = 0$, więc $\int_z \omega = 0$.

Wybór współczynników wyjaśnia tu ważną różnicę. Według Twierdzenia 6.8.5 przejście z $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ zachowuje liczby Betti'ego, lecz usuwa torsję; Przykład 8.7.7 pokazuje to dla $\mathbb{RP}^2$ i torusa. Zwykły kompleks form de Rhama jest rzeczywisty i oblicza $H^k_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R})$. Jeśli dopuścimy formy zespolone, $\Omega^\bullet(M;\mathbb{C}) = \Omega^\bullet(M;\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, otrzymamy analogicznie $H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}) \cong H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. Współczynniki $\mathbb{Q}$ stosujemy bezpośrednio w łańcuchach i kołańcuchach singularnych; nie wymagają one osobnej teorii gładkich form o wymiernych współczynnikach.

### Od sfer do cykli

W tym porównaniu zakładamy, że $M$ jest spójna drogowo; w przeciwnym razie pracujemy na składowej zawierającej $p$. Element $\pi_k(M,p)$ jest klasą odwzorowania $(S^k,*) \to (M,p)$. Po

przeniesieniu generatora $H_k(S^k;\mathbb{Z})$ otrzymujemy klasę w $H_k(M;\mathbb{Z})$: to odwzorowanie Hurewicza $h_k$ z Rozdziału 9. W stopniu 1 dokładna odpowiedź z Twierdzenia 9.4.1 brzmi

$$H_1(M;\mathbb{Z}) \cong \pi_1(M,p)_{\mathrm{ab}}.$$

Komutatory pętli znikają po przejściu do homologii, ponieważ dodawanie cykli jest przemienne; $\pi_1$ może być nieprzemienna. W wyższych stopniach $h_k$ nie musi być izomorfizmem. Dla $k \geq 2$, gdy $M$ jest $(k-1)$-spójna, Twierdzenie 9.6.6 utożsamia pierwszą możliwą niezerową grupę $\pi_k(M)$ z $H_k(M;\mathbb{Z})$. Aby zastosować tu wersję twierdzenia dla kompleksów CW, używamy dodatkowego twierdzenia o triangulacji gładkich rozmaitości: każda taka rozmaitość dopuszcza lokalnie skończoną triangulację, a przy brzegu można wybrać $\partial M$ jako podkompleks. Sympleksy tej triangulacji są komórkami CW. Istnienie triangulacji jest osobnym wynikiem topologii różniczkowej, nie konsekwencją de Rhama; jego dowód wykracza poza to porównanie. Źródło wskazano w dalszej lekturze. W rozważanych przykładach okręgu, sfer, torusa i przestrzeni rzutowej strukturę CW znamy już jawnie z wcześniejszych rozdziałów. Teza dotyczy właśnie pierwszego niezerowego stopnia przy podanej spójności; nie utożsamia wszystkich późniejszych grup.

**Przykład 10.10.1** (Ta sama informacja w stopniu pierwszym)**.** Na $S^1$ zachodzi $\pi_1(S^1) \cong H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, a $H^1_{\mathrm{dR}}(S^1) \cong \mathbb{R}$. Klasa formy $\vartheta/(2\pi)$ z Przykładu 10.8.3 daje wartość 1 na dodatnim generatorze homologii. Liczba całkowita zlicza okrążenia, a całka z formy przypisuje im liczby rzeczywiste w sposób liniowy.

**Przykład 10.10.2** (Ta sama pierwsza homologia, różne grupy podstawowe)**.** Torus $T^2$ ma $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$. Jeśli usuniemy otwarty dysk o domknięciu zawartym we wnętrzu jego dwuwymiarowej komórki, otrzymamy zwartą powierzchnię z brzegiem $P = T^2 \setminus \operatorname{int} D^2$. W modelu komórkowym z Przykładu 7.6.8 część dwuwymiarowa po usunięciu dysku ściąga się na część jednowymiarową $S^1 \vee S^1$. Dlatego $\pi_1(P) \cong F_2$, wolna nieprzemienna grupa na dwóch generatorach, podczas gdy $H_1(P;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$. Zarówno $P$, jak i $T^2$ mają więc $H^1_{\mathrm{dR}} \cong \mathbb{R}^2$: w stopniu pierwszym formy i homologia nie wykrywają nieprzemienności $\pi_1(P)$. Pełne grupy homologii tych przestrzeni różnią się jednak w stopniu 2: $H_2(P;\mathbb{Z}) = 0$, a $H_2(T^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$.

**Przykład 10.10.3** (Informacja sferyczna bez klasy homologii)**.** Dla $\mathbb{RP}^2$ wcześniejsze obliczenia dają

$$\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2, \qquad \pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(\mathbb{RP}^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2, \qquad H_2(\mathbb{RP}^2;\mathbb{Z}) = 0.$$

Porównaj Przykłady 9.7.3 i 8.7.5. Nakrycie $S^2 \to \mathbb{RP}^2$ pozostawia nietrywialną klasę w $\pi_2$, ale jej obraz przez $h_2$ jest zerowy. Dodatkowo $H^k_{\mathrm{dR}}(\mathbb{RP}^2) = 0$ dla każdego $k > 0$: całki form nie wykryją ani torsji w $H_1$, ani tej klasy sferycznej. Jest to wyraźny przykład, dlaczego trzech teorii nie wolno po prostu utożsamiać.

*Dalsza lektura:* Notatki kursu *Geometry of Manifolds* (MIT OpenCourseWare), wykłady o formach, twierdzeniu Stokesa i twierdzeniu de Rhama. Zob. także notatki o formach różniczkowych i twierdzeniu Stokesa Uniwersytetu w Toronto. Porównanie z homologią i homotopią rozwija Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdziały 2–4. Twierdzenie o triangulacji rozmaitości gładkich omawia Jacob Lurie w notatkach *Whitehead Triangulations*, wykład 3 i kolejnych wykładach tego kursu.

# Indeks


Algebra abstrakcyjna, 116
Algebra Clifforda, 104
Algebra symetryczna, 88
Algebra tensorowa, 86
Algebra zewnętrzna, 88

Brzeg rozmaitości, 11

Całka z formy o zwartym nośniku, 196
ciało, 122
ciało ułamków, 128
ciąg dokładny
    rozszczepiony, 121
Cofnięcie pola tensorowego, 96
CW-kompleks, 157
Cykle, brzegi i grupy homologii, 133

Dokładność ciągu, 131
Dołączenie komórki, 156
Drogi, pętle i homotopia dróg, 147
drzewo
    grafowe, 155
działanie grupy
    przez automorfizmy, 120
dziedzina całkowitości, 122

Filtracja kompleksu, 141
Forma różniczkowa, 189
Formy i ich wartości, 189

graf, 155
Grassmannian zorientowany, 102
grupa
    iloczyn prosty, 120
    iloczyn półprosty, 120
grupa afiniczna
    jako iloczyn półprosty, 121
grupa diedralna
    jako iloczyn półprosty, 121
grupa euklidesowa
    jako iloczyn półprosty, 121
grupa homotopii, 174
Grupa i homomorfizm, 116
Grupa Pin, 107
grupa podstawowa, 146
grupa ruchów euklidesowych, 121
Grupa Spin, 99, 107
Grupa wolna, 116
Grupa wolna i iloczyn wolny, 117
Grupy względne i zredukowane, 163

Homologia, 131
Homologia singularna, 162
Homotopia i równoważność homotopijna, 146
Homotopia łańcuchowa, 138

Ideał, 122
iloczyn prosty grup, 120
iloczyn półprosty grup, 120
    wewnętrzny, 121
Iloczyn tensorowy modułów, 126
Izomorfizm wiązek wektorowych, 36

Kiełek funkcji, 31
Kohomologia de Rhama, 200
Kompleks kołańcuchowy i kohomologia, 136
Kompleks komórkowy, 170
Kompleks łańcuchów symplicjalnych, 160
Kompleks łańcuchowy, 133
Kontrakcja, 86
Kontrakcja i pochodna Liego, 191
Krótki ciąg dokładny, 131

Lokalna spójność i warunek półlokalny, 151

modul ilorazowy
    wymiar, 125
Moduł ilorazowy, 124
Moduł nad pierścieniem, 122

Nakrycie i arkusze, 149
Nasycenie zbioru, 5

Odwzorowanie Hurewicza, 183
Odwzorowanie łańcuchowe, 133
Orbita i nasycenie przez przepływ, 73
Orientacja, 193
Orientacja brzegu: normalna na zewnątrz, 194

Pierścień, 122

Pochodna Liego dowolnego pola tensorowego, 96
Podgrupa normalna i iloraz, 116
Podmoduł, homomorfizm, moduł wolny, 123
Pole tensorowe, 94
pole wektorowe, 61
Prezentacja grupy, 116, 119
Przestrzeń rzutowa
    wiązka tautologiczna, 39

ranga modułu, 130
    addytywność, 130
redukcja słowa, 117
Retrakt deformacyjny, 146
Rozmaitość, 4
Rozmaitość gładka, 10
Rozmaitość gładka z brzegiem, 11
rozszerzenie grup
    rozszczepione, 121

Sekcja wiązki wektorowej, 35
Skończony kompleks symplicjalny, 154
Słaba równoważność homotopijna, 181
słowo w grupie wolnej, 117
Spinor zespolony, 110
Spójność homotopijna, 177
Stopień odwzorowania sfer, 170
Struktura różniczkowa, 10
Struktura spinowa i wiązka spinorów, 113
Suma i wiązka dualna, 47
Symetryzator i antysymetryzator, 87
Sympleks standardowy i ściany, 154

tensor, 80
Topologia ilorazowa, 5
Trywializacja wiązki, 35

Wiązka tautologiczna, 101
Wiązka tautologiczna, 39
Wiązka wektorowa, 35
    trywialność globalna, 36
    trywialność lokalna, 36
Wiązka wektorowa
    wstęga Möbiusa, 36
Własność uniwersalna, 80
Wstęga Möbiusa, 36
    nietrywialność, 38
Wyznacznik operatora, 91
Względne grupy homotopii, 176