



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Leversjukdomar



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Upplägg

**Anatomi, symtom och tecken på leversjukdom,
diagnostik, behandling, omvårdnad**





Leverns funktioner

Nedbrytning

Syntes av ämnen

Lagring

Blodtrycksreglering



Mittuniversitetet

MID SWEDEN UNIVERSITY



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anatomi och fysiologi



Leversjukdom

- Akut leversvikt kan debutera på några dygn.
- Långvarig leversvikt kan utvecklas under flera år.
- Levercirros.
- Portal hypertension.
- Försämrad leverfunktion medför minskad metabolism av galla, bilirubin, läkemedel och toxiska substanser.



Vanligaste orsakerna till levercirros i Sverige

- Alkoholmissbruk
- Långvarig virushepatit
- Icke-alkoholorsakad steatohepatit
- Immunologiska lever-/gallvägssjukdomar
- Kryptogen levercirros
- Ärftliga sjukdomar, exempelvis genetisk hemokromatos och alfa-1-antitrypsinbrist



Patient med leversjukdom

Ikterus - gulsot




Patient med leversjukdom

← Encefalopati – störd hjärnfunktion
sekundärt till sviktande
leverfunktion



Patient med leversjukdom


Esofagusvaricer (åderbräck i matstrupen) – kan brista och orsaka livshotande blödningar





Patient med leversjukdom


Flapping tremor – korta ryckiga rörelser i händerna när armarna sträcks ut, händerna böjs bakåt och patienten spretar med fingrarna





Patient med leversjukdom

Ascites – ansamling av vätska i buken





Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Patient med leversjukdom

Klintman & Bengtsson, Omvårdnad
och medicin, 2016

Diagnostik

Anamnes

Klinisk
bild

Laboratorie-
prover

Bilddiagnostiska
undersökningar

Leverbiopsi

Laboratorie- prover

Laboratorieprov	Normalvärde
ASAT	0,25-0,6 µKat/l
ALAT	0,15-0,75 µKat/l
ALP	0,6-1,8 µKat/l
Bilirubin	5-25 µmol/l
Gamma-GT	0,15-1,2 µKat/l
PK eller INR	< 1,3
Albumin	36-45 g/l
Immunoglobuliner	
ANA, SMA, AMA	
Hfe-genotyp	
Anti-HAV, HbsAg, anti-HCV	
CDT, PEth	
Alfa-1-antitrypsin, ceruloplasmin	
AFP, CA19-9	

Bilddiagnostiska
undersökningar

Metod

Ultraljudsundersökning

Datortomografi (DT)

Magnetresonanstomografi (MRT)

Magnet-resonanskolangiopankreatikografi (MRCP)

Endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP)

Leverbiopsi

- Vävnadsprov tas från levern.
- NSAID-preparat och antikoagulantia sätts ut inför ingreppet.
- Blodgruppering samt aktuellt svar på Hb, trombocyter, PK och APT-tid ska finnas inför ingreppet.
- **Blödningsrisk.** Patienten ska ligga stilla och puls- och blodtryckskontroller tas under ett par timmar efteråt.



Elastografi

är en nyare metod att mäta vävnadsskada. Metoden liknar en ultraljudsundersökning och mäter en vävnads elasticitet och täthet. Icke-invasiv metod med färre risker än leverbiopsi. Dock inte lika träffsäkert.



Gradering av svårighetsgrad av leversjukdom

Tabell 16.2 Child-Pughindex vid långvarig leversjukdom (Pugh m.fl. 1973; D'Amico, Garcia-Tsao & Pagliaro 2006).

Faktor	Poäng		
	1	2	3
Encefalopatigrad	Ingen	1-2	3-4
Ascites	Ingen	Lätt	Måttlig
Bilirubin ($\mu\text{mol/l}$)	< 35	35-50	> 50
S-Albumin (g/l)	> 35	28-35	< 28
PK-INR	< 1,3	1,3-1,8	> 1,8
Child-Pughgrad	A = 5-6 poäng	B = 7-9 poäng	C = 10-15 poäng
1 år	84 %	62 %	42 %
5 år	44 %	20 %	21 %



Behandling

Portal hypertension och esofagusvaricer

- Behandla grundsjukdomen.
- Mål att sänka trycket i portakretsloppet.
- Betablockad.
- Gummibandsligering.
- TIPS (transjugular intrahepatisk portosystemisk stent/shunt).



Behandling

Ascites

- Behandla grundsjukdomen.
- Vätskedrivande läkemedel.
- Eventuellt vätskerestriktion.
- Ascitestappning, paracentes.
 - Tillförsel av albumin.



Behandling

Leverencefalopati

- Behandla de faktorer som utlöser encefalopati.
- Laktulos. Målet är att patienten ska ha 1-3 ordentliga avföringar/dag. (Vid medvetslöshet, laktuloslavemang.)
- Ibland ges antibiotika.

Viktigt att uppmärksamma förändringar i patientens mentala tillstånd!



Behandling

Ikterus

- Behandla grundsjukdomen.
- Lindra klådan med exempelvis kolestyramin som binder gallsalterna, Rifampicin, opioidantagonister, sertralin, plasmaferes.

Lösa, svala kläder kan lindra klådan. Att duscha kallt med olja i stället för tvål kan också lindra liksom att undvika att frottera huden med handduk efter dusch.



Levertransplantation

- De vanligaste indikationerna för levertransplantation är i Sverige:
 - Primär skleroserande kolangit
 - Hepatocellulär cancer
 - Alkohol- och hepatit C-orsakad cirros
 - Akut leversvikt

Levertransplantation forts.

- Relativa eller absoluta kontraindikationer:
 - Spridd, obotbar malignitet
 - Komplett trombos i vena porta och vena mesenterica

Ålder, andra sjukdomar samt pågående missbruk vägs också in.



NUTRITION

LEVNADS-
VANOR

LÄKEMEDEL