



Farmakologi T3

Farmakologi behandling av höga kolesterol och triglyceridnivåer



Läkemedel för behandling av höga kolesterol och triglyceridnivåer

- Kolesterol och i synnerhet LDL kolesterol har en avgörande roll vid uppkomsten av ateroskleros
- Många epidemiologiska undersökningar har påvisat ett samband mellan graden av dyslipidemi och risken att utveckla ischemisk hjärtsjukdom
- Målet med läkemedelsbehandlingen är att reducera nivåerna av kolesterol och triglycerider

Läkemedelsgrupp Statiner

- Vid farmakologisk behandling av höga kolesterolnivåer är läkemedelsgruppen Statiner förstahandsval. Används både vid primär och sekundärprevention vid hjärt- och kärlsjukdom
- Livslång behandling
- Hämmar ett enzym som är med i tillverkningen av kolesterol i levern



Biverkningar

- Dosrelaterade
- Illamående
- Myalgi
- Stegring av kreatininkinas (CK)
- **Rhabdomyolys**
- Leverpåverkan = Transaminasstegring



Det finns flera olika CYP- enzymer i levern som metaboliserar läkemedel.

Statiner metaboliseras av CYP- enzymet 3A4 som kan hämmas av läkemedel som metaboliseras av samma enzym. Kombination av dessa läkemedel tillsammans kan minska nedbrytningen av Statiner.

Det ger ökad risk för höga plasma koncentrationer av Statiner som kan leda till mer eller mindre allvarliga biverkningar.

Observera biverkningar om patienter sätts in på andra läkemedel som metaboliseras av samma CYP-enzym, tex läkemedlen:

Erytromycin

Diltiazem

Verapamil

Svamp och HIV-medel.

Läs in er på läkemedelsgruppen Statiner

Övriga läkemedelsgrupper som presenteras vidare i Åhörarkopian
behöver ni endast känna till inför erat kommande yrke som
sjuksköterska

Läkemedelsgrupp Fibrater

- Minskar nivåer av triglycerider.
- Frisättningen av VLDL från levern minskar
- HDL produktionen stimuleras
- Olämpligt att kombinera med statiner

Läkemedelsgrupp Selektiva kolesterolupptagshämmare

- Hämmar upptaget av Kolesterol i tarmen
- Minskade nivåer av LDL i blodet
- Tilläggsbehandling
- Få rapporterade biverkningar – nytt medel



Läkemedelsgrupp Resiner

- Resiner binder gallsyror i tarmen så att gallsyrorna försvinner ur kroppen med avföringen i stället för att tas upp i blodet. Då används kroppens överskott av kolesterol för att bilda nya gallsyror, och på så sätt minskar kolesterolhalten i blodet.
- Resiner minskar mängden LDL-kolesterol.
- Kan användas om man inte kan använda Statiner



Läkemedelsgrupp PCSK9-hämmare

- Minskar nedbrytningen av LDL-receptorer i levern vilket ökar upptaget av LDL i levern
- Till svårbehandlade patienter eller de med Familjär hyperkolesterolemi
- Ges som injektioner

Läs in er på läkemedelsgruppen Statiner och övriga läkemedelsgrupper behöver ni känna till inför erat kommande yrke som sjuksköterska



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Läkemedelsgrupp	Aktiv substans	Ex på preparat	Verkan
Statiner	Simvastatin Atorvastatin Pravastatin Fluvastatin	Zocord Lipitor Pravachol Lescol	Hämmar det viktigaste enzymet i produktionen av kolesterol
Fibrater	Gemfibrozil Bezafibrat	Lopid Bezalip	Ökar avlägsnandet av trigly, ökar produktion av HDL, minskar frisättning av VLDL i levern
Selektiva kolersterolupptag hämmare	Ezetmib	Ezetrol	Reducerar upptaget av kolesterol i tarmen
Resiner	Kolepistol	Lestid	Ökar utsöndring av gallsyror
	Kolestyramin	Questran	Reducerar utsöndringen av gallsyra och kolesterol i tarmen
PCSK9-hämmare	Evolokumab Alirokumab	Repatha Praluent	Minskar nedbrytningen av LDL-receptorer i levern och därmed ökar upptag av LDL från blodet.