



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 2	2 0 2 4 - 0 3 - 1 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen i farmakologi - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-03-18

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Para ihop rätt diuretika med rätt verkningsställe.

	Loop-diuretika	Tiazider	Kaliumsparande diuretika
Henles slynga	☐	☐	☐
Första delen av distala tubuli	☐	☐	☐
Sista delen av distala tubuli	☐	☐	☐

Totalpoäng: 1.5

2 ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. Välj det alternativ som bäst beskriver vad torrhostan beror på.**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ ACE-hämmare ökar produktionen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta
- ☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin-produktionen, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta
- ☐ ACE-hämmare hämmar nedbrytningen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta
- ☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin från att tas upp i blodbanan, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge en vasokonstriktion i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

Totalpoäng: 1

3 Vilken av följande läkemedelsgrupper syftar till att höja blodtrycket.**Välj ett alternativ:**

- ☐ Muskarina agonister
- ☐ Betareceptorantagonister
- ☐ Adrenerga agonister
- ☐ ACE-hämmare
- ☐ Loopdiuretika

Totalpoäng: 1

4 Vid vilket medicinskt tillstånd kan användningen av trombolytiska läkemedel vara farlig eller kontraindicerad?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Vid hypertoni
- ☐ Vid högt kolesterol
- ☐ Vid symptom på hjärt-kärlsjukdom
- ☐ Vid en aktiv inre blödning

Totalpoäng: 1

5 Vilket påstående stämmer bäst varför Acetylsalicylsyra ger ökad blödningsrisk:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Förhindrar den fibrinolytiska processen
- ☐ Förhindrar trombocyters aggregation till varandra
- ☐ Förhindrar fibrinogen att binda in till trombocyterna
- ☐ Förhindrar koagulationsfaktorer att aktiveras

Totalpoäng: 1

6 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ International normalized Ratio (INR)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)

Totalpoäng: 1

7 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Adenosindifosfatreceptorhämmare
- ☐ Statiner
- ☐ Beta 2 antagonist
- ☐ ACE-hämmare

Totalpoäng: 1

8 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☐ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar

Totalpoäng: 1

9 Vilken är den främsta orsaken till att nitroglycerin har god effekt vid angina pectoris?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Kontrahering av vener ger ökad diastoliskt tryck
- ☐ Kontrahering av njurartärerna ger ökande urinmängder
- ☐ Dilatering av vener ger minskad diastoliskt tryck
- ☐ Dilatering av njurartärerna ger minskade urinmängder

Totalpoäng: 1

10 Beskriv vad som skiljer Tiazider från Loop-diuretika i relation till effektens inträde och diures.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 11 Ange en allvarlig konsekvens som kan uppstå vid en överdosering av kaliumsparande diuretika? Förklara hur denna konsekvens uppstår.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x |   |    |   | Ω   |

Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 2

12 Beskriv skillnaden mellan var ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister (ARB) verkar i RAAS-systemet.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 2

13 Förklara varför icke-selektiva betablockerare inte är lämpliga läkemedel för astmatiker.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 14 **Förklara** orsaken till att det rekommenderas ett dosuppehåll på 10–12 timmar vid kontinuerlig nitroglycerinbehandling med långtidsverkande depåtabletter?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | Ω |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

- 15 Ange två (2) läkemedelsnamn (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen trombocyttaggregationshämmande läkemedel.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | Ω |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

16 Beskriv indikationen för läkemedelsgruppen Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK):**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | Ω |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1