



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 4 - 0 4 - 0 2
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund****Tentamen MV037G, 5hp****2024-04-02****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

Instruktion

Via miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Arne har på grund av folatbrist drabbats av anemi. Vad heter den typ av anemi Arne drabbats av?
1p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | | |

Arne har drabbats av megaloblastanemi (eller makrocytär anemi). Vid folatbrist hämmas DNA-syntesen i de röda blodkropparna, vilket gör att de inte delar sig normalt utan istället blir onormalt stora och omogna.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 2** Nämn två (2) vanliga orsaker till varför en person drabbas av denna typ av anemi. **0,5 p / rätt svar. Max 1p.**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | | Σ |

Två vanliga orsaker till detta är bristfälligt intag via kosten (t.ex. för lite grönsaker) och malabsorption i tarmen (exempelvis vid celiaki eller alkoholmissbruk).

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 3** Myelom är en typ av blodcancer. Vilken typ av celler bildas ohämmat vid myelom? Välj rätt svarsalternativ. **1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Trombocyter
- ☐ Röda blodkroppar
- ☐ Röda och vita blodkroppar
- ☒ Plasmacellerna

Totalpoäng: 1

- 4 Vid leukemi drabbas personen av flera symtom som är viktiga att vara observant på som sjuksköterska.

0,5 p per rätt svar. Max 2p.

Para ihop rätt ord med rätt förklaring.

	Kan resultera i långdragna halsinfektioner eller andra infektioner.	Brist gör att man blöder lättare. Det kan visa sig som på konstiga ställen.	Blek hy	Blödningar under huden, försvinner ej vid tryck.
Petekier	☐	☐	☐	☒
För få blodplättar (trombocyter)	☐	☒	☐	☐
Brist på mogna vita blodkroppar	☒	☐	☐	☐
En minskad mängd hemoglobin (HB) eller minskat antal erytrocyter i blodet	☐	☐	☒	☐

Totalpoäng: 2

5 Ella-Britt har drabbats av en hjärtinfarkt. Har sedan tidigare hypertension.

1. Vilka skyddsfaktorer finns för att inte drabbas av hjärt-kärl sjukdom såsom hjärtinfarkt och hypertension?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Hög alkoholkonsumtion
- ☐ Rökning
- ☐ Bukfetma
- ☒ Hög konsumtion av frukt och grönsaker

Ateroskleros är en av de orsaker som finns som kan utlösa exempelvis en hjärtinfarkt.

2. Vilka typer av kärl drabbas av ateroskleros?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Kan utvecklas i både venösa och arteriella kärl
- ☐ Olika på olika människor, drabbar vissa i venösa kärl och andra i artärer
- ☐ Drabbar enbart venösa kärl
- ☒ Drabbar enbart artärer

3. Vad betyder hypertension på svenska?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Typ A -beteende
- ☐ Låg andningsfrekvens
- ☐ Hög andningsfrekvens
- ☐ Lågt blodtryck
- ☒ Högt blodtryck

Totalpoäng: 1.5

- 6 Ella-Britt har en hjärtinfarkt och får i efterförloppet besvär med kärlkramp.

Ange tre typiska/vanliga symtom vid kärlkramp. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Tre typiska symtom vid kärlkramp är tryckande eller krampande bröstsmärta, utstrålning mot vänster arm eller käke samt andnöd (dyspné). Symtomen utlöses ofta av fysisk ansträngning eller emotionell stress och lindras vanligtvis vid vila eller intag av nitroglycerin.

Vad heter kärlkramp på medicinskt språk? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Kärlkramp heter angina pectoris på medicinskt språk.

Kärlkramp kan vara stabil eller instabil.

Vad är karakteristiskt för en instabil angina. (1p)

Skriv in ditt svar här

Instabil angina karaktäriseras av bröstsmärta som uppstår vid vila, har ett nydebuterat förlopp eller uppvisar en ökad intensitet och frekvens jämfört med tidigare. Det är ett allvarligt tillstånd som ofta beror på en plackbristning och som inte lindras av vila på samma sätt som stabil angina.

Totalpoäng: 3

- 7 När man har haft en hjärtinfarkt finns en risk att man utvecklar en hjärtsvikt.

Ange det blodprov som är hjärtsviktsspecifikt och tas vid misstanke om hjärtsvikt. (0,5p)

Det hjärtsviktsspecifika blodprovet som tas är NT-proBNP (eller BNP). Detta prov mäter nivåerna av ett hormon som frisätts från hjärtmuskeln när hjärtat utsätts för ökad belastning eller uttänjning.

Ange två specifika tecken/symtom vid enbart en högerkammarsvikt. (1p)

Två specifika tecken på högerkammarsvikt är perifer ödem (svullna anklar och ben) samt halsvenstas (utspända vener på halsen). Dessa symtom uppstår för att blodet stockar sig bakåt i det systemiska venösa kretsloppet när höger kammare inte orkar pumpa effektivt.

Vid vänsterkammarsvikt kan man ha tungt att andas.

Ange tre omvårdnadsåtgärder som du gör för att patienten ska få det lättare med sin andning. (1,5p)

Hjärtsängsläge: Placera patienten i högt ryggsläge med sänkta fotändar för att minska det venösa återflödet till hjärtat och underlätta lungexpansionen.

Syrgasbehandling: Administrera ordinerad syrgas för att optimera syresättningen i blodet.

Psykologiskt stöd: Stanna hos patienten och skapa lugn, eftersom minskad ångest sänker hjärtats arbetsbelastning och syrebehov.

Välj en av dessa omvårdnadsåtgärder du svarat ovan och förklara varför den åtgärden gör att patienten andas bättre. (2p)

Skriv in ditt svar här

Genom att placera patienten i hjärtsängsläge minskar det venösa återflödet till hjärtat, vilket sänker trycket i lungkretsloppet och motverkar lungödem. Samtidigt gör det upprätta läget att bukorganen sjunker nedåt, vilket ger diafragman mer utrymme att röra sig och därmed ökar lungornas expansionsförmåga.

Totalpoäng: 5

8 Hjärtrytmen på bilden nedan är en arytm, dvs en rytm som inte är normal.

Vilken typ av hjärtrytm ser du på bilden? (1p)



Skriv in ditt svar här

Bilden visar ventrikeltakykardi (VT). Rytmen kännetecknas av breddökade QRS-komplex och en mycket snabb, regelbunden frekvens som utgår från kamrarna.

Ange tre åtgärder du akut gör när du upptäcker att patienten har denna rytm. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Kontrollera medvetande och puls för att avgöra om rytmen är cirkulationsstoppande eller inte.
Larma/påkalla hjälp och hämta akutvagnen inklusive en defibrillator.
Påbörja HLR omedelbart om patienten är pulslös, eller förbered för akut elkonvertering
/läkemedelsbehandling om patienten är vaken men instabil.

Totalpoäng: 2.5

- 9 Pelle är 4 år och har för några veckor sedan fått diagnosen Typ 1 diabetes. Det är nu dags för Pelle att gå tillbaka till förskolan. (2,5p)

Beskriv 3 specifika och tidiga symtom på hypoglykemi som hans föräldrar informerar personalen om. (0,5p/svar, max 1,5 p)

1

darrighet

2

kallsvette

3

blekhet

Förklara hur personalen ska behandla hypoglykemin utifrån ovanstående symtom. (1 p)

Personalen ska direkt ge Pelle snabba kolhydrater, såsom druvsocker eller ett glas juice, för att snabbt höja blodsockernivån. När de akuta symtomen avtagit bör han äta något mer långverkande, exempelvis en smörgås, för att stabilisera värdet över tid. Personalen måste stanna hos honom tills han är helt återställd och därefter kontrollera hans blodsocker igen.

Totalpoäng: 2.5

- 10** Matteus är 14 år och har Typ 1 diabetes. Han tränar fotboll tre kvällar i veckan.

Förklara varför Matteus behöver minska på insulindosen inför fotbollsträningen (1 p)?

Fysisk aktivitet ökar muskelcellernas glukosupptag och gör dem mer känsliga för insulin, vilket sänker behovet av tillfört insulin. Om dosen inte minskas riskerar Matteus att drabbas av hypoglykemi (blodsockerfall) eftersom kroppen förbrukar mer glukos under träningen.

Vilken konsekvens kan det innebära för Matteus om han inte reglerar sin insulindos? (0,5p)

Konsekvensen av att inte reglera insulindosen vid fysisk aktivitet är att Matteus drabbas av hypoglykemi (blodsockerfall). Detta beror på att träningen ökar musklernas glukosförbrukning och insulinkänslighet, vilket i kombination med en för hög insulindos sänker blodsockret till farligt låga nivåer.

Totalpoäng: 1.5

- 11** Diabetes mellitus klassificeras i olika typer. I Sverige beräknas 20–25% av befolkningen ha hereditet för typ 2 diabetes.

Förklara patofysiologin till typ 2 diabetes. (1p)

Vid typ 2-diabetes uppstår insulinresistens, vilket innebär att kroppens celler har en nedsatt känslighet för insulin och därmed svårare att ta upp glukos. Bukspottkörteln försöker initialt kompensera genom att producera mer insulin, men med tiden räcker produktionen inte till för att täcka kroppens behov. Detta leder till en relativ insulinbrist och att blodsockernivån stiger (hyperglykemi).

Totalpoäng: 1

- 12** Som en följd till långvarigt högt plasmaglukos kan mikro- och makrovaskulära senkomplikationer uppstå hos personer med diabetes. Dessa kan förebyggas genom olika egenvårdsåtgärder.

Beskriv 3 förebyggande egenvårdsåtgärder. (0,5p/svar, max 1,5p)

1

noggrann egenkontroll av blodsockret för att nå målvärdet

2

daglig inspektion av fötterna för att förebygga sår

3

rökavvänjning för att skydda kärlen

Totalpoäng: 1.5

- 13** Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)

Blodprovet heter HbA1c (långtidssocker). Det mäter den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste 2–3 månaderna genom att mäta hur mycket glukos som bundit till hemoglobinet i de röda blodkropparna. Provet är centralt både vid diagnostisering och för att följa upp behandlingseffekten över tid.

Förklara betydelsen av detta blodprov kopplat till behandlingen vid diabetes. (1p)

HbA1c-provet mäter det genomsnittliga blodsockret under de senaste 2–3 månaderna och visar hur väl den långsiktiga behandlingen fungerar. Det används som underlag för att utvärdera om patientens medicinering eller livsstilsåtgärder behöver justeras för att nå det individuella målvärdet. Genom att optimera värdet minskar man risken för att patienten utvecklar mikro- och makrovaskulära komplikationer.

Totalpoäng: 1.5

14 Nedan följer några påståenden kopplat till diabetes mellitus.

Markera om påståendet är sant eller falskt. (0,5p/svar, max 2p)

	FALSKT	SANT
Hypoglykemi behandlas med insulin	☒	☐
SGLT2 hämmare är grunden i läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes	☒	☐
Förhöjda plasmaglukos värden upp till ett dygn efter en hypoglykemi kallas rekyleffekt	☐	☒
Glukagon stimulerar till nedbrytning av leverglykogen, så att glukos frisätts till blodet	☐	☒

Totalpoäng: 2

15 Ange två oberoende omvårdnadsåtgärder till en patient med hyperthyreos**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | |

Σ |

Två oberoende omvårdnadsåtgärder är att erbjuda en sval och lugn miljö för att lindra patientens värmeintolerans och rastlöshet. Du bör även tillgodose behovet av extra energi genom att erbjuda näringstät kost och täta mellanmål eftersom ämnesomsättningen är kraftigt förhöjd.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

16 Addisons sjukdom är en ovanlig men allvarlig sjukdom.

Beskriv kortfattat patofysiologin bakom sjukdomen.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω | |

Σ |

Addisons sjukdom orsakas oftast av en autoimmun destruktion av binjurebarken, vilket leder till en primär brist på hormonerna kortisol och aldosteron. Denna hormonbrist gör att kroppen inte kan reglera salt- och vätskebalansen normalt eller svara adekvat på fysiologisk stress.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

17 Vilken är den vanligaste orsaken till hypofyssvikt?**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω | |

Σ |

Den vanligaste orsaken till hypofyssvikt är en tumör i hypofysen, ett så kallat hypofysadenom. Hormonbristen uppstår antingen genom att tumören trycker på den friska körtelvävnaden eller som en följd av behandlingar som kirurgi och strålning.

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

18

Vilka symptom stämmer in på hyperthyreos?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Långsamma rörelser
- ☒ Ökad tarmperistaltik
- ☐ Minskad metabolism
- ☐ Minskad tarmperistaltik
- ☒ Hög puls
- ☐ Låg puls
- ☒ Tremor

Totalpoäng: 1.5

- 19 Vid misstänkt leversjukdom fastställs diagnosen med hjälp av olika byggstenar (= kontroller eller undersökningar med mera) .

Nämn tre byggstenar förutom anamnes och klinisk bild.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{1}{x}$ | | | | Ω | |

Σ |

Tre centrala byggstenar är blodprover (t.ex. leverstatus och koagulationsprover), bilddiagnostik (såsom ultraljud eller DT) och leverbiopsi (vävnadsprov). Dessa metoder används för att objektivt bedöma leverns funktion, struktur och eventuella vävnadsskador.

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

- 20** Om en patient ska genomgå en leverbiopsi så är det sjuksköterskan som ansvarar för förberedelser och efterkontroller.

Vilken allvarlig komplikation är det som kan uppstå efter en leverbiopsi?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω |

Σ |

Den mest allvarliga komplikationen efter en leverbiopsi är en inre blödning, eftersom levern är ett mycket kärlrikt organ. En stor blödning kan i värsta fall leda till cirkulationssvikt eller hypovolemisk chock. Det är därför kritiskt att noga övervaka patientens vitalparametrar och insticksstället under de första timmarna efter ingreppet.

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

21 Vilka tillstånd/symtom kan uppkomma i till följd av levercirros? Välj fyra alternativ.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Urinvägsinfektion
- ☒ Flapping tremor
- ☒ Illamående/matleda
- ☐ Encefalit
- ☒ Ikterus
- ☐ Lungemboli
- ☒ Encefalopati
- ☐ Meningit

Totalpoäng: 2

22 Nämn en kontraindikation till levertransplantation.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

En vanlig kontraindikation är pågående missbruk av alkohol eller droger, då patienten måste kunna följa en strikt medicinsk behandling efteråt. Andra exempel inkluderar extrahepatisk malignitet (cancer utanför levern) eller svår hjärt-lungsjukdom som gör operationsrisken för hög.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

23 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller allergisk astma.**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Vanligast bland vuxna
- ☒ Aktiveras av allergener
- ☐ Att reagera på kallluft är vanligast vid allergisk astma
- ☐ Vanligt med hemoptys
- ☐ Aktiveras av irriteranter
- ☐ Mastcellerna påverkas inte
- ☒ Ärftligt betingad
- ☒ Vanligast hos barn

Vilka undersökningar används för ställa diagnosen astma**Välj ett eller flera alternativ**

- ☒ Peef-mätning
- ☐ Bronkoscopi
- ☒ Spirometri
- ☐ Lungröntgen
- ☐ Arbets-ekg

Totalpoäng: 2.5

- 24 Beskriv vad som händer i luftvägarna vid obstruktivitet som finns både vid astma och KOL (kronisk obstruktiv sjukdom), som gör att det blir så tungt/svårt att andas.**

Skriv in ditt svar här

Vid obstruktivitet svullnar slemhinnan i luftvägarna och slemproduktionen ökar, vilket gör att passagen för luften blir betydligt trängre. Samtidigt drar den glatta muskulaturen runt luftrören ihop sig (bronkkonstriktion), vilket skapar ett ökat motstånd för luftflödet. Detta gör det ansträngande att andas då det krävs mer kraft för att pressa luften genom de försnävrade rören, vilket märks tydligast vid utandning.

Totalpoäng: 3

25 Vad är rätt eller fel vad det gäller KOL (Kronisk obstruktiv sjukdom)**KOL drabbar enbart rökare****Välj ett alternativ**☒ Falskt☐ Sant**Rökning är den största riskfaktor för att drabbas av KOL****Välj ett alternativ**☒ Sant☐ Falskt**Passiv rökning är inte en riskfaktor för att utveckla KOL****Välj ett alternativ**☐ Sant☒ Falskt**Symtomen är reversibla vid KOL****Välj ett alternativ**☒ Falskt☐ Sant**Vid KOL finns risk att utveckla emfysem****Välj ett alternativ:**☐ Falskt☒ Sant

Totalpoäng: 2.5

26 Vid Astma och KOL används en del läkemedel.

Vad är rätt eller fel vad det gäller beta 2-stimulerare

Kryssa i rätt eller fel

	Fel	Rätt
Anti-inflammatorisk effekt	☒	☐
Dilaterar bronkialmuskulaturen	☐	☒
Minskad frisättning av mediatorer från immuncellerna	☐	☒
Bronkialsekretets viskositet minskas	☒	☐
Stimulerande effekt på cilierna	☐	☒
Minskad kärl-permiabilitet	☐	☒

Totalpoäng: 3

27 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller Neurologiska sjukdomar

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Rigiditet är ett typiskt symtom vid Parkinson
- ☒ Vid MS är dessa symtom relativt vanliga; balansproblem, humörsvingningar, nedsatt talförmåga
- ☒ Fatigue är vanligt vid Parkinsons sjukdom
- ☐ Vid Parkinsons sjukdom blir talet sällan drabbat av sjukdomen
- ☐ RA är en neurologisk sjukdom
- ☒ Neurologi är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar kroppens nervsystem
- ☐ Vid Parkinsons sjukdom brukar rörelserna bli snabba

Totalpoäng: 2

28 Vilka av nedanstående påståenden kopplade till njurbiopsi är sanna respektive falska?
(0,5p/rätt, max 2,5p)

Markera om påståendet är sant eller falskt.

	Falskt	Sant
Högt blodtryck inför en njurbiopsi anses öka blödningsrisken.	☐	☒
Att ta ett vävnadsprov från njurbarken (njurbiopsi) är enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt.	☒	☐
Komplikationsfrekvensen efter njurbiopsi är hög.	☒	☐
Patienten är alltid sövd i samband med att en njurbiopsi görs.	☒	☐
Den vanligaste komplikationen efter en njurbiopsi är infektion i njuren.	☒	☐

Totalpoäng: 2.5

- 29 Gun, 58 år, har en sjukdom som orsakar ihållande nedsättning av njurfunktionen. Utifrån GFR delas funktionsnedsättningen in efter en enkel skala, CKD (Chronic kidney disease). Gun har njursvikt i CKD-stadie 5.

Utifrån CKD – är Gun svårt sjuk eller mindre svårt sjuk i sin njursvikt? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | |

Σ |

Gun är svårt sjuk i sin njursvikt. CKD-stadie 5 innebär terminal njursvikt (njurinsufficiens) där GFR-värdet är under 15 ml/min, vilket oftast kräver dialys eller transplantation. Det är det sista och mest allvarliga stadiet i skalan.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

30 Ahmed, 40 år, får peritonealdialys (PD) på grund av svår njursvikt.

Vilken är den allvarligaste komplikationen till peritonealdialys (PD)? (1p)

Skriv in ditt svar här

Den allvarligaste komplikationen till peritonealdialys (PD) är peritonit (bukhinninflammation). Det orsakas oftast av att bakterier kommer in i bukhålan via dialyskatetern i samband med påsbyte.

Förutom peritonealdialys (PD) finns en annan dialysform. Vilken? (1p)

Skriv in ditt svar här

Den andra vanliga dialysformen förutom peritonealdialys är hemodialys (HD). Vid hemodialys renas blodet utanför kroppen genom en dialysmaskin och ett filter (en "konstgjord njure").

Totalpoäng: 2

31 I njurmärgen bildas EPO. EPO är en förkortning, för vad? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

EPO står för erytropoetin. Det är ett hormon som stimulerar benmärgen att producera fler röda blodkroppar.

Vid njursvikt kan man se en otillräcklig frisättning av EPO. Beskriv vad denna otillräckliga frisättning leder till i kroppen. (1p)

Skriv in ditt svar här

Otillräcklig frisättning av EPO leder till renal anemi, vilket innebär en brist på röda blodkroppar eftersom benmärgen inte stimuleras till produktion. Detta resulterar i försämrad syretransport i blodet, vilket kliniskt visar sig som uttalad trötthet och andfåddhet.

Totalpoäng: 1.5

- 32** Para ihop följande beskrivningar med respektive metabolisk fas vid kirurgi, skada och kritisk sjukdom 0,5 p/rätt svar

Matcha ihop:

	Anabola fasen	Katabola fasen	Chockfasen
Nedbrytning av vävnad, hypermetabolism och negativ kvävebalans	☐	☒	☐
Minskad metabolism och minskat energibehov	☐	☐	☒
Uppbyggnad av vävnad, positiv kvävebalans	☒	☐	☐

Totalpoäng: 1.5

- 33** Sjuksköterskan Nils har identifierat att Annes kläder börjat hänga allt lösare sista tiden och bestämmer sig för att genomföra en kartläggning av risken för undernäring enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Nämn två (2) komponenter som finns med i denna första screening. 0,5 / rätt svar.

Skriv in ditt svar här

De tre komponenterna i Socialstyrelsens första screening för undernäring är ofrivillig viktnedgång, ätproblem (t.ex. tugg- och svårigheter eller nedsatt aptit) samt lågt BMI (under 20 för vuxna <70 år, eller under 22 för vuxna >70 år).

Hur vet sjuksköterskan Nils om det föreligger en risk för undernäring utifrån den screening han utfört? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Det föreligger en risk för undernäring om patienten uppfyller minst ett av de tre screeningkriterierna (ofrivillig viktnedgång, ätproblem eller lågt BMI). Ett positivt svar på någon av dessa punkter innebär att sjuksköterskan ska gå vidare med en fördjupad utredning.

Totalpoäng: 1.5

34 Nämn två (2) förebyggande åtgärder mot refeeding syndrom. (1p)**Skriv in ditt svar här**

Två förebyggande åtgärder mot refeeding syndrome är att starta näringstillförseln långsamt med låga doser (successiv upptrappning) samt att noggrant övervaka och korrigera elektrolytnivåer (främst fosfat, magnesium och kalium). Det är också viktigt att ge profylaktisk tillförsel av vitaminer, särskilt tiamin (B1), innan näringsintaget påbörjas.

Totalpoäng: 1

35 Ada är inlagd på kirurgavdelningen och är så pass sjuk att energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition och ska få näring via blodbanan.**Vad heter det när energi/näring ges direkt i blodbanan? (0,5p)****Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω

Σ |

Det kallas för parenteral nutrition (eller total parenteral nutrition, TPN). Det innebär att näringen ges som en infusion direkt i blodomloppet, vanligtvis via en central venkateter (CVK).

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

- 36** Hudcancer har seglat upp som en av de fyra vanligaste cancerformerna i Sverige. Hudcancer är ett samlingsnamn för flera diagnoser. Vilka?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** | *I* | U | $\times_2$ | $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | $\sqrt{\square}$ | $\int$ | $\frac{\square}{\square}$ | $\leftarrow$ | $\rightarrow$ | $\curvearrowright$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | Ω |

 |

De fyra diagnoser som samlas under begreppet hudcancer är basalcells cancer (basaliom), skivepitelcancer, malignt melanom samt aktiniska keratoser (som räknas som ett förstadium). Ibland inkluderas även ovanliga former som Merkelcellscancer, men de tre förstnämnda är de absolut vanligaste.

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

- 37** a) Rökning är en riskfaktor för lungcancer. Ange ytterligare fyra cancerdiagnoser som kan orsakas av rökning. (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Fyra andra cancerformer som orsakas av rökning är urinblåsecancer, bukspottkörtelcancer (pankreascancer), matstrupscancer (esofaguscancer) och cancer i munhåla/svalg. Rökning är även en stark riskfaktor för njurcancer och livmoderhalscancer.

- b) Hur stor andel av alla cancersjukdomar i västvärlden orsakas av rökning?

Skriv in ditt svar här

Ungefär 20 % (en femtedel) av alla cancerfall i västvärlden beräknas orsakas av rökning. Det är den enskilt största påverkbara riskfaktorn för att utveckla cancersjukdom.

Totalpoäng: 1.5

38 Vilka delar består en malignitetsutredning av? (0,5 p/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

En malignitetsutredning består av den så kallade trippeldiagnostiken: klinisk undersökning (palpation), bilddiagnostik (exempelvis mammografi, ultraljud eller röntgen) samt vävnadsprovtagning (biopsi eller punktionscytologi). Dessa tre delar vägs samman för att fastställa om en förändring är godartad eller elakartad.

Ord: 0

Totalpoäng: 2.5

39 Vilka organ undersöks vid misstanke om metastasering av cancersjukdom? (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | |

Σ |

De organ som i första hand undersöks vid misstanke om fjärrmetastaser är lungor, lever, skelett och hjärna. Dessa organ är de vanligaste platserna där cancerceller sprider sig via blodet.

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

40 Dehydrering (uttorkning) kan bero på flera olika orsaker.

Markera fyra orsaker till dehydrering.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Hypotermi
- ☐ Migrän
- ☒ Förhöjd kroppstemperatur
- ☒ Massiva diarréer
- ☒ För lågt intag av vätska
- ☐ För stort intag av vätska
- ☒ Brännskada

Totalpoäng: 2

- 41 Hyponatremi är en relativt vanligt förekommande elektrolytrubbning som kan uppkomma akut eller vara kronisk.

Ge två exempel på orsaker till den akuta hyponatremi.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

Två vanliga orsaker till akut hyponatremi är stort intag av natriumfattig vätska (exempelvis vid extrem uthållighetsidrott) samt övervätskning via intravenösa infusioner med låg natriumhalt. Det kan även orsakas av ett snabbt insättande SIADH (felaktig utsöndring av ADH), vilket leder till att njurarna sparar för mycket vatten och späder ut natriumet i blodet.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 42** Du tar en blodgas på en patient som inkommer med ambulans efter en heroinöverdos. Patienten är medvetandesänkt och har en andningsfrekvens på 6 / minut.

Svaret visar:

pH 7.27 CO₂ 11,2 kPa HCO₃ 22 mmol/l BE -1 mmol/l

(ref.värden: CO₂ 4,6-6 HCO₃ 21-27 BE 0 (-3-+3))

Vilken syra-basrubbning har din patient

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

Patienten har en respiratorisk acidosis. Detta beror på att heroinöverdosen orsakat en andningsdepression (

Ord: 0

Totalpoäng: 1

43 Utgå från förra frågan och ta ställning till nedanstående påstående:

Kolsyran är källan till vätejoner i ovanstående syra-bas-rubbning.

Välj ett alternativ:

☒ Sant

☐ falskt

Totalpoäng: 0.5

44 Vilket organ i kroppen kompenserar för de respiratoriska syra-basrubbningarna?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | |

Σ |

Det organ som kompenserar för respiratoriska syra-basrubbningar är njurarna. De gör detta genom att ju

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

- 45** Huden kan drabbas av olika åkommor. Erysipelas är en som kan uppkomma på olika ställen på kroppen, dock oftast på underbenen.

Vad heter erysipelas på svenska

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | |

Σ |

Erysipelas heter rosfeber på svenska. Det är en bakteriell infektion i hudens övre lager, oftast orsakad av streptokocker.

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

46 Vilken läkemedelsgrupp används för att behandla/bota erysipelas?**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾

B *I* U x_2 x^2 I_x          

Σ 

Erysipelas (rosfeber) behandlas med läkemedelsgruppen antibiotika. Förstahandsvalet är vanligtvis penicillin (exempelvis Kåvepenin eller Bensylpenicillin) eftersom infektionen oftast orsakas av streptokocker.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

47 Herpes Zoster (bältros) är en annan hudåkomma.

Vad är anledningen till att man inte kan behandla herpes zoster med antibiotika?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | | |

Σ |

Anledningen till att man inte kan behandla herpes zoster (bältros) med antibiotika är att sjukdomen orsakas av ett virus (Varicella zoster-virus), inte bakterier. Antibiotika har endast effekt på bakteriella infektioner och biter därför inte på virussjukdomar. Istället används vid behov antivirala läkemedel för att bromsa virusets förökning.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

48 Lungemboli ger ofta akuta symtom för den som drabbas.

Markera två vanliga/typiska symtom eller tecken på lungemboli.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Förhöjt CRP
- ☐ Förhöjt BNP
- ☒ Plötslig svimning
- ☐ Förhöjt troponin
- ☐ Stasade halsvener
- ☒ Andningskorrelerad bröstsmärta
- ☐ Benödem
- ☐ Feber

Totalpoäng: 1

49 Med vilken undersökningsmetod kan man ställa diagnosen lungemboli?

Välj ett alternativ:

- ☒ Skintigrafi
- ☐ EKG
- ☐ Slätröntgen
- ☐ Ultraljud

Totalpoäng: 0.5

50 Oftast orsakas lungemboli av att patienten har en djup ventrombos.

Vid en djup ventrombos i ett underben bedömer man det drabbade benets utseende och jämför med det andra benet.

Vilka faktorer/tecken bedömer man, nämn tre.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... **B** *I* U x_2 x^2 I_x

Σ

Vid misstanke om djup ventrombos (DVT) i ett underben bedöms följande tre faktorer/tecken: ödem (svullnad av underbenet), rodnad (missfärgning) samt värmeökning i huden. Man jämför även om det drabbade benet har en ökad vedomfång och om patienten upplever smärta/ömheter vid palpation eller rörelse.

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

- 51 Personer som är njurtransplanterade har en ökad benägenhet att drabbas av infektioner.

Beskriv vad orsaken till detta är.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

Orsaken till den ökade infektionskänsligheten är den livslånga behandlingen med immunsuppressiva läkemedel (avstötningshämmande mediciner). Dessa läkemedel sänker immunförsvarets aktivitet för att hindra kroppen från att stöta bort den nya njuren, vilket samtidigt gör patienten mer sårbar för bakterier, virus och svampar.

Ord: 0

Totalpoäng: 1