

Information

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Flerval

Question	Marks	Question type
1	1.5	Matching
2	1	Multiple Response
3	1	Multiple Choice
4	1	Multiple Choice
5	1	Multiple Choice
6	1	Multiple Choice
7	1	Multiple Choice
8	1	Multiple Choice
9	1	Multiple Choice

Essä

Question	Marks	Question type
10	1	Essay
11	2	Essay
12	2	Essay
13	2	Essay

14	1.5	Essay
15	1	Essay
16	1	Essay

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-03-18

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Para ihop rätt diuretika med rätt verkningsställe.

	Loop-diuretika	Tiazider	Kaliumsparande diuretika
Första delen av distala tubuli	☐	☒	☐
Sista delen av distala tubuli	☐	☐	☒
Henles slynga	☒	☐	☐

Maximum marks: 1.5

2 ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. Välj det alternativ som bäst beskriver vad torrhostan beror på.

Välj ett eller flera alternativ:

☐ ACE-hämmare ökar produktionen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

☒ ACE-hämmare hämmar bradykinin från att tas upp i blodbanan, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge en vasokonstriktion i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

☐ ACE-hämmare hämmar nedbrytningen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin-produktionen, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

Maximum marks: 1

3 Vilken av följande läkemedelsgrupper syftar till att höja blodtrycket.**Välj ett alternativ:**

- ☐ ACE-hämmare
- ☐ Muskarina agonister
- ☐ Loopdiuretika
- ☐ Adrenerga agonister
- ☒ Betareceptorantagonister

Maximum marks: 1

4 Vid vilket medicinskt tillstånd kan användningen av trombolytiska läkemedel vara farlig eller kontraindicerad?

Välj ett alternativ:

- ☐ Vid en aktiv inre blödning
- ☒ Vid hypertoni
- ☐ Vid symptom på hjärt-kärlsjukdom
- ☐ Vid högt kolesterol

Maximum marks: 1

**5 Vilket påstående stämmer bäst varför Acetylsalicylsyra ger ökad blödningsrisk:
Välj ett alternativ:**

- ☒ Förhindrar koagulationsfaktorer att aktiveras
- ☐ Förhindrar fibrinogen att binda in till trombocyterna
- ☐ Förhindrar trombocyters aggregation till varandra
- ☐ Förhindrar den fibrinolytiska processen

Maximum marks: 1

**6 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)
- ☒ International normalized Ratio (INR)
- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)

Maximum marks: 1

7 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?**Välj ett alternativ:**

- ☒ Statiner
- ☐ Beta 2 antagonister
- ☐ Adenosindifosfatreceptorhämmare
- ☐ ACE-hämmare

Maximum marks: 1

**8 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni

Maximum marks: 1

9 Vilken är den främsta orsaken till att nitroglycerin har god effekt vid angina pectoris?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Dilatering av njurartärerna ger minskade urinmängder
- ☐ Kontrahering av njurartärerna ger ökande urinmängder
- ☒ Kontrahering av vener ger ökad diastoliskt tryck
- ☐ Dilatering av vener ger minskad diastoliskt tryck

Maximum marks: 1

10 Beskriv vad som skiljer Tiazider från Loop-diuretika i relation till effektens inträde och diures.

Skriv in ditt svar här

Loop-diuretika blockerar återupptaget av K^+ , Natrium och klor, Det utsöndras via urinen och det sker i Heines slygna. Medans Tiazider blockerar reabsorption av K^+ och även natrium och klor och det sker i distala tubil

Words: 35

Maximum marks: 1

- 11 **Ange en allvarlig konsekvens som kan uppstå vid en överdosering av kaliumsparande diuretika? Förklara hur denna konsekvens uppstår.**

Skriv in ditt svar här

Det kan göra att man får hög koncentration av natrium.

Kaliumsparande diuretika blockerar återupptaget mot vatten och klor i byter för magnesium.

Words: 22

Maximum marks: 2

12 Beskriv skillnaden mellan var ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister (ARB) verkar i RAAS-systemet.

Skriv in ditt svar här

ACE-hämmare gör att angiotensin inte omvandlar till angiotensin 2 genom att ACE som hjälper angitensin hämmas. Angiotensin 2- receptorantagonister gör att det inte binder till recptor AT1 och även blockar aldoterson utveckling.

Words: 32

Maximum marks: 2

13 Förklara varför icke-selektiva betablockerare inte är lämpliga läkemedel för astmatiker.**Skriv in ditt svar här**

Icke-selektiva betablockerare fungera för sjukdomar som är relaterad till hjärttillstånd och andra vävnader. Det är inte astmatiker eftersom det är inte lika effektiv på luftvägarna och lungorna.

Words: 26

Maximum marks: 2

14 Förklara orsaken till att det rekommenderas ett dosuppehåll på 10–12 timmar vid kontinuerlig nitroglycerinbehandling med långtidsverkande depåtabletter?

Skriv in ditt svar här

Eftersom det blir en tolerans utveckling alltså kroppen vänjer sig. Detta gör att det blir sämre effekt, det är därför kroppen måste ta paus för att kunna återhämta sig och för att undvika tolerans utveckling.

Words: 35

Maximum marks: 1.5

- 15 Ange två (2) läkemedelsnamn (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen trombocyttaggregationshämmande läkemedel.**

Skriv in ditt svar här

ASA= acetylsalicylsyra och ADP-receptorhämmare

Words: 4

Maximum marks: 1

16 Beskriv indikationen för läkemedelsgruppen Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK):**Skriv in ditt svar här**

Det gör att blodproppar inte uppstår genom att hämma koagulationprocessen effekt inom 1 minut.

Words: 14

Maximum marks: 1