

Information

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Flerval

Question	Marks	Question type
1	1.5	Matching
2	1	Multiple Response
3	1	Multiple Choice
4	1	Multiple Choice
5	1	Multiple Choice
6	1	Multiple Choice
7	1	Multiple Choice
8	1	Multiple Choice
9	1	Multiple Choice

Essä

Question	Marks	Question type
10	1	Essay
11	2	Essay
12	2	Essay
13	2	Essay

14	1.5	Essay
----	-----	-------

15	1	Essay
----	---	-------

16	1	Essay
----	---	-------

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-03-18

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Para ihop rätt diuretika med rätt verkningsställe.

	Kaliumsparande diuretika	Loop-diuretika	Tiazider
Sista delen av distala tubuli	☒	☐	☐
Henles slynga	☐	☒	☐
Första delen av distala tubuli	☐	☐	☒

Maximum marks: 1.5

2 ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. Välj det alternativ som bäst beskriver vad torrhostan beror på.

Välj ett eller flera alternativ:

☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin-produktionen, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin från att tas upp i blodbanan, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge en vasokonstriktion i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

☒ ACE-hämmare ökar produktionen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

☐ ACE-hämmare hämmar nedbrytningen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

Maximum marks: 1

3 Vilken av följande läkemedelsgrupper syftar till att höja blodtrycket.**Välj ett alternativ:**

- ☐ ACE-hämmare
- ☐ Loopdiuretika
- ☒ Adrenerga agonister
- ☐ Betareceptorantagonister
- ☐ Muskarina agonister

Maximum marks: 1

4 Vid vilket medicinskt tillstånd kan användningen av trombolytiska läkemedel vara farlig eller kontraindicerad?

Välj ett alternativ:

- ☐ Vid symptom på hjärt-kärlsjukdom
- ☐ Vid högt kolesterol
- ☒ Vid hypertoni
- ☐ Vid en aktiv inre blödning

Maximum marks: 1

**5 Vilket påstående stämmer bäst varför Acetylsalicylsyra ger ökad blödningsrisk:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Förhindrar trombocyters aggregation till varandra
- ☒ Förhindrar koagulationsfaktorer att aktiveras
- ☐ Förhindrar fibrinogen att binda in till trombocyterna
- ☐ Förhindrar den fibrinolytiska processen

Maximum marks: 1

6 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:**Välj ett alternativ:**

- ☒ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)
- ☐ International normalized Ratio (INR)

Maximum marks: 1

7 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?**Välj ett alternativ:**

- ☐ ACE-hämmare
- ☐ Beta 2 antagonister
- ☒ Statiner
- ☐ Adenosindifosfatreceptorhämmare

Maximum marks: 1

**8 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☒ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar

Maximum marks: 1

9 Vilken är den främsta orsaken till att nitroglycerin har god effekt vid angina pectoris?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Dilatering av vener ger minskad diastoliskt tryck
- ☐ Dilatering av njurartärerna ger minskade urinmängder
- ☐ Kontrahering av njurartärerna ger ökande urinmängder
- ☒ Kontrahering av vener ger ökad diastoliskt tryck

Maximum marks: 1

10 Beskriv vad som skiljer Tiazider från Loop-diuretika i relation till effektens inträde och diures.

Skriv in ditt svar här

Tiazider verkar i första delen av distala tubuli.

upptaget av na, cl, kl

Na stannar kvar i nefronet och ger öka vattenutsödring

Första handsval vid hypertoni behandling

Loopdiuretika verkar i henlesslynga. Återupptag av Cl, Na, K.

Mg och k förlust

Prostacyclin

Words: 41

Maximum marks: 1

- 11 **Ange en allvarlig konsekvens som kan uppstå vid en överdosering av kaliumsparande diuretika? Förklara hur denna konsekvens uppstår.**

Skriv in ditt svar här

Dyhydrering

Kaliumsparande diuretika verkar i sista delen av dista tubuli. Utbyte av vatten mot kalium. Återabsorption av kalium leder till att det blir överskott. Det ger ökad vattenutsöndring och leder till ökad urinmängd.

Words: 33

Maximum marks: 2

12 Beskriv skillnaden mellan var ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister (ARB) verkar i RAAS-systemet.

Skriv in ditt svar här

Levern frisätter angiotensinogen, njurarna frisätter renin och angiotensinogen omvandlas till angiotensin 1 med hjälp av renin. ACE- hämmare hämmar bildningen av angiotensin II. Angiotensin II-receptor antagonist hämmar receptornerna av angiotensin II.

Words: 31

Maximum marks: 2

13 Förklara varför icke-selektiva betablockerare inte är lämpliga läkemedel för astmatiker.**Skriv in ditt svar här**

Icke selektiva betablockerare hämmar effekten adrenalin och noradrenalin. Vid sympatikus påslag frisätts adrenalin och det är ett svar på stressrespons, vid sympatikus påslag höjs blodtrycket, hjärtfrekvensen och lungorna behöver mer syre. Vid icke selektiva betablockerare hämmas det här systemet och astmatiker som behöver mer syre får inte tillräckligt med syre, därför är det inte lämpligt för astmatiker.

Words: 57

Maximum marks: 2

14 Förklara orsaken till att det rekommenderas ett dosuppehåll på 10–12 timmar vid kontinuerlig nitroglycerinbehandling med långtidsverkande depåtabletter?

Skriv in ditt svar här

Nitroglycerin som är mot angina pectoris och hypertoni. Det rekommenderas ett dosuppehåll på 10-12 timmar för att depåtabletter löses upp långsammare. Patienten ska inte överdoseras, om patienten överdoseras då kan det leda till allvarlig blodtrycksanfall.

Words: 35

Maximum marks: 1.5

- 15 Ange två (2) läkemedelsnamn (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen trombocyttaggregationshämmande läkemedel.**

Skriv in ditt svar här

ASA och Hepariner

Words: 3

Maximum marks: 1

16 Beskriv indikationen för läkemedelsgruppen Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK):**Skriv in ditt svar här**

DVT och lungemboli

Words: 3

Maximum marks: 1