

Termin 2 Exempeltenta 1

Fråga 1.

Situation: Patient med kronisk smärta ordineras opioidplåster i smärtlindrande syfte.

Ordination: Fentanyl Orion depotplåster 75 mikrogram/timme i 24 timmar, transdermalt.

Uppgift: Hur många mg Fentanyl får patienten under ett dygn? Ange ditt svar med en decimal.

Svar:

Fråga 2.

Ordination: T. Levaxin 0,1 mg, 1 gång/dag, p.o.

Tillgängligt preparat: T. 50 mikrogram.

Uppgift: Hur många tabletter av tillgängligt preparat ska patienten ha enligt ordinationen? Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 3.

Situation: En syrgaskrävande patient har beviljats permission under dagen och beräknas vara borta i fyra timmar.

Ordination: 2 liter O₂/min, kontinuerligt via gramma.

Uppgift: Hur många liter syrgas kommer patienten att förbruka under fyra timmar? Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 4.

Situation: Patient med profylaktisk antibiotikabehandling postoperativt.

Ordination: Inf. Cloxacillin 2 g, 4 ggr/dygn, i.v.

Enligt FASS ska torrsubstansen Cloxacillin 2 g lösas med 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml, för att sedan administreras till patienten under 30 minuter.

Uppgift: Vilken hastighet i dr/min ställer du in droppaggregatet på?
Aggregatet ger 20 dr/ml. Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 5.

Situation: Patient med förmaksflimmer.

Ordination: T. Digoxin 0,13 mg, 2 ggr dagligen i sju dagar, p.o.

Uppgift: Hur många mikrogram Digoxin får patienten på sju dagar?

Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 6.

Situation: Patient med elektrolytrubbningar.

Ordination: Inf. Ringer-Acetat 1000 ml med tillsatserna 60 mmol Addex-Natriumklorid och 40 mmol Addex-Kaliumklorid,
i.v. Administrationshastighet: 70 ml/tim.

Tillgängligt preparat:

Ringer-Acetat 1000 ml

Addex-Natriumklorid 4 mmol/ml

Addex-Kaliumklorid 2 mmol/ml

Uppgift: Hur lång tid tar infusionen att infundera?

Ange ditt svar i hela timmar och minuter.

Svar:

Fråga 7.

Situation: Patient med djup ventrombos ordineras antikoagulantia.

Patientens vikt: 80 kg.

Ordination: Inj. Innohep 175 E/kg kroppsvikt, en gång dagligen, s.c.

Tillgängligt preparat: Innohep® 20 000 E/ml.

Uppgift: Hur många ml får patienten vid varje tillfälle?

Ange ditt svar med en decimal.

Svar:

Fråga 8.

Ordination: Inj. Novomix 48 E x 1 s.c.

Tillgängligt preparat: NovoMix® 30 FlexPen® 100 E/ml.

Förpackningen innehåller 5 pennor á 3 ml.

Uppgift: Hur många hela dagar räcker förpackningen utifrån ordinationen?
Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 9.

Situation: Gravid kvinna med gallstenssmärtor.

Ordination: Inj. Ketogan 1 mg/ml, 7,5 mg i.v. vid behov.

Tillgängligt preparat: Ketogan 5 mg/ml, injektionslösning.

Uppgift: Du skall späda 10 mg Ketogan till styrkan 1 mg/ml. Hur många ml Natriumklorid 9 mg/ml späder du med? Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 10.

Situation: Barn med feber. Barnets vikt: 16 kg.

Ordination: Alvedon 180 mg, 4 ggr dagligen, p.o.

Tillgängligt preparat: Alvedon 24 mg/ml, oral suspension.

Uppgift: Hur många ml ger du till barnet vid varje tillfälle?

Ange ditt svar med en decimal.

Svar: