

Termin 2 Exempeltenta 2

Fråga 1.

Situation: Patient med förmaksflimmer.

Ordination: Inf. Brinavess 3 mg/kg, i.v. som engångsdos.

Tillgängligt preparat: BRINAVESS® Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml.

Uppgift: Enligt FASS ska du späda 25 ml Brinavess 20 mg/ml med 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Vad blir styrkan på läkemedlet angett i mg/ml efter spädningen? Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 2.

Situation: Patient som har ordinerad tarmvila på grund av ileus.

Ordination: Inf. Glukos Baxter 50 mg/ml 1000 ml med tillsats av 80 mmol Addex Natriumklorid 4 mmol/ml och 40 mmol Addex Kaliumklorid 2 mmol/ml.

Infusionen ska administreras på 8 timmar. Droppaggregatet ger 20 dr/ml.

Tillgängligt preparat:

Glukos Baxter 50 mg/ml. En påse innehåller 1000 ml.

Addex Natriumklorid 4 mmol/ml.

Addex Kaliumklorid 2 mmol/ml.

Uppgift: Hur många dr/min ställer du in aggregatet på? Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 3.

Situation: Patient med anafylaktisk chock.

Ordination: Inj. Adrenalin 0,1 mg/ml, 5 ml ges som långsam intravenös injektion under minst 2 minuter.

Tillgängligt preparat: Adrenalin Bradex 1 mg/ml, injektionsvätska. En ampull innehåller 1 ml lösning.

Uppgift: Du skall späda 1 ml Adrenalin 1 mg/ml till styrkan 0,1 mg/ml. Vad blir den totala volymen angett i ml efter spädning? Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 4.

Situation: Patient i behov av sedering inför röntgenundersökning.

Ordination: Inj. Midazolam 1 mg/ml, 2 mg, i.v.

Tillgängligt preparat: Midazolam, injektionsvätska, 5 mg/ml. En ampull innehåller 1 ml.

Innan du administrerar läkemedlet behöver du späda 1 ml Midazolam 5 mg/ml med Natriumklorid 9 mg/ml till styrkan 1 mg/ml.

Uppgift: Hur många ml spädningsvätska behöver du använda i iordningställandet för att erhålla den ordinerade styrkan? Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 5.

Situation: Patient med KOL som skall ut på promenad.

Ordination: 2 l O₂/min, kontinuerligt via syrgasgrimma.

Tillgängligt preparat: 2,5 liters syrgasflaska med barometertryck på 100 bar.

Uppgift: Hur länge räcker syrgasflaskan utifrån ordinationen? Räkna bort 5 bar som säkerhet.

Ange ditt svar i hela timmar och minuter.

Svar:

Fråga 6.

Situation: Din patient med behov av syrgasbehandling ska ha permission från sjukhuset. Patienten beräknas vara borta i 5 timmar.

Ordination: 2 l O₂/min, kontinuerligt via syrgasgrimma.

Tillgängligt preparat: 5 liters syrgasflaska med barometertryck på 180 bar.

Uppgift: Hur många liter syrgas kommer patienten att förbruka under sin permission? Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 7.

Situation: Patient med anemi till följd av kronisk njursjukdom. Patientens vikt: 95 kg.

Ordination: Inj. Eporatio 20 E/kg kroppsvikt, 3 gånger per vecka, s.c.

Tillgängligt preparat: Eporatio 10 000 E/ml, injektionsvätska, lösning.

Uppgift: Hur många ml iordningställer du per tillfälle utifrån ordinationen?
Ange ditt svar med en decimal.

Svar:

Fråga 8.

Situation: Du vårdar en patient med borrelia.

Ordination: T. Kåvepenin 1 g, 2 gånger dagligen, p.o.

Tillgängligt preparat: T. Kåvepenin 500 mg. En förpackning innehåller 40 tabletter.

Uppgift: Hur många hela dagar räcker en förpackning tabletter för patienten?

Svar:

Fråga 9.

Situation: Dehydrerad patient som har behov av vätska.

Ordination: Inf. Ringer-Acetat 1000 ml. i.v.

Infusionen ska administreras på 8 timmar.

Uppgift: Hur många ml/tim ställer du in infusionspumpen på? Ange ditt svar i heltal.

Svar:

Fråga 10.

Situation: Patient med förmaksflimmer i behov av akut digitalisering.

Ordination: Inj. Digoxin 0,5 mg i.v.

Tillgängligt preparat: Digoxin Evolan 0,25 mg/ml, injektionsvätska. En ampull innehåller 1 ml lösning.

Uppgift: Hur många ml av det tillgängliga läkemedlet administrerar du till patienten utifrån ordinationen? Ange ditt svar i heltal.

Svar: