



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
0 M 0 8 5 G	2 0 0 1	2 0 2 4 - 1 0 - 3 1
Kursnamn	Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		



Institutionen för hälsovetenskaper, OMVÅRDNAD

Campus Sundsvall/Östersund

TENTAMEN

OMVÅRDNAD GR (A)

Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp

Kurskod: OM085G

Maxpoäng: 45

Datum: 241031

Skrivtid: 4 timmar

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna. Samarbete är ej tillåtet.

Kursansvariga lärare:

Erika Gillström Sundsvall 010-1427856

Sandra Klippenberger Östersund 010-1428190

Information

Salstentamen består av beskrivande, para ihop, flervals- och sant eller falskt-frågor. Du kan få max 45 poäng och för godkänt betyg krävs att du uppnår 29 poäng (65%). Betyg kommer rapporteras och synas i Ladok senast 15 arbetsdagar efter genomförd examination.

Betygsskala (poäng)

VG	G	U
38-45	29-37,5	<29

OBS

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. omvårdnadsåtgärder så rättas det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Lycka till!

- 1 Postural hypotension kan förekomma hos den äldre personen. Vad innebär postural hypotension . Markera det rätta svaret? 1p

Välj ett alternativ:

- ☐ Postural hypotension innebär att personen svimmar på grund av hypertoni
- ☐ Postural hypotension innebär taccycardi
- ☒ Postural hypotension innebär svårighet att behålla blodtrycket på en adekvat nivå vid uppresning
- ☐ Postural hypotension innebär att blodtrycket stiger vid uppresning.

Totalpoäng: 1

- 2 Förstoppning kan vara ett livshotande tillstånd hos den äldre personen. Som sjuksköterska är det av betydelse att förebygga att förstoppning uppstår. **Nämn två (2) olika omvårdnadsråd** som Du ger till en person som kan förebygga förstoppning (ej medicinska åtgärder). **0,5p/ rätt svar, max 1p.**

Ange ett omvårdnadsråd (0,5p)

Ser till att patienten dricka vatten

Ange ett omvårdnadsråd (0,5p)

Ser till att patienten rör på sig

Totalpoäng: 1

- 3 Vilken är **den viktigaste åtgärden** att vidta när en äldre person uppvisar tecken på konfusion? **1p**
Skriv in ditt svar här

Hitta orsaken

Totalpoäng: 1

- 4 Karin har drabbats av bältros och hon har så ont i utslagen som hon har på huvudet. **Vad kallas den typ av smärta** som kan uppkomma vid bältros? Denna smärta beskrivs som en stickande, skärande, huggande och ilande smärta. **1p**

Skriv in ditt svar här

Neuropatisk smärta

Totalpoäng: 1

- 5 Markera de två (2) rätta påståendena gällande konfusion hos den äldre.
0,5p/rätt svar, max 1p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Urinvägsinfektion (UVI) hos den äldre kan leda till konfusion
- ☐ Symtomen vid konfusion kommer smygande.
- ☐ Personer med demens drabbas sällan av konfusion.
- ☒ Obstipation hos den äldre kan leda till konfusion

Totalpoäng: 1

- 6 **Vad heter det instrument** som ingår i kvalitetsregistret Senior alert som Du som sjuksköterska använder Dig av när Du gör en munhälsobedömning? **1p**

Skriv in ditt svar här

ROAG

Detta instrument innebär att en bedömning utförs av bland annat; *röst, munslemhinnor, tunga, tandkött, tänder, proteser, saliv och läppar*. **Ytterligare en sak ska bedömas. Vad ska mer bedömas? 1p**

Skriv in ditt svar här

sväljnings förmåga

Totalpoäng: 2

- 7 Kolinesterashämmare är läkemedel som används vid Alzheimers sjukdom. Markera de två (2) rätta svaren angående kolinesterashämmare. **0,5 p/ rätt svar, max 1p**

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Kolinesterashämmare ökar produktionen av signalsubstansen Dopamin i hjärnan vilket leder till kognitiva förbättringar.
- ☐ Kolinesterashämmare är det enda läkemedel som i dag kan bota Alzheimers sjukdom
- ☒ Kolinesterashämmare kan lindra symtomen vid Alzheimers sjukdom vilket kan leda till kognitiva förbättringar
- ☒ Kolinesterashämmare ökar signalsubstansen Acetylkolin i hjärnan vilket leder till kognitiva förbättringar.
- ☐ Kolinesterashämmare minskar signalsubstansen Acetylkolin i hjärnan vilket leder till kognitiva förbättringar.

Totalpoäng: 1

- 8 Reminiscens är en metod som kan användas för personer med demens. Vad är syftet med denna metod? **1p**

Välj ett alternativ:

- ☒ Reminiscens är en metod vars syfte är att stärka personens identitet, integritet och känsla av kontinuitet och sammanhang. Metoden kan vara ett sätt att stödja minnet
- ☐ Reminiscens kan användas som metod för diagnossättande vid demenssjukdom
- ☐ Reminiscens är en metod vars syfte är att lugna en person med demens som har ett aggressivt beteende
- ☐ Reminiscens kan användas som metod för att diagnostisera i vilka delar av hjärnan som nervcellernas antal minskat

Totalpoäng: 1

9 Vilket av dessa påståenden stämmer överens med Alzheimers sjukdom? 1p

Välj ett alternativ:

- ☐ Skadan i frontalloberna påverkar främst sociala och praktiska funktioner vilket kan yttra sig som förlust av hämningar och omdöme.
- ☐ Symtomen utvecklas stegvis och man kan efter en ganska lång stabil period plötsligt försämrats igen.
- ☒ De första symtomen är ofta tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor.
- ☐ Symtomen kommer oftast hastigt och märkbart och personen kan oftast berätta när besvären började.

Totalpoäng: 1

10 Para ihop nedanstående påståenden med rätt typ av stroke 1 p

Matcha ihop värdena:

	Intracerebral blödning (hjärnblödning)	Hjärninfarkt
En blodpropp täpper till ett blodkärl i hjärnan och orsakar en ischemi.	☐	☒
Ett blodkärl i hjärnan brister vilket medför en skada i hjärnvävnaden.	☒	☐

Totalpoäng: 1

11 Beskriv hur visuell neglekt efter stroke kan påverka en persons intag av mat **1p**

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 13** Ange **ett (1)** exempel på en omvårdnadsåtgärd som en högerhänt person med svaghet i höger hand och arm kan vara i behov av. **1 p**

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 14** Arytmier anses vara den mest dominerande bakomliggande orsaken till hjärtsvikt. **0,5p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Falskt
- ☐ Sant

Totalpoäng: 0.5

- 15 Utifrån kronisk och akut hjärtsvikt så är den kroniska varianten mest vanligt förekommande innefattande ett smygande sjukdomsförlopp och med både stabila och försämrade perioder. **0,5p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5

- 16 Vilka två (2) av nedan påståenden är korrekta kopplat till hur sjuksköterskan kan underlätta pågående andningssvårigheter hos patient med hjärtsvikt? **0,5p/rätt svar (max 1p).**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Hos patienter med funktionsdyspné kan sjuksköterskan motivera patienten till ökad rörelse för att underlätta andningssvårigheterna
- ☐ Hos patienter med funktionsdyspné är det viktigt att minska på ansträngade rörelser genom att sjuksköterskan skapar förutsättningar för vila under aktiviteter
- ☐ Genom att alltid administrera syrgas kan sjuksköterskan underlätta patientens andningssvårigheter
- ☐ Hos patienter med ortopné kan sjuksköterskan informera om vikten av att ligga plant i sängen vilket ökar syreupptaget och därmed minskar pågående andningssvårigheter
- ☐ Hos patienter med ortopné kan sjuksköterskan underlätta hens andning genom att sätta denne i sittande ställning.
- ☐ Sjuksköterskan kan underlätta patientens andningssvårigheter genom att motivera till ökad konditionsträning vilket alltid har en direkt positiv inverkan på andningen

Totalpoäng: 1

- 17 Vilka fyra (4) av nedanstående påståenden är vanligt förekommande tecken till försämring av hjärtsvikt och som sjuksköterskan ska vara uppmärksam på? **0,5p/rätt svar (max 2p).**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Trötthet
- ☐ Illamående och kräkningar
- ☐ Natliga besvär med inslag av mardrömmar
- ☐ Snabb viktuppgång
- ☐ Ökad törst
- ☐ Ökad andfåddhet
- ☐ Snabb viktninskning
- ☐ Sjunkande blodtryck och puls
- ☐ Svullnad i ben och/eller fötter

Totalpoäng: 2

22 Vad är rätt / falsk av påståenderna nedan. Välj de rätta alternativen. =0,5 p / rätt svar. Max 2p
Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ ☐ Enteral nutrition ger en mer komplett näring än parenteral nutrition.
- ☐ ☐ Parenteral nutrition ger en mer komplett näring än enteral nutrition.
- ☒ ☐ Nedsatt eller ingen tarmmotorik är en kontraindikation för enteral nutrition
- ☒ ☐ En fördel med enteral nutrition är att tunntarmens autonomi och fysiologi bevaras.
- ☒ ☐ Patienten bör få en perkutan endoskopisk gastrostomi, PEG vid behov av enteral nutrition längre än 4-6 veckor
- ☐ ☐ En indikation för enteral nutrition är bristande energi- och näringsintag pga. sjukdom under en period som beräknas överstiga 3 dagar
- ☐ ☐ Enteral nutrition ges intravenöst
- ☐ ☐ En nasogastrisk sond har en begränsad tid upp till ca 8-10 veckor.

Totalpoäng: 2

23 Ange vad som anses vara ett normalt plasmaglukos när en person utan diabetesdiagnos tagit ett fasteprovn (glöm inte skriva vad värdet mäts i)? (1p)

Skriv in ditt svar här

4 - 6 mmol/l

Totalpoäng: 1

24

Ange organet i kroppen där hormonet insulin bildas? (0,5p)

Bukspottskörtel

Vad heter de insulinproducerande cellerna? (0,5p)

Beta celler

Totalpoäng: 1

25 Ange 2 typiska symtom som tyder på en person med insulinbehandlad diabetes har insulinkänning. (1p)

1

kall svett

2

Skakar

Totalpoäng: 1

26

Beskriv hur du som sjuksköterska bör hjälpa en person med hypoglykemi? (1p)

Ger snabba kolhydrater som till exempel honung

Totalpoäng: 1

- 27** En person med insulinbehandlad diabetes som utvecklar hyperglykemi på grund av att insulinet har hanterats på ett sätt som lett till att insulinet har tappat sin verkan.

Ange 2 orsaker till att insulin kan tappa sin verkan, förutom att insulinet har blivit för gammalt. (0,5p/svar, max 1p)

1

Fryst

2

Utsatt för solljus

Totalpoäng: 1

- 28** Ange 2 patientgrupper inom vården som har särskilt ökad risk för att utveckla trycksår, förutom patienter med diabetes och patienter som genomgår långa operationer. (0,5p/ rätt svar, max 1p)

1

Neddsatt rörlighet

2

Neddsatt känsel

Totalpoäng: 1

Kryssa i 2 påståenden som stämmer med Inkontinens-associerad dermatit (IAD) (0,5p/rätt svar, max 1p)

- ☐ Delhudsskada, vanligtvis över benutskott, som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbädd. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld blåsa.
- ☐ Djup fullhudsskada, som involverar ben, sena eller muskel.
- ☐ Fullhudsskada, där subkutant fett är synligt men ben, sena, muskel syns inte.
- ☒ Kvarstående rodnad, blank och macererad hud mellan klinkorna
- ☐ Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar vid tryck.
- ☒ Ytliga småsår eller spegelsår på klinkorna

Totalpoäng: 1

30 Ange 2 förebyggande omvårdnadsåtgärder som behöver utföras när du har identifierat en ökad risk för utveckling av trycksår hos en patient, förutom att se till att patientens hudområde inte blir utsatt högt och långvarigt tryck.

(0,5p/ rätt svar, max 1p)

1

Se till att patienten får mat och vätska

2

Se till att man kolla patienten

Totalpoäng: 1

34 Vilka kontroller ska utföras i samband med iordningställande av injektioner? 0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Läkemedelsnamn, mängd, administrationssätt, tidpunkt Läkemedelsnamn, styrka, mängd, administreringsätt, tidpunkt
- ☐ Läkemedelsnamn, styrka, mängd, administreringsätt
- ☐ Läkemedelsnamn, styrka, mängd, administreringsätt, tidpunkt

Totalpoäng: 0.5

35

I vilken position du bör placera patienten i för att uppnå god muskelavslappning vid injektionsgivning i sätesregionen?1p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

36 I vilken kvadrant i sätesregionen ger du dorsogluteal intramuskulär injektion? 1p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 37** Lennart bor på ett äldreboende och distriktsläkaren har ordinerat att han ska få en kvarliggande urinkateter r/t att han har resurin. Han har aldrig haft någon KAD tidigare. I syfte att göra kateterbehandlingen så trygg som möjligt ska du inför utförandet av momentet informera Lennart. Ange 4 saker du informerar Lennart om inför katetersättningen. 0,5p/rätt svar, 2p.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 38** Lennarts urinkateter (KAD) fungerar inte som den ska. Han får ofta stopp i urinkatetern. Ange två (2) orsaker till att stopp i urinkatetern kan uppstå och ge exempel på hur du åtgärdar respektive problem. (0,5p/rätt svar) 1p

Svar 1: Beskrivning av orsak till stopp och beskrivning av åtgärd för att åtgärda stoppet, 0,5p:

Svar 2: Beskrivning av orsak till stopp och beskrivning av åtgärd för att åtgärda stoppet 0,5p:

Totalpoäng: 1

- 39** Du arbetar som sjuksköterska och träffar under ditt arbetspass patienten Selma, 60 år. Du genomför ett bedömningssamtal som du sedan dokumenterar.

I vilken del av omvårdnadsjournalen dokumenterar du Selmas bakgrundshistoria, det vill säga information om hennes hälsa/sjukdom och vardagligt liv före aktuellt vårdtillfälle? (1p)

Skriv in ditt svar här

I vilken del av omvårdnadsjournalen dokumenterar du Selmas aktuella tillstånd? (1p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

40 Vilka av nedanstående är VIPS-sökord? Markera två (2). (0,5p/rätt svar, max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Kommunikation

☒ Överkänslighet

☐ Samarbete

☐ Sjukdom

☐ Illamående

☐ Hälsa

☐ Behandling

☐ Trötthet

Totalpoäng: 1