



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
O M Ø 8 5 G	2 0 0 1	2 0 2 4 - 1 2 - 1 6
Kursnamn	Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		



Institutionen för hälsovetenskaper, OMVÅRDNAD

Campus Sundsvall/Östersund

TENTAMEN

OMVÅRDNAD GR (A)

Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp

Kurskod: OM085G

Maxpoäng: 45

Datum: 241216

Skrivtid: 4 timmar

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna. Samarbete är ej tillåtet.

Kursansvariga lärare:

Erika Gillström	Sundsvall	010-1427856
Sandra Klippenberger	Östersund	010-1428190

Information

Salstentamen består av beskrivande, para ihop, flervals- och sant eller falskt-frågor. Du kan få max 45 poäng och för godkänt betyg krävs att du uppnår 29 poäng (65%). Betyg kommer rapporteras och synas i Ladok senast 15 arbetsdagar efter genomförd examination.

Betygsskala (poäng)

VG	G	U
38-45	29-37,5	<29

OBS

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. omvårdnadsåtgärder så rättas det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Lycka till!

- 1 *Maj-Lis, 66 år arbetar som sjuksköterska på en hjärtavdelning på sjukhuset. Hennes kollegor upplever att Maj-Lis har svårt att komma ihåg saker och i det dagliga sjuksköterskearbetet märks detta tydligt. Saker som hon tidigare har utfört glömmar hon nu bort. Kollegorna misstänker att detta kan handla om en begynnande demenssjukdom. Maj-Lis har fått hjälp att beställa en tid på hälsocentralen. Kollegan Fatima följer med henne dit.*

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomar ska den kognitiva förmågan bedömas med hjälp av två tester.

Vilka är dessa **två (2) tester?** (0,5 p/rätt svar, max 1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | | |

| | | | |

Mini Mental State examination

Klocktestet

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 2 Vad kallas det kvalitetsregister där man systematiskt kan följa och utvärdera olika omvårdnadsåtgärder när till exempel en person med demens är orolig eller aggressiv? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | | |

| | | | |

BPSD-register

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 3 Ortostatism är relativt vanligt hos den äldre personen. Nämn **ett (1) vanligt symtom** som förekommer vid ortostatism (endast ett svar). (1p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 4 Vad kallas den typ av smärta som orsakas av vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, exempelvis i kroppens inre organ eller vid inflammationer? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾



Nocipetiv smärta

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 5 Vid långvarig förstoppning kan en ansamling av avföring bildas i rektum. Detta tillstånd kan vara mycket smärtsamt för den äldre. Vad kallas denna ansamling av avföring i rektum? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | ↺ |

| | ✎ | Σ | ✕ |

Fekalom

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 6 Eftersom äldre personer är känsliga för läkemedel och ofta har nedsatta organfunktioner så drabbas de lättare av biverkningar av läkemedel med antikolinerg effekt. Markera de två (2) rätta påståendena gällande läkemedel med antikolinerg effekt. (0,5 p/rätt svar, max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Antikolinerga läkemedel ökar överföringen av acetylkolin vilket kan leda till förstoppning.
- ☒ Antikolinerga läkemedel minskar överföringen av acetylkolin vilket kan leda till minnessvårigheter.
- ☒ Antikolinerga läkemedel minskar överföringen av acetylkolin vilket kan leda till muntorrhet.
- ☐ Antikolinerga läkemedel ökar överföringen av acetylkolin vilket kan leda till urinretention.

Totalpoäng: 1

7 Markera det rätta svaret gällande äldre personer. (1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Den äldre personen får en minskad andel kroppsvatten och en minskad andel kroppsfett.
- ☐ Den äldre personen får en ökad andel kroppsvatten och en minskad andel kroppsfett.
- ☒ Äldre personer reagerar inte alltid med temperaturhöjning (feber) vid infektion.

Totalpoäng: 1

8 Markera det rätta svaret gällande demenssjukdomar. (1p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Vid Alzheimers sjukdom är de första symtomen ofta tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor
- ☐ I det första stadiet av frontallobsdemens (frontotemporal demens) ses en minnesstörning och minskad spontanitet
- ☐ I det första stadiet av Alzheimers sjukdom blir främst personligheten förändrad medan minnesproblem är mindre uttalade
- ☐ Vid vaskulär demens är omdömeslöshet och personlighetsförändring framträdande symtom

Totalpoäng: 1

9 Vid Alzheimers sjukdom kommer minnesförsämringen något senare i sjukdomen

Observation är av betydelse i vården av äldre människor för att kunna upptäcka tecken på smärta. Markera två (2) vanliga tecken på smärta. (0,5 p/rätt svar, max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Personen äter sämre
- ☐ Urinretention
- ☐ Personen blir lätt förstoppad
- ☐ Låg pulsfrekvens
- ☒ Höjd pulsfrekvens
- ☐ Lågt blodtryck

Totalpoäng: 1

10 Vilket läkemedel används vanligtvis vid Alzheimers sjukdom för att lindra symtomen? (1p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Kolinesterashämmare
- ☐ Antikoagulantia
- ☐ Antidepressiva läkemedel
- ☐ Lugnande läkemedel

Totalpoäng: 1

- 11 Varför är tiden av intresse vid insjuknandet i hjärninfarkt? Två (2) av följande svarsalternativ är rätt om personen har en misstänkt hjärninfarkt (0,5p/rätt svar, max 1p).

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Ju fortare en person med misstänkt hjärninfarkt får vård desto mindre blir skadorna i hjärnan.
- ☐ Vid hjärninfarkt brister en artär i hjärnan och blod strömmar ut i hjärnvävnaden. Därför är det viktigt med ett snabbt omhändertagande.
- ☒ Personen kan bli aktuell för trombolysbehandling, men behandlingen behöver ges inom en viss tidsram.
- ☐ Vid hjärninfarkt bör man vänta så länge som möjligt med mobilisering.

Totalpoäng: 1

- 12 Apraxi är ett symptom som ibland inte upptäcks på en gång när du möter en person med stroke. **Ange två (2) exempel på svårigheter** som en person med apraxi och stroke kan uppleva, exempelvis vid genomförandet av personlig hygien eller vid en måltidssituation. **(2p)**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | | |

| | | | |

Svårt att hålla bestyck och använda den

Svårt att tvätta med tvål

Ord: 0

Totalpoäng: 2

13 Ange en **(1) bidragande orsak** till att en person med stroke kan uppleva svårigheter avseende sexuella behov. **(1p)**

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 1

14 Hjärtsvikt innebär att hjärtat har en sviktande pumpförmåga och drabbar vanligtvis äldre personer. **(0,5p)**

Välj ett alternativ:

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5

- 15 Hjärtfunktionen påverkas av graden och typen av funktionsstörning i hjärtat, samt effekten av de olika kompensationsmekanisemerna. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5

- 16 Vilka tre (3) av nedan påståenden är korrekta gällande *hjärtsängläge* hos patienter med hjärtsvikt? (0,5p/rätt svar, max 1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Att ligga i hjärtsängläge innebär ett högt tryck på lår och fotrygg vilket medför risk för trycksår
- ☐ Hjärtsängläge medför ett ökat syrgasbehov i vävnaderna vilket anses som en gynnande effekt för hjärtats arbetsbelastning
- ☐ Att ligga i hjärtsängläge innebär ett tryck på ryggen, sätet och benen vilket medför en risk för trycksår
- ☐ Hjärtsängläge kan reducera hjärtats arbetsbelastning, vävnadernas syrebehov och venösa återflöde
- ☐ Hjärtsängläge ökar det venösa återflödet vilket underlättar för patienten att andas
- ☐ Hjärtsängläge innebär att patienten ligger plant vilket underlättar för patientens andningsarbete
- ☐ Att lägga patienten i hjärtsängläge med högt ryggläge bidrar till att ödem kan samlas i ben och i sätområdet

Totalpoäng: 1.5

- 17 Vilka tre (3) av nedanstående påståenden är korrekta gällande näring och vätska kopplat till personer med hjärtsvikt? (0,5p/rätt svar, max 1,5p).

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Det är bra att inta mindre måltider med tätare mellanrum vilket minskar hjärtats arbetsbelastning
- ☐ Vätskerestriktion på 3500-4000 ml ska alltid införas då risken för ödemutveckling minskar markant
- ☐ Via administration med större bolusdoser av sondnäring kan illamående och nedsatt aptit reduceras
- ☐ Kostrestriktionerna bör ej vara för strikta då nedsatt aptit och undernäring ofta kan vara ett problem
- ☐ Det är viktigt att personen har en strikt kosthållning och intar större måltider för att på så vis kunna tillgodose kroppens näringsbehov
- ☐ Personer med hjärtsvikt bör uppmanas att äta en saltfattig kost i syfte att minska vätskeretention

Totalpoäng: 1.5

- 18** Det är en varm sommardag och en undersköterska där du jobbar som sjuksköterska har precis rapporterat att en boende verkar vara dehydrerad. Det finns flera tecken på att en person är dehydrerad.

Välj de fyra (4) svarsalternativ som är symtom på dehydrering. **(0,5p / rätt svar, max 2p).**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Förstoppning
- ☐ Ökad urinmängd
- ☐ Ökad spänning och elasticitet i en vävnad, tex på handen
- ☒ Illamående / kräkning
- ☒ Torra slemhinnor
- ☐ Ökat blodtryck
- ☒ Svullen tunga

Totalpoäng: 2

- 19 Trötthet, viktnedgång och mineralbrist är konsekvenser som kan uppstå vid undernäring. Vilka konsekvenser kan en proteinbrist ge? Uppge en (1) konsekvens. (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | | |

Minskad muskelmassa

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 20 I hälso-och sjukvårdslagen står det att Vårdgivaren ska fastställa rutiner för hur undernäring ska förebyggas, när en bedömning av risken för undernäring ska göras samt hur en bedömning av risken för undernäring ska göras. Är påståendet nedan sant eller falskt? (1p)

Välj ett alternativ:

☐ Falskt

☒ Sant

Totalpoäng: 1

21

Anna har blivit ordinerad artificiell nutrition pga. bristande energi- och näringsintag pga. sjukdom under en period som beräknas överstiga en vecka. Hon ska få näringen enteralt och frågar dig vad det innebär och hur detta går till. (2p)

a) Hur sker näringstillförseln när den ges enteralt? 0,5p

Sond genom näsan

b) Vart tas näringen upp när en patient får enteral nutrition? 0,5p

mag-tarmkanalen

c) Nämn två (2) fördelar med enteral nutrition (gentemot parenteral nutrition) 0,5/rätt svar. Max 1 p

Bevara mag-tarmkanalens autonomi

mer komplett näring

Totalpoäng: 2

22

Markera om påståendet om typ1 diabetes är sant eller falskt. (0,25p/markering, max 0,5p)

Metformin är den enda farmakologiska behandlingen vid denna sjukdom.

Insulin är den enda farmakologiska behandlingen vid denna sjukdom.

FALSKT SANT

☒

☐

☐

☒

Totalpoäng: 0.5

23 Markera om påståendet om typ1 diabetes är sant eller falskt. (0,25p/markering, max 0,5p)

	FALSKT	SANT
Typ 2 diabetes är en folkhälsosjukdom	☐	☒
Typ 2 diabetes är en autoimmun sjukdom	☒	☐

Totalpoäng: 0.5

24 Vilken typ av diabetessjukdom har en person med nedsatt insulinkänslighet? (1p)

typ-2

Totalpoäng: 1

25 Vilken typ av diabetessjukdom har en person med insulinbrist? (1p)

typ-1

Totalpoäng: 1

- 26 Vid insulinbehandlad diabetessjukdom behöver patienten och/eller vårdpersonalen ha kunskap över vilka risker som kan utvecklas i samband med insulingivning.

Markera vilken risk som kan utvecklas utifrån nedanstående påståenden.

(0,5p/rätt markering, max 2 p)

	...finns en ökad risk för hypoglykemi	...finns en ökad risk för ett svängande och opålitligt p-glukos	...finns en ökad risk för hyperglykemi	...finns ingen påverkan på p- glukos
När insulin har varit fryst ...	☐	☐	☒	☐
När insulin har administrerats intramuskulärt...	☒	☐	☐	☐
När insulin har varit utsatt för solljus ...	☐	☐	☒	☐
När insulin administreras på samma ställe i den subcutana vävnaden, i lip hypertrofier...	☐	☒	☐	☐

Totalpoäng: 2

- 27 En hudbedömning ska upprepas dagligen hos personer som har ökad risk för trycksår. Hos personer med melaninrik hud (mörkare hud) kan avsaknad av synlig hudförändring förekomma över tryckutsatt område .

Beskriv hur du på annat sätt kan identifiera en förändring i huden över ett tryckutsatt område på kroppen? (1p)

känna efter om det finns en temperatur skilnad eller svullnad

Totalpoäng: 1

28

Vad är första åtgärden som du vidtar efter du identifierat ett kategori 1 trycksår i sacrum hos en sängliggande person? (1p)

Avlasta området

Totalpoäng: 1

29


Kryssa i 2 påståenden som stämmer med Inkontinens-associerad dermatit (IAD) (0,5p/rätt svar, max 1p)

- ☐ Delhudsskada, vanligtvis över benutskott, som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbädd. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld blåsa.
- ☐ Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar vid tryck.
- ☒ Ytliga småsår eller spegelsår på klinkorna
- ☐ Fullhudsskada, där subkutant fett är synligt men ben, sena, muskel syns inte.
- ☐ Djup fullhudsskada, som involverar ben, sena eller muskel.
- ☒ Kvarstående rodnad, blank och macererad hud mellan klinkorna

Totalpoäng: 1

- 30 Rita** en schematisk bild **och** förklara med **ord** vad som skiljer palliativ vård från kurativ vård. Använd pennan i övre högra hörnet att rita med. **(4 p)**

Skriv in ditt svar här



Totalpoäng: 4

- 31 Vilken fråga är viktigast att ställa till patienten i samband med injektionsgivning? (1p)**

Välj ett alternativ:

- ☐ Vad är ditt namn och personnummer?
- ☐ Har du fått information om anledningen till injektionen?
- ☒ Har du fått någon biverkning vid tidigare injektioner?

Totalpoäng: 1

- 32** I samband med iordningställande av injektioner bör du utföra kontroller för att försäkra dig om att du har rätt läkemedel/ läkemedelsnamn? Ange de övriga fyra kontroller du ska utföra. **(0,5/rätt svar, max 2p)**

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 2

33 Ange de fakta som är korrekta angående kateterisering av urinblåsa via urinröret, Välj fyra (4) alternativ, (0,5p/rätt svar, max 2p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Indikation för att tömma urinblåsan med kateterisering kan vara vid skada på urinröret.
- ☐ Indikation för att tömma urinblåsan med kateterisering kan vara akut eller kronisk urinretention.
- ☐ Det första kateterbytet bör göras inom 4-6 veckor
- ☐ Indikation för att tömma urinblåsan med kateterisering kan vara vid mätning eller övervakning av timdiures vid svår sjukdom.
- ☐ Vid kateterisering av man används 10g bedövningsgel
- ☐ Indikation för att tömma urinblåsan med kateterisering kan vara för att underlätta välbefinnande i livets slut.
- ☐ Vid kateterisering av kvinna används 10g bedövningsgel
- ☐ Innan avlägsnande av kateter ska alltid blåsträning ske i några dygn

Totalpoäng: 2

34 Vad innebär intermittent kateterisering? (1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Att kateterisering av urinblåsan sker med en kvarliggande latexkateter
- ☐ Att kateterisering av urinblåsan sker med en kvarliggande urinkateter som placeras i urinblåsan genom bukväggen
- ☐ Att kateterisering av urinblåsan sker med en kvarliggande silikonkateter
- ☐ Innebär att urinblåsan töms regelbundet flera gånger per dygn med en kateter som tas ut efter användandet.

Totalpoäng: 1

- 35** I vilken del av omvårdnadsjournalen dokumenterar du en patients bakgrundshistoria, det vill säga information om patientens hälsa/sjukdom och vardagligt liv före aktuellt vårdtillfälle? **(1p)**

Skriv in ditt svar här

Ange fyra (4) VIPS-sökord som används för att strukturera informationen i den del av omvårdnadsjournalen som beskrivs ovan, det vill säga den del av omvårdnadsjournalen som innehåller dokumentation kring patientens bakgrundshistoria och information om patientens hälsa/sjukdom före aktuellt vårdtillfälle. **(0,5p/rätt svar, max 2p)**

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 3