



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
O M 1 2 0 G	1 0 0 0	2 0 2 4 - 1 0 - 3 1
Kursnamn	Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

Institutionen för hälsovetenskaper, OMVÅRDNAD

Campus Sundsvall/Östersund

TENTAMEN

OMVÅRDNAD GR (A)

Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp

Kurskod: OM120G

Maxpoäng: 32p

Datum: 241031

Skrivtid: 4 timmar

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna. Samarbete är ej tillåtet.

Kursansvariga lärare:

Erika Gillström Sundsvall 010-1427856

Sandra Klippenberger Östersund 010-1428190

Information

Salstentamen består av beskrivande, para ihop, flervals- och sant eller falskt-frågor. Du kan få max 32 poäng och för godkänt betyg krävs att du uppnår 21 poäng (65%). Betyg kommer rapporteras och synas i Ladok senast 15 arbetsdagar efter genomförd examination.

Betygsskala (poäng)

VG	G	U
27-32	21-26,5	<21

OBS

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. omvårdnadsåtgärder så rättas det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Lycka till!

- 1 Postural hypotension kan förekomma hos den äldre personen. Vad innebär postural hypotension . Markera det rätta svaret? **1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Postural hypotension innebär svårighet att behålla blodtrycket på en adekvat nivå vid uppresning
- ☐ Postural hypotension innebär att blodtrycket stiger vid uppresning.
- ☐ Postural hypotension innebär taccycardi
- ☐ Postural hypotension innebär att personen svimmar på grund av hypertoni

Totalpoäng: 1

- 2 Förstoppning kan vara ett livshotande tillstånd hos den äldre personen. Som sjuksköterska är det av betydelse att förebygga att förstoppning uppstår. **Nämn två (2) olika omvårdnadsråd** som Du ger till en person som kan förebygga förstoppning (ej medicinska åtgärder). **0,5p/ rätt svar, max 1p.**

Ange ett omvårdnadsråd (0,5p)

Ange ett omvårdnadsråd (0,5p)

Totalpoäng: 1

- 3 Vilken är **den viktigaste åtgärden** att vidta när en äldre person uppvisar tecken på konfusion? **1p**
Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 4 Karin har drabbats av bältros och hon har så ont i utslagen som hon har på huvudet. **Vad kallas den typ av smärta** som kan uppkomma vid bältros? Denna smärta beskrivs som en stickande, skärande, huggande och ilande smärta. **1p**
Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 5 Markera de två (2) rätta påståendena gällande konfusion hos den äldre.
0,5p/rätt svar, max 1p
Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Urinvägsinfektion (UVI) hos den äldre kan leda till konfusion
- ☐ Personer med demens drabbas sällan av konfusion.
- ☐ Symtomen vid konfusion kommer smygande.
- ☐ Obstipation hos den äldre kan leda till konfusion

Totalpoäng: 1

- 6 **Vad heter det instrument** som ingår i kvalitetsregistret Senior alert som Du som sjuksköterska använder Dig av när Du gör en munhälsobedömning? **1p**

Skriv in ditt svar här

Detta instrument innebär att en bedömning utförs av bland annat; *röst, munslemhinnor, tunga, tandkött, tänder, proteser, saliv och läppar*. **Ytterligare en sak ska bedömas. Vad ska mer bedömas? 1p**

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 7 Kolinesterashämmare är läkemedel som används vid Alzheimers sjukdom. Markera de två (2) rätta svaren angående kolinesterashämmare. **0,5 p/ rätt svar, max 1p**

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Kolinesterashämmare kan lindra symtomen vid Alzheimers sjukdom vilket kan leda till kognitiva förbättringar
- ☐ Kolinesterashämmare är det enda läkemedel som i dag kan bota Alzheimers sjukdom
- ☐ Kolinesterashämmare ökar signalsubstansen Acetylkolin i hjärnan vilket leder till kognitiva förbättringar.
- ☐ Kolinesterashämmare minskar signalsubstansen Acetylkolin i hjärnan vilket leder till kognitiva förbättringar.
- ☐ Kolinesterashämmare ökar produktionen av signalsubstansen Dopamin i hjärnan vilket leder till kognitiva förbättringar.

Totalpoäng: 1

8 Reminiscens är en metod som kan användas för personer med demens. Vad är syftet med denna metod? **1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Reminiscens kan användas som metod för diagnossättande vid demenssjukdom
- ☐ Reminiscens kan användas som metod för att diagnostisera i vilka delar av hjärnan som nervcellernas antal minskat
- ☐ Reminiscens är en metod vars syfte är att stärka personens identitet, integritet och känsla av kontinuitet och sammanhang. Metoden kan vara ett sätt att stödja minnet
- ☐ Reminiscens är en metod vars syfte är att lugna en person med demens som har ett aggressivt beteende

Totalpoäng: 1

9 Vilket av dessa påståenden stämmer överens med Alzheimers sjukdom? **1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ De första symtomen är ofta tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor.
- ☐ Skadan i frontalloberna påverkar främst sociala och praktiska funktioner vilket kan yttra sig som förlust av hämningar och omdöme.
- ☐ Symtomen kommer oftast hastigt och märkbart och personen kan oftast berätta när besvären började.
- ☐ Symtomen utvecklas stegvis och man kan efter en ganska lång stabil period plötsligt försämrats igen.

Totalpoäng: 1

10 Para ihop nedanstående påståenden med rätt typ av stroke **1 p**

Matcha ihop värdena:

	Hjärninfarkt	Intracerebral blödning (hjärnblödning)
En blodpropp täpper till ett blodkärl i hjärnan och orsakar en ischemi.		
Ett blodkärl i hjärnan brister vilket medför en skada i hjärnvävnaden.		

Totalpoäng: 1

11 Beskriv hur visuell neglekt efter stroke kan påverka en persons intag av mat **1p**

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 13** Ange **ett (1)** exempel på en omvårdnadsåtgärd som en högerhänt person med svaghet i höger hand och arm kan vara i behov av. **1 p**

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 15** Undernäring innebär ett stort lidande för en person och innebär flera konsekvenser. Ange två (2) konsekvenser som kan uppstå vid undernäring (relaterat till nutrition). **0,5 p /rätt svar. Max 1p.**
Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 16** Sarkopeni betyder att en person har en begränsad reservkapacitet i kroppens organ, 1P
Välj ett alternativ:

☐ Falskt

☐ Sant

Totalpoäng: 1

18 Vad är rätt / falsk av påståenderna nedan. Välj de rätta alternativen. =0,5 p / rätt svar. Max 2p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ ☐ Parenteral nutrition ger en mer komplett näring än enteral nutrition.
- ☐ ☐ Enteral nutrition ges intravenöst
- ☐ ☐ Enteral nutrition ger en mer komplett näring än parenteral nutrition.
- ☐ ☐ En nasogastrisksond har en begränsad tid upp till ca 8-10 veckor.
- ☐ ☐ En fördel med enteral nutrition är att tunntarmens autonomi och fysiologi bevaras.
- ☐ ☐ Nedsatt eller ingen tarmmotorik är en kontraindikation för enteral nutrition
- ☐ ☐ En indikation för enteral nutrition är bristande energi- och näringsintag pga. sjukdom under en period som beräknas överstiga 3 dagar
- ☐ ☐ Patienten bör få en perkutan endoskopisk gastrostomi, PEG vid behov av enteral nutrition längre än 4-6 veckor

Totalpoäng: 2

19 Ange vad som anses vara ett normalt plasmaglukos när en person utan diabetesdiagnos tagit ett fasteprovn (glöm inte skriva vad värdet mäts i)? (1p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

20

Ange organet i kroppen där hormonet insulin bildas? (0,5p)

Vad heter de insulinproducerande cellerna? (0,5p)

Totalpoäng: 1

21 Ange 2 typiska symtom som tyder på en person med insulinbehandlad diabetes har insulinkänning. (1p)

1

2

Totalpoäng: 1

22

Beskriv hur du som sjuksköterska bör hjälpa en person med hypoglykemi? (1p)

Totalpoäng: 1

- 23 En person med insulinbehandlad diabetes som utvecklar hyperglykemi på grund av att insulinet har hanterats på ett sätt som lett till att insulinet har tappat sin verkan.

Ange 2 orsaker till att insulin kan tappa sin verkan, förutom att insulinet har blivit för gammalt. (0,5p/svar, max 1p)

1

2

Totalpoäng: 1

- 24 Ange 2 patientgrupper inom vården som har särskilt ökad risk för att utveckla trycksår, förutom patienter med diabetes och patienter som genomgår långa operationer. (0,5p/ rätt svar, max 1p)

1

2

Totalpoäng: 1

25

Kryssa i 2 påståenden som stämmer med Inkontinens-associerad dermatit (IAD) (0,5p/rätt svar, max 1p)

- ☐ Fullhudsskada, där subkutant fett är synligt men ben, sena, muskel syns inte.
- ☐ Ytliga småsår eller spegelsår på klinkorna
- ☐ Kvarstående rodnad, blank och macererad hud mellan klinkorna
- ☐ Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar vid tryck.
- ☐ Delhudsskada, vanligtvis över benutskott, som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbädd. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld blåsa.
- ☐ Djup fullhudsskada, som involverar ben, sena eller muskel.

Totalpoäng: 1

26 Ange 2 förebyggande omvårdnadsåtgärder som behöver utföras när du har identifierat en ökad risk för utveckling av trycksår hos en patient, förutom att se till att patientens hudområde inte blir utsatt högt och långvarigt tryck.

(0,5p/ rätt svar, max 1p)

1

2

Totalpoäng: 1

