



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
O M 1 2 0 G	1 0 0 0	2 0 2 4 - 1 2 - 1 6
Kursnamn	Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		



Institutionen för hälsovetenskaper, OMVÅRDNAD

Campus Sundsvall/Östersund

TENTAMEN

OMVÅRDNAD GR (A)

Hälsa och ohälsa I, 6 hp

Kurskod: OM120G

Maxpoäng: 32

Datum: 241216

Skrivtid: 4 timmar

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna. Samarbete är ej tillåtet.

Kursansvariga lärare:

Erika Gillström	Sundsvall	010-1427856
Sandra Klippenberger	Östersund	010-1428190

Information

Salstentamen består av beskrivande, para ihop, flervals- och sant eller falskt-frågor. Du kan få max 32 poäng och för godkänt betyg krävs att du uppnår 21 poäng (65%). Betyg kommer rapporteras och synas i Ladok senast 15 arbetsdagar efter genomförd examination.

Betygsskala (poäng)

VG	G	U
27-32	21-26,5	<21

OBS

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. omvårdnadsåtgärder så rättas det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Lycka till!

- 1 *Maj-Lis, 66 år arbetar som sjuksköterska på en hjärtavdelning på sjukhuset. Hennes kollegor upplever att Maj-Lis har svårt att komma ihåg saker och i det dagliga sjuksköterskearbetet märks detta tydligt. Saker som hon tidigare har utfört glömmar hon nu bort. Kollegorna misstänker att detta kan handla om en begynnande demenssjukdom. Maj-Lis har fått hjälp att beställa en tid på hälsocentralen. Kollegan Fatima följer med henne dit.*

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomar ska den kognitiva förmågan bedömas med hjälp av två tester.

Vilka är dessa **två (2) tester?** (0,5 p/rätt svar, max 1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | |

| | |

Mini mental test

Klocktestet

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 2 Vad kallas det kvalitetsregister där man systematiskt kan följa och utvärdera olika omvårdnadsåtgärder när till exempel en person med demens är orolig eller aggressiv? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | ↺ |

| | ✎ | Σ | ✕

BPSP

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 3 Ortostatism är relativt vanligt hos den äldre personen. Nämn **ett (1) vanligt symtom** som förekommer vid ortostatism (endast ett svar). **(1p)**

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 4 Vad kallas den typ av smärta som orsakas av vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, exempelvis i kroppens inre organ eller vid inflammationer? (1p)

Skriv in ditt svar här

nociceptiv smärta

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 5** Vid långvarig förstoppning kan en ansamling av avföring bildas i rektum. Detta tillstånd kan vara mycket smärtsamt för den äldre. Vad kallas denna ansamling av avföring i rektum? **(1p)**

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 1

- 6** Eftersom äldre personer är känsliga för läkemedel och ofta har nedsatta organfunktioner så drabbas de lättare av biverkningar av läkemedel med antikolinerg effekt. Markera de två (2) rätta påståendena gällande läkemedel med antikolinerg effekt. **(0,5 p/rätt svar, max 1p)**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Antikolinerga läkemedel ökar överföringen av acetylkolin vilket kan leda till förstoppning.
- ☒ Antikolinerga läkemedel minskar överföringen av acetylkolin vilket kan leda till muntorrhet.
- ☒ Antikolinerga läkemedel minskar överföringen av acetylkolin vilket kan leda till minnessvårigheter.
- ☐ Antikolinerga läkemedel ökar överföringen av acetylkolin vilket kan leda till urinretention.

Totalpoäng: 1

7 Markera det rätta svaret gällande äldre personer. (1p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Äldre personer reagerar inte alltid med temperaturhöjning (feber) vid infektion.
- ☐ Den äldre personen får en minskad andel kroppsvatten och en minskad andel kroppsfett.
- ☐ Den äldre personen får en ökad andel kroppsvatten och en minskad andel kroppsfett.

Totalpoäng: 1

8 Markera det rätta svaret gällande demenssjukdomar. (1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Vid vaskulär demens är omdömeslöshet och personlighetsförändring framträdande symtom
- ☐ I det första stadiet av frontallobsdemens (frontotemporal demens) ses en minnesstörning och minskad spontanitet
- ☒ Vid Alzheimers sjukdom är de första symtomen ofta tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor
- ☐ I det första stadiet av Alzheimers sjukdom blir främst personligheten förändrad medan minnesproblem är mindre uttalade

Totalpoäng: 1

9 Vid Alzheimers sjukdom kommer minnesförsämringen något senare i sjukdomen

Observation är av betydelse i vården av äldre människor för att kunna upptäcka tecken på smärta. Markera **två (2) vanliga tecken** på smärta. **(0,5 p/rätt svar, max 1p)**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Lågt blodtryck
- ☐ Urinretention
- ☐ Låg pulsfrekvens
- ☐ Personen blir lätt förstoppad
- ☒ Personen äter sämre
- ☒ Höjd pulsfrekvens

Totalpoäng: 1

10 **Vilket läkemedel** används vanligtvis vid Alzheimers sjukdom för att lindra symtomen? **(1p)**

Välj ett alternativ:

- ☐ Antidepressiva läkemedel
- ☐ Lugnande läkemedel
- ☒ Kolinesterashämmare
- ☐ Antikoagulantia

Totalpoäng: 1

- 11 Varför är tiden av intresse vid insjuknandet i hjärninfarkt? Två (2) av följande svarsalternativ är rätt om personen har en misstänkt hjärninfarkt **(0,5p/rätt svar, max 1p)**.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Vid hjärninfarkt brister en artär i hjärnan och blod strömmar ut i hjärnvävnaden. Därför är det viktigt med ett snabbt omhändertagande.
- ☒ Personen kan bli aktuell för trombolysbehandling, men behandlingen behöver ges inom en viss tidsram.
- ☒ Ju fortare en person med misstänkt hjärninfarkt får vård desto mindre blir skadorna i hjärnan.
- ☐ Vid hjärninfarkt bör man vänta så länge som möjligt med mobilisering.

Totalpoäng: 1

- 12 Apraxi är ett symptom som ibland inte upptäcks på en gång när du möter en person med stroke. Ange två (2) exempel på svårigheter som en person med apraxi och stroke kan uppleva, exempelvis vid genomförandet av personlig hygien eller vid en måltidssituation. (2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | |

| | |

Svårt att använda bestik

Svårt att tvätta med den förlamad sida

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 13 Ange en (1) **bidragande orsak** till att en person med stroke kan uppleva svårigheter avseende sexuella behov. (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | | |

Problem med erektionen

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 14** Det är en varm sommardag och en undersköterska där du jobbar som sjuksköterska har precis rapporterat att en boende verkar vara dehydrerad. Det finns flera tecken på att en person är dehydrerad.

Välj de fyra (4) svarsalternativ som är symtom på dehydrering. **(0,5p / rätt svar, max 2p).**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Ökat blodtryck
- ☒ Illamående / kräkning
- ☐ Ökad spänning och elasticitet i en vävnad, tex på handen
- ☒ Förstoppning
- ☒ Torra slemhinnor
- ☐ Ökad urinmängd
- ☒ Svullen tunga

Totalpoäng: 2

- 15 Trötthet, viktnedgång och mineralbrist är konsekvenser som kan uppstå vid undernäring. Vilka konsekvenser kan en proteinbrist ge? Uppge en (1) konsekvens. (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Försämrad sårläkning

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 16 I hälso-och sjukvårdslagen står det att Vårdgivaren ska fastställa rutiner för hur undernäring ska förebyggas, när en bedömning av risken för undernäring ska göras samt hur en bedömning av risken för undernäring ska göras. Är påståendet nedan sant eller falskt? (1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Falskt
- ☒ Sant

Totalpoäng: 1

17

Anna har blivit ordinerad artificiell nutrition pga. bristande energi- och näringsintag pga. sjukdom under en period som beräknas överstiga en vecka. Hon ska få näringen enteralt och frågar dig vad det innebär och hur detta går till. (2p)

a) Hur sker näringstillförseln när den ges enteralt? 0,5p

Det sker via magtarm systemet genom en sond

b) Vart tas näringen upp när en patient får enteral nutrition? 0,5p

Tunntarmen

c) Nämn två (2) fördelar med enteral nutrition (gentemot parenteral nutrition) 0,5/rätt svar. Max 1 p

Bevara tarmens funktion

Mindre risk för infektioner

Totalpoäng: 2

18

Markera om påståendet om typ1 diabetes är sant eller falskt. (0,25p/markering, max 0,5p)

Insulin är den enda farmakologiska behandlingen vid denna sjukdom.

Metformin är den enda farmakologiska behandlingen vid denna sjukdom.

FALSKT SANT



x



Totalpoäng: 0.5

19 Markera om påståendet om typ1 diabetes är sant eller falskt. (0,25p/markering, max 0,5p)

	FALSKT	SANT
Typ 2 diabetes är en autoimmun sjukdom	☒	☐
Typ 2 diabetes är en folkhälsosjukdom	☐	☒

Totalpoäng: 0.5

20 Vilken typ av diabetessjukdom har en person med nedsatt insulinkänslighet? (1p)

Typ-2

Totalpoäng: 1

21 Vilken typ av diabetessjukdom har en person med insulinbrist? (1p)

Typ-1

Totalpoäng: 1

- 22 Vid insulinbehandlad diabetessjukdom behöver patienten och/eller vårdpersonalen ha kunskap över vilka risker som kan utvecklas i samband med insulingivning.

Markera vilken risk som kan utvecklas utifrån nedanstående påståenden.

(0,5p/rätt markering, max 2 p)

	...finns ingen påverkan på p-glukos	...finns en ökad risk för ett svängande och opålitligt p-glukos	...finns en ökad risk för hyperglykemi	...finns en ökad risk för hypoglykemi
När insulin har administrerats intramuskulärt...	☐	☐	☐	☒
När insulin administreras på samma ställe i den subcutana vävnaden, i liphypertrofier...	☐	☒	☐	☐
När insulin har varit utsatt för solljus ...	☒	☐	☐	☐
När insulin har varit fryst ...	☐	☐	☒	☐

Totalpoäng: 2

- 23 En hudbedömning ska upprepas dagligen hos personer som har ökad risk för trycksår. Hos personer med melaninrik hud (mörkare hud) kan avsaknad av synlig hudförändring förekomma över tryckutsatt område .

Beskriv hur du på annat sätt kan identifiera en förändring i huden över ett tryckutsatt område på kroppen? (1p)

Smärta eller ömhet i området

Totalpoäng: 1

24

Vad är första åtgärden som du vidtar efter du identifierat ett kategori 1 trycksår i sacrum hos en sängliggande person? (1p)

Avlasta trycket genom att ändra patientens lägesposition

Totalpoäng: 1

25

Kryssa i 2 påståenden som stämmer med Inkontinens-associerad dermatit (IAD) (0,5p/rätt svar, max 1p)

- ☒ Kvarstående rodnad, blank och macererad hud mellan klinkorna
- ☐ Djup fullhudsskada, som involverar ben, sena eller muskel.
- ☒ Ytliga småsår eller spegelsår på klinkorna
- ☐ Fullhudsskada, där subkutan fett är synligt men ben, sena, muskel syns inte.
- ☐ Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar vid tryck.
- ☐ Delhudsskada, vanligtvis över benutskott, som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbädd. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld blåsa.

Totalpoäng: 1

- 26 Rita** en schematisk bild **och** förklara med **ord** vad som skiljer palliativ vård från kurativ vård. Använd pennan i övre högra hörnet att rita med. **(4 p)**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | |

| | |

Palliativ vård syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet när sjukdomen inte längre går att bota. Fokus ligger på symtomlindring, psykosocialt och existentiellt stöd för patient och närstående.

Kurativ vård syftar till att bota sjukdomen eller stoppa dess utveckling. Målet är återhämtning och överlevnad genom medicinsk behandling som operation, läkemedel eller strålning.

Skillnaden:

Kurativ vård = botande.

Palliativ vård = lindrande och stödjande.

Ord: 0

Totalpoäng: 4