



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
O M 1 2 0 G	1 0 0 0	2 0 2 5 - 0 3 - 2 0
Kursnamn	Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

**Institutionen för hälsovetenskaper, OMVÅRDNAD****Campus Sundsvall/Östersund****TENTAMEN****OMVÅRDNAD GR (A)****Hälsa och ohälsa I, 6 hp****Kurskod:** OM120G**Maxpoäng:** 32**Datum:** 250320**Skrivtid:** 4 timmar**Hjälpmedel:** Inga hjälpmedel tillåtna. Samarbete är ej tillåtet.**Kursansvariga lärare:**

Erika Gillström	Sundsvall	010-1427856
Sandra Klippenberger	Östersund	010-1428190

Information

Salstentamen består av beskrivande, para ihop, flervals- och sant eller falskt-frågor. Du kan få max 32 poäng och för godkänt betyg krävs att du uppnår 21 poäng (65%). Betyg kommer rapporteras och synas i Ladok senast 15 arbetsdagar efter genomförd examination.

Betygsskala (poäng)

VG	G	U
27-32	21-26,5	<21

OBS

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. omvårdnadsåtgärder så rättas det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Lycka till!

- 1 Alex 85 år fick för två år sedan diagnosen Alzheimers sjukdom. Han bor nu på ett demensboende där Du gör Din VFU. Undersköterskan Vincent berättar för Dig att Alex upplevs ha ont. När Vincent tar i hans arm skriker Alex och slår mot honom. Alex har kommunikationssvårigheter och kan inte själv beskriva/uttrycka sin smärta.

Vad heter det observationsinstrument som Du kan använda som sjuksköterska för att bedöma smärta hos en person som inte kommunicera och beskriva sin smärta. 1p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | | | ↺ | | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

2 *De svar du anger i textfält sparar automatiskt*

Observationsförmåga är en central egenskap i vården av äldre människor. Det finns olika fysiologiska tecken som kan vara ett uttryck vid smärta hos äldre.

a) Hur påverkas blodtrycket vid akut smärta hos den äldre personen? 0,5p

Skriv in ditt svar här

b) Hur påverkas pulsen vid akut smärta hos den äldre personen? 0,5p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 3 Förstoppning kan leda till ett livshotande tillstånd hos den äldre människan. Nämn två (2) vanliga orsaker till förstoppning/obstipation hos den äldre personen (0,5p/ rätt svar). Max 1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

4 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Förmågan att känna törst försämras när man blir äldre. Detta kan vara en orsak till att äldre riskerar uttorkning. I särskilda boenden och demensboenden är dock tillgången till dryck ibland begränsad särskilt om personen är beroende av hjälp att dricka. Personer med kognitiv sjukdom kanske inte kan påtala att de är törstiga.

Uttorkning ökar risken för allvarliga komplikationer hos den äldre personen. Beskriv två (2) komplikationer (0,5p/ rätt svar). Max 1p

Beskriv en komplikation**0,5p****Skriv in ditt svar här****Beskriv en komplikation****0,5p****Skriv in ditt svar här**

Totalpoäng: 1

5 Varför används BPSD-registret?**1p****Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

6 Vilken typ av kognitiv sjukdom/demens har ett förlopp som kan beskrivas som att sjukdomen utvecklas stegvis med omväxlande perioder av stabilitet och försämring? 1p**Välj ett alternativ:**

- ☐ Kognitiv sjukdom av Lewykroppps typ (Lewykroppps demens)
- ☐ Kognitiv sjukdom av Frontotemporal typ (Frontallobsdemens)
- ☐ Kognitiv sjukdom av Vaskulär typ (Vaskulär demens)
- ☐ Kognitiv sjukdom av Alzheimers typ (Alzheimers sjukdom)

Totalpoäng: 1

- 7 Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert innehåller ett bedömningsinstrument som används för att bedöma risk för fall hos den äldre personen. Vad heter detta bedömningsinstrument? 1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ ROAG
- ☐ Modifierade Nortonskalan
- ☐ MMSE
- ☐ DFRI
- ☐ MNA

Totalpoäng: 1

- 8 Läkemedel med antikolinerg effekt minskar överföringen av en transmittorsubstans/ signalsubstans, vilket ger en minskad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet. Samma transmittorsubstans/ signalsubstans är det brist på vid Alzheimers sjukdom. Vilken transmittorsubstans/signalsubstans? (endast ett rätt svar). 1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Noradrenalin
- ☐ Kolinesterashämmare
- ☐ Oxytocin
- ☐ Serotonin
- ☐ Acetylkolin
- ☐ Dopamin

Totalpoäng: 1

9 Markera det rätta påståendet gällande konfusion och äldre (endast ett rätt svar). 1p**Välj ett alternativ:**

- ☐ Konfusion är vanligen ett helt reversibelt tillstånd
- ☐ Konfusion drabbar sällan personer med demens.
- ☐ Konfusion och demens är samma sak.
- ☐ Konfusion är ett kroniskt tillstånd.

Totalpoäng: 1

10 Vilken typ av smärta kan förekomma vid tillstånd som exempelvis vid bältros, diabetesneuropati och smärta efter en stroke. Smärtan kan beskrivas som : huggande, skärande, ilande eller brännande eller diffust obehaglig eller som överkänslighet för beröring. 1p**Välj ett alternativ:**

- ☐ Ideopatiska smärtsyndrom
- ☐ Somatoforma smärtsyndrom
- ☐ Nociceptiv smärta
- ☐ Neuropatisk smärta
- ☐ Psykogen smärta

Totalpoäng: 1

11 Ange två (2) symtom som kan uppkomma vid stroke. **(0,5 p/rätt svar, max 1 p)**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

12 En stroke kan medföra konsekvenser för patientens grundläggande behov.

Ange två (2) förklaringar till att det kan uppstå problem med urininkontinens efter stroke. (1 p/rätt svar, max 2 p)

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 2

13 Vilken av följande beskrivningar stämmer överens med TIA (Transitorisk ischemisk attack)? **1 p**

Välj ett alternativ:

- ☐ En artär i hjärnan brister och medför neurologiska symtom som varar mer än 24 h.
- ☐ En tillfällig akut störning i hjärnan med neurologiska symtom som varar mindre än 24 h. Risken för ett efterföljande insjuknande i hjärninfarkt är hög.
- ☐ En embolus från hjärtat fastnar i en artär i hjärnan. Konsekvensen blir ischemi och neurologiska symtom som varar i mer än 24 h.
- ☐ En arteriell blödning subaraknoidalt, oftast med åskknallshuvudvärk som symtom. Tillståndet kan kräva akut behandling på neurokirurgisk klinik.

Totalpoäng: 1

- 14** Näringsriktiga måltider till yngre friska skapar förutsättningar för en långsiktig god hälsa och minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar som till exempel diabetes och hjärtkärlsjukdom. Beskriv vad måltidens bidrag och syfte har för en äldre och skör person? **1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 15** I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring (HSLF-FS 2022:49) finns det fastställda rutiner som en vårdtagare måste följa. Nämn två (2) av dessa rutiner. **0,5p / rätt svar. Max 1p.**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾

↺

✎

Σ

✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 16** Åldrande processen gör att äldre har ofta sämre aptit än en yngre individ. Vilka två (2) av de fyra (4) fysiska orsakerna är korrekta orsaker till att aptiten ofta är sämre hos en äldre person än en yngre individ. Välj de rätta alternativen. **(0,5/ rätt svar, max 1 p).**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Försämrade lufkfunktion påverkar aptiten och upplevs upp till 75% av äldre över 80 år
- ☐ Minskad salivproduktion medför att en äldre person oftare känner sig torr i munnen
- ☐ Ökad känslighet i munnen kan påverka förmågan att känna igen olika konsistenser på födan och även påverka artikulationen vid tal.
- ☐ Produktion av t ex matsmältningsenzymer ökar vilket ger en förlängd mättnadskänsla

Totalpoäng: 1

- 17** Du har identifierat att en äldre man med demenssjukdom på boendet där du arbetar är underviktig. Ge förslag på två (2) relevanta ätstödjande åtgärder du som sjuksköterska kan sätta in. **(0.5 / rätt svar, max 1 p)**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 18** Näring kan ges parenteralt eller enteralt. Para ihop rätt förklaring med rätt svar. **0,5p/ rätt svar, max 2p**

	Näring via sond eller percutan endoskopisk gastrostomi (PEG)	Näring via via venös infart, perifer venkateter (PVK) eller central venkateter (CVK)	Intravenös näringstillförsel	Näringstillförsel direkt till mag- och tarmkanalen
Enteral nutrition (EN)	☐	☐	☐	☐
Parenteral nutrition (PN)	☐	☐	☐	☐
Parenteral nutrition (PN)	☐	☐	☐	☐
Enteral nutrition (EN)	☐	☐	☐	☐

Totalpoäng: 2

- 19** De svar du anger i textfält sparas automatiskt

En person med insulinbehandlad diabetes kan utveckla akuta komplikationer som hyper och hypoglykemi.

Ange 2 vanliga symtom eller tecken som en person med hyperglykemi kan ha, förutom yrsel och trötthet? (0,5p/svar, max 1p)

Ange 2 vanliga symtom eller tecken som en person med hypoglykemi kan ha, förutom yrsel och trötthet? (0,5p/svar, max 1p)

Totalpoäng: 2

- 20** Vid insulinbehandlad diabetessjukdom behöver patienten och/eller vårdpersonalen ha kunskap över vilka risker som kan utvecklas i samband med insulingivning.

Markera vilken risk som kan utvecklas utifrån nedanstående påståenden.

(0,5p/rätt markering, max 3p)

	...finns en ökad risk för ett svängande och opålitligt p-glukos	...finns en ökad risk för hyperglykemi	...finns ingen påverkan på p- glukos	...finns en ökad risk för hypoglykemi
När en person har glömt att få insulin...	☐	☐	☐	☐
När insulin har administrerats intramuskulärt...	☐	☐	☐	☐
När insulin administreras på samma ställe i den subcutana vävnaden, i liphypertrofier...	☐	☐	☐	☐
När en person har fått en för stor dos insulin i förhållande till matintaget...	☐	☐	☐	☐
När insulin har varit utsatt för solljus ...	☐	☐	☐	☐
När insulin har varit fryst ...	☐	☐	☐	☐

Totalpoäng: 3

21 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Du arbetar som sjuksköterska på ett SÄBO. Paula som bor på boendet har en ökad risk för trycksår. Du har identifierat att det finns flera olika orsaker till att Paula har en ökad risk för att utveckla trycksår. En bidragande orsak är att hon inte självständigt kan få i sig tillräckligt med dryck och har därmed en ökad risk för intorkning.

Du gör en omvårdnadsplan utifrån omvårdnadsdiagnosen **Ökad risk för trycksår** och omvårdnadsmålet är att förhindra uppkomst av trycksår.

I omvårdnadsplanen sätts 3 delmål utifrån andra faktorer som kan öka risken för trycksår. Du ska ordinera 2 relevanta omvårdnadsåtgärder som bidrar till att vardera delmål kan uppnås.

(0,5p/relevant omvårdnadsåtgärd, max 3p)

Omvårdnadsmål: Förhindra uppkomst av trycksår		
	Delmål	Ange 2 omvårdnadsåtgärder för att uppnå delmålet
Exempel Delmål	<i>Exempel:</i> Att Paula får i sig tillräckligt med vätska (30ml/kg /dygn)	<i>Exempel:</i> Paula ska erbjudas dryck till varje måltid och att hon alltid har ett glas med dryck inom räckhåll.
Delmål 1:	Tillgodose näringsbehovet	1
		2
Delmål 2:	Bibehålla torr, smidig och hel hud	1
		2
Delmål 3:	Minska tryck, skjuv och friktion	1
		2

Omvårdnads mål: Förhindra uppkomst av trycksår

--	--	--

Totalpoäng: 3

- 22** Karl är obotligt sjuk och har palliativa vårdbehov. Han vistas i hemmet och har stöd från hemtjänst och hemsjukvård. Genom ditt arbete i hemsjukvården besöker du honom och då frågar han dig hur länge du tror att han kommer att leva.

Hur besvarar du frågan så att sista tiden i livet uppleva så bra som möjligt? (2p)

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 2

- 23** Karl dör i hemmet. Hans dotter är distriktssköterska och arbetar i hemsjukvården där Karl bor. Medicinskt ansvarig läkare har dokumenterat att tjänstgörande sjuksköterska kan utföra kontroller om indirekt dödsfall. Det gör att läkaren kan gå vidare och fastställa dödsfall.

a) Vilka är de indirekta kriterierna för att avgöra om en människa dött? **1p**

b) Kan Karls dotter utföra kontrollerna och meddela läkaren? Motivera ditt svar. **1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 2