



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
O M 1 2 0 G	1 0 0 0	2 0 2 5 - 0 5 - 1 5
Kursnamn	Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

**Institutionen för hälsovetenskaper, OMVÅRDNAD****Campus Sundsvall/Östersund****TENTAMEN****OMVÅRDNAD GR (A)**

Hälsa och ohälsa I, 6 hp

Kurskod: OM120G

Maxpoäng: 32

Datum: 250515

Skrivtid: 4 timmar

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna. Samarbete är ej tillåtet.

Kursansvariga lärare:

Erika Gillström	Sundsvall	010-1427856
Sandra Klippenberger	Östersund	010-1428190

Information

Salstentamen består av beskrivande, para ihop, flervals- och sant eller falskt-frågor. Du kan få max 32 poäng och för godkänt betyg krävs att du uppnår 21 poäng (65%). Betyg kommer rapporteras och synas i Ladok senast 15 arbetsdagar efter genomförd examination.

Betygsskala (poäng)

VG	G	U
27-32	21-26,5	<21

OBS

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. omvårdnadsåtgärder så rättas det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Lycka till!

- 1 Du gör Din VFU på ett särskilt boende för äldre (SÄBO). Där använder Du bedömningsinstrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) för att bedöma Justins munhälsa. ROAG omfattar nio områden som ska bedömas bland annat ; röst, läppar, tunga, tänder, proteser, munslemhinnor och tandkött. **Två områden till** ska bedömas enligt ROAG? Vilka två (2) områden? (0,5p för varje rätt svar). Max 1p

Ett område 0,5p

Skriv in ditt svar här

Ett område 0,5p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 2 Vid långvarig förstoppning kan en ansamling av avföring bildas i rektum. Detta tillstånd kan vara mycket smärtsamt för den äldre. Vad kallas denna ansamling av avföring i rektum? **1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 3 Vad kallas den form av inkontinens som är vanligast hos kvinnor och som uppstår vid fysisk aktivitet som när man till exempel hoppar, nyser eller hostar? Det kommer små skvättar av urin utan att man känner urinträngningar. **1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✖

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 4 Ortostatism är relativt vanligt hos den äldre personen. Nämn ett (1) vanligt symtom som förekommer vid ortostatism (endast ett svar). **1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 5 Läkemedel med antikolinerg effekt minskar överföringen av en transmittorsubstans/ signalsubstans, vilket ger en minskad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet. Samma transmittorsubstans/ signalsubstans är det brist på vid Alzheimers sjukdom. **Max 2p**

Vilken transmittorsubstans? 1p

Skriv in ditt svar här

Hur kan läkemedel med antikolinerg effekt påverka en person med Alzheimers sjukdom när det gäller salivproduktionen? 1p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 6 Vad kallas den typ av smärta som orsakas av vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, exempelvis i kroppens inre organ eller vid inflammationer? **1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾





Ord: 0

Totalpoäng: 1

7

Maj-Lis, 66 år arbetar som sjuksköterska på en hjärtavdelning på sjukhuset. Hennes kollegor upplever att Maj-Lis har svårt att komma ihåg saker och i det dagliga sjuksköterskearbetet märks detta tydligt. Saker som hon tidigare har utfört glömmar hon nu bort. Kollegorna misstänker att detta kan handla om en begynnande demenssjukdom. Maj-Lis har fått hjälp att beställa en tid på hälsocentralen. Kollegan Fatima följer med henne dit.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomar ska den kognitiva förmågan bedömas med hjälp av två (2) tester.

Vilka är dessa två tester ? (0,5 p för varje rätt svar). **Max 1p**

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 1

8 Markera det rätta påståendet gällande konfusion och äldre (endast ett rätt svar).1p**Välj ett alternativ:**

- ☐ Konfusion är ett kroniskt tillstånd.
- ☐ Konfusion drabbar sällan personer med demens.
- ☐ Konfusion är vanligen ett helt reversibelt tillstånd
- ☐ Konfusion och demens är samma sak.

Totalpoäng: 1

9 Observation är av betydelse i vården av äldre människor för att kunna upptäcka tecken på smärta. Markera ett (1) vanligt tecken på akut smärta hos äldre (endast ett rätt svar) 1p**Välj ett alternativ:**

- ☐ Lågt blodtryck
- ☐ Låg pulsfrekvens
- ☐ Bradycardi
- ☐ Höjd pulsfrekvens

Totalpoäng: 1

- 10** Ange två (2) problem som kan uppstå vid personlig hygien hos en person med svaghet i höger arm och hand efter stroke. Personen är högerhänt. **2 p**

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 2

- 11** Vilka två (2) av följande alternativ kan vara tecken på neglekt efter stroke. **0,5 p/rätt svar, max 1p**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Personen har svårigheter med artikulering och pratar därmed sluddrigt.
- ☐ Personen ser allting dubbelt.
- ☐ Personen rakar sig enbart på ena ansiktshalvan.
- ☐ Personen äter upp halva portionen med mat, men fortsätter att äta om tallriken snurras.

Totalpoäng: 1

12 Ange ett (1) exempel på vad du bör tänka på vid kommunikation med en person med afasi. **1p**
Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 1

- 13 Äldre har större risk att drabbas av dehydrering än en yngre person. Nämn fyra (4) tecken på att att en person drabbas av dehydrering. **Max 2p (0,5 per rätt svar)**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾

| | | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 2

14 Nils har Parkinson och tillhör en extra utsatt grupp för att drabbas av undernäring.

a) Beskriv varför och på vilket sätt (hur) parkinson gör att Nils är extra utsatt för att drabbas av undernäring. **1p**

Skriv in ditt svar här

b) Nämn ytterligare två (2) sjukdomar/diagnoser där en person har särskilt stor risk att drabbas av undernäring. 0,5 / rätt svar, max 1 p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

15 Lotta ska påbörja behandling med enteral nutrition. Vilka två (2) fördelar har enteral nutrition gentemot parenteral nutrition. Välj de rätta svaren.

Max 1p, 0,5p / rätt svar.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Avlastar tarmen
- ☐ Kan ges direkt i blodet
- ☐ Bevarar tunntarmens autonomi och fysiologi
- ☐ Förebygger mikrobiell överväxt och translokation

Totalpoäng: 1

16 Vilken av följande katetrar är lämplig för enteral nutrition? **1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG)
- ☐ Central venkateter (CVK)
- ☐ PICC-line
- ☐ Perifer venkateter (PVK)
- ☐ Kateter à demeure (KAD)

Totalpoäng: 1

17 Ange vad som anses vara ett normalt plasmaglukos när en person utan diabetesdiagnos tagit ett fasteproprov (glöm inte skriva vad värdet mäts i)? **(1p)**

Totalpoäng: 1

18 Ange två (2) typiska symtom som tyder på en person med insulinbehandlad diabetes har insulinkänning. **0,5 poäng/rätt svar, max 1p**

1

2

Totalpoäng: 1

19 Beskriv hur du som sjuksköterska bör hjälpa en person med hypoglykemi? **(1p)**

Totalpoäng: 1

20 En person med insulinbehandlad diabetes som utvecklar hyperglykemi på grund av att insulinet har hanterats på ett sätt som lett till att insulinet har tappat sin verkan.

Ange två (2) orsaker till att insulin kan tappa sin verkan, förutom att insulinet har blivit för gammalt. **(1p/svar, max 2p)**

1**2**

Totalpoäng: 2

- 21** En hudbedömning ska upprepas dagligen hos personer som har risk för trycksår. Hos personer med melaninrik hud (mörk hud) kan avsaknad av synlig hudförändring förekomma över tryckutsatt område .

På vilket sätt kan en hudförändring över tryckutsatt område i stället identifieras? **0,5p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Genom att observera om det finns rivmärken i huden på grund av klåda.
- ☐ Genom att känna efter om det finns temperatur eller konsistensskillnader i huden.
- ☐ Genom att observera om det finns fuktskador i huden.
- ☐ Genom att känna efter om huden är torr och flagig.

Totalpoäng: 0.5

- 22** Ange två (2) patientgrupper inom vården som har särskilt ökad risk för att utveckla trycksår, förutom patienter med diabetes och patienter som genomgår långa operationer.
(0,5p/ rätt svar, max 1p)

1

2

Totalpoäng: 1

23

Kryssa i 2 påståenden som stämmer med Inkontinens-associerad dermatit (IAD) (0,5p/rätt svar, max 1p)

- ☐ Fullhudsskada, där subkutant fett är synligt men ben, sena, muskel syns inte.
- ☐ Delhudsskada, vanligtvis över benutskott, som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbädd. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld blåsa.
- ☐ Djup fullhudsskada, som involverar ben, sena eller muskel.
- ☐ Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar vid tryck.
- ☐ Ytliga småsår eller spegelsår på klinkorna
- ☐ Kvarstående rodnad, blank och macererad hud mellan klinkorna

Totalpoäng: 1

24 I samband med hudbedömningen kan det finnas anledning att använda sig av "fingertrycktest-metoden". När då? **0,5p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Vid misstanke om trycksår, kategori 1
- ☐ Vid misstanke om trycksår, kategori 2
- ☐ Vid misstanke om trycksår, kategori 3
- ☐ Vid misstanke om trycksår, kategori 4

Totalpoäng: 0.5

25 Döden ser ungefär likadan ut oavsett diagnos. Förklara vilka omvårdnadsåtgärder som kan underlätta **livets slutskede fram till döden** hos en döende person som: 1p/del, max 3 p.

a) Drabbats av rosslighet

Skriv in ditt svar här

b) Drabbats av ångest

Skriv in ditt svar här

c) Drabbats av andnöd

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 3

26 Hur ska minskat matintag hanteras i livets slut? (1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Man bör sätta ett dropp som går sakta för att minska närståendes oro för intorkning och näringsbrist
- ☐ Man bör aldrig sätta dropp för att minska risken för lungödem
- ☐ Man bör aldrig sätta dropp för det gör ont att sätta en percutan venös kanyl
- ☐ Man bör alltid sätta dropp för att minska risken för intorkning

Totalpoäng: 1