

Первый курс, весенний семестр
Практика по алгоритмам #14:
Быстрое преобразование Фурье

Contents

Новые задачи	2
Домашнее задание	3
Обязательная часть	3
Дополнительная часть	3

Новые задачи

1. Возведение в степень.

За какое время можно посчитать 2^n в десятичной системе счисления?

2. Поиск с ошибками.

Даны текст t и строка s над алфавитом размера k . Для каждого из $|t| - |s| + 1$ наложений s на t узнать количество ошибок. Время $\mathcal{O}(k|t| \log |t|)$.

3. Поиск с ошибками и шаблоном.

Апгрейд предыдущей задачи. И в тексте, и в строке допустимы символы “?”.

4. Дуэль!

В каждой клетке полосы $1 \times n$ или растёт дерево, или нет. За $\mathcal{O}(n \log n)$ найдите количество троек деревьев, подходящих для дуэли (два дуэлянта и секундант). Тройка подходит для дуэли, если расстояния равны.

5. Уравнение.

Даны n и m . Найдите количество троек (x, y, z) , решений уравнения $x^n + y^n \equiv z^n \pmod m$

6. Два в одном!

На паре у нас было FFT над многочленами с комплексными коэффициентами. Пусть на самом деле коэффициенты – вещественные числа. Например, так будет, если мы пишем длинную арифметику в целых числах. Сделайте два Фурье в одном. Подсказка: $c_j = a_j + i \cdot b_j$, осталось понять, как $\text{FFT}(a)$ и $\text{FFT}(b)$ выразить через $\text{FFT}(c)$.

7. Динамика по дереву.

Сколько способов вырезать из полного бинарного дерева глубины k поддерево размера s , содержащее корень исходного?

8. (*) Задача о рюкзаке.

Даны n предметов и запросы “можно ли набрать вес w_i , используя только предметы с номерами от l_i до r_i ”. При этом все $w_i \leq s$. Сделайте предподсчёт за $\mathcal{O}(ns \log s)$ так, чтобы на запрос можно было бы в online ответить за $\mathcal{O}(s \log s \log n)$.

9. (*) Пентоганальная теорема Эйлера.

Собственно теорема заключается в том, что $\prod_{k=1}^{\infty} (1 - x^k) = \sum_{q=-\infty}^{\infty} (-1)^q x^{(3q^2+q)/2}$. Рассмотрим

$P(x) = p_0 + xp_1 + x^2p_2 + \dots$, где p_n – число разбиений числа n на возрастающие слагаемые.

Заметим, что $P(x) = \prod_{k=1}^{\infty} (1 - x^k)$. Используя эти знания и FFT за $\mathcal{O}(n \log n)$, найдите

количество разложений числа n на возрастающие слагаемые по модулю $3 \cdot 2^{18} + 1$ (простое).

Предложите, как найти само число, а не только остаток от деления. $\mathcal{O}(mn \log n + m^2)$, где m – длина ответа.

Домашнее задание

Обязательная часть

1. **(4) Обратное по модулю.**

Найти к числу x ($0 \leq x < m$) обратное по модулю m за $\mathcal{O}(\log^2 m)$.

2. **(4) AVL деревья.**

Найти количество AVL деревьев глубины h из n вершин по модулю $3 \cdot 2^{18} + 1$ за $\mathcal{O}(nh + n \log n)$.

3. **(3) Циклические сдвиги.**

Даны A, B , $|A| = |B| = n$. Найти D – такой циклический сдвиг B , что скалярное произведение A и D максимально.

4. **(3) Поиск подкартинки.**

Даны две картины, заданные 256 оттенками серого. То есть даны матрицы целых чисел a и b . a по обоим размерам больше b . Найти такое наложение матрицы b на a , что суммарное квадратичное отклонение цветов минимально.

То есть найти такие i, j , что $\sum_{x,y} (a[x, y] - b[x + i, y + j])^2 \rightarrow \min$.

5. **(3) Одно FFT через несколько FFT.**

Сведите вычисление FFT последовательности размера pn к p вычислениям FFT от последовательностей размера n и $\mathcal{O}(p^2 n)$ дополнительных операций.

Дополнительная часть

1. **(4) Перевод из системы счисления в другую быстрее квадрата.**
2. **(5) Интерполяция быстрее квадрата.**
3. **(5) С помощью FFT за $\mathcal{O}^*(2^n)$ найдите покраску вершин неорграфа в k цветов.**
4. **(5) Количество счастливых билетов из $2n$ цифр за $\mathcal{O}(n \log n)$ операций с числами порядка ответа.**
5. **(4) Даны строка и текст. Оба могут содержать вопросы.**
Найти точное совпадение за $\mathcal{O}(1)$ вызовов Фурье. Алфавит – не константа!