· $7H_2O$. М. м. 252,18. Бесцветные кристаллы. На воздухе легко теряет воду и окисляется.

Хранят в банках с притертыми пробками, залитыми парафином. ГОСТ 429-76.

Натрия сульфита раствор. 30 г натрия сульфита растворяют в воде и доводят объем раствора водой до 100 мл.

Натрий сернистый. Натрия сульфид. $Na_2S \cdot 9H_2O$. М. м. 240,18. Бесцветные или светло-желтые кристаллы, расплывающиеся на воздухе. ГОСТ 2053-77, ч. д. а.

Натрия сульфида раствор. 2 г натрия сульфида растворяют в воде, прибавляют 2—3 капли глицерина и доводят объем раствора водой до 100 мл.

Хранят в небольших, хорошо укупоренных, наполненных доверху стеклянных сосудах в прохладном и защищенном от света месте.

Натрий серноватистокислый. Натрия тиосульфат. $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$. М. м. 248,18. Бесцветные прозрачные кристаллы. СТ СЭВ 223-75.

Натрий сернокислый. Натрия сульфат. $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$. М. м. 322,19. Бесцветные прозрачные, выветривающиеся на воздухе кристаллы. ГОСТ 4171-76.

Натрия сульфата раствор. 20 г натрия сульфата растворяют в воде и доводят объем раствора водой до 100 мл.

Натрий сернокислый безводный. Натрия сульфат безводный. Na_2SO_4. М. м. 142,04. Белый кристаллический порошок. ГОСТ 4166-76, х. ч., ч. д. а.

Натрий тетраборнокислый 10-водный. Натрия тетраборат. Бура. $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$. М. м. 381,37. Бесцветные прозрачные, легко выветривающиеся кристаллы или белый кристаллический порошок. ГОСТ 4199-76, СТ СЭВ 1751-79.

Натрия тетрабората (буры) насыщенный раствор. 5 г мелко растертого натрия тетрабората заливают 100 мл воды и оставляют при частом взбалтывании на 24 ч. Раствор фильтруют.

Натрия тетрабората (буры) раствор (0,05 моль/л). Натрия тетраборат дважды перекристаллизовывают из воды, растворяя его при температуре не выше 60 °С и сушат между листами фильтровальной бумаги, меняя последнюю до тех пор, пока отдельные кристаллы не перестанут прилипать к стеклянной палочке.

19,07 г перекристаллизованного натрия тетрабората растворяют в воде и доводят объем раствора водой до 1 л.

Натрий углекислый безводный. Натрия карбонат безводный. Na_2CO_3. М. м. 105,99. Белый зернистый порошок. ГОСТ 83-79, х. ч.

Натрия карбоната раствор. 10 г натрия карбоната безводного растворяют в воде и доводят объем раствора водой до 100 мл.

Натрия карбоната раствор (0,05 моль/л). 5,3 г натрия карбоната растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 1 л и доводят объем раствора водой до метки.

Натрий уксуснокислый 3-водный. Натрия ацетат. $CH_3COONa \cdot 3H_2O$. М. м. 136,08. Бесцветные прозрачные кристаллы, выветриваются в теплом воздухе. ГОСТ 199-78.

Натрия ацетата раствор. 10 г натрия ацетата растворяют в воде и доводят объем раствора водой до 100 мл. Раствор применяют свежеприготовленным.

Натрия ацетата раствор (0,1 моль/л). 1,36 г натрия ацетата растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 100 мл и доводят объем раствора водой до метки.

Натрия ацетат безводный. Натрия ацетат сначала высушивают при 60 °С, а затем при 120 °С до постоянной массы.

Натрий фосфорноватистокислый. Натрия гипофосфит. $NaH_2PO_2 \cdot H_2O$. М. м. 106,01. Белый кристаллический порошок, гигроскопичен. ГОСТ 200-76.

Натрия гипофосфита раствор (реактив Тиле). 20 г натрия гипофосфита растворяют в 40 мл воды. Раствор вливают в 180 мл концентрированной хлористоводородной кислоты и оставляют на 24 ч. По осаждении выделившихся кристаллов натрия хлорида жидкость сливают с осадка. Раствор должен быть бесцветным.

Хранят в стеклянном сосуде с притертой пробкой.

Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Натрия фосфат двузамещенный. $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$. М. м. 358,17. Прозрачные бесцветные кристаллы, выветриваются в сухом воздухе. ГОСТ 4172-76.

Натрия фосфата раствор. 5 г натрия фосфата двузамещенного растворяют в воде и доводят объем раствора водой до 100 мл.

Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Натрия фосфат однозамещенный. $NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O$. М. м. 156,01. Бесцветные или белые кристаллы. ГОСТ 245-76, ч. д. а.

Натрий фосфорномолибденовокислый. Натрия фосфорномолибдат. $Na_3H_4[P(Mo_2O_7)_6] \cdot 19H_2O$. М. м. 2269,5. Желтый мелкокристаллический порошок. ТУ 6-09-2406-81.

Натрий хлористый. Натрия хлорид. NaCl. М. м. 58,44. Белые кубические кристаллы или белый кристаллический порошок. ГОСТ 4233-77.

Натрия хлорида насыщенный раствор. 40 г натрия хлорида заливают 100 мл воды и оставляют при частом взбалтывании 24 ч. Раствор фильтруют.

Натрий щавелевокислый. Натрия оксалат. $(COONa)_2$. М. м. 134,00. Белый кристаллический порошок. ГОСТ 5839-77, х. ч.

1-Нафтиламин. β-Нафтиламин. Азоамин гранатовый С. $C_{10}H_7NH_2$. М. м. 143,19. Белый или белый с розоватым или желтовато-розоватым оттенком кристаллический порошок с неприятным запахом. ГОСТ 8827-74, ч. д. а.

N-(1-Нафтил)-этилендиамин дигидрохлорид. α-Нафтилэтилендиамин дихлоргидрат. $C_{12}H_{14}N_2 \cdot 2HCl$. М. м. 259,18. Белый или слегка розовый кристаллический порошок. ТУ 6-09-15-420-80.

1-Нафтол. α-Нафтол. $C_{10}H_7OH$. М. м. 144,17. Белый с розовым оттенком, блестящий кристаллический порошок или блестящие