

	
자재명	뉴룩시캄캡슐_300C-라벨
규격	161 X 70mm
인쇄도수	■K100% ■PANTONE 123C ■PANTONE 2728C ■PANTONE 348C
작성(수정)일	2020.09.10
기타	풀림방향 : 두출(시계방향) 전문의약품, 분류번호, 유효성분 외 본문 - 7pt

전문 의약품 분류번호 114

뉴룩시캄캡슐

[멜록시캄]

300캡슐

DASAN
Pharmaceutical

7.5mg

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 멜록시캄(BP) 7.5mg
- 첨가제(타르색소) : 청색5호, 황색5호, 황색203호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물소, 사용부위:우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 시트르산나트륨수화물, 옥수수전분, 이산화규소, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 캡슐, 크로스카르멜로소스나트륨

[성상] 미황색의 내용물이 충전된 상,하부 녹색의 경질캡슐제

[효능 · 효과]

1. 통증과 운동실조를 수반하는 골관절염(퇴행관절염)의 급성악화시 단기간의 증상치료
2. 류마티스관절염의 증상치료
3. 강직척추염의 증상치료

[용법 · 용량]

1. 골관절염(퇴행관절염)의 급성악화시 :
○ 성인 : 멜록시캄으로서 7.5 mg을 1일 1회 경구투여한다. 증상이 개선되지 않을 경우 필요에 따라 1일 15 mg까지 증량할 수 있다.
2. 류마티스관절염, 강직척추염 :
○ 성인 : 이 약으로서 15 mg을 1일 1회 경구투여한다. 치료에 대한 반응에 따라 1일 7.5 mg로 감량할 수 있다.

이 약은 1일 15 mg을 초과하여 투여해서는 안되며, 식사 중 물 또는 다른 음료와 복용해야 한다.

- 고령자 또는 이상반응이 증대될 위험이 높은 자에게는 보통 1일 7.5 mg의 용량으로 치료를 시작한다.
- 혈액투석을 받은 중증의 신부전증 환자는 1일 7.5 mg 이상 투약하여서는 안된다.

[사용상의 주의사항] 첨부문서 참조

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조자] (주)메디카코리아 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

[제조의회사]  (주)다산제약
충청남도 아산시 도고면 덕암산로 381

[PM0276/00]

제조
번호

사용
기한

34 X 14mm
(착인공간) / 무코팅



병 : HDPE
캡 : LDPE