

	
자재명	록소디엘정60mg_600T-라벨
규격	140 X 70mm
인쇄도수	■K100% ■PANTONE 123C ■PANTONE 2728C ■PANTONE 348C
작성(수정)일	2022.05.03
기타	- 착인공간 : 40X18 - 폴림방향 : 라벨 폴림방향은 미출 - 재질 : 아트지 80g, 강접 - 전체 무코팅

전문의약품 분류번호 114

록소디엘정

[록소프로펜나트륨수화물]

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 록소프로펜나트륨수화물(IP) 68.1 mg(무수물로서 60.0 mg)
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

• 기타 첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저지환도하드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨

[성상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과]

1. 다음 질환 및 증상의 소염·진통·만성류마티스관절염, 골관절염(퇴행관절염), 요통, 건관절주위염, 경경원증후군

2. 수술후 외상후 및 발치후의 소염·진통

3. 다음 질환의 해열·진통 : 급성 상기도염(급성기관지염을 수반한 급성 상기도염을 포함)

[용법·용량]

1. 효능·효과 1, 2의 경우

○성인 : 록소프로펜나트륨(무수물)으로서 1회 60 mg을 1일 3회 경구투여한다. 1회 요법시에는 1회 60~120 mg을 경구투여한다.

2. 효능·효과 3의 경우

○성인 : 록소프로펜나트륨(무수물)으로서 1회 60 mg을 경구 투여한다. 원칙적으로 1일 2회, 1일 최대 180 mg까지 투여할 수 있다. 공복시에는 복용을 피하는 것이 바람직하다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항] 첨부문서 참조

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조사] (주)씨엘지제약

경기도 시흥시 공단대로27번길 27

[제조외사]  (주)다산제약

충청남도 아산시 도고면 덕암산로 381

제조번호
사용기한

인장공간표시 : 40*18mm
실제 인쇄시 백색

[PM1117/00]

600정

60mg

DASAN
Pharmaceutical