

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
KHOA TOÁN - TIN HỌC



**BÁO CÁO**  
**ĐỀ TÀI: TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ VỚI**  
**COPULA**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**  
Năm học: 2025 - 2026

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

ThS. Nguyễn Hữu Toàn

**SINH VIÊN THỰC HIỆN**

Phan Hoàng Đạt - 22110037.

Hồ Chí Minh – 2026

## Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan rằng, báo cáo này là sản phẩm được thực hiện bởi tôi, được thực hiện dựa trên sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn và các tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ. Mọi dữ liệu, số liệu và kết quả trình bày trong luận văn đều trung thực và chưa từng được sử dụng trong bất kỳ công trình nào trước đây, trừ khi được chỉ rõ trong phần tham khảo.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung bài báo cáo.

## Lời cảm ơn

Quá trình học môn học này là một giai đoạn rất quan trọng. Nó là tiền đề nhằm trang bị cho em những kỹ năng nghiên cứu, những kiến thức quý báu, tạo bước đệm cho quá trình sau này.

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo khoa đã tạo điều kiện học tập tốt nhất với môi trường học tập hiện đại, trang thiết bị đầy đủ, giúp em tiếp cận với các công nghệ và phương pháp thực hành tiên tiến.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn của chúng tôi, Ths. Nguyễn Hữu Toàn, vì sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình trong suốt môn học cũng như là quá trình thực hiện báo cáo. Em cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn ủng hộ và khích lệ chúng tôi trong mọi hoàn cảnh.

Mặc dù đã cố gắng hết mình, nhưng bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

# Mục lục

|            |                                                               |           |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>MỞ ĐẦU (INTRODUCTION)</b>                                  | <b>5</b>  |
| I.1        | Bối cảnh nghiên cứu . . . . .                                 | 5         |
| I.2        | Mục tiêu nghiên cứu . . . . .                                 | 5         |
| I.3        | Phạm vi và giới hạn nghiên cứu . . . . .                      | 5         |
| <b>II</b>  | <b>CƠ SỞ LÝ THUYẾT</b>                                        | <b>5</b>  |
| II.1       | Bài toán tối ưu hóa Mean-Variance (Markowitz) . . . . .       | 5         |
| II.1.1     | Quy tắc trung bình-phương sai và đa dạng hóa . . . . .        | 5         |
| II.1.2     | Danh mục đầu tư rủi ro tối thiểu (MVP) . . . . .              | 6         |
| II.1.3     | Danh mục đầu tư có tài sản phi rủi ro . . . . .               | 7         |
| II.2       | Copula và sự phụ thuộc đuôi . . . . .                         | 7         |
| II.2.1     | Các Copula . . . . .                                          | 7         |
| II.2.2     | Các ví dụ của Copula . . . . .                                | 9         |
| II.2.3     | Phân phối meta . . . . .                                      | 10        |
| II.2.4     | Các đặc tính khác của Copula . . . . .                        | 11        |
| II.2.5     | Sự phụ thuộc hoàn hảo . . . . .                               | 11        |
| II.3       | Các thước đo sự phụ thuộc đuôi . . . . .                      | 12        |
| II.3.1     | Tương quan tuyến tính . . . . .                               | 12        |
| II.3.2     | Tương quan hạng . . . . .                                     | 13        |
| II.3.3     | Các hệ số phụ thuộc đuôi . . . . .                            | 14        |
| II.4       | Các Copula hỗn hợp chuẩn . . . . .                            | 15        |
| II.4.1     | Phụ thuộc đuôi . . . . .                                      | 15        |
| II.4.2     | Tương quan hạng . . . . .                                     | 16        |
| II.5       | Các Copula Archimedean . . . . .                              | 17        |
| <b>III</b> | <b>Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo từ Copula</b>                | <b>18</b> |
| III.1      | Quy trình chung cho phân phối Meta . . . . .                  | 18        |
| III.2      | Mô phỏng Gauss Copula . . . . .                               | 19        |
| III.3      | Mô phỏng t Copula . . . . .                                   | 19        |
| III.4      | Mô phỏng Copula Archimedean (LT-Archimedean) . . . . .        | 19        |
| III.5      | Các thuật toán nâng cao cho phân phối hỗn hợp chuẩn . . . . . | 20        |
| <b>IV</b>  | <b>PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU</b>                                 | <b>21</b> |
| IV.1       | Thu thập và xử lý dữ liệu . . . . .                           | 21        |
| IV.2       | Quy trình phân tích dữ liệu . . . . .                         | 21        |
| <b>V</b>   | <b>PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ</b>                          | <b>21</b> |
| V.1        | Phân tích đơn biến . . . . .                                  | 21        |
| V.2        | Phân tích biến phụ thuộc . . . . .                            | 21        |
| V.3        | Áp dụng mô hình Copula . . . . .                              | 21        |
| V.4        | Mô hình mô phỏng Monte Carlo . . . . .                        | 21        |
| V.4.1      | Thiết kế mô hình mô phỏng Monte Carlo . . . . .               | 21        |
| V.4.2      | Chiến lược triển khai mô phỏng với 10.000 kịch bản . . . . .  | 21        |
| V.5        | Tối ưu hóa danh mục đầu tư . . . . .                          | 21        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>VI Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ</b>            | <b>21</b> |
| VI.1 Giải thích kết quả . . . . .                 | 21        |
| VI.2 Ý nghĩa cho doanh nghiệp . . . . .           | 21        |
| VI.3 Ý nghĩa cho nghiên cứu học thuật . . . . .   | 21        |
| <b>VII KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI</b> | <b>21</b> |
| VII.1 Tóm tắt kết quả chính . . . . .             | 21        |
| VII.2 Đóng góp học thuật . . . . .                | 21        |
| VII.3 Hướng nghiên cứu trong tương lai . . . . .  | 21        |

# I MỞ ĐẦU (INTRODUCTION)

## I.1 Bối cảnh nghiên cứu

Trong quản trị rủi ro tài chính, hệ số tương quan tuyến tính truyền thống thường thất bại trong việc đo lường chính xác các biến động rủi ro, đặc biệt là khi thị trường rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Bản chất của hệ số tương quan tuyến tính chỉ là đo lường mức độ liên kết tuyến tính trung bình giữa hai biến số. Tuy nhiên, trên thực tế, khi thị trường xảy ra khủng hoảng, các tài sản tài chính lại có xu hướng sụp đổ cùng nhau một cách mạnh mẽ hơn nhiều so với điều kiện bình thường; thậm chí tồn tại trường hợp hai biến có tương quan tuyến tính cao nhưng lại hoàn toàn không có sự phụ thuộc đuôi. Chính vì vậy, việc chỉ dựa vào tương quan tuyến tính hoặc áp đặt giả định độc lập có thể dẫn đến việc đánh giá thấp một cách nghiêm trọng xác suất xảy ra các tổn thất lớn.

Để giải quyết hạn chế này, lý thuyết Copula đã được xem như một công cụ mạnh mẽ thay thế cho hệ số tương quan tuyến tính nhờ vào khả năng tách biệt các hàm phân phối biên ra khỏi cấu trúc phụ thuộc. Tóm lại, hệ số tương quan tuyến tính thất bại vì nó giả định một mối quan hệ đồng nhất trên toàn bộ phân phối, trong khi rủi ro thực sự trong các cuộc khủng hoảng lại nằm ở sự hội tụ của các giá trị cực hạn tại đuôi phân phối, một đặc tính mà chỉ mô hình Copula mới có thể nắm bắt và phản ánh một cách hiệu quả[2].

## I.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu ứng dụng lý thuyết Copula để mô hình hóa cấu trúc sự phụ thuộc đuôi, tức là hiện tượng các tài sản tài chính sụt giảm giá trị đồng thời. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tiến hành xây dựng một danh mục đầu tư tối ưu có tính bền vững cao hơn nhằm khắc phục những nhược điểm và mang lại hiệu quả vượt trội hơn so với mô hình Markowitz truyền thống.

## I.3 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

# II CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## II.1 Bài toán tối ưu hóa Mean-Variance (Markowitz)

### II.1.1 Quy tắc trung bình-phương sai và đa dạng hóa

Mô hình dựa trên giả thuyết rằng các nhà đầu tư coi tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là điều mong muốn và lo ngại rủi ro. Quá trình lựa chọn danh mục đầu tư gồm hai bước: đầu tiên là xác định các danh mục đầu tư tối ưu nằm trên đường biên hiệu quả dựa trên sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận, sau đó chọn danh mục phù hợp nhất với hàm thỏa dụng của từng nhà đầu tư tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và vốn đầu tư[1]. Markowitz đã thiết lập nền tảng cho việc lựa chọn danh mục đầu tư bằng cách ánh xạ mong muốn đầu tư lên biểu đồ rủi ro - lợi nhuận. Trong biểu đồ này thì lợi nhuận được đo bằng giá trị trung bình và rủi ro được đo bằng phương sai hoặc độ lệch chuẩn của phân phối lợi nhuận[3]. Công thức tính phương sai danh mục được xác định cụ thể như sau:

$$\sigma_w^2 = \text{Var}(R_w) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$$

Trong đó,  $\rho_{ij}$  là hệ số tương quan tuyến tính giữa các tài sản. Công thức này cho thấy rủi ro danh mục không phụ thuộc vào biến thiên riêng lẻ của từng tài sản mà phụ thuộc vào mối tương quan giữa các tài sản đó. Tuy nhiên,  $\rho$  chỉ đo lường mối quan hệ tuyến tính, và đây chính là điểm yếu mà hàm Copula sẽ khắc phục bằng cách tách biệt hàm phân phối biên và mô phỏng cấu trúc phụ thuộc phi tuyến.

Khi xem xét hai trường hợp biên với giả sử một danh mục gồm  $N$  tài sản có trọng số bằng nhau  $w_i = \frac{1}{N}$ , ta có các kết quả cụ thể. Trong trường hợp thứ nhất khi các tài sản không tương quan và độc lập với nhau, tức là  $\rho_{ij} = 0$  với mọi  $i \neq j$ , phương sai danh mục được tính bằng:

$$\text{Var}(R_w) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{N}\right)^2 \sigma_i^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sigma_i^2$$

Khi  $N \rightarrow \infty$  thì  $\text{Var}(R_w) \rightarrow 0$ . Việc có nhiều tài sản độc lập dẫn đến rủi ro danh mục càng nhỏ, điều này cho thấy rủi ro phi hệ thống có thể được triệt tiêu hoàn toàn nếu các tài sản không có sự liên kết với nhau. Trong trường hợp thứ hai khi các tài sản có tương quan với nhau, tức là  $\rho_{ij} = c > 0$  với mọi  $i \neq j$ , hiệp phương sai giữa mọi cặp tài sản là  $\sigma_{ij} = \text{Cov}(R_i, R_j) = c\sigma^2$ . Khi đó, phương sai danh mục trở thành:

$$\begin{aligned} \text{Var}(R_w) &= \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} = \frac{1}{N^2} \left( \sum_{1 \leq i \leq N} \sigma_{ii} + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \sigma_{ij} \right) \\ &= \frac{\sigma^2}{N} + \left(1 - \frac{1}{N}\right) c\sigma^2 = \frac{1-c}{N} \sigma^2 + c\sigma^2 \end{aligned}$$

Khi  $N \rightarrow \infty$ , phương sai danh mục sẽ hội tụ về giới hạn:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var}(R_w) = c\sigma^2$$

Như vậy, dù có tăng số lượng tài sản đến vô hạn thì phương sai danh mục vẫn không thể nhỏ hơn  $c\sigma^2$ . Nếu  $c = 0$  đối với tài sản độc lập, kết quả sẽ trở về trường hợp thứ nhất với rủi ro giảm dần về 0 khi  $N$  tăng. Ngược lại, khi  $c > 0$ , rủi ro hệ thống chung giữa các tài sản luôn tồn tại và không thể loại bỏ được bằng đa dạng hóa.

Hạn chế của mô hình Markowitz là rủi ro này phụ thuộc chặt chẽ vào hệ số  $c$  tương quan tuyến tính. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ số  $c$  thường tăng mạnh trong các giai đoạn thị trường hoảng loạn tạo nên hiện tượng tương quan đuôi. Nếu chỉ sử dụng mô hình trung bình - phương sai, nhà đầu tư sẽ đánh giá thấp rủi ro hệ thống này vì giả định  $c$  là một hằng số tuyến tính không đổi[3].

### II.1.2 Danh mục đầu tư rủi ro tối thiểu (MVP)

Mục tiêu cốt lõi của danh mục đầu tư rủi ro tối thiểu (MVP) là tìm kiếm một tập hợp các tỷ trọng tài sản  $w$  sao cho tổng thể của danh mục được đo bằng phương sai  $\sigma_w^2$  là nhỏ nhất, do nhà đầu tư coi rủi ro là điều đáng ghét và lợi nhuận kỳ vọng là điều mong muốn. MVP đại diện cho điểm mà tại đó sự lo ngại rủi ro được đẩy lên mức cao nhất và không quan tâm đến lợi nhuận đạt được bao nhiêu. Để xác định bài toán tối ưu toán học cho danh mục gồm  $N$  tài sản rủi ro được xác định bởi vectơ  $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ , ta sử dụng ma trận hiệp phương sai  $C = [\sigma_{ij}]$  với  $\sigma_{ij} = \text{Cov}(R_i, R_j)$  và vectơ suất lợi nhuận  $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$ . Nhà đầu tư giải bài toán tối ưu hóa bằng phương pháp nhân tử Lagrange với hàm mục tiêu là giảm thiểu phương sai danh mục  $\min \sigma_w^2 = w^T C w$  (trong

đó  $w^T$  là ma trận chuyển vị của  $w$ ), đi kèm ràng buộc tổng tỷ trọng các tài sản phải bằng 1, nghĩa là  $\sum_{i=1}^N w_i = 1$  nhằm đảm bảo toàn bộ tài sản được đầu tư hết.

Ý nghĩa của hiệp phương sai được thể hiện qua công thức:

$$\sigma_w^2 = \sum_{i=1} w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i < j} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Công thức này được tính dựa trên trọng số và các phần tử trong ma trận hiệp phương sai. Vai trò của hiệp phương sai giữa các tài sản là rất lớn, nếu hiệp phương sai âm hoặc thấp thì rủi ro tổng thể của danh mục sẽ giảm đáng kể nhờ các biến động ngược chiều triệt tiêu lẫn nhau. Khi chuyển sang mô hình Copula, mối liên hệ này sẽ cho thấy rủi ro thực tế không chỉ nằm ở hiệp phương sai mà còn ở cấu trúc phụ thuộc phi tuyến tại các điểm cực trị của đuôi phân phối [mcneil2005quantitative].

Đường biên hiệu quả của mô hình mang lại những kết quả quan trọng về mặt hình học và ứng dụng. Trên mặt phẳng rủi ro - lợi nhuận với trục hoành là độ lệch chuẩn  $\sigma$  và trục tung là lợi nhuận kỳ vọng  $\mu$ , các danh mục khả thi tạo thành một vùng được bao bọc bởi một đường cong hình hyperbol. Điểm MVP của danh mục này nằm chính xác tại đỉnh của đường cong hyperbol, vốn là điểm cực trái nhất trên đồ thị. MVP cũng chính là điểm khởi đầu của đường biên hiệu quả; mọi danh mục nằm phía trên điểm MVP trên đường cong này được coi là hiệu quả, trong khi các danh mục nằm phía dưới MVP là không hiệu quả vì có rủi ro cao hơn nhưng lợi nhuận lại thấp hơn. Sự ra đời của đường biên hiệu quả đã thúc đẩy sự phát triển bùng nổ của các phương pháp quản trị rủi ro trong những thập kỷ tiếp theo, bao gồm các mô hình quan trọng như tỷ lệ Sharpe, mô hình định giá vốn tài sản (CAPM) và lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (APT).

### II.1.3 Danh mục đầu tư có tài sản phi rủi ro

Lãi suất phi rủi ro  $r_f$  là tỷ suất sinh lời của một tài sản được coi là không có rủi ro vỡ nợ, thường là trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Trong các mô hình định giá, lãi suất này được dùng làm lợi nhuận cơ sở để tính toán phần bù rủi ro. Khi kết hợp tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro, tập hợp các danh mục đầu tư khả thi sẽ tạo thành một đường thẳng nối từ điểm phi rủi ro và đi qua điểm danh mục tài sản rủi ro đó. Đường biên hiệu quả mới lúc này không còn là hình hyperbol mà trở thành một đường thẳng tiếp tuyến với đường biên hiệu quả của các tài sản rủi ro. Đường này được gọi là đường thị trường vốn (Capital Market Line - CML).

## II.2 Copula và sự phụ thuộc đuôi

### II.2.1 Các Copula

Copula giúp hiểu về sự phụ thuộc ở mức độ sâu hơn, cho phép chúng ta thấy những cam bẫy tiềm ẩn của các phương pháp tiếp cận sự phụ thuộc vốn chỉ tập trung vào tương quan, đồng thời chỉ cho chúng ta cách xác định một số thước đo hữu ích. Copula tạo điều kiện cho phương pháp tiếp cận mô hình đi từ dưới lên. Cách tiếp cận Copula cho phép chúng ta kết hợp các mô hình biên đã phát triển kỹ lưỡng với nhiều mô hình phụ thuộc khả thi khác nhau, từ đó nghiên cứu mức độ nhạy cảm của rủi ro đối với các đặc điểm phụ thuộc được chỉ định. Vì các loại Copula rất dễ mô phỏng nên chúng đặc biệt phù hợp cho các nghiên cứu rủi ro bằng phương pháp Monte Carlo.

**Các thuộc tính cơ bản:** Một Copula  $d$ -chiều là một hàm phân phối trên khối lập phương đơn vị  $[0, 1]^d$  với các phân phối biên đều tiêu chuẩn. Gọi  $C$  là một ánh xạ có dạng  $C : [0, 1]^d \rightarrow [0, 1]$ . Để  $C$  là một Copula thì nó phải thỏa mãn ba điều kiện: đầu tiên là  $C(u_1, \dots, u_d)$  tăng trong mỗi thành phần  $u_i$ ; tiếp theo là  $C(1, \dots, 1, u_i, 1, \dots, 1) = u_i$  với mọi  $i \in \{1, \dots, d\}$  và  $u_i \in [0, 1]$ ; cuối cùng là phải thỏa mãn bất đẳng thức hình chữ nhật với mọi  $(a_1, \dots, a_d)$  và  $(b_1, \dots, b_d) \in [0, 1]^d$  thỏa  $a_i \leq b_i$ , ta có:

$$\sum_{i_1=1}^2 \cdots \sum_{i_d=1}^2 (-1)^{i_1+\dots+i_d} C(u_{1i_1}, \dots, u_{di_d}) \geq 0$$

Trong đó  $u_{j1} = a_j$  và  $u_{j2} = b_j$  với mọi  $j \in \{1, \dots, d\}$ . Đối với thuộc tính biên, với bất kỳ số nguyên  $k$  nào thỏa mãn  $2 \leq k < d$ , các phân phối biên  $k$ -chiều của một Copula  $d$ -chiều thì bản thân chúng cũng là các Copula. Nếu ta gọi  $G$  là một hàm phân phối và  $G^{-1}$  là nghịch đảo tổng quát của  $G$ , tức là hàm  $G^{-1}(y) = \inf\{x : G(x) \geq y\}$ , thì ta có các biến đổi thành phần. Đầu tiên là biến đổi phân vị, nếu  $U \sim U(0, 1)$  có phân phối đều tiêu chuẩn thì  $P(G^{-1}(U) \leq x) = G(x)$ . Tiếp theo là biến đổi xác suất, nếu  $Y$  có phân phối tích lũy  $G$ , trong đó  $G$  là một hàm phân phối đơn biến liên tục, thì  $G(Y) \sim U(0, 1)$ .

**Định lý Sklar:** Định lý này được Sklar giới thiệu vào năm 1959, là định lý quan trọng nhất trong nghiên cứu về Copula và đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng các hàm phân phối đa biến. Định lý thiết lập mối quan hệ giữa hàm phân phối đồng thời  $F$  và các hàm phân phối biên  $F_1, \dots, F_d$  thông qua một hàm Copula  $C$ . Về sự tồn tại, với bất kỳ hàm phân phối đồng thời  $F$  có biên  $F_1, \dots, F_d$  luôn tồn tại một Copula  $C : [0, 1]^d \rightarrow [0, 1]$  sao cho với mọi  $x_1, \dots, x_d$  trong  $\bar{R}$ , ta có:

$$F(x_1, \dots, x_d) = C(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$$

Về tính duy nhất, nếu các biên  $F_1, \dots, F_d$  là liên tục thì Copula  $C$  là duy nhất. Nếu các biên không liên tục (ví dụ phân phối rời rạc), Copula  $C$  vẫn tồn tại nhưng chỉ được xác định duy nhất trên phạm vi giá trị của các biên ( $\text{Ran}F_1 \times \dots \times \text{Ran}F_d$ ), với  $\text{Ran}F_i = F_i(\bar{R})$  biểu thị phạm vi giá trị mà hàm phân phối biên  $F_i$  có thể nhận được. Chiều ngược lại mang tính hướng tổng quát, nếu  $C$  là một Copula và  $F_1, \dots, F_d$  là các hàm phân phối đơn biến, thì hàm  $F$  được xác định theo công thức trên chắc chắn là một hàm phân phối đồng thời hợp lệ với các biên chính là  $F_1, \dots, F_d$ . Mệnh đề tiếp theo chỉ ra rằng nếu  $T$  liên tục thì  $T \circ T^{-1}(y) = y$ . Từ một hàm phân phối đồng thời  $F$  có các biên liên tục, bằng cách sử dụng các hàm ngược  $F_i^{-1}$  tại  $x_i = F_i^{-1}(u_i)$ , với  $0 \leq u_i \leq 1$ ,  $i = 1, \dots, d$ , ta thu được công thức:

$$C(u_1, \dots, u_d) = F(F_1^{-1}(u_1), \dots, F_d^{-1}(u_d))$$

Công thức này cho thấy Copula diễn tả sự phụ thuộc trên thang đo phân vị.

Ý nghĩa của định lý trong quản trị rủi ro là rất lớn. Định lý cho phép nhà quản lý rủi ro tách biệt việc mô hình hóa hành vi biên của từng yếu tố rủi ro riêng lẻ khỏi việc mô hình hóa cấu trúc phụ thuộc giữa chúng. Sự linh hoạt này giúp nhà nghiên cứu có thể tự do kết hợp các loại phân phối biên khác nhau (như normal, t-Student, Pareto) với các cấu trúc phụ thuộc khác nhau nhằm tạo ra các mô hình phân phối đa biến phức tạp và thực tế hơn. Ngoài ra, khi ứng dụng trong các kịch bản cực đoan, Copula giúp mô hình hóa sự phụ thuộc của các kết quả cực đoan (như trong tính toán Value-at-Risk), điều mà các thước đo tương quan tuyến tính truyền thống thực hiện không tốt. Khi vectơ ngẫu nhiên  $X$  có phân phối tích lũy đồng thời  $F$  với các phân phối biên liên tục  $F_1, \dots, F_d$ , thì Copula của  $F$  (hoặc  $X$ ) là hàm phân phối đa biến  $C$  của  $(F_1(X_1), \dots, F_d(X_d))$ .



**Tính bất biến:** Copula của một phân phối sẽ không thay đổi dưới các phép biến đổi tăng nghiêm ngặt của các biến biên. Điều này có nghĩa là cấu trúc phụ thuộc (được biểu diễn bởi Copula) tách biệt hoàn toàn với hình dạng của các phân phối biên riêng lẻ. Chúng ta có thể thay đổi thang đo của từng tài sản mà không làm thay đổi bản chất mối quan hệ phụ thuộc giữa chúng. Mệnh đề cụ thể phát biểu rằng: Gọi  $(X_1, \dots, X_d)$  là một vectơ ngẫu nhiên với các biên liên tục và Copula  $C$ , gọi  $T_1, \dots, T_d$  là các hàm tăng ngặt. Khi đó  $(T_1(X_1), \dots, T_d(X_d))$  cũng có Copula là  $C$ .

Để chứng minh, đầu tiên biến đổi  $T_i(X_i)$  có hàm phân phối liên tục  $\bar{F}_i(y) := F_i \circ T_i^{-1}(y)$ . Để thấy điều này, áp dụng mệnh đề  $T \circ T^{-1}(y) \geq y$  ta có:

$$\bar{F}_i(y) = P(X_i \leq T_i^{-1}(y)) = P(T_i^{-1} \circ T_i(X_i) \leq T_i^{-1}(y))$$

Vì  $T_i^{-1}$  là một phép biến đổi tăng, chúng ta sử dụng bổ đề: Nếu  $F$  là hàm phân phối tích lũy của biến ngẫu nhiên  $X$ , thì  $P(F(X) \leq F(x)) = P(X \leq x)$ . Ta được:

$$\bar{F}_i(y) = P(T_i(X_i) \leq y) + P(X_i = T_i^{-1}(y), T_i(X_i) > y)$$

Nhưng xác suất thứ hai ở vế phải bằng không vì  $F_i$  liên tục. Vì  $C$  là Copula của  $X$ , nên có thể tính toán rằng:

$$C(u_1, \dots, u_d) = P(F_1(X_1) \leq u_1, \dots, F_d(X_d) \leq u_d) = P(\bar{F}_1(T_1(X_1)) \leq u_1, \dots, \bar{F}_d(T_d(X_d)) \leq u_d)$$

Vì  $\bar{F}_i \circ T_i(x) = F_i \circ T_i^{-1} \circ T_i(x) = F_i(x)$  theo mệnh đề đã nêu, suy ra  $C$  cũng là Copula của  $(T_1(X_1), \dots, T_d(X_d))$ .

**Giới hạn Fréchet:** Đối với mọi Copula  $C(u_1, \dots, u_d)$ , chúng ta luôn có các giới hạn biên sau:

$$\max \left\{ \sum_{i=1}^d u_i + 1 - d, 0 \right\} \leq C(u) \leq \min\{u_1, \dots, u_d\}$$

Mặc dù đưa ra các giới hạn Fréchet cho một Copula, các giới hạn Fréchet có thể đưa ra cho bất kỳ hàm phân phối đa biến nào. Đối với một hàm phân phối tích lũy đa biến  $F$  với các biên  $F_1, \dots, F_d$ , chúng ta thiết lập bằng lập luận tương tự là:

$$\max \left\{ \sum_{i=1}^d F_i(x_i) + 1 - d, 0 \right\} \leq F(x) \leq \min\{F_1(X_1), \dots, F_d(X_d)\}$$

Vì vậy chúng ta có các giới hạn cho  $F$  theo các phân phối biên riêng lẻ của nó.

## II.2.2 Các ví dụ của Copula

**Các Copula cơ bản:** Copula độc lập ( $\Pi$ ) xuất hiện khi các biến ngẫu nhiên liên tục là độc lập nếu và chỉ nếu cấu trúc phụ thuộc của chúng được mô tả bởi công thức  $\Pi(u_1, \dots, u_d) = \prod_{i=1}^d u_i$ . Copula đồng biến ( $M$ ) là giới hạn trên Fréchet, được định nghĩa là  $M(u_1, \dots, u_d) = \min\{u_1, \dots, u_d\}$ , đại diện cho sự phụ thuộc thuận hoàn hảo khi các biến là hàm tăng nghiêm ngặt của nhau. Copula nghịch biến ( $W$ ) là giới hạn dưới Fréchet, xác định bởi  $W(u_1, u_2) = \max\{u_1 + u_2 - 1, 0\}$ , chỉ áp dụng cho trường hợp hai chiều và đại diện cho sự phụ thuộc nghịch hoàn hảo.

**Các Copula ẩn:** Gauss Copula được trích xuất từ phân phối chuẩn đa biến và được tham số hóa bởi ma trận tương quan. Đặc điểm quan trọng là nó không có phụ thuộc đuôi, nghĩa là các sự kiện cực đoan có xu hướng xảy ra độc lập trong các biến. Ngược lại, Student  $t$  Copula được trích xuất từ phân phối  $t$  đa biến. Khác với Gauss Copula,  $t$  Copula có phụ thuộc đuôi ở cả hai phía, khiến nó phù hợp hơn để mô phỏng các rủi ro cực đoan xảy ra đồng thời.

**Các Copula hiển (tường minh):** Đặc điểm chính của nhóm Copula hiển là chúng có một công thức giải tích đơn giản, khác với Copula ẩn vốn phải trải qua tính toán tích phân từ phân phối đa biến. Chúng ta có thể đặt các giá trị  $u_1, \dots, u_d$  trực tiếp vào công thức để tính ra kết quả. Cấu trúc hàm sinh của đa số các Copula hiển phổ biến thuộc học Archimedean Copulas, được xây dựng dựa trên một hàm số đơn biến  $\phi$  gọi là hàm sinh, công thức và tính chất chuyên sâu sẽ được phân tích ở các mục sau.

**Các biến thể nâng cao:** Skewed  $t$  Copula (Copula  $t$  lệch) là một phiên bản không đối xứng của  $t$  Copula, cho phép các mức độ phụ thuộc đuôi khác nhau ở các góc đối diện của phân phối. Grouped  $t$  Copula (Copula  $t$  phân nhóm) cho phép các nhóm tài sản khác nhau trong một danh mục có các mức độ phụ thuộc đuôi khác nhau thông qua việc tham số hóa bậc tự do  $\nu$  khác nhau. Galambos Copula là một ví dụ về Copula cực đoan, mô tả cấu trúc phụ thuộc của các giá trị cực đại đa biến. Việc lựa chọn giữa các loại Copula này rất quan trọng vì chúng dẫn đến các đánh giá rủi ro khác nhau, đặc biệt là khi tính toán xác suất xảy ra các biến cố cực đoan đồng thời.

### II.2.3 Phân phối meta

Phân phối meta là các hàm phân phối đa biến được xây dựng bằng cách kết hợp một Copula cụ thể với các phân phối biên tùy ý. Cơ sở xây dựng dựa trên định lý Sklar, nếu ta chọn một Copula  $C$  và các hàm phân phối biên  $F_1, \dots, F_d$  thì hàm phân phối đa biến  $F$  được xác định bởi công thức:

$$F(x_1, \dots, x_d) = C(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$$

Hàm số này chắc chắn là một hàm phân phối đồng thời hợp lệ với các biến chính là  $F_1, \dots, F_d$ .

Các ví dụ điển hình bao gồm phân phối Meta-Gaussian, sử dụng Gauss Copula kết hợp với các phân phối biên bất kỳ. Phân phối Meta- $t$  sử dụng  $t$  Copula kết hợp với các biến tùy ý; phân phối này thường được quan tâm hơn Meta-Gaussian vì nó có khả năng mô tả phụ thuộc đuôi. Ngoài ra còn có phân phối Meta-Clayton và Meta-Gumbel được tạo ra bằng cách sử dụng Copula Clayton hoặc Gumbel với các phân phối biên do người dùng tự lựa chọn.

Ưu điểm của cấu trúc này trong quản trị rủi ro nằm ở tính linh hoạt, cho phép nhà quản lý rủi ro tách việc mô hình hóa hành vi của từng tài sản riêng lẻ khỏi việc mô hình hóa cấu trúc phụ thuộc (Copula). Bên cạnh đó, nó hỗ trợ phân tích độ nhạy một cách tối ưu; phương pháp này cho phép thực hiện các thử nghiệm kiểm tra sức chịu tải bằng cách thay đổi Copula (ví dụ: dịch chuyển từ Meta-Gaussian không có phụ thuộc đuôi sang Meta- $t$  có phụ thuộc đuôi mạnh) trong khi vẫn giữ nguyên các phân phối biên để xem rủi ro tổng thể thay đổi như thế nào.

## II.2.4 Các đặc tính khác của Copula

**Copula sống sót (survival copulas):** Trong khi một Copula thông thường kết nối các hàm phân phối tích lũy, Copula sống sót ( $\hat{C}$ ) kết nối các hàm sống sót biên để tạo thành hàm sống sót đồng thời thông qua công thức:

$$\bar{F}(x_1, \dots, x_d) = \hat{C}(\bar{F}_1(x_1), \dots, \bar{F}_d(x_d))$$

Về mặt toán học, nếu vectơ  $U$  có phân phối Copula  $C$ , thì Copula sống sót của  $C$  chính là hàm phân phối của vectơ  $1 - U$ . Mối liên hệ trong trường hợp hai chiều được biểu diễn như sau:

$$\hat{C}(1 - u_1, 1 - u_2) = 1 - u_1 - u_2 + C(u_1, u_2)$$

**Tính đối xứng xuyên tâm:** Một vectơ ngẫu nhiên được gọi là đối xứng xuyên tâm quanh điểm  $a$  nếu  $X - a = a - X$ . Đối với Copula, tính chất này có nghĩa là  $U = 1 - U$ . Khi một Copula có tính đối xứng xuyên tâm, Copula sống sót của nó sẽ bằng chính nó ( $\hat{C} = C$ ). Ví dụ điển hình là các Copula của phân phối elip (như Gauss và  $t$ ) đều có tính đối xứng xuyên tâm, trong khi các Copula Archimedean như Gumbel và Clayton thì không.

**Phân phối có điều kiện của Copula:** Đặc tính này cho phép tính xác suất để một biến vượt qua một ngưỡng nhất định khi biết giá trị cụ thể của biến kia (trên thang đo phân vị). Trong hai chiều, hàm phân phối có điều kiện của  $U_2$  khi biết  $U_1 = u_1$  được tính bằng đạo hàm riêng:

$$C_{U_2|U_1}(u_2|u_1) = \frac{\partial}{\partial u_1} C(u_1, u_2)$$

**Mật độ Copula:** Hầu hết các Copula tham số thường dùng đều có mật độ (ngoại trừ các trường hợp phụ thuộc hoàn hảo như tính đồng điệu). Mật độ Copula được xác định bằng đạo hàm bậc  $d$  của hàm  $C(u_1, \dots, u_d)$  theo tất cả các thành phần. Mật độ này rất quan trọng trong việc ước lượng tham số bằng phương pháp tối đa hóa xác suất. Hình ảnh mật độ giúp trực quan hóa cấu trúc phụ thuộc; ví dụ, mật độ của  $t$  Copula tập trung nhiều khối lượng xác suất ở các góc hơn so với Gauss Copula do có hiện tượng phụ thuộc đuôi.

**Tính trao đổi được:** Một Copula được gọi là trao đổi được nếu giá trị của nó không đổi khi ta hoán vị các đối số, thể hiện qua công thức  $C(u_1, \dots, u_d) = C(u_{\pi(1)}, \dots, u_{\pi(d)})$  với mọi hoán vị  $\pi$ . Hầu hết các Copula Archimedean chuẩn là trao đổi được, trong khi Gauss và  $t$  Copula chỉ trao đổi được khi ma trận tương quan có các hệ số tương quan cặp bằng nhau.

**Đặc tính co giãn của Copula giá trị cực trị:** Các Copula giá trị cực trị có một đặc tính tỷ lệ đặc biệt, thỏa mãn hệ thức  $C(u^t) = C^t(u)$  với mọi  $t > 0$ . Đặc tính này phản ánh cấu trúc phụ thuộc giới hạn của các giá trị cực đại trong các khối dữ liệu.

## II.2.5 Sự phụ thuộc hoàn hảo

Sự phụ thuộc hoàn hảo được mô tả thông qua hai trạng thái cực đoan của cấu trúc phụ thuộc: sự đồng biến và sự nghịch biến. Các khái niệm này liên quan chặt chẽ đến các giới hạn Fréchet của Copula.

**Sự đồng biến (Phụ thuộc thuận hoàn hảo):** Các biến ngẫu nhiên  $X_1, \dots, X_d$  được gọi là đồng biến nếu chúng có Copula là giới hạn trên Fréchet:

$$M(u_1, \dots, u_d) = \min\{u_1, \dots, u_d\}$$

Đặc điểm hình học chỉ ra rằng các điểm dữ liệu tuân theo cấu trúc đồng biến sẽ nằm hoàn toàn trên một đường chéo tăng trong không gian đa biến. Về tính chất toán học, các biến số đồng biến thực chất là các hàm tăng của cùng một biến ngẫu nhiên duy nhất  $Z$ . Đối với các biến có hàm phân phối liên tục,  $X_i$  và  $X_j$  là đồng biến khi và chỉ khi tồn tại một phép biến đổi tăng ngặt  $T$  sao cho  $X_j = T(X_i)$  hầu chắc chắn. Một đặc tính quan trọng của rủi ro đồng biến là giá trị phân vị có tính cộng tính, tức là Var của tổng của rủi ro đồng biến bằng tổng các Var của từng rủi ro thành phần.

**Sự nghịch biến (Phụ thuộc nghịch hoàn hảo):** Hai biến ngẫu nhiên  $X_1$  và  $X_2$  được gọi là nghịch biến nếu chúng có Copula là giới hạn dưới Fréchet:

$$W(u_1, u_2) = \max\{u_1 + u_2 - 1, 0\}$$

Đặc điểm của trường hợp này là biến này là hàm giảm nghiêm ngặt của biến kia hầu chắc chắn. Tuy nhiên, cấu trúc này có hạn chế về chiều: khác với sự đồng biến, khái niệm nghịch biến không thể mở rộng cho không gian ba chiều trở lên ( $d > 2$ ). Giới hạn dưới Fréchet  $W$  không còn là một Copula hợp lệ khi số chiều lớn hơn hai.

**Ý nghĩa trong quản trị rủi ro:** Mọi Copula bất kỳ  $C(u_1, \dots, u_d)$  luôn nằm trong khoảng giới hạn Fréchet  $W \leq C \leq M$  (với  $W$  chỉ áp dụng cho hai chiều). Trong kỹ thuật Stress-testing, sự đồng biến thường đại diện cho kịch bản rủi ro tập trung cao nhất đối với các thước đo rủi ro hiệp biến như Expected Shortfall (ES), vì khi đó đa dạng hóa không mang lại lợi ích giảm rủi ro. Đối với mối quan hệ tương quan tuyến tính, hệ số tương quan tuyến tính đạt giá trị cực đại khi các biến đồng biến và đạt giá trị cực tiểu khi chúng nghịch biến (với điều kiện các biến có cùng kiểu phân phối).

## II.3 Các thước đo sự phụ thuộc đuôi

### II.3.1 Tương quan tuyến tính

**Định nghĩa và cơ sở toán học:**

- Hệ số tương quan ( $\rho$ ) giữa hai biến ngẫu nhiên  $X_1$  và  $X_2$  được tính bằng tỷ số giữa hiệp phương sai và tích các độ lệch chuẩn của chúng:

$$\rho(X_1, X_2) = \frac{\text{cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{\text{var}(X_1)\text{var}(X_2)}}$$

- Đối với một vectơ ngẫu nhiên đa biến  $X$ , ma trận tương quan  $P = \rho(X)$  có các phần tử tại vị trí  $(i, j)$  là tương quan cặp giữa  $X_i$  và  $X_j$ . Ma trận này luôn có tính chất xác định dương hoặc ít nhất là nửa xác định dương.

### Các đặc tính chính:

- Hệ số tương quan tuyến tính luôn nằm trong khoảng  $[-1, 1]$ . Khi  $\rho = 1$ , hai biến có sự phụ thuộc tuyến tính thuận hoàn hảo, và khi  $\rho = -1$ , hai biến có sự phụ thuộc tuyến tính nghịch hoàn hảo.
- Một thuộc tính quan trọng khác là tính bất biến: tương quan tuyến tính có tính bất biến dưới các phép biến đổi tuyến tính tăng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nó không bất biến đối với các phép biến đổi phi tuyến.

**Hạn chế và những cạm bẫy:** Tương quan chỉ được xác định khi các biến có phương sai hữu hạn, điều này gây khó khăn với các rủi ro có đuôi nặng (như rủi ro hoạt động) có phương sai vô hạn. Mối liên hệ giữa tương quan và độc lập cũng dễ gây nhầm lẫn: độc lập dẫn đến tương quan bằng 0, nhưng ngược lại không luôn đúng. Các biến không tương quan vẫn có thể phụ thuộc chặt chẽ về mặt cấu trúc trong các mô hình phi Gaussian.

Bên cạnh đó, mô hình này còn vấp phải ba cạm bẫy lớn trong quản trị rủi ro:

- **Cạm bẫy 1 (Xác định phân phối):** Các phân phối biên và tương quan cặp không đủ để xác định phân phối đồng thời của một vectơ ngẫu nhiên.
- **Cạm bẫy 2 (Tương quan có thể đạt được):** Với các phân phối biên cho trước, dải tương quan đạt được thực tế có thể hẹp hơn khoảng  $[-1, 1]$ . Ngay cả khi hai biến phụ thuộc thuận mạnh nhất, tương quan tuyến tính vẫn có thể rất thấp.
- **Cạm bẫy 3 (Rủi ro danh mục):** Một quan niệm sai lầm phổ biến là cho rằng rủi ro của một danh mục là tệ nhất khi tương quan đạt cực đại. Thực tế, đối với các phân phối không đối xứng, danh mục có tương quan thấp hơn đôi khi lại tạo ra tổn thất cực đoan lớn hơn so với tương quan hoàn hảo.

Mặc dù tương quan tuyến tính là một tham số tự nhiên trong các mô hình elip, nó không phản ánh được các cấu trúc phụ thuộc phi tuyến hoặc phụ thuộc đuôi. Do đó, các nhà quản lý rủi ro thường hướng tới sử dụng Copula để tách biệt hành vi biến của tài sản khỏi cấu trúc phụ thuộc của chúng, cho phép đánh giá chính xác hơn các kịch bản rủi ro cực đoan.

### II.3.2 Tương quan hạng

Tương quan hạng là các thước đo phụ thuộc vô hướng chỉ phụ thuộc vào Copula của phân phối đa biến mà không bị ảnh hưởng bởi các phân phối biên. Các thuộc tính chung bao gồm tính bất biến đối với các phân phối biên liên tục dưới các phép biến đổi đồng tăng nghiêm ngặt; phạm vi giá trị luôn nằm ở đoạn  $[-1, 1]$ ; trạng thái cực đoan đạt giá trị 1 khi các biến là đồng biến và đạt  $-1$  khi chúng nghịch biến; và thuộc tính độc lập khi hai biến độc lập sẽ có tương quan hạng bằng 0 (tuy nhiên giá trị bằng 0 không nhất thiết hàm ý sự độc lập). Đối với nhóm phân phối elip và các Copula hỗn hợp phương sai chuẩn, hệ số Kendall's tau có mối quan hệ trực tiếp lý tưởng với tham số tương quan tuyến tính  $\rho$  qua hệ thức:

$$\rho_\tau(X_1, X_2) = \frac{2}{\pi} \arcsin(\rho)$$

Mối liên hệ chức năng này rất mạnh mẽ, cho phép các nhà quản lý rủi ro có thể ước lượng ma trận tương quan  $\rho$  một cách vững chắc từ mẫu dữ liệu thực tế, ngay cả khi gặp phải

hiện tượng đuôi nặng hoặc phương sai vô hạn, vốn là những trường hợp mà cách tính tương quan tuyến tính trực tiếp hoạt động kém hiệu quả.

Bên cạnh Kendall's Tau, Spearman's Rho ( $\rho_s$ ) là một thước đo quan trọng khác dựa trên sự biến đổi xác suất của các biến ngẫu nhiên qua các hàm biên phân phối liên tục, cụ thể  $\rho_s(X_1, X_2) = \rho(F_1(X_1), F_2(X_2))$ , biểu diễn bằng tích phân qua Copula như sau:

$$\rho_s(X_1, X_2) = 12 \int_0^1 \int_0^1 (C(u_1, u_2) - u_1 u_2) du_1 du_2$$

Đối với Gauss Copula, Spearman's rho có công thức dạng đóng  $\rho_s(X_1, X_2) = \frac{6}{\pi} \arcsin\left(\frac{\rho}{2}\right)$ , mang lại giá trị thực nghiệm rất gần với tham số  $\rho$  ( $\rho_s \approx \rho$ ) với sai số tối đa không quá 0.0181. Tuy nhiên, đối với các Copula hỗn hợp chuẩn phức tạp khác như Student  $t$  Copula, hiện chưa có hệ thức đóng đơn giản tương tự cho Spearman's rho, dù các kiểm định mô phỏng cho thấy độ chênh lệch xấp xỉ vẫn ở mức nhỏ không đáng kể.

**Kendall's Tau ( $\rho_\tau$ ):** Thước đo này đo lường mức độ hòa hợp giữa các cặp biến ngẫu nhiên. Hai điểm  $(x_1, x_2)$  và  $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)$  được gọi là hòa hợp nếu  $(x_1 - \tilde{x}_1)(x_2 - \tilde{x}_2) > 0$  and bất hòa nếu tích này nhỏ hơn 0. Công thức tính được xác định qua biểu thức:

$$\rho_\tau(X_1, X_2) = P((X_1 - \bar{X}_1)(X_2 - \bar{X}_2) > 0) - P((X_1 - \bar{X}_1)(X_2 - \bar{X}_2) < 0)$$

Trong đó  $(\bar{X}_1, \bar{X}_2)$  là bản sao độc lập của  $(X_1, X_2)$ . Khi tính toán qua Copula, công thức trở thành:

$$\rho_\tau(X_1, X_2) = 4 \int_0^1 \int_0^1 C(u_1, u_2) dC(u_1, u_2) - 1$$

Ứng dụng của Kendall's Tau thường được dùng để hiệu chuẩn các tham số của Copula elip hoặc Copula Archimedean.

### II.3.3 Các hệ số phụ thuộc đuôi

Trong quản trị rủi ro định lượng, các hệ số phụ thuộc đuôi là thước đo mức độ phụ thuộc giữa các biến ở các cực đoan đồng thời của một phân phối đa biến. Đây là các đại lượng không đổi khi phụ thuộc vào Copula của cặp biến ngẫu nhiên đó.

**Định nghĩa các hệ số:** Có hai hệ số chính được sử dụng để đo lường sự phụ thuộc tại các vùng cực đoan:

- Hệ số phụ thuộc đuôi trên ( $\lambda_u$ ) đo lường xác suất một biến vượt qua một ngưỡng phân vị rất cao, với điều kiện biến kia cũng đã vượt qua ngưỡng đó. Công thức được xác định là giới hạn:

$$\lambda_u = \lim_{q \rightarrow 1^-} P(X_2 > F_2^{-1}(q) | X_1 > F_1^{-1}(q))$$

Nếu  $\lambda_u > 0$ , cặp biến số có sự phụ thuộc đuôi trên (phụ thuộc cực đoan); nếu  $\lambda_u = 0$ , chúng độc lập tiệm cận ở đuôi trên.

- Hệ số phụ thuộc đuôi dưới ( $\lambda_l$ ) tương tự đo lường xác suất một biến nhận giá trị cực thấp khi biến kia cũng đang ở vùng cực thấp. Công thức là:

$$\lambda_l = \lim_{q \rightarrow 0^+} P(X_2 \leq F_2^{-1}(q) | X_1 \leq F_1^{-1}(q))$$

Đối với các Copula có tính đối xứng xuyên tâm như Gauss hay  $t$ , ta luôn có  $\lambda_l = \lambda_u$ .

**Đặc điểm của các loại Copula phổ biến:** Mỗi loại Copula mang lại các đặc tính phụ thuộc đuôi rất khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá rủi ro hệ thống:

- Gauss:  $\lambda_u = \lambda_l = 0$ . Đặc điểm rủi ro là độc lập tiệm cận ở cả hai đuôi, có thể đánh giá thấp rủi ro các biến cố cực đoan xảy ra cùng lúc.
- Student  $t$ :  $\lambda_u = \lambda_l > 0$ . Đặc điểm rủi ro là có phụ thuộc đuôi ở cả hai phía, phụ thuộc tăng khi bậc tự do  $\nu$  giảm hoặc tương quan  $\rho$  tăng.
- Gumbel:  $\lambda_u = 2 - 2^{1/\theta}$ ,  $\lambda_l = 0$ . Đặc điểm rủi ro là chỉ phụ thuộc đuôi trên, thường dùng mô hình hóa các khoản thua lỗ lớn đồng thời.
- Clayton:  $\lambda_u = 0$ ,  $\lambda_l = 2^{-1/\theta}$ . Đặc điểm rủi ro là chỉ phụ thuộc đuôi dưới.
- Frank:  $\lambda_u = \lambda_l = 0$ . Đặc điểm rủi ro là không có phụ thuộc đuôi ở bất kỳ phía nào.

**Ý nghĩa trong quản trị rủi ro:** Sự độc lập tiệm cận của Gauss Copula cho thấy việc sử dụng Gauss Copula cho sự kiện rủi ro cao, ngay cả khi có hệ số tương quan rất lớn, khi tiến sâu vào vùng đuôi cực đoan, các biến cố trong mô hình Gaussian có xu hướng xảy ra độc lập, dẫn đến việc đánh giá thấp xác suất xảy ra khủng hoảng đồng thời. Ngược lại, việc sử dụng Student  $t$  Copula được ưa chuộng hơn trong thực tế vì nó ghi nhận hiện tượng xảy ra các tài sản cùng sụt giảm mạnh. Ví dụ, xác suất xảy ra biến cố cực đoan đồng thời trong mô hình  $t$  có thể cao gấp nhiều lần so với mô hình Gaussian. Đối với phân phối elip, trọng tâm phụ thuộc đuôi được quyết định bởi đuôi của biến trộn; nếu biến trộn có phân phối đuôi nặng (như nghịch đảo Gamma trong trường hợp phân phối  $t$ ), chúng ta sẽ thu được phụ thuộc đuôi.

## II.4 Các Copula hỗn hợp chuẩn

### II.4.1 Phụ thuộc đuôi

Phụ thuộc đuôi của các Copula hỗn hợp chuẩn là một yếu tố then chốt để hiểu cách các biến cố cực đoan liên kết với nhau trong quản trị rủi ro.

**Đặc tính chung và tính đối xứng:** Các Copula hỗn hợp phương sai chuẩn có tính đối xứng xuyên tâm. Do đó, hệ số phụ thuộc đuôi trên ( $\lambda_u$ ) và đuôi dưới ( $\lambda_l$ ) luôn bằng nhau:  $\lambda_u = \lambda_l = \lambda$ . Vì các Copula này thường có tính trao đổi được, hệ số phụ thuộc đuôi có thể được tính đơn giản qua giới hạn xác suất có điều kiện:  $\lambda = 2 \lim_{q \rightarrow 1^-} P(U_2 \leq q | U_1 = q)$ .

**Sự khác biệt giữa các Copula Gauss và Copula Student  $t$ :**

- Gauss Copula: Có đặc tính độc lập tiệm cận, nghĩa là  $\lambda = 0$ . Dù hệ số tương quan có cao đến đâu, khi tiến sâu vào vùng đuôi cực đoan, các biến cố có xu hướng xảy ra độc lập. Việc sử dụng Copula này có thể dẫn đến việc đánh giá thấp rủi ro hệ thống trong các cuộc khủng hoảng.
- Student  $t$  Copula: Có phụ thuộc đuôi ( $\lambda > 0$ ) ở cả hai phía. Hệ số này phụ thuộc vào bậc tự do ( $\nu$ ) và tương quan ( $\rho$ ) theo công thức:

$$\lambda = 2t_{\nu+1} \left( -\sqrt{\frac{(\nu+1)(1-\rho)}{1+\rho}} \right)$$

Phụ thuộc đuôi sẽ tăng lên khi bậc tự do  $\nu$  giảm (đuôi nặng hơn) hoặc hệ số tương quan  $\rho$  tăng. Ngay cả khi tương quan bằng 0 hoặc âm, Copula  $t$  vẫn có thể phụ thuộc đuôi dương.

**Vai trò của biến trộn  $W$ :** Yếu tố quyết định một Copula hỗn hợp phương sai chuẩn có phụ thuộc đuôi hay không nằm ở đuôi của phân phối biến trộn  $W$ :

- Nếu  $W$  có phân phối với đuôi lũy thừa (như nghịch đảo Gamma trong trường hợp phân phối  $t$ ), Copula sẽ có phụ thuộc đuôi.
- Ngược lại, nếu  $W$  không có đuôi lũy thừa (như trong phân phối Hyperbolic), Copula sẽ độc lập tiệm cận ở các đuôi, tương tự như Copula Gauss.

**Các biến thể nâng cao:**

- Skewed  $t$  Copula (Copula  $t$  lệch): Cho phép các mức độ phụ thuộc đuôi khác nhau ở các góc đối diện của phân phối (ví dụ: rủi ro cùng sụt giảm mạnh hơn là cùng tăng mạnh), phá vỡ tính đối xứng xuyên tâm.
- Grouped  $t$  Copula (Copula  $t$  phân nhóm): Cho phép các nhóm tài sản khác nhau trong một danh mục có các mức độ phụ thuộc đuôi khác nhau (thông qua các tham số  $\nu$  riêng biệt cho từng nhóm).

## II.4.2 Tương quan hạng

Tương quan hạng của các Copula hỗn hợp chuẩn là các thước đo phụ thuộc vô hướng chỉ phụ thuộc vào cấu trúc phụ thuộc (Copula) mà không bị ảnh hưởng bởi các phân phối biên.

**Kendall's Tau ( $\rho_\tau$ ):** Đây là thước đo quan trọng nhất đối với các Copula hỗn hợp phương sai chuẩn vì nó có mối quan hệ trực tiếp và đơn giản với tham số tương quan. Công thức tổng quát như ở mục 2.3.2, đối với hầu hết các Copula hỗn hợp phương sai chuẩn (thuộc họ phân phối elip), mối quan hệ giữa Kendall's tau và tham số tương quan tuyến tính  $\rho$  được xác định bởi:

$$\rho_\tau(X_1, X_2) = \frac{2}{\pi} \arcsin(\rho)$$

Phạm vi áp dụng của công thức này áp dụng chính xác cho cả Gauss Copula và Student  $t$  Copula. Ý nghĩa ước lượng của mối quan hệ này rất mạnh mẽ; nhà quản lý rủi ro có thể ước lượng ma trận tương quan  $\rho$  một cách mạnh mẽ từ Kendall's tau mẫu, ngay cả khi dữ liệu có đuôi nặng hoặc phương sai vô hạn, vốn là những trường hợp mà tương quan tuyến tính tính toán trực tiếp hoạt động kém hiệu quả.

**Spearman's Rho ( $\rho_s$ ):** Mối quan hệ Spearman's rho với tham số tương quan phức tạp hơn và không đồng nhất giữa các loại Copula hỗn hợp chuẩn. Đối với Gauss Copula, Spearman's rho có công thức dạng đóng:

$$\rho_s(X_1, X_2) = \frac{6}{\pi} \arcsin\left(\frac{\rho}{2}\right)$$



Giá trị này rất gần với tham số  $\rho$  ( $\rho_s \approx \rho$ ) với sai số tối đa không quá 0.0181. Đối với các Copula hỗn hợp chuẩn khác (như  $t$  Copula), mối quan hệ trên không nhất thiết đúng cho tất cả các phân phối elip. Hiện chưa có công thức đơn giản tương tự cho  $t$  Copula, mặc dù các nghiên cứu mô phỏng cho thấy sai số xấp xỉ  $\rho_s \approx \rho$  ở mức không đáng kể, dù lớn hơn so với trường hợp Gauss.

## II.5 Các Copula Archimedean

Họ Copula Archimedean là một nhóm các cấu trúc phụ thuộc được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng tài chính và quản trị rủi ro nhờ vào công thức dạng đóng đơn giản và khả năng nắm bắt các loại phụ thuộc khác nhau.

**Định nghĩa và hàm sinh:** Một Copula Archimedean hai chiều được xác định thông qua một hàm số  $\phi$  gọi là hàm sinh, công thức tổng quát là:

$$C(u_1, u_2) = \phi^{[-1]}(\phi(u_1) + \phi(u_2))$$

Trong đó  $\phi$  là hàm liên tục, giảm nghiêm ngặt và lồi trên thỏa mãn  $\phi(1) = 0$ . Ký hiệu  $\phi^{[-1]}$  được định nghĩa là một nghịch đảo giả của  $\phi$ , có dạng:

$$\phi^{[-1]} = \begin{cases} \phi^{-1}(t), & 0 \leq t \leq \phi(0) \\ 0, & \phi(0) < t \leq \infty \end{cases}$$

Nếu  $\phi(0) = \infty$ , hàm sinh được gọi là nghiêm ngặt và ta có thể dùng hàm nghịch đảo thông thường  $\phi^{-1}$ .

### Các ví dụ phổ biến:

- Gumbel Copula: Có hàm sinh  $\phi(t) = (-\ln t)^\theta$ , với  $\theta \geq 1$ . Nó đặc trưng bởi phụ thuộc đuôi trên.
- Clayton Copula: Có hàm sinh  $\phi(t) = \frac{1}{\theta}(t^{-\theta} - 1)$  với  $\theta > 0$  (trong trường hợp nghiêm ngặt). Nó đặc trưng bởi phụ thuộc đuôi dưới.
- Frank Copula: Có hàm sinh là  $\phi(t) = -\ln\left(\frac{e^{-\theta t} - 1}{e^{-\theta} - 1}\right)$ , với  $\theta \in R$ . Đây là loại Copula Archimedean duy nhất có tính đối xứng tâm và không phụ thuộc đuôi ở bất kỳ phía nào.
- Copula Clayton tổng quát: Có hàm sinh là  $\phi(t) = \theta^{-\delta}(t^{-\theta} - 1)^\delta$ , với  $\theta > 0, \delta \geq 1$ . Đây là một biến thể hai tham số có thể phụ thuộc ở cả hai đuôi.

**Mở rộng đa biến và tính trao đổi được:** Mở rộng một Copula Archimedean  $d$  chiều có thể được xây dựng theo công thức:

$$C(u_1, \dots, u_d) = \phi^{-1}(\phi(u_1) + \dots + \phi(u_d))$$

Điều kiện tồn tại để công thức này tạo thành một Copula hợp lệ trong mọi số chiều  $d$  là hàm nghịch đảo  $\phi^{-1}$  phải có tính đơn điệu hoàn toàn. Về tính trao đổi được, các Copula Archimedean đa biến tiêu chuẩn có tính trao đổi được, nghĩa là vai trò của các biến là như nhau. Tuy nhiên, ta có thể xây dựng các phiên bản không trao đổi được bằng cách áp dụng đệ quy các hàm sinh khác nhau để tạo cấu trúc phân nhóm.

**Copula LT-Archimedean:** Đây là một nhóm con quan trọng được xây dựng dựa trên biến đổi Laplace-Stieltjes (LT) của một hàm phân phối  $G$ . Hàm nghịch đảo của hàm sinh  $\phi^{-1}$  chính là biến đổi Laplace của  $G$ . Cách tiếp cận này cho phép mô phỏng dễ dàng bằng cách sử dụng một biến nguyên trộn  $V$  có phân phối  $G$  (ví dụ: phân phối Gamma cho Clayton, hoặc phân phối ổn định định hướng cho Gumbel). Ứng dụng của nó rất hữu ích trong mô hình hóa rủi ro tín dụng danh mục, nơi biến  $V$  đóng vai trò là yếu tố rủi ro chung.

**Thước đo phụ thuộc:** Các thước đo rủi ro có thể được tính trực tiếp từ hàm sinh  $\phi$ :

- Hệ số Kendall's tau ( $\rho_\tau$ ) được tính theo công thức:

$$\rho_\tau = 1 + 4 \int_0^1 \frac{\phi(t)}{\phi'(t)} dt$$

- Phụ thuộc đuôi: Các hệ số  $\lambda_u$  và  $\lambda_l$  được xác định dựa trên tham số  $\theta$  của từng loại (ví dụ:  $\lambda_u = 2 - 2^{1/\theta}$  cho Gumbel).

### III Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo từ Copula

Mô phỏng Monte Carlo dựa trên Copula là một công cụ mạnh mẽ trong quản trị rủi ro định lượng, giúp hiểu sâu hơn về cấu trúc phụ thuộc của các biến ngẫu nhiên. Kỹ thuật xây dựng mô hình đi từ dưới lên này cho phép các nhà quản lý rủi ro linh hoạt kết hợp cấu trúc phân phối của các biến biên độc lập với các mô hình Copula đặc trưng nhằm mô phỏng chính xác hành vi rủi ro toàn danh mục. Việc tạo lập các phân phối liên kết Meta như Meta-Gaussian hay Meta-t đóng vai trò cốt lõi phục vụ phân tích thử nghiệm và đánh giá mức độ nhạy cảm của hệ thống trước sự biến đổi từ các tham số phụ thuộc đuôi. Trong quản trị rủi ro tín dụng, mô phỏng Copula được ứng dụng để xác định phân phối tổn thất của danh mục vay hoặc trái phiếu thông qua việc mô phỏng thời gian vỡ nợ đồng thời của các đối tác, đây là phương pháp tiêu chuẩn để định giá các sản phẩm phái sinh tín dụng phức tạp như basket derivatives và các tầng của CDO (Collateralized Debt Obligations).

Hơn nữa, việc mô phỏng các cấu trúc này cho phép các nhà giao dịch tính toán tương quan tài sản ngầm định từ giá thị trường của các tầng CDO, giúp so sánh rủi ro giữa các điểm đánh kèm và nhóm tài sản khác nhau. Để cải thiện hiệu suất khi mô phỏng các biến cố cực đoan như tổn thất lớn trong các tầng CDO cao, kỹ thuật lấy mẫu ưu tiên thường được kết hợp với mô phỏng Copula để giảm biến số và tăng độ chính xác của ước lượng. Đối với các bài toán ước tính rủi ro đa kỳ hạn, mô phỏng Monte Carlo từ Copula cho phép xác định các thước đo rủi ro như VaR và expected shortfall cho các kỳ hạn dài bằng các mô phỏng các đường dẫn thực tế của các yếu tố rủi ro thay vì dựa vào các quy tắc tỷ lệ đơn giản. Ngoài ra, trong các mô hình actuarial của rủi ro hoạt động và bảo hiểm, mô phỏng được sử dụng để tính toán tổng mức tổn thất bằng cách kết hợp sự phụ thuộc giữa tần suất xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của các loại tổn thất khác nhau.

#### III.1 Quy trình chung cho phân phối Meta

Phân phối Meta cung cấp giải pháp thuật toán tích hợp để liên kết cấu trúc của một hàm Copula  $C$  với các phân phối biên  $F_1, \dots, F_d$  tùy ý. Về mặt thực hành tính toán, quy trình mô phỏng bao gồm hai bước nền tảng:

- Bước đầu tiên là phát sinh thành công một vectơ ngẫu nhiên biến đều tiêu chuẩn  $U = (U_1, \dots, U_d)^T$  dựa trên thuật toán lấy mẫu của Copula  $C$  đã lựa chọn.
- Bước tiếp theo sử dụng phép biến đổi phân vị nghịch đảo bằng cách thiết lập giá trị thực tế  $X_i = F_i^{-1}(U_i)$  với mọi  $i = 1, \dots, d$ .

Vectơ đầu ra  $X = (X_1, \dots, X_d)^T$  được tạo thành đảm bảo phản ánh chuẩn xác các đặc tính biên mong muốn gắn liền với cấu trúc phụ thuộc gốc từ hệ hàm Copula đã chọn.

### III.2 Mô phỏng Gauss Copula

Gauss Copula được trích xuất từ phân phối chuẩn đa biến. Thuật toán tuân thủ quy trình sau:

- Thực hiện phân rã Cholesky ma trận tương quan  $P$  để thu được nhân tử Cholesky  $P^{1/2}$ .
- Tạo vectơ  $Z = (Z_1, \dots, Z_d)^T$  có phân phối chuẩn đa biến  $N_d(0, P)$  bằng cách đặt  $Z = P^{1/2}\epsilon$ , với  $\epsilon$  là vectơ các biến chuẩn tắc độc lập.
- Trả về vectơ kết quả cuối cùng  $U = (\Phi(Z_1), \dots, \Phi(Z_d))^T$ , trong đó  $\Phi$  là hàm phân phối chuẩn tắc đơn biến.

### III.3 Mô phỏng t Copula

Thuật toán này dựa trên việc mô phỏng phân phối Student  $t$  đa biến. Để tạo một vectơ  $X \sim t_d(\nu, 0, P)$ , quy trình tuân theo các bước cụ thể:

- Tạo vectơ  $Z \sim N_d(0, P)$  như ở thuật toán Gauss.
- Tạo độc lập một biến trộn  $W \sim Ig(\nu/2, \nu/2)$  thuộc phân phối nghịch đảo Gamma, hoặc tạo biến trộn từ phân phối khi bình phương thông qua hệ thức  $\nu/W \sim \chi_\nu^2$ .
- Tiến hành đặt  $X = \sqrt{W}Z$ .
- Trả về vectơ kết quả sau cùng  $U = (t_\nu(X_1), \dots, t_\nu(X_d))^T$ , trong đó  $t_\nu$  là hàm phân phối Student  $t$  đơn biến với  $\nu$  bậc tự do.

### III.4 Mô phỏng Copula Archimedean (LT-Archimedean)

Phương pháp này sử dụng biến đổi Laplace-Stieltjes để tạo ra các Copula có tính trao đổi trong mọi số chiều. Quy trình thực hiện gồm các bước:

- Tạo một biến ngẫu nhiên  $V$  có hàm phân phối  $G$  sao cho biến đổi Laplace-Stieltjes  $\hat{G}$  của nó chính là nghịch đảo của hàm sinh Copula  $\phi = \hat{G}^{-1}$ .
- Tạo các biến ngẫu nhiên đều tiêu chuẩn độc lập  $X_1, \dots, X_d$ .
- Trả về vectơ kết quả được tính theo biểu thức:

$$U = \left( \hat{G} \left( -\frac{\ln(X_1)}{V} \right), \dots, \hat{G} \left( -\frac{\ln(X_d)}{V} \right) \right)^T$$

Đối với các trường hợp cụ thể, cấu trúc của biến trộn  $V$  được xác định riêng biệt cho từng loại Copula:

- Với Clayton Copula: biến  $V$  được mô phỏng từ phân phối Gamma  $\text{Ga}(1/\theta, 1)$ .
- Với Gumbel Copula: biến  $V$  được mô phỏng từ phân phối ổn định dương.
- Với Frank Copula:  $V$  là biến ngẫu nhiên rời rạc có hàm khối xác suất được tính theo công thức  $p(k) = (1 - e^{-\theta})^k / (k\theta)$ .

### III.5 Các thuật toán nâng cao cho phân phối hỗn hợp chuẩn

Đối với các cấu trúc nâng cao thuộc họ phân phối hỗn hợp chuẩn, quy trình mô phỏng đòi hỏi các kỹ thuật xử lý chuyên biệt:

- Khi mô phỏng Skewed  $t$  Copula, biến ngẫu nhiên được khởi tạo từ phân phối  $t$  lệch đa biến, sau đó các biến số  $U_i$  được tính toán thông qua tích phân số của mật độ  $t$  lệch đơn biến.
- Đối với Grouped  $t$  Copula, mô hình cho phép các nhóm biến có mức độ phụ thuộc khác nhau bằng cách sử dụng các biến trộn  $W_k$  khác nhau cho từng nhóm, nhưng vẫn đảm bảo các biến trộn này có tính đồng biến với nhau.

## **IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU**

**IV.1 Thu thập và xử lý dữ liệu**

**IV.2 Quy trình phân tích dữ liệu**

## **V PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ**

**V.1 Phân tích đơn biến**

**V.2 Phân tích biến phụ thuộc**

**V.3 Áp dụng mô hình Copula**

**V.4 Mô hình mô phỏng Monte Carlo**

**V.4.1 Thiết kế mô hình mô phỏng Monte Carlo**

**V.4.2 Chiến lược triển khai mô phỏng với 10.000 kịch bản**

**V.5 Tối ưu hóa danh mục đầu tư**

## **VI Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ**

**VI.1 Giải thích kết quả**

**VI.2 Ý nghĩa cho doanh nghiệp**

**VI.3 Ý nghĩa cho nghiên cứu học thuật**

## **VII KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI**

**VII.1 Tóm tắt kết quả chính**

**VII.2 Đóng góp học thuật**

**VII.3 Hướng nghiên cứu trong tương lai**

## References

- [1] Argimiro Arratia. *Computational Finance: An Introductory Course with R*. Vol. 1. Atlantis Studies in Computational Finance and Financial Engineering. Paris, France: Atlantis Press, 2014. ISBN: 978-94-6239-069-0. DOI: 10.2991/978-94-6239-070-6.
- [2] Macquarie University. *ACST3060/ACST8085: Quantitative Methods for Risk Analysis – Exercise Booklet*. Session 2, 2024. Updated Friday 2nd August, 2024. Aug. 2024.
- [3] Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, and Paul Embrechts. *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*. Revised. Princeton Series in Finance. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2015. ISBN: 978-0-691-16627-8.