

照护者入门指南

普通话

诊断之前，先看见这个人。

服从之前，先维护尊严。

活动之前，先建立关系。

完成之前，先重视参与。

普通话 · 类型 一

照护者入门指南

以人为本的交流

交流是照护的一部分，不是额外任务。先了解对方的身份、喜好、能力和节奏。

询问喜欢的称呼，并观察什么环境最有利于参与。

开口之前

从正面靠近，保持舒适的视线高度，先获得注意，并减少噪声。

检查助听器、眼镜、疼痛、饥渴、疲劳和如厕需要。

清楚而成人化的语言

句子简短，一次表达一个意思，使用熟悉的词。保持成人对成人的语气。

不要把对方当小孩、过度提高音量，或当着本人谈论本人。

留出时间

说完后等待。马上重复可能打断正在形成的回答。

观察眼神、手势、姿势和语气；回应不一定是语言。

支持选择

提供两个真实选项，必要时把物品展示出来。在安全允许时尊重“不”。

把指令分成小步骤，并认可每一次尝试，而不只是结果。

回应情绪

先承认情绪，例如害怕、担心、自豪、悲伤或快乐。

为了传达安全与尊重，不必纠正每一个细节。

重复与记忆

平静回应，使用可见提示、固定流程和简单提醒。

想一想重复是否在表达某种需要：方向感、安慰、疼痛或不确定。

有意义的活动

从兴趣、文化、工作、家庭和习惯出发。邀请参与，不要强迫。

调整支持程度，让对方能够贡献、选择和决定。

紧张升级时

放慢速度，减少语言，留出空间，一次只改变一个环境因素。

如果存在即时风险，请依照安全流程寻求支援。

团队沟通

记录哪些用词、方法和话题有帮助或造成困难，并把具体信息交给下一位照护者。

保护隐私，避免用某个行为给一个人贴标签。

突然变化

交流、清醒程度或行为突然改变，可能需要临床评估。

依照正常渠道报告，并记录变化内容、时间和观察到的情况。

照顾自己并反思

困难的交流也会影响照护者。需要时先安全暂停并寻求支持。

回顾什么有效，下次尝试一个小调整。

证据基础

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

证据说明：本指南参考系统综述与证据综合。关于沟通技巧和有意义互动的证据，比关于广泛临床结果的证据更一致。

本实用资源用于支持交流与联结，不属于医疗建议、治疗、临床培训或认证。