

遇到这种情况怎么办？情境指南集

普通话

类型 二

反复讲同一个故事

可能发生了什么

“反复讲同一个故事”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

类型 二

记不起我的名字

可能发生了什么

“记不起我的名字”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

类型 二

想不起某个词

可能发生了什么

“想不起某个词”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

类型 二

说的内容似乎不对

可能发生了什么

“说的内容似乎不对”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

没有回应

可能发生了什么

“没有回应”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

谈话停了下来

可能发生了什么

“谈话停了下来”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

看起来很困惑

可能发生了什么

“看起来很困惑”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

类型 二

感到挫败

可能发生了什么

“感到挫败”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

类型 二

失去兴趣

可能发生了什么

“失去兴趣”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

类型 二

拒绝活动

可能发生了什么

“拒绝活动”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

类型 二

看起来很疲倦

可能发生了什么

“看起来很疲倦”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

类型 二

情绪激动或难过

可能发生了什么

“情绪激动或难过”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

我听不明白

可能发生了什么

“我听不明白”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

反复问同一个问题

可能发生了什么

“反复问同一个问题”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

我不知道说什么

可能发生了什么

“我不知道说什么”可能与记忆、语言、注意力、疲劳、情绪变化或环境要求过高有关。

可以怎么做

放慢速度，一次只表达一个意思并留出时间。先回应情绪，再考虑是否需要补充事实。

可以这样说

“没关系，不着急。我们可以一起看看。”

尽量避免

不要考验记忆、争辩、羞辱、幼儿化，也不要当着本人谈论本人。

留意什么

留意噪声、疼痛、饥饿、疲劳、面部表情、姿势，以及什么话题能让对方恢复平静。

仍然没有帮助时

简化内容、提供两个选择、换个话题或暂停。如果变化突然或令人担忧，请依照正常渠道寻求临床支持。

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

证据说明：本指南参考系统综述与证据综合。关于沟通技巧和有意义互动的证据，比关于广泛临床结果的证据更一致。

本实用资源用于支持交流与联结，不属于医疗建议、治疗、临床培训或认证。