



Trang chủ / --

Giảm cảm cúm cho trẻ 6-10 tuổi (15-20kg)



**MIỄN PHÍ
GIAO NGAY**



Thêm vào giỏ

Mua ngay

Nhóm sản phẩm giảm cảm cúm cho trẻ 6-10 tuổi (Cân nặng 15-20kg)

Mã: OL00325 Yêu thích: 18.1k



198.800 đ/Bộ

Giá đã bao gồm thuế. Phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) sẽ được thể hiện khi đặt hàng.

Gợi ý cho bạn



Dung dịch uống A.T Desloratadin 2.5mg trị viêm mũi dị ứng, mày đay, ngứa (30 ống x 5ml)

3.700 đ



Pharma

🔍 Tìm kiếm theo thương hiệu



Thông tin chi tiết

Thuốc cần kê đơn:

Không

Chỉ định:

Giảm cảm cúm cho trẻ

Đối tượng sử dụng:

Cho trẻ 6-10 tuổi (Cân nặng 15-20kg)

Quy cách:

Gồm 3 sản phẩm





Giao hàng siêu tốc



Miễn phí vận chuyển



Đủ thuốc chuẩn

Mô tả sản phẩm

1. A.T Desloratadin 2.5mg (Hộp/ 30 ống 5ml)

Dung dịch uống A.T Desloratadin 2.5mg là gì?

Dung dịch uống A.T Desloratadin 2.5mg là một loại thuốc kháng histamin chứa hoạt chất desloratadine, dùng để làm giảm triệu chứng trong các bệnh như viêm mũi dị ứng, ngứa, nổi mề đay mãn tính.

Thành phần Dung dịch uống A.T Desloratadin 2.5mg

- Hoạt chất: Desloratadin 2.5mg.
- Tá dược: Sucrose, Sucralose, Acid citric, Sorbitol 70%, Methyl paraben, Propyl paraben, Propylen glycol, Đỏ erythrosin, Hương dâu, Nước tinh khiết.

Công dụng của Dung dịch uống A.T Desloratadin 2.5mg

Chỉ định

Thuốc A.T Desloratadin 2.5mg ống 5ml được chỉ định dùng để làm giảm triệu chứng trong các bệnh: Viêm mũi dị ứng, ngứa, nổi mề đay mạn tính.

Dược lực học

- Desloratadine là một thuốc kháng histamine ba vòng có tác dụng kéo dài với hoạt tính kháng thụ thể histamine H1 có tính lựa chọn cao. Cơ sở gắn kết thụ thể chỉ ra rằng ở nồng độ 2 - 3 ng/ml, desloratadine có tương tác đáng kể với thụ thể histamine H1 ở người.
- Trên *in vitro*, desloratadine ức chế giải phóng histamine tế bào ở người.

Dược động học

- Kết quả nghiên cứu phân bố bằng đồng vị phóng xạ trên chuột chỉ ra rằng desloratadine không đi qua hàng rào máu não.
- Theo đường uống, desloratadine 5 mg/lần/ngày, uống trong vòng 10 ngày, th



- Desloratadine chuyển hoá thành 3 - hydroxydesloratadine, một chất chuyển hoá hoạt tính và sau trở thành glucuronidat. Các enzym đảm bảo cho việc hình thành 3 -hydroxydesloratadine chưa được xác định.
- Desloratadine và 3 - hydroxydesloratadine gắn kết với protein huyết tương xấp xỉ 82 - 87% và 85 - 89%. Sự gắn kết của desloratadine và 3 - hydroxydesloratadine không thay đổi ở bệnh nhân suy thận.
- Thời gian bán thải của desloratadine là 27 giờ. Giá trị Cmax (nồng độ đỉnh huyết tương) và AUC (diện tích dưới đường cong) tăng lên khi dùng liều đơn từ 5 - 20 mg. Tăng tích lũy đạt được sau khi uống 14 ngày phù hợp với thời gian bán thải và liều dùng thường xuyên. Nghiên cứu ở người cho thấy khoảng 87% liều dùng desloratadine được tìm thấy trong nước tiểu và phân dưới dạng các chất chuyển hoá.
- Các nghiên cứu về nốt phỏng ở da người với liều đơn và liều lặp lại 5 mg desloratadine chỉ ra rằng thuốc ức chế kháng histamine một cách hiệu quả sau 1 giờ và kéo dài 24 giờ.

Cách dùng

Uống 1 lần duy nhất trong ngày.

Liều dùng

Đối với quy cách ống uống 5 ml hoặc gói 5 ml

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi ngày 2 ống hoặc 2 gói.
- Trẻ em từ 6 - 11 tuổi: Uống mỗi ngày 1 ống hoặc 1 gói.
- Trẻ em từ 2 - 5 tuổi: Uống mỗi ngày 1/2 ống hoặc 1/2 gói.

Đối với quy cách ống uống 10 ml hoặc gói 10 ml

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi ngày 1 ống hoặc 1 gói.
- Trẻ em từ 6 - 11 tuổi: Uống mỗi ngày 1/2 ống hoặc 1/2 gói.
- Trẻ em từ 2 - 5 tuổi: Sử dụng quy cách chai.

Đối với quy cách chai (đong thuốc bằng ống đong kèm theo)

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi ngày 10 ml.
- Trẻ em từ 6 - 11 tuổi: Uống mỗi ngày 5 ml.
- Trẻ em từ 2 - 5 tuổi: Uống mỗi ngày 2,5 ml.
- Người bị suy gan hoặc suy thận nặng (độ thanh thải creatinin < 30 ml/phút): Uống hai ngày 1 lần với liều 10 ml.

*Lưu ý: Liều dùng trên chỉ mang tính chất tham khảo. Liều dùng cụ thể tùy thuộc vào thể trạng và mức độ diễn tiến của bệnh. Để có liều dùng phù hợp, bạn cần tham khảo



Ở người lớn, khi uống quá liều thường có biểu hiện: Buồn ngủ, nhịp tim nhanh, nhức đầu. Ở trẻ em có biểu hiện ngoại tháp, đánh trống ngực.

Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều:

- Điều trị quá liều desloratadine thường là điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Gây nôn bằng sirô Ipeca, than hoạt. Nếu gây nôn không hiệu quả hoặc có chống chỉ định (người bệnh ngất, co giật, thiếu phản xạ nôn) thì có thể tiến hành rửa dạ dày với dung dịch natri clorid 0,9% và đặt ống nội khí quản để phòng ngừa hít phải dịch dạ dày.
- Desloratadine không bị loại bằng thẩm tách máu.

Tác dụng phụ

Khi sử dụng thuốc A.T Desloratadin 2.5mg ống 5ml, bạn có thể gặp các tác dụng không mong muốn (ADR).

- Ít có tác dụng không mong muốn.
- Desloratadine được dung nạp tốt. Desloratadine ít gây ra một số tác dụng không mong muốn như đau đầu, ngái ngủ, mệt mỏi, khô miệng, khó thở, nôn nao, đau bụng, khó chịu, hoa mắt, phản ứng quá mẫn.
- Trên trẻ em: Tác dụng phụ thường thấy là tiêu chảy, sốt, mất ngủ, đau đầu.

Hướng dẫn cách xử trí ADR

Khi gặp tác dụng phụ của thuốc, cần ngưng sử dụng và thông báo cho bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Lưu ý

Trước khi sử dụng thuốc bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tham khảo thông tin bên dưới.

Chống chỉ định

Thuốc A.T Desloratadin 2.5mg ống 5ml chống chỉ định trong các trường hợp mẫn cảm với desloratadin hoặc các thành phần khác của thuốc.

Thận trọng khi sử dụng

- Thận trọng với bệnh nhân suy gan.
- An toàn và hiệu quả khi dùng desloratadin cho trẻ em dưới 2 tuổi chưa được xác định.
- Khi sử dụng desloratadin, có nguy cơ khô miệng, đặc biệt ở người cao tuổi, và tăng nguy cơ sâu răng. Do đó, cần phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ khi dùng desloratadin.



thu glucose-galactose hoặc thiếu hụt enzym sucrose-isomaltase không nên sử dụng thuốc này.

- Tá dược methyl paraben, propyl paraben có thể gây dị ứng.
- Mỗi 5 ml dung dịch có chứa 1 g sucrose, 1 g sorbitol 70%, 2,5 mg sucralose, cần cân nhắc khi sử dụng cho bệnh nhân bị đái tháo đường.
- Mỗi 5 ml dung dịch thuốc có chứa 55 mg propylen glycol, hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi cho trẻ nhỏ dùng thuốc, nhất là khi trẻ được cho dùng các thuốc khác có chứa propylen glycol hay alcol.

Khả năng lái xe và vận hành máy móc

Ở liều điều trị, thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên nên lưu ý rằng đau đầu, mệt mỏi, ngái ngủ, hoa mắt có thể xảy ra trong thời gian điều trị.

Thời kỳ mang thai

Chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm tra tốt về sử dụng desloratadine trong thai kỳ. Do đó chỉ dùng desloratadine cho phụ nữ có thai khi cần thiết, với liều thấp và trong thời gian ngắn.

Thời kỳ cho con bú

Desloratadine và chất chuyển hóa descarboethoxyloratadine được tiết vào sữa mẹ. Do đó chỉ dùng desloratadine cho phụ nữ cho con bú khi cần thiết, với liều thấp và trong thời gian ngắn.

Tương tác thuốc

- Dùng đồng thời với ketoconazole, [erythromycin](#) hoặc cimetidine, nồng độ desloratadine tăng trong huyết tương.
- Trong xét nghiệm: Nên ngưng sử dụng thuốc 48 giờ trước khi tiến hành các thử nghiệm trên da.
- Uống desloratadine cùng với rượu không làm tăng nguy cơ suy giảm hành vi của rượu.

Thông tin sản xuất

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 độ C, tránh ánh sáng

Đóng gói: Hộp 30 ống, mỗi ống 5ml

Thương hiệu: An Thien Pharma

Nơi sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên (Việt Nam)

2. Hapacol 250mg Hộp 24 gói



Bột sủi bột Hapacol 250mg là một loại thuốc giảm đau và hạ sốt, được bào chế dưới dạng bột sủi bột hòa tan trong nước, chứa hoạt chất Paracetamol.

Thành phần Bột sủi bột Hapacol 250mg

- **Hoạt chất:** Paracetamol 250mg
- **Tá dược:** Acid citric khan, manitol, đường trắng, aspartam, natri hydrocarbonat, PVP K30, màu sunset yellow, bột hương cam vừa đủ 1 gói

Công dụng của Bột sủi bột Hapacol 250mg

Chỉ định

- Hạ sốt, giảm đau cho trẻ trong các trường hợp: cảm, cúm, sốt xuất huyết, nhiễm khuẩn, nhiễm siêu vi, mọc răng, sau khi tiêm chủng, sau phẫu thuật.

Cách dùng

Thuốc Hapacol 250 được bào chế dưới dạng thuốc bột sủi bột, hòa tan trong nước trước khi uống.

Hòa tan thuốc vào lượng nước (thích hợp cho bé) đến khi sủi hết bột. Cách mỗi 6 giờ uống một lần, không quá 5 lần/ ngày.

Liều dùng

Liều trung bình từ 10 - 15 mg/ kg thể trọng/ lần.

Tổng liều tối đa không quá 60 mg/kg thể trọng/ 24 giờ. Hoặc theo phân liều sau:

Trẻ em từ 4 đến 6 tuổi: Uống 1 gói/ lần. Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Lưu ý: Không nên kéo dài việc tự sử dụng thuốc cho trẻ mà cần có ý kiến bác sĩ khi:

- Có triệu chứng mới xuất hiện.
- Sốt cao (39,5°C) và kéo dài hơn 3 ngày hoặc tái phát.
- Đau nhiều và kéo dài hơn 5 ngày.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Lưu ý: Liều dùng trên chỉ mang tính chất tham khảo. Liều dùng cụ thể tùy thuộc vào thể trạng và mức độ diễn tiến của bệnh. Để có liều dùng phù hợp, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên y tế về cách chọn liều lượng thuốc hạ sốt Hapacol cho trẻ.

Làm gì khi dùng quá liều?

Quá liều Paracetamol do dùng một liều độc duy nhất hoặc do uống lặp lại liều lớn

Paracetamol (75 - 10 g mỗi ngày trong 1-2 ngày) hoặc do uống thuốc dài ngày. Hội



Biểu hiện của quá liều Paracetamol: Buồn nôn, nôn, đau bụng, triệu chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay.

Biểu hiện của ngộ độc nặng Paracetamol: Ban đầu kích thích nhẹ, kích động và mê sảng. Tiếp theo là ức chế hệ thần kinh trung ương: Sững sờ, hạ thân nhiệt, mệt lả, thở nhanh và nông; mạch nhanh, yếu, không đều, huyết áp thấp và suy tuần hoàn.

Cách xử trí: Chẩn đoán sớm rất quan trọng trong điều trị quá liều Paracetamol. Khi nhiễm độc Paracetamol nặng, cần điều trị hỗ trợ tích cực. Cần rửa dạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khi uống.

Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chất Sulfhydryl. N - acetylcystein có tác dụng khi uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Ngoài ra, có thể dùng Methionin, than hoạt và/hoặc thuốc tẩy muối.

Làm gì khi quên 1 liều?

Nếu bạn quên một liều thuốc, hãy dùng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và dùng liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch. Lưu ý rằng không nên dùng gấp đôi liều đã quy định.

Tác dụng phụ của Bột sủi bọt Hapacol 250mg

Quá liều và cách xử trí

- **Tác dụng phụ:** Ít gặp ban da; buồn nôn, nôn; bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày; giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, thiếu máu. Hiếm gặp phản ứng quá mẫn.
- **Quá liều:** Có thể gây hoại tử gan nghiêm trọng. Biểu hiện của quá liều bao gồm buồn nôn, nôn, đau bụng, triệu chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay. Ngộ độc nặng có thể gây sững sờ, hạ thân nhiệt, thở nhanh và nông, mạch nhanh và yếu, huyết áp thấp, suy tuần hoàn.
- **Xử trí:** Chẩn đoán sớm và điều trị hỗ trợ tích cực rất quan trọng. Rửa dạ dày trong vòng 4 giờ sau khi uống. Sử dụng các hợp chất Sulfhydryl như N-acetylcystein, Methionin, than hoạt và/hoặc thuốc tẩy muối.

Lưu ý khi dùng Bột sủi bọt Hapacol 250mg

Trước khi sử dụng thuốc bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tham khảo thông tin bên dưới.

Chống chỉ định

Thuốc Hapacol 250 chống chỉ định trong các trường hợp sau:

Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.

Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.



Đối với người bị phenylketon - niệu và người phải hạn chế lượng phenylalanin đưa vào cơ thể nên tránh dùng Paracetamol với thuốc hoặc thực phẩm có chứa Aspartam.

Đối với một số người quá mẫn (bệnh hen) nên tránh dùng Paracetamol với thuốc hoặc thực phẩm có chứa sulfit.

Phải dùng thận trọng ở người bệnh có thiếu máu từ trước, suy giảm chức năng gan và thận.

Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của Paracetamol, nên tránh hoặc hạn chế uống rượu.

Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

Khả năng lái xe và vận hành máy móc

Người thường xuyên lái xe hay vận hành máy móc có nên dùng thuốc?

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Thời kỳ mang thai

Phụ nữ trong thời kỳ mang thai có nên dùng thuốc?

Chưa xác định được tính an toàn của Paracetamol đối với thai nhi khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai. Do đó, chỉ nên dùng thuốc ở người mang thai khi thật cần thiết.

Thời kỳ cho con bú

Phụ nữ cho con bú có nên dùng thuốc?

Nghiên cứu ở người mẹ cho con bú, dùng Paracetamol không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ bú mẹ.

Tương tác thuốc

Tương tác thuốc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thuốc hoặc gây ra các tác dụng phụ. Nên báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ danh sách những thuốc và các thực phẩm chức năng bạn đang sử dụng. Không nên dùng hay tăng giảm liều lượng của thuốc mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ.

Uống dài ngày liều cao Paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của Coumarin và dẫn chất Indandion.

Cần chú ý đến khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng thời Phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.

Các thuốc chống co giật (Phenytoin, Barbiturat, Carbamazepin), **Isoniazid** và các thuốc chống lao có thể làm tăng độc tính đối với gan của Paracetamol.



Thông tin sản xuất

Bảo quản

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thương hiệu

Dược Hậu Giang

Nơi sản xuất

Việt Nam

3. Bipp zinc powder 70mg DHG (Hộp 24 gói x 1.5g)

Thành phần

Kẽm Gluconat 70mg

Công Dụng

Công dụng của Thuốc Bipp zinc powder 70mg

Chỉ định

Bipp ZinC giúp chỉ định điều trị trong các trường hợp sau:

- Bổ sung kẽm vào chế độ ăn hàng ngày, tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể khỏe mạnh.
- Trẻ em bị tiêu chảy cấp và mạn tính (uống kết hợp với các dung dịch bù nước và điện giải trong phác đồ điều trị tiêu chảy kéo dài theo khuyến cáo của Tổ chức Y Tế thế giới WHO).
- Trẻ em có các triệu chứng do thiếu kẽm: Còi xương, suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng, thường bị rối loạn tiêu hóa, chán ăn, khó ngủ, khóc đêm, da khô, loạn dưỡng móng (móng nhăn, có vệt trắng, chậm mọc), sức đề kháng kém, thường bị nhiễm trùng tái diễn ở da và đường hô hấp.

Dược lực học

Mã ATC: A12C B02

- Kẽm là khoáng chất thiết yếu tìm thấy trong hầu hết các tế bào. Cơ thể chứa khoảng 2 - 3 g kẽm, có trong xương, răng, tóc, da, gan, cơ bắp, bạch cầu và tinh hoàn. Kẽm kích thích hoạt động của rất nhiều enzym là



thích sự phát triển của các tế bào mới, phục hồi các tế bào đã bị các gốc tự do làm tổn thương. Kẽm cũng cần thiết cho sự tổng hợp DNA, kích thích sự chuyển hóa của vitamin A, kích thích sự hoạt động của thị giác và của hệ thần kinh trung ương.

- Đặc biệt, kẽm giúp cho việc phát triển và tăng trưởng chiều cao ở trẻ em và thanh thiếu niên.
- Trẻ em bị tiêu chảy kéo dài làm mất đi một lượng kẽm đáng kể. Việc giảm kẽm trong cơ thể làm chậm quá trình tái tạo và phục hồi về cấu tạo và chức năng tế bào niêm mạc ruột dẫn đến kéo dài thời gian tiêu chảy.
- Vì vậy việc bổ sung kẽm có khả năng làm giảm tiêu chảy ở trẻ bị tiêu chảy kéo dài.

Dược động học

- Kẽm hấp thu qua đường tiêu hóa không hoàn toàn, sinh khả dụng đường uống khoảng từ 20 - 30%. Kẽm được phân bố trên toàn cơ thể, với nồng độ cao nhất được tìm thấy ở: Cơ, xương, da, mắt và dịch tiền liệt tuyến. Thuốc được thải trừ chủ yếu qua đường phân, một lượng nhỏ được thải qua nước tiểu và mồ hôi.

Hướng dẫn sử dụng

Cách dùng Thuốc Bipp zinc powder 70mg

Cách dùng

- Có thể trộn vào thức ăn hoặc hòa vào khoảng 5 - 10 ml nước cho bé uống. Sau khi pha thành hỗn dịch, thuốc được dùng ngay sau khi pha. Nếu lượng thuốc không dùng hết hoặc chưa dùng nên bỏ đi.

Liều dùng

Bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày (uống sau khi ăn):

- Trẻ em 6 tháng - 6 tuổi: 1/2 gói/ngày.

Điều trị thiếu kẽm ở trẻ em (uống sau khi ăn):

- Trẻ em (< 10 kg): 2 gói x 1 lần/ ngày.
- Trẻ em (10 kg - 30 kg): 2 gói x 1 - 3 lần/ ngày.
- Người lớn và trẻ em (> 30 kg): 4 ½ gói x 1 - 3 lần/ ngày.

Bổ sung kẽm cho trẻ em bị tiêu chảy cấp và mạn tính:

- Trẻ dưới 6 tháng tuổi: 1 gói/ ngày, trong vòng 10 - 14 ngày



Lưu ý: Liều dùng trên chỉ mang tính chất tham khảo. Liều dùng cụ thể tùy thuộc vào thể trạng và mức độ diễn tiến của bệnh. Để có liều dùng phù hợp, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên y tế.

Làm gì khi dùng quá liều?

- Trong ngộ độc cấp tính, muối kẽm gây ăn mòn do sự tạo thành kẽm clorid dưới tác dụng acid dạ dày. Xử trí bằng cách cho uống sữa, hoặc muối kiềm carbonat hoặc than hoạt tính.
- Không nên gây nôn hoặc rửa dạ dày.
- Bổ sung kẽm liều cao dài ngày hoặc sử dụng dung dịch thẩm tách máu có nhiễm kẽm gây thiếu đồng, dẫn đến thiếu máu nguyên bào sắt, giảm bạch cầu trung tính. Làm giảm lượng kẽm trong máu bằng cách sử dụng chất tạo phức natri calci edetat.
- Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi ngay cho Trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm Y tế địa phương gần nhất.

Làm gì khi quên 1 liều?

- Bổ sung liều ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu thời gian giãn cách với liều tiếp theo quá ngắn thì bỏ qua liều đã quên và tiếp tục lịch dùng thuốc. Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã bị bỏ lỡ.

Thận trọng

Tác dụng phụ

Khi sử dụng thuốc thường gặp các tác dụng không mong muốn (ADR) như:

- Có thể gặp đau bụng, khó tiêu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, kích ứng dạ dày và viêm dạ dày. Các triệu chứng trên có thể giảm bằng cách uống sau khi ăn.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Lưu ý

Trước khi sử dụng thuốc bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tham khảo thông tin bên dưới.

Chống chỉ định

Bipp ZinC chống chỉ định trong các trường hợp sau:

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.



- Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân suy thận. Sử dụng kẽm kéo dài sẽ làm giảm hấp thu đồng, dẫn đến thiếu máu và giảm bạch cầu.

Liên quan đến tá dược

- Đường trắng: Bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp về không dung nạp fructose, kém hấp thu glucose galactose hoặc thiếu sucrase - isomaltase không nên dùng thuốc này.
- Aspartam: Thuốc này chứa 25 mg aspartam trong mỗi gói. Aspartam là một nguồn phenylalanin. Có thể có hại nếu người sử dụng mắc bệnh phenylketon niệu (PKU), một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, trong đó phenylalanin tích tụ do cơ thể không thể loại bỏ đúng cách.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

- Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú

- Tương tự như các thuốc khác, cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng thuốc.

Tương tác thuốc

- Các kháng sinh nhóm tetracyclin, các kháng sinh nhóm fluoroquinolon, các chế phẩm có chứa sắt, đồng làm giảm hấp thu kẽm.
- Kẽm gluconat khi dùng chung với hai nhóm kháng sinh trên có thể làm giảm hấp thu của các kháng sinh dùng chung.

Thông tin sản xuất

Bảo quản: Bảo quản Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Nơi sản xuất: Việt Nam

Nhà sản xuất: DHG Pharma

Quy cách: Hộp 24 gói x 1,5g.

Thu gọn

Hỏi & Đáp (0)



Về Pharmacy

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Giấy phép kinh doanh

Quy chế hoạt động

Chính sách đổi trả và bảo hành

Thông tin bảo hành máy thiết bị y tế theo hãng

Chính sách giao hàng

Chính sách nội dung

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chính sách thanh toán

Thể lệ chương trình thẻ thành viên

Câu hỏi thường gặp

Bệnh viện

Thông tin tuyển dụng

Danh mục

Thuốc

Tra cứu bệnh

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Chăm sóc cá nhân

Mẹ và Bé

Chăm sóc sắc đẹp

Thiết bị y tế

Sản phẩm tiện lợi

Doanh nghiệp

Nhãn hàng Pharmacy

Khuyến mãi HOT

Góc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe



Hỗ trợ đặt hàng

1800 6821 (Nhánh 1)

Thông tin nhà thuốc, khuyến mãi

1800 6821 (Nhánh 2)

Khiếu nại, góp ý

1800 6821 (Nhánh 2)


Theo dõi chúng tôi trên



Chứng nhận bởi



Hỗ trợ thanh toán



Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacy

Trụ sở: 248A Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1800 6821 - Email: cskh@pharmacy.vn

GCNDKDN: 0311770883 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 05/05/2012.

GCNDDKKDD: 6782/DDKKDDD-ĐNai ngày cấp 26/4/2022 Sở Y Tế Tỉnh Đồng Nai.

