

1	Cap1	1
1.1	Introduzione	1
1.2	Alcune definizioni di probabilità di un evento	2
1.3	Teoria degli insiemi applicata alla probabilità	2
1.4	Misura di probabilità - assiomi e proprietà	4
1.5	Calcolo combinatorio	10
	1.5.1 Funzione Γ di Eulero	10
	1.5.2 Strutture combinatorie elementari	12
1.6	σ -algebre di Borel	15
1.7	Alcuni esempi di limiti di successioni di eventi	17
1.8	Teorema di equivalenza	19
1.9	Eventi indipendenti e probabilità condizionata	22

1.1 Introduzione

Si introduce la materia studiando l'esperimento casuale: “*lancio di un dado*”.

ESEMPIO 1.1. Si definisce l'insieme dei possibili risultati dell'esperimento:

$$\Omega = \{\text{Possibili risultati}\} = I_6 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

L'insieme Ω prende il nome di *spazio campione*. Un *evento* è un sottoinsieme di Ω . Ad esempio, l'evento “*uscita di un numero pari*” è:

$$\{2, 4, 6\} \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Se si è interessati all'uscita del 6, l'evento corrispondente è:

$$\{6\} \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Si costruisce, a partire da questo evento, una famiglia di sottoinsiemi di Ω chiusa rispetto all'unione $\cup$, l'intersezione $\cap$ e la complementazione $(\cdot)^c$:

$$\mathcal{F} = \{\Omega, \{6\}, \emptyset, \Omega \setminus \{6\}\}.$$

Osservazione. Le famiglie che sicuramente soddisfano le proprietà di chiusura sopra citate sono:

- (i) la famiglia banale $\{\Omega, \emptyset\}$;
- (ii) la famiglia massima possibile $\mathcal{P}(\Omega)$.

DEFINIZIONE 1.1. L'insieme Ω prende il nome di *spazio campione*, *insieme universo* o *insieme certo*.

DEFINIZIONE 1.2. Una famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi di Ω è una σ -algebra se:

- (i) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- (ii) $A \in \mathcal{F}$ allora $A^c \in \mathcal{F}$;

(iii) per ogni successione di insiemi

$$\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F},$$

allora anche l'unione numerabile

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

D'ora in avanti, se non esplicitamente detto diversamente, si indicherà con $\mathcal{F}$ una σ -algebra di sottoinsiemi di Ω .

DEFINIZIONE 1.3. La coppia $(\Omega, \mathcal{F})$ prende il nome di *spazio probabilizzabile*.

1.2 Alcune definizioni di probabilità di un evento

DEFINIZIONE 1.4. Classica. Dato un evento A , la sua probabilità classica è il rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero di casi possibili, sempre che i casi possibili siano *equiprobabili*.

Osservazione. Richiedere che i casi possibili siano equiprobabili per definire la probabilità introduce un *ragionamento circolare!!!*

DEFINIZIONE 1.5. Frequentista. È il rapporto tra il numero di volte in cui A si verifica e il numero n di prove effettuate, per $n \rightarrow +\infty$.

Osservazione. L'ipotesi di effettuare infinite prove ($n \rightarrow +\infty$) rende questa definizione *non concreta!!!*

DEFINIZIONE 1.6. Soggettiva. È la somma, compresa tra 0 e 1, che si è disposti a scommettere per riavere 0 se A non si verifica e 1 se A si verifica; è valida se non ci sono vincite o perdite certe e il banco deve sempre essere disposto a scambiarsi con lo scommettitore prima dell'evento.

Osservazione. Criticità: la valutazione è *soggettiva!!!*

1.3 Teoria degli insiemi applicata alla probabilità

Ogni evento è un sottoinsieme di Ω . Siano A e B due eventi. Se $A \subset B$, allora l'evento il verificarsi dell'evento A *implica* il verificarsi dell'evento B .

ESEMPIO 1.2. Nell'esperimento del lancio del dado, si consideri l'evento $\{3\}$. Poiché vale l'inclusione:

$$\{3\} \subset \{1, 3, 5\}$$

dunque il verificarsi dell'evento $\{3\}$ implica il verificarsi dell'evento $\{1, 3, 5\}$, ovvero l'uscita di un numero dispari.

DEFINIZIONE 1.7. L'evento Ω è detto *evento certo*, mentre l'evento $\emptyset$ è detto *evento impossibile*.

DEFINIZIONE 1.8. Se $A \cap B = \emptyset$, si dice che A è *incompatibile* con B . In altre parole, A e B non possono avvenire simultaneamente.

Sono elencate di seguito alcune proprietà degli insiemi, utili per lo studio della probabilità.

Proprietà. (i) $A \subseteq B \Rightarrow B = A \cup (B \cap A^c) = A \cup (B \setminus A)$

$$(ii) \quad \boxed{A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)}$$

(iii) Siano $A, B, C \in \mathcal{F}$ eventi. Valgono le seguenti proprietà distributive:

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C); \\ A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C). \end{aligned}$$

(iv) Valgono le seguenti *relazioni di De Morgan*:

$$\begin{aligned} (A \cup B)^c &= A^c \cap B^c; \\ (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c. \end{aligned}$$

DEFINIZIONE 1.9. Sia $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Essa si dice *crescente* (rispettivamente *strettamente crescente*) se:

$$A_n \subseteq A_{n+1} \quad (\text{rispettivamente } A_n \subsetneq A_{n+1}) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

DEFINIZIONE 1.10. Sia $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Essa si dice *decrescente* (rispettivamente *strettamente decrescente*) se:

$$A_n \supseteq A_{n+1} \quad (\text{rispettivamente } A_n \supsetneq A_{n+1}) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

DEFINIZIONE 1.11. Il limite di una successione di eventi monotona è definito come segue:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} A_n &= \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \quad \text{per } A_n \text{ crescente;} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} A_n &= \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n \quad \text{per } A_n \text{ decrescente.} \end{aligned}$$

Osservazione. Data una successione di eventi $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ qualsiasi, possiamo sempre costruire le seguenti due successioni:

(i) una successione crescente:

$$\left\{ \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \inf_{k \geq n} A_k \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

dove l'inf è calcolato rispetto alla relazione di inclusione;

(ii) una successione decrescente:

$$\left\{ \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \sup_{k \geq n} A_k \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

dove il sup è calcolato rispetto alla relazione di inclusione.

DEFINIZIONE 1.12. Data una successione di eventi $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ nello spazio $(\Omega, \mathcal{F})$, si definiscono:

1) il *limite inferiore* della successione:

$$\begin{aligned}\liminf_{n \rightarrow +\infty} A_n &= \{ \omega \in \Omega \mid \exists m \in \mathbb{N} : \forall k \geq m, \omega \in A_k \} \\ &= \bigcup_{m=1}^{+\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k = \lim_{m \rightarrow +\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k = \sup_{m \in \mathbb{N}} \left(\inf_{k \geq m} A_k \right);\end{aligned}$$

2) il *limite superiore* della successione:

$$\begin{aligned}\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n &= \{ \omega \in \Omega \mid \forall m \in \mathbb{N}, \exists k \geq m : \omega \in A_k \} \\ &= \bigcap_{m=1}^{+\infty} \bigcup_{k=m}^{+\infty} A_k = \lim_{m \rightarrow +\infty} \bigcup_{k=m}^{+\infty} A_k = \inf_{m \in \mathbb{N}} \left(\sup_{k \geq m} A_k \right).\end{aligned}$$

PROPOSIZIONE 1.1. Per ogni successione di eventi $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, vale sempre la seguente inclusione:

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n$$

DIMOSTRAZIONE. Sia

$$\omega \in \liminf_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcup_{m=1}^{+\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k.$$

Per definizione di unione, ciò implica che esiste un certo indice $\bar{m} \in \mathbb{N}$ tale per cui, per ogni $k \geq \bar{m}$, si ha $\omega \in A_k$:

$$\exists \bar{m} \in \mathbb{N} \mid \forall k \geq \bar{m}, \omega \in A_k \implies \omega \in \bigcap_{k=\bar{m}}^{+\infty} A_k$$

Si fissi ora un generico $m \in \mathbb{N}$ e si definisca $k := \max\{m, \bar{m}\}$. Essendo per costruzione $k \geq \bar{m}$, per quanto stabilito al passo precedente si ha sicuramente $\omega \in A_k$.

Ne consegue che, per un qualunque m , è sempre possibile trovare un $k \geq m$ (nello specifico $k = \max\{m, \bar{m}\}$) che soddisfa l'appartenenza:

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \exists k = \max\{m, \bar{m}\} \mid \omega \in A_k.$$

Ma questa è esattamente la condizione che definisce il limite superiore. Perciò:

$$\omega \in \limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n \implies \liminf_{n \rightarrow +\infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n.$$

□

1.4 Misura di probabilità - assiomi e proprietà

Sia $(\Omega, \mathcal{F})$ uno spazio probabilizzabile. Un'applicazione

$$\mathcal{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R} \tag{1.1}$$

si chiama *misura di probabilità* se soddisfa gli assiomi di Kolmogorov elencati di seguito.

ASSIOMA 1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

ASSIOMA 2. Per ogni evento $A \in \mathcal{F}$, si ha $\mathbb{P}(A) \geq 0$.

ASSIOMA 3. Data una successione di eventi $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ a due a due disgiunti, ovvero tali che $A_i \cap A_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$, la probabilità dell'unione (disgiunta) è pari alla somma delle probabilità:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

DEFINIZIONE 1.13. Si definisce *spazio di probabilità* la terna $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dove:

- (i) Ω è lo *spazio campione* (l'insieme di tutti i possibili esiti di un esperimento aleatorio);
- (ii) $\mathcal{F}$ è una σ -algebra di sottoinsiemi di Ω (lo *spazio degli eventi*);
- (iii) $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ è una *misura di probabilità* che soddisfa gli assiomi di Kolmogorov.

Proprietà. Dagli assiomi appena enunciati derivano le seguenti proprietà fondamentali elencate di seguito.

- (i) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Si può scrivere l'insieme vuoto come unione numerabile di insiemi vuoti: $\emptyset = \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$, e applicando l'Assioma 3 si ottiene l'asserto. $\square$

- (ii) $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

DIMOSTRAZIONE. Essendo A e A^c disgiunti e tali che $A \cup A^c = \Omega$, si ha:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup A^c) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c).$$

Da questa relazione si ricava:

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

$\square$

- (iii) $\forall A \in \mathcal{F}, \quad 0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$.

DIMOSTRAZIONE. $\mathbb{P}(A) \geq 0$ è garantito direttamente dall'Assioma 2.

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \underbrace{\mathbb{P}(A^c)}_{\geq 0} \implies \mathbb{P}(A) \leq 1.$$

$\square$

- (iv) Se $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

DIMOSTRAZIONE. Essendo $A \subseteq B$, si può riscrivere l'evento B come unione di due eventi disgiunti:

$$B = A \cup (B \setminus A) = A \cup (B \cap A^c).$$

Applicando l'ASSIOMA 3 (poiché l'unione è disgiunta), si ottiene:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}(B \cap A^c)}_{\geq 0} \geq \mathbb{P}(A).$$

□

$$(v) \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

DIMOSTRAZIONE. Si può scrivere l'unione $A \cup B$ come unione disgiunta:

$$A \cup B = A \cup (B \cap A^c).$$

Passando alle probabilità, per l'ASSIOMA 3:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap A^c). \quad (1.2)$$

Consideriamo ora l'evento B . Usando una partizione con l'evento certo $\Omega = A \cup A^c$, abbiamo:

$$B = B \cap \Omega = B \cap (A \cup A^c) = (B \cap A) \cup (B \cap A^c).$$

Applicando nuovamente l'additività delle probabilità:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \cap A^c) \implies \mathbb{P}(B \cap A^c) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Sostituendo quest'ultima espressione nell'equazione (1.2), otteniamo la tesi:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

□

PROPOSIZIONE 1.2. Siano $A_1, \dots, A_n$ eventi. Allora vale la seguente disuguaglianza:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione procede per induzione su n .

(Base d'induzione) Sia $n = 2$. Dalla proprietà (v) appena dimostrata:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Poiché $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$, si deduce immediatamente che:

$$\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

(Passo induttivo) Si supponga che l'asserto sia valido per $n \geq 2$. Isolando l'ultimo termine dell'unione si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right).$$

Applicando il passo base, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}).$$

Per l'ipotesi induttiva,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Sostituendo:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i).$$

La tesi è dunque dimostrata. □

PROPOSIZIONE 1.3 (Disuguaglianza di Boole). Dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e una successione qualsiasi di eventi $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, vale la seguente disuguaglianza:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

DIMOSTRAZIONE. Si procede costruendo una nuova successione di eventi $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ a partire da $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ nel modo seguente:

$$\begin{aligned} B_1 &:= A_1 \\ B_2 &:= A_2 \cap A_1^c \\ B_3 &:= A_3 \cap A_1^c \cap A_2^c \\ &\vdots \\ B_n &:= A_n \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right)^c = A_n \cap \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i^c. \end{aligned}$$

Per costruzione, gli insiemi B_n sono a due a due disgiunti e tali che $B_n \subseteq A_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Inoltre, l'unione numerabile dei B_n coincide esattamente con l'unione numerabile degli A_n :

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n.$$

Per verificare ciò si procede dimostrando la doppia inclusione.

$\square$ Se $\omega \in \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$, deve esistere almeno un indice per cui ω vi appartiene. Sia definito

$$m := \min\{n \in \mathbb{N} \mid \omega \in A_n\};$$

si ha allora che $\omega \in A_m$ ma $\omega \notin A_i$ per tutti gli $i < m$. Di conseguenza, $\omega \in A_i^c$ per ogni $i \in \{1, \dots, m-1\}$. Questo implica che $\omega \in B_m$, e quindi

$$\omega \in \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n.$$

$\square$ Dalla definizione risulta evidentemente che $B_n \subseteq A_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Ne consegue banalmente che l'unione di tutti i B_n è contenuta nell'unione di tutti gli A_n .

Poiché $B_n \subseteq A_n$, per la monotonia della misura di probabilità (proprietà (iv)) si deduce che

$$\mathbb{P}(B_n) \leq \mathbb{P}(A_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sfruttando l'ASSIOMA 3 sull'unione numerabile (disgiunta) degli eventi B_n , si può concludere la dimostrazione:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

$\square$

Si conclude la sezione con un risultato molto importante, noto come *principio di inclusione-esclusione*, il quale permette di generalizzare la formula per l'unione di due eventi (vista nella proprietà (v)) a una famiglia finita di n eventi qualsiasi, correggendo sistematicamente le sovrapposizioni.

PROPOSIZIONE 1.4 (Principio di inclusione-esclusione). *Dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e una famiglia finita di eventi $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, la probabilità della loro unione è data da:*

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ &\quad - \dots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right). \end{aligned}$$

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione procede per induzione sul numero di eventi n .

(Base d'induzione) Sia $n = 2$. La formula si riduce a:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2),$$

che è vera in virtù della proprietà (v) precedentemente dimostrata.

(Passo induttivo) Si supponga che l'asserto sia valido per un generico intero $n \geq 2$. Si vuole dimostrare che esso è valido anche per $n + 1$. Si isoli l'evento A_{n+1} riscrivendo l'unione nel modo seguente:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right).$$

Applicando il passo base (ovvero la formula per l'unione di due eventi) a questa espressione, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cap A_{n+1}\right). \quad (1.3)$$

Per le proprietà distributive dell'intersezione rispetto all'unione, l'argomento dell'ultima probabilità si può espandere come:

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1}).$$

Sostituendo questa identità, il terzo termine al secondo membro dell'equazione (1.3) diventa la probabilità di un'unione di n eventi. È dunque possibile applicare l'ipotesi induttiva su entrambi i termini dell'equazione (1.3) che coinvolgono l'unione di n insiemi come segue.

(i) Per il primo termine, l'ipotesi induttiva fornisce direttamente l'enunciato per n :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right).$$

(ii) Per il terzo termine, applicando l'ipotesi induttiva agli n insiemi del tipo $(A_i \cap A_{n+1})$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1})\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i \cap A_{n+1}) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_{n+1}) \\ &\quad + \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right). \end{aligned}$$

Sostituendo queste due espansioni nell'equazione (1.3) occorre prestare attenzione al segno meno davanti al terzo termine del secondo membro, il quale inverte tutti i segni della seconda espansione (il $+$ diventa $-$ e il termine $(-1)^{n-1}$ diventa $(-1)^n$).

Raggruppando i termini che condividono la stessa dimensione delle intersezioni, si osserva che:

(a) Somma delle singole probabilità:

$$\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i).$$

(b) Somma delle intersezioni a coppie:

$$-\sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) - \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i \cap A_{n+1}) = -\sum_{1 \leq i < j \leq n+1} \mathbb{P}(A_i \cap A_j).$$

(c) La medesima logica si applica per le triplette e così via, fino all'ultima intersezione contenente tutti gli $n + 1$ eventi, che avrà coefficiente $(-1)^n$.

Ricostruendo l'espressione completa si ottiene l'asserto:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n+1} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \cdots + (-1)^n \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right).$$

□

1.5 Calcolo combinatorio

1.5.1 Funzione Γ di Eulero

DEFINIZIONE 1.14 (Funzione Gamma di Eulero). Si dice *funzione Gamma di Eulero* l'applicazione $\Gamma : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definita dal seguente integrale improprio:

$$\Gamma(t) := \int_0^{+\infty} z^{t-1} e^{-z} dz.$$

PROPOSIZIONE 1.5 (Proprietà fondamentali della funzione Gamma). La funzione Gamma gode delle seguenti proprietà:

- (i) $\Gamma(t + 1) = t \Gamma(t)$ per ogni $t > 0$;
- (ii) $\Gamma(1) = 1$;
- (iii) $\Gamma(n + 1) = n!$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

DIMOSTRAZIONE.

(i) Sostituendo $t + 1$ nella definizione della funzione Gamma, si ha:

$$\Gamma(t + 1) = \int_0^{+\infty} z^t e^{-z} dz.$$

Risolvendo l'integrale per parti si ottiene:

$$\Gamma(t + 1) = [-z^t e^{-z}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} t z^{t-1} e^{-z} dz.$$

Valutando il primo addendo si ottiene:

$$[-z^t e^{-z}]_0^{+\infty} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(-\frac{z^t}{e^z}\right) - (-0^t e^{-0}) = 0.$$

L'espressione si riduce dunque al solo termine integrale:

$$\Gamma(t+1) = t \int_0^{+\infty} z^{t-1} e^{-z} dz = t \Gamma(t).$$

(ii) Valutando la definizione direttamente per $t = 1$:

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} z^{1-1} e^{-z} dz = \int_0^{+\infty} e^{-z} dz.$$

Risolvendo questo integrale elementare si ottiene:

$$\Gamma(1) = [-e^{-z}]_0^{+\infty} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{e^z} \right) - (-e^0) = 0 + 1 = 1.$$

(iii) Applicando iterativamente la proprietà (i) appena dimostrata e sfruttando il risultato della proprietà (ii) come caso base, si ottiene:

$$\begin{aligned} \Gamma(n+1) &= n \Gamma(n) \\ &= n(n-1) \Gamma(n-1) \\ &= n(n-1)(n-2) \Gamma(n-2) \\ &\vdots \\ &= \underbrace{n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1}_{n!} \cdot \underbrace{\Gamma(1)}_1 = n! \end{aligned}$$

La dimostrazione è così conclusa. □

ESEMPIO 1.3. Si calcoli il valore della funzione Gamma in $t = \frac{1}{2}$:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} z^{\frac{1}{2}-1} e^{-z} dz = \int_0^{+\infty} z^{-\frac{1}{2}} e^{-z} dz.$$

Per risolvere l'integrale, si effettua la sostituzione di variabile ponendo $u^2 = z$, da cui si ottiene $2u du = dz$. Poiché per $z \rightarrow 0$ si ha $u \rightarrow 0$ e per $z \rightarrow +\infty$ si ha $u \rightarrow +\infty$, gli estremi di integrazione rimangono invariati. Sostituendo all'interno dell'integrale si ottiene:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{u} e^{-u^2} (2u) du = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

Riconoscendo nel termine a destra il ben noto integrale di Gauss, il quale valutato su metà asse reale restituisce $\sqrt{\pi}/2$, si può concludere che:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

1.5.2 Strutture combinatorie elementari

Per introdurre le tecniche del calcolo combinatorio, si consideri un generico insieme finito costituito da n elementi distinti, indicato con $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Qualora ci dovessero essere delle ripetizioni da prendere in considerazione, si userà la n -upla $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$.

NOTAZIONE 1.15. Si consideri una generica n -upla $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ all'interno della quale vi siano degli elementi ripetuti. Per costruire una notazione che ignora l'ordine posizionale degli elementi, interessandosi esclusivamente alla loro identità e al numero di volte in cui compaiono, si procede come segue.

- (i) Si isolano i k elementi *distinti* (o unici) presenti nella n -upla, con $1 \leq k < n$. Per identificarli, si selezioni un opportuno sottoinsieme di indici $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subset \{1, 2, \dots, n\}$, così da poter denotare tali elementi univoci come $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}$. L'insieme $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}\}$ ha dunque cardinalità k .
- (ii) Per ciascun indice $i_h \in I$, si definisca $n_h \in \mathbb{N}$ come il numero di occorrenze (o *molteplicità*) dell'elemento a_{i_h} all'interno della n -upla originale.

Per costruzione, è necessario che la somma delle molteplicità sia pari ad n :

$$\sum_{h=1}^k n_h = n.$$

Sotto tali premesse, è possibile abbandonare la n -upla a favore di una notazione più compatta che evidenzia esclusivamente gli elementi distinti e le loro molteplicità:

$$\{a_{i_1}^{(n_1)}, a_{i_2}^{(n_2)}, \dots, a_{i_k}^{(n_k)}\}.$$

La classificazione dei raggruppamenti che è possibile formare a partire da un insieme composto da elementi distinti oppure da una n -upla con ripetizioni si basa su due criteri:

- (a) l'*ordine* con cui vengono estratti o disposti gli elementi: se l'ordine conta si parla di *disposizioni*, se non conta si parla di *combinazioni*;
- (b) la possibilità di *ripetere* o meno gli elementi all'interno del raggruppamento, generando sequenze *con ripetizione* o *semplici*.

DEFINIZIONE 1.16. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti, si definisce *permutazione semplice* (o senza ripetizione) una sequenza ordinata che contiene tutti gli n elementi di S , in cui ogni elemento compare esattamente una volta. Il numero totale delle permutazioni semplici di n elementi è indicato con P_n ed è dato da:

$$P_n = n!$$

DEFINIZIONE 1.17. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $1 \leq k \leq n$, si definisce *disposizione semplice* di lunghezza k una sequenza ordinata di k elementi scelti tra gli n disponibili, senza ripetizioni. Il numero totale di tali sequenze è indicato con $D_{n,k}$ ed è dato da:

$$D_{n,k} = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Osservazione. Emerge chiaramente che le permutazioni semplici P_n rappresentano un caso particolare di disposizioni semplici $D_{n,k}$ in cui $k = n$

$$D_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n! = P_n.$$

DEFINIZIONE 1.18. Dato un intero $n \in \mathbb{N}$ e una partizione di n tramite k interi non negativi $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}_0$ tali che

$$\sum_{i=1}^k n_i = n,$$

si definisce *coefficiente multinomiale* la quantità:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} := \frac{n!}{\prod_{i=1}^k (n_i!)} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

Osservazione. Si osservi il caso particolare in cui $k = 2$. Dalla condizione $n_1 + n_2 = n$ si deduce immediatamente che $n_2 = n - n_1$. Sostituendo questa espressione all'interno della formula generale del coefficiente multinomiale, si ottiene:

$$\binom{n}{n_1, n_2} = \frac{n!}{n_1! n_2!} = \frac{n!}{n_1! (n - n_1)!} = \binom{n}{n_1}.$$

PROPOSIZIONE 1.6. Il coefficiente binomiale gode di un'importante proprietà ricorsiva nota come *LEGGE DI STIEFEL*. Per ogni intero $n \geq 1$ e per ogni intero k tale che $1 \leq k \leq n$, vale la seguente identità:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

DIMOSTRAZIONE. Omessa. □

DEFINIZIONE 1.19. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $k \in \mathbb{N}$ (non necessariamente minore o uguale a n), si definisce *disposizione con ripetizione* di lunghezza k una sequenza ordinata di k elementi scelti tra gli n disponibili, in cui è ammessa la reiterazione di uno stesso elemento. In altre parole, dopo l'estrazione di un elemento, esso viene reinserito nell'insieme S e può essere nuovamente estratto. Il numero totale di tali sequenze è indicato con $D_{n,k}^*$ ed è dato da:

$$D_{n,k}^* = n^k.$$

DEFINIZIONE 1.20. Si consideri un raggruppamento di n elementi descritto tramite la notazione per molteplicità precedentemente introdotta:

$$\{a_{i_1}^{(n_1)}, a_{i_2}^{(n_2)}, \dots, a_{i_k}^{(n_k)}\},$$

dove

$$\sum_{h=1}^k n_h = n.$$

Si definisce *permutazione con ripetizione* ogni sequenza ordinata di lunghezza n che riordina tutti gli elementi del raggruppamento, tenendo conto che scambiare di posizione due elementi identici non produce una sequenza distinguibile. Il numero totale di tali permutazioni è indicato con $P_{n,(n_1,\dots,n_k)}^*$ ed è dato dal rapporto tra le permutazioni semplici di n elementi e le permutazioni interne agli insiemi di elementi identici:

$$P_{n,(n_1,\dots,n_k)}^* = \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}.$$

Osservazione. Da un punto di vista algebrico, il termine

$$\prod_{h=1}^k (n_h!)$$

presente al denominatore ha proprio il ruolo di annullare l'ordine interno tra gli elementi indistinguibili.

ESEMPIO 1.4. Il problema di calcolare il numero di anagrammi della parola “MATEMATICA” è equivalente al calcolo del numero di permutazioni con ripetizione degli elementi di

$$\{M^{(2)}, A^{(3)}, T^{(2)}, E^{(1)}, I^{(1)}, C^{(1)}\}.$$

La parola è composta da un totale di $n = 10$ lettere. Applicando la formula per le permutazioni con ripetizione, si ottiene:

$$P_{10,(2,3,2,1,1,1)}^* = \binom{10}{2, 3, 2, 1, 1, 1} = \frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{3\,628\,800}{2 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = 151\,200.$$

Vi sono dunque 151 200 possibili anagrammi (anche privi di senso compiuto) generabili a partire da tale parola.

DEFINIZIONE 1.21. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $0 \leq k \leq n$, si definisce *combinazione semplice* di lunghezza k un sottoinsieme di S costituito da esattamente k elementi distinti. A differenza delle disposizioni, nelle combinazioni l'ordine in cui gli elementi vengono selezionati è del tutto ininfluenza.

Il numero totale di tali raggruppamenti è indicato con $C_{n,k}$. Poiché ogni singola combinazione di k elementi può essere riordinata al suo interno in $k!$ modi diversi (generando così $k!$ disposizioni semplici), il valore di $C_{n,k}$ si ottiene dividendo il numero di disposizioni semplici $D_{n,k}$ per le permutazioni interne P_k . Tale calcolo restituisce esattamente la formula del coefficiente binomiale:

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{k!} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

DEFINIZIONE 1.22. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $k \in \mathbb{N}$ (non necessariamente minore o uguale a n), si definisce *combinazione con ripetizione* di lunghezza k un raggruppamento di k elementi scelti tra gli n disponibili, in cui l'ordine non conta ed è ammessa la reiterazione degli elementi.

Il numero totale di tali raggruppamenti è indicato con $C_{n,k}^*$ ed è dato da:

$$C_{n,k}^* = \binom{n+k-1}{k, n-1} = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

Tale problema risulta equivalente al problema di calcolare il numero di permutazioni con ripetizione dell'insieme

$$\{0^{(n-1)}, 1^{(k)}\}$$

Viene fornito un esempio pratico per $n = 3$ e $k = 6$.

ESEMPIO 1.5. Si calcoli il numero di combinazioni con ripetizione di lunghezza 6 che è possibile formare a partire dall'insieme $S = \{a, b, c\}$ con $a \neq b \neq c$. Per comprendere graficamente l'isomorfismo con le sequenze binarie, si consideri una specifica combinazione in cui si estrae due volte a , tre volte b e una volta c , indicata con

$$\{a^{(2)}, b^{(3)}, c^{(1)}\}.$$

Si associno gli elementi estratti al simbolo 1 e si utilizzino i simboli 0 come *separatori* per demarcare il passaggio da un elemento di S al successivo. Essendoci $n = 3$ elementi in S , sono sufficienti $n - 1 = 2$ separatori.

La combinazione considerata si codifica univocamente nella stringa riportata di seguito.

$$\underbrace{1 \ 1}_a \quad \boxed{0} \quad \underbrace{1 \ 1 \ 1}_b \quad \boxed{0} \quad \underbrace{1}_c$$

Ogni possibile combinazione è associata univocamente a una specifica sequenza di questi 8 simboli. Il calcolo si riduce pertanto a determinare le permutazioni con ripetizione di

$$\{0^{(2)}, 1^{(6)}\}.$$

Applicando la formula si ottiene:

$$C_{3,6}^* = P_{8,(2,6)}^* = \binom{3+6-1}{6} = \binom{8}{6} = \frac{8!}{6!2!} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28.$$

1.6 σ -algebre di Borel

DEFINIZIONE 1.23. Sia X un insieme e $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{P}(X)$ un arbitrario insieme di sottoinsiemi di X . Si indichi con $\mathcal{A}$ la famiglia di tutte le σ -algebre definite su X e contenenti $\mathcal{Y}$:

$$\mathcal{A} := \{\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(X) \mid \mathcal{G} \text{ è una } \sigma\text{-algebra e } \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{G}\}.$$

Si definisce σ -algebra generata da $\mathcal{Y}$, e si denota con $\sigma(\mathcal{Y})$, la più piccola σ -algebra contenente $\mathcal{Y}$:

$$\sigma(\mathcal{Y}) := \bigcap_{\mathcal{G} \in \mathcal{A}} \mathcal{G}.$$

È possibile adattare la definizione appena fornita al caso in cui la famiglia $\mathcal{Y}$ sia composta da un singolo sottoinsieme $Y \subseteq X$.

DEFINIZIONE 1.24. Sia X un insieme e $Y \in \mathcal{P}(X)$ un suo sottoinsieme arbitrario. Si definisce σ -algebra generata dall'insieme Y , e la si denota con $\sigma(Y)$, la σ -algebra generata dalla famiglia composta dal solo elemento Y :

$$\sigma(Y) := \sigma(\{Y\}).$$

Osservazione. La σ -algebra generata da un singolo sottoinsieme $Y \subseteq X$ si esplicita sempre in una famiglia di quattro elementi:

$$\sigma(Y) := \sigma(\{Y\}) = \{\emptyset, X, Y, X \setminus Y\}.$$

ESEMPIO 1.6. Si consideri lo spazio campionario relativo al lancio di un dado a sei facce:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Sia dato l'evento $Y = \{6\}$, corrispondente all'uscita del numero 6. Applicando la definizione appena fornita per un singolo sottoinsieme, la σ -algebra generata da tale evento risulta esplicitamente:

$$\sigma(Y) = \{\emptyset, \Omega, \{6\}, \Omega \setminus \{6\}\}.$$

DEFINIZIONE 1.25. Preso l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, si consideri la famiglia $\mathcal{Y}$ costituita da tutti gli intervalli chiusi a destra e illimitati inferiormente:

$$\mathcal{Y} = \{(-\infty, x] \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

La σ -algebra di Borel, denotata con la lettera $\mathfrak{B}$, è definita come la σ -algebra generata da tale famiglia di intervalli:

$$\mathfrak{B} := \sigma(\mathcal{Y}).$$

Gli elementi di $\mathfrak{B}$ sono detti *insiemi boreliani* e si indicano con la notazione $B \in \mathfrak{B}$.

Viene fornita un'ulteriore definizione equivalente della σ -algebra di Borel.

DEFINIZIONE 1.26. Indicando con τ la *topologia naturale* di $\mathbb{R}$, si ha che:

$$\mathfrak{B} = \sigma(\tau).$$

Osservazione. Nonostante la sua vastità, è possibile dimostrare che la cardinalità della σ -algebra di Borel coincide con la potenza del continuo:

$$\#\mathfrak{B} = 2^{\aleph_0}.$$

Qualora lo spazio campionario di interesse sia limitato a un sottoinsieme proprio dei reali, come ad esempio l'intervallo $[0, 1]$, è possibile definire la σ -algebra di Borel restritta al nuovo dominio:

$$\mathfrak{B}_{[0,1]} := \sigma(\{[0, x] \mid x \in [0, 1]\}).$$

Il corrispondente spazio misurabile ristretto diventa dunque $([0, 1], \mathfrak{B}_{[0,1]})$.

1.7 Alcuni esempi di limiti di successioni di eventi

ESEMPIO 1.7. Si consideri una successione di eventi $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definita per casi nel modo seguente:

$$A_n = \begin{cases} (0, 1) & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left(0, \frac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ci si pone il problema di verificare se tale successione ammette limite, ovvero se

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Si calcoli innanzitutto il limite inferiore:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

Sviluppando l'intersezione si ottiene:

$$\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left(0, \frac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left(0, \frac{1}{n+1}\right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$ si ottiene $\emptyset$:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset.$$

Procedendo in maniera analoga per il limite superiore:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

Sviluppando l'unione, si osserva che

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = (0, 1) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$ si ottiene $(0, 1)$:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = (0, 1).$$

Essendo $\emptyset \neq (0, 1)$, si deduce che la successione di eventi non ammette limite.

ESEMPIO 1.8. Si consideri una successione di eventi $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definita per casi nel modo seguente:

$$A_n = \begin{cases} \emptyset & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left[0, \frac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si calcoli innanzitutto il limite inferiore:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

Poiché in ogni sequenza di indici $k \geq n$ vi è necessariamente almeno un indice pari per il quale $A_k = \emptyset$, l'intersezione interna si annulla costantemente:

$$\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k = \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$ si ottiene banalmente $\emptyset$:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset.$$

Si calcoli ora il limite superiore:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

Sviluppando l'unione, i termini pari vuoti non contribuiscono, pertanto ci si riduce all'intervallo dispari più ampio:

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left[0, \frac{1}{n} \right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left[0, \frac{1}{n+1} \right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$, l'estremo destro tende a zero. Essendo l'intervallo chiuso a sinistra, lo zero non viene mai escluso:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \{0\}.$$

Essendo $\emptyset \neq \{0\}$, si deduce che la successione di eventi non ammette limite.

ESEMPIO 1.9. Si consideri una variante dell'esempio precedente:

$$A_n = \begin{cases} \emptyset & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left(0, \frac{1}{n} \right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Il limite inferiore, per le medesime ragioni analizzate in precedenza, risulta vuoto:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset.$$

Per il limite superiore si ottiene invece:

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left(0, \frac{1}{n} \right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left(0, \frac{1}{n+1} \right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$, in questo caso lo zero non appartiene a nessuno degli insiemi originari. L'intersezione generalizzata non trattiene dunque alcun elemento:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Si deduce, dunque, che la successione di eventi ammette limite e tale limite è l'insieme vuoto $\emptyset$.

1.8 Teorema di equivalenza

DEFINIZIONE 1.27. Dato uno spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$ e data una misura di probabilità $\mathbb{P}$ su $\mathcal{F}$ si definisce *continuità della misura di probabilità* la seguente proprietà: per ogni successione di eventi che ammette limite, $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$, si ha che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right).$$

TEOREMA DI EQUIVALENZA 1.7. Dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, la proprietà di σ -additività per $\mathbb{P}$ è equivalente al sussistere congiunto della proprietà di additività finita e della proprietà di continuità.

DIMOSTRAZIONE.

- $\Rightarrow$ (i) Data una famiglia finita di eventi a due a due disgiunti $A_1, A_2, \dots, A_k$, è sufficiente estendere tale famiglia a una successione definita per casi:

$$A_n = \begin{cases} A_n & \text{se } n \leq k \\ \emptyset & \text{se } n > k \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Poiché $\emptyset$ è disgiunto da tutti gli altri eventi, la successione è formata da eventi disgiunti. Applicando la σ -additività, e ricordando che $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, si deduce immediatamente l'additività finita.

- (ii) Si consideri una successione di eventi $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ monotona decrescente e convergente a $\emptyset$. Fissato un generico indice n , è possibile esprimere B_n come l'unione numerabile delle "corone" successive, le quali sono sempre disgiunte tra loro:

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{+\infty} (B_k \cap B_{k+1}^c).$$

Applicando la σ -additività, si ottiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_n) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} (B_k \cap B_{k+1}^c)\right) \\ &= \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(B_k \cap B_{k+1}^c). \end{aligned} \tag{1.4}$$

Risulta dunque:

$$0 \leq \mathbb{P}(B_1) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(B_k \cap B_{k+1}^c) \leq 1.$$

La (1.4) rappresenta il resto n -esimo di una serie convergente, pertanto tende a zero per $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = 0 = \mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} B_n\right).$$

- (iii) Si consideri una successione di eventi $\{D_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ monotona decrescente e convergente a $D \neq \emptyset$. Vale la relazione:

$$\begin{aligned} D_n &= D_n \cap \Omega = D_n \cap (D \cup D^c) \\ &= (D_n \cap D) \cup (D_n \cap D^c) = D \cup (D_n \cap D^c). \end{aligned}$$

Passando alla probabilità e applicando la σ -additività, si ottiene:

$$\mathbb{P}(D_n) = \mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(D_n \cap D^c).$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$, si osserva che la successione $\{D_n \cap D^c\}_{n \in \mathbb{N}}$ è monotona decrescente e converge a $\emptyset$. Applicando il risultato del punto precedente, si ottiene:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(D_n) = \mathbb{P}(D) + \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(D_n \cap D^c)}_{=0} = \mathbb{P}(D) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} D_n\right).$$

- (iv) Si consideri una successione di eventi $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ monotona crescente e convergente a $C \neq \emptyset$. Vale la relazione:

$$C^c = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} C_n\right)^c = \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} C_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{+\infty} C_n^c = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^c.$$

Per il punto precedente, si ha che:

$$1 - \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(C^c) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^c\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_n^c) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_n).$$

Si conclude che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_n) = \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} C_n\right).$$

- (v) Si consideri un'arbitraria successione di eventi $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a un evento A . Si considerino le due successioni estratte da $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\begin{aligned} \left\{ \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n \in \mathbb{N}} & \quad \text{successione crescente;} \\ \left\{ \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n \in \mathbb{N}} & \quad \text{successione decrescente.} \end{aligned}$$

Vale la relazione:

$$\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \subseteq A_n \subseteq \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando alla probabilità si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i\right) \leq \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i\right).$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$ e applicando i risultati dei punti precedenti, si ottiene:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \right); \\ \Rightarrow \underbrace{\mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \right)}_{=\mathbb{P}(A)} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \underbrace{\mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \right)}_{=\mathbb{P}(A)}. \end{aligned}$$

Si deduce necessariamente che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A) = \mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n \right).$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sia $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di eventi a due a due disgiunti. Per ipotesi vale la relazione:

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \right) &= \mathbb{P} \left(\left(\bigcup_{n=1}^h A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \right) \right) \\ &= \underbrace{\mathbb{P} \left(\bigcup_{n=1}^h A_n \right)}_{\sum_{n=1}^h \mathbb{P}(A_n)} + \mathbb{P} \left(\bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \right). \end{aligned}$$

Per $h \rightarrow +\infty$, applicando l'ipotesi di continuità, si ottiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \right) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \lim_{h \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P} \left(\lim_{h \rightarrow +\infty} \bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \right). \end{aligned}$$

Si supponga per assurdo che esista un elemento

$$x \in \lim_{h \rightarrow +\infty} \bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n = \bigcap_{h=1}^{+\infty} \left(\bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \right) \Rightarrow x \in \bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \quad \forall h \in \mathbb{N}.$$

In particolare, per $h = 1$ vale la relazione:

$$x \in \bigcup_{n=2}^{+\infty} A_n,$$

da cui segue che esiste almeno un indice $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che $x \in A_{n_1}$. Ma vale anche che

$$x \in \bigcup_{n=n_1+1}^{+\infty} A_n,$$

da cui si deduce che esiste almeno un indice $n_2 > n_1$ tale che $x \in A_{n_2}$. Dunque $x \in A_{n_1} \cap A_{n_2}$ il che è assurdo, poiché gli eventi sono a due a due disgiunti. Da ciò segue l'asserto:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(\emptyset) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

□

1.9 Eventi indipendenti e probabilità condizionata

ESEMPIO 1.10. Si consideri l'esperimento casuale del lancio di un dado a sei facce:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si consideri l'evento $\{1, 3, 5\}$, corrispondente all'uscita di un numero dispari, e la σ -algebra generata da esso:

$$\mathcal{F} = \sigma(\{1, 3, 5\}) = \{\emptyset, \Omega, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}.$$

Allo spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$ si può assegnare una misura di probabilità $\mathbb{P}_1$ definita come segue.

$$\mathbb{P}_1 : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

$$\emptyset \longmapsto 0$$

$$\Omega \longmapsto 1$$

$$\{1, 3, 5\} \longmapsto 1/2$$

$$\{2, 4, 6\} \longmapsto 1/2$$

$\mathbb{P}_1$ descrive il comportamento di un dado *non truccato* ed è detta *misura di probabilità classica*, in quanto assegna a ogni evento $A \in \mathcal{F}$ la quantità

$$\mathbb{P}_1(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}.$$

È possibile però assegnare una misura di probabilità $\mathbb{P}_2$ diversa, definita come segue.

$$\mathbb{P}_2 : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

$$\emptyset \longmapsto 0$$

$$\Omega \longmapsto 1$$

$$\{1, 3, 5\} \longmapsto 0$$

$$\{2, 4, 6\} \longmapsto 1$$

$\mathbb{P}_2$ descrive il comportamento di un dado *truccato*, il quale non può mai restituire un numero dispari.

Da tale esempio si evince che, a parità di spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$, è possibile definire misure di probabilità differenti, che rispettano gli ASSIOMI 1, 2, 3 di Kolmogorov. In generale, dunque, la misura di probabilità non è univocamente determinata dallo spazio probabilizzabile.

DEFINIZIONE 1.28. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $I, C \in \mathcal{F}$ due eventi tali che $I \neq \emptyset$ e $C \neq \Omega$.

(i) L'evento I è detto *quasi impossibile* se $\mathbb{P}(I) = 0$.

(ii) L'evento C è detto *quasi certo* se $\mathbb{P}(C) = 1$.