

# 1 Introduzione

Obbiettivo finale di questo esperimento è quello di determinare l'indice di rifrazione  $n$  del vetro di cui è composto un prisma, o, più propriamente di verificare la legge di dispersione secondo la legge di Cauchy qui di seguito

$$n^2(\lambda) = a + \frac{b}{\lambda^2}. \quad (1)$$




Figura 1: Schema della sezione del prisma

Tuttavia prima di arrivare a questo punto sarà necessario adempiere a tappe intermedie quali la misurazione dell'angolo  $\alpha$  caratterizzante il prisma e, subito dopo la ricerca dell'angolo di deviazione minima per ogni colore dello spettro della lampada di Hg. Lo spettro del mercurio era stato trovato e analizzato nell'esperienza precedente. Denotando con  $i$  l'angolo di incidenza e con  $i'$  l'angolo di emergenza, con  $r$  l'angolo in uscita dalla prima faccia, con  $r'$  l'angolo in entrata nella seconda faccia e con  $\delta$  l'angolo di deviazione, si scrivono le seguenti relazioni:

$$r + r' = \alpha \quad \delta = i + i' - \alpha \quad (2)$$

e

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n \quad \frac{\sin r'}{\sin i'} = \frac{1}{n}. \quad (3)$$

Cercando il minimo della funzione  $\delta = \delta(i)$  per derivazione, con un po' di algebra si arriva alla condizione

$$i = i' \quad r = r' \quad (4)$$

ossia il raggio di luce deve essere ortogonale alla bisettrice del prisma. Attraverso le 1, si ricava

$$\delta_m = 2i_m - \alpha \quad r_m = \frac{\alpha}{2} \quad \sin i_m = n \sin \left( \frac{\alpha}{2} \right) \quad (5)$$

Da cui si può ottenere la formula definitiva per  $n$

$$n(\lambda) = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta_m}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}. \quad (6)$$

Si andrà quindi a misurare l'angolo  $\alpha$  di un prisma e l'angolo  $\delta_m$  per diverse lunghezze d'onda della lampada di mercurio, che presenta uno spettro ben visibile e ben distribuito su tutto lo spettro visibile. Dall'analisi di questi dati sarà possibile ricavare la legge di Cauchy, come mostreremo successivamente.