

CFA Level II Quantitative Methods 溫習筆記

學生：Chi Wai（香港） | 繁體中文，CFA 關鍵詞保留英文

累積版本 | 產生日期：2026-09-26

教材：CFA Program Curriculum Level II, Quantitative Methods（書頁為印刷頁碼）

目錄 Contents

00 目錄與使用說明	3
1. 這套筆記是甚麼	3
2. 目錄	3
3. 每課筆記的固定結構	3
4. 怎樣使用	4
5. 連結清單	4
Day 1 LM1 多元回歸基礎與假設 (Multiple Regression Basics & Assumptions)	6
1. 一句總結	6
2. 日常例子	6
3. 正式概念 (CFA 詞彙)	6
4. 圖表	9
5. 公式	15
6. 口訣	16
7. 考試陷阱	16
8. 自測題 (答案放最後)	16
9. 相關筆記連結	18
補底 假設檢定、p 值、t 值、標準誤 (Level I 基礎)	19
1. 一句總結	19
2. 日常例子	19
3. 正式概念 (CFA 詞彙)	19
4. 圖表	21
5. 公式	22
6. 口訣	22
7. 考試陷阱	22
8. 自測題 (答案放最後)	22
9. 相關筆記連結	23
口訣總表 (累積)	24
Day 1 LM1 多元回歸基礎	24
補底 假設檢定	24
公式總表 (累積)	25
Day 1 LM1 多元回歸基礎	25
補底 假設檢定	25
易錯點與弱項 (累積)	27
弱項紀錄	27
考試陷阱 (提醒)	27
學習習慣提醒	28
練習題庫 (累積)	29
A. 題目	29
B. 答案與簡短解釋	30

00 | 目錄與使用說明

CFA Level II Quantitative Methods 溫習筆記 | 學生：Chi Wai (香港) | 筆記由 2026-09-26 開始累積 | 語言：繁體中文，CFA 關鍵詞保留英文

1. 這套筆記是甚麼

這套筆記是為**不讀課本**而設的。每一課都自成一體：先用日常例子講明白，再帶出 CFA 的英文詞彙、書中的圖表、公式、口訣、考試陷阱和自測題。所有數字都來自課本或上課紀錄；上課用的示範例子（例如每月開支）會清楚註明是示範。

2. 目錄

課堂筆記（每課一份）

檔案	內容	狀態
01 LM1 多元回歸基礎	Day 1：多元回歸用途與流程、方程式與係數、SST、五個假設、四種診斷圖	已完成（2026-09-26，小測 7/7）
Day 2 LM2（未建立）	Goodness of fit、adjusted R^2 、AIC/BIC、F-test、forecasting	下一課

補底筆記（Level I 基礎）

檔案	內容	狀態
補底 假設檢定_p值 t值_標準誤	擲硬幣概念、p 值、t 值、標準誤、ABC 回歸表；進階：臨界值 1.98、1% 水平、非零假設值	基本掌握；進階部分待教

累積總表（每課更新）

檔案	內容
口訣總表	所有口訣
公式總表	所有公式
易錯點與弱項	弱項、陷阱、日期和狀態
練習題庫	所有檢查題和小測題，連答案和簡短解釋，按主題加標籤

3. 每課筆記的固定結構

每份課堂筆記和補底筆記都用同一個次序：

1. 一句總結：一句講完今課重點。
2. 日常例子：用生活例子先明白概念。
3. 正式概念（CFA 詞彙）：把例子對應到考試用的英文詞彙。
4. 圖表：每幅圖下面都有解說，講清楚「看甚麼」和「結論是甚麼」。
5. 公式
6. 口訣
7. 考試陷阱
8. 自測題：答案放在該部分最後，先自己作答再看。
9. 相關筆記連結

4. 怎樣使用

每日溫習（約 10–15 分鐘）

1. 早上上新課之前，先做兩條題：分別來自 1 日前、3 日前、7 日前的課（在[練習題庫](#)揀）。
2. 讀一次[易錯點與弱項](#)中狀態是「進行中」或「待教」的項目。
3. 晚上小測後，把答錯或猜中的題目記入易錯點，並更新狀態。
4. 每條題都寫一個簡短答案（一個字母或一句話都可以），不要只在心裏說「我懂了」。

模擬試（mock）之前

1. 由頭讀一次[口訣總表](#)和[公式總表](#)。
2. 讀[易錯點與弱項](#)中所有「考試陷阱」。
3. 在[練習題庫](#)重做所有 🤖（猜中）和 🟩（未作答）的題目。

PDF 版本

- CFA_L2_Quant_筆記.pdf：全部筆記的累積版本（每課更新）。
- CFA_L2_Quant_筆記_Day1.pdf：Day 1 完成時的版本。
- 每上完一課，新增 0X_...md，更新總表，然後執行 `./build_pdf.sh` 重新產生 PDF。

5. 連結清單

- [01 LM1 多元回歸基礎.md](#)
- [補底 假設檢定 p值 t值 標準誤.md](#)
- [口訣總表.md](#)
- [公式總表.md](#)
- [易錯點與弱項.md](#)
- [練習題庫.md](#)

- 圖片資料夾：`img/` (`ex2_process`、`ex19_book`、`ex21_book`、`ex23_book`、`ex25_book` 是書中 Exhibit；`contrast.png` 是模擬示意圖；`ttest.png` 是 t 分佈示意圖)

Day 1 | LM1 多元回歸基礎與假設 (Multiple Regression Basics & Assumptions)

上課日期：2026-09-26（原定 Day 1 為 9/27，提早一日完成） | 教材出處：CFA L2 Quant，Learning Module 1，書頁 p3-24 | 晚間小測：7/7（第 4 題是猜中的，見下文）

1. 一句總結

多元回歸（multiple regression）就是用兩個或以上的因素（X）一齊去解釋一個結果（Y），每個係數都要讀成「其他因素不變時，這個因素多一單位，Y 變多少」，而且要先用五個假設和四種圖檢查模型，結果才可以信。

2. 日常例子

想像你每個月的開支會受兩件事影響：出外吃飯的次數，和搭的士的次數。假設我們用過去的紀錄，得出這條式子：

$$\text{開支} = 8000 + 150 \times \text{出外吃飯次數} + 80 \times \text{打的士次數}$$

這條式子可以這樣讀：

- **8000** 是「底數」。即使一次都沒有出外吃飯、一次都沒有搭的士，每個月大約仍要用 8000 元（租、電話費等）。在 CFA 裏這叫 **intercept（截距）**。
- **150** 的意思是：在打的士次數不變的情況下，每多出外吃飯一次，開支平均多 150 元。
- **80** 的意思是：在出外吃飯次數不變的情況下，每多打的士一次，開支平均多 80 元。
- 如果某個月出外吃飯 10 次、打的士 5 次，預計開支就是 $8000 + 150 \times 10 + 80 \times 5 = 8000 + 1500 + 400 = 9900$ 元。

重點是「**其他不變**」這四個字。150 不是「吃飯的全部影響」，而是「把的士次數固定住之後，吃飯本身的影響」。

（以上數字是上課用的示範例子，不是真實數據。）

3. 正式概念（CFA 詞彙）

3.1 多元回歸用來做甚麼（uses of multiple regression）

書中列出三大用途：**找出變數之間的關係（identify relationships）**、**測試現有理論（test existing theories）**、**作出預測（forecast）**。書中的例子包括：

- 基金經理用 Fama-French 五因子模型，了解哪些因子推動某隻股票的超額回報。

- 財務顧問用 financial leverage、profitability、revenue growth 等變數，預測公司會否陷入 financial distress。
- 分析師研究國家風險（政治穩定、經濟狀況、ESG）對該國股票回報的影響。

3.2 回歸流程 (regression process)

書中的流程圖（見第 4 部分的圖）可以用一句話記住：先問 Y 是否連續 → 估計模型 → 分析 residuals → 假設是否成立 → 整體擬合是否顯著 → 是否最好的模型 → 才拿來分析和預測。任何一步答「否」，就要回頭調整模型（adjust the model）再估計。

- 如果 Y 不是連續數字，而是「是/否」（例如公司會否成為收購目標，1 或 0），就要改用 **logistic regression**。
- 如果 residuals 不符合 homoskedasticity，或者所有 X 都不顯著，就是「調整模型再估計」。

3.3 方程式的結構

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + \cdots + b_k X_{ki} + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- Y：dependent variable（因變數，想解釋的結果）。
- X_1 到 X_k ：independent variables（自變數，用來解釋的因素），共 k 個。
- n：observations（觀察值數目），n 必須大過 k。
- b_0 ：intercept，當所有 X 都等於 0 時 Y 的預期值。
- b_1 到 b_k ：slope coefficients，又叫 **partial regression coefficients / partial slope coefficients**。 b_j 表示 **在其他 X 不變 (holding all other independent variables constant)** 的情況下， X_j 多一單位，Y 平均變多少。
- ε_i ：error term（誤差項），模型解釋不到的隨機部分（stochastic part）；X 那部分叫 deterministic part。
- 估計出來的係數會戴帽，例如 $\hat{b}_1$ ；實際值減估計值就是 **residual（殘差）**。

3.4 Fama-French 三因子例子（書中 Knowledge Check，p9）

書中的估計式（回報以整數百分比表示，1 即 1%）：

$$\text{RETRF} = 1.5324 + 0.5892 \text{ MKTRF} - 0.8719 \text{ SMB} - 0.0560 \text{ HML}$$

- **MKTRF**：市場超額回報（market excess return）。
- **SMB**：小型股回報減大型股回報（size effect）。
- **HML**：價值股回報減增長股回報（value effect）。

讀法：

- **Intercept 1.5324**：如果 MKTRF、SMB、HML 全部等於 0，組合的預期回報是 1.5324%。
- **0.5892**：SMB 和 HML 不變時，市場超額回報升 1%，組合回報預期升 0.5892%。
- **-0.8719**：其他不變時，SMB 升 1%，組合回報預期跌 0.8719%。
- **-0.0560**：其他不變時，HML 升 1%，組合回報預期跌 0.056%。

預測（MKTRF = 1，SMB = 4，HML = -2）：

$$1.5324 + 0.5892(1) - 0.8719(4) - 0.0560(-2) = 1.5324 + 0.5892 - 3.4876 + 0.112 = -1.254$$

注意最後一項：負的係數乘以負的 HML，**負負得正**，所以是 **+0.112**，不是 -0.112。如果做錯這一步，會得出 -1.478。（書中答案寫 -1.2524，因為書的算式把 1.5324 寫成了 1.534；用正確的 1.5324 計，答案是 -1.254。）

3.5 Y 的變化量 (Variation of Y / SST)

回歸的目標是解釋 **Y 的變化 (variation of Y)**。書中的定義是每個 Y 減去平均值，再平方，然後加起來，這個數也叫 **sum of squares total (SST)**。

簡單計法示範（只為說明計法的示範數字）：假設三個月的開支是 8000、9000、10000 元。

1. 平均值 = $(8000 + 9000 + 10000) \div 3 = 9000$ 。
2. 每個月減平均：-1000、0、+1000。
3. 平方：1,000,000、0、1,000,000。
4. 加起來：SST = 2,000,000。

SST 愈大，代表 Y 上落愈大，需要解釋的東西愈多。書中 ABC 股票的例子（Exhibit 4 的 ANOVA 表）Total SS = 0.7489，其中回歸解釋了 0.2914，剩下 0.4575 是 residual。這部分會在 Day 2（LM2，R²、F-test）詳細講。

3.6 五個假設 (five assumptions) : LINE + I

字母	假設 (英文)	白話意思	口訣句子	關於
L	Linearity	Y 和各個 X 的關係是直線的	每次一樣	Y 與 X 的關係（用 residual 圖檢查）
I	Independence of errors	每個 residual 互不相關（今個月錯唔會影響下個月錯）	互不影響	residuals
N	Normality	residuals 整體呈鐘形（normal distribution）	小錯為主	residuals
E	Equal variance = Homoskedasticity	每個觀察值的 residual 大小（variance）一樣	錯得平均	residuals
+ I	Independence of independent variables	X 不是隨機的，而且 X 之間沒有完全的線性關係	各有各講	X 本身


- 書中的次序是：(1) linearity、(2) homoskedasticity、(3) independence of errors、(4) normality、(5) independence of independent variables。LINE + I 只是方便記憶的排法。
- 前四個（L、I、N、E）都是透過誤差／residuals 去檢查的（linearity 本身講 Y 與 X 的關係，但同樣可以從 residual 圖看出來）；最後一個「各有各講」講的是 X 本身。
- 第 5 個假設如果完全違反（X 之間有 exact linear relationship），模型根本估計不到；如果只是 X 之間高度相關（approximate linear relationship，例如 pairwise correlation 顯著），模型可以估計，但係數很難解讀。這就是之後 Day 3 的 multicollinearity。

分清 homoskedasticity 與 normality（曾經混淆，已解決）：

- **Homoskedasticity (錯得平均)** 問的是：每一個觀察值的錯誤大小是否差不多。如果預測值愈大，錯誤就愈大（或愈小），residuals vs predicted 圖會出現 **漏斗形 (funnel shape)**，這叫 heteroskedasticity，即違反了 homoskedasticity。
- **Normality (小錯為主)** 問的是：把全部 residuals 放在一起，形狀是否像一個鐘（大部分是小錯，大錯很少）。要用 **normal Q-Q plot** 去看；如果兩端的點彎離直線，代表 **fat tails (肥尾，大錯比正常多)**。
- 一句分辨：漏斗 → homoskedasticity 有問題；Q-Q 圖兩頭彎 → normality 有問題。

4. 圖表

4.1 回歸流程圖（書中 Exhibit 2，p6）




解說： 由上而下讀。第一步問「dependent variable 是否連續 (continuous)」，如果不是（例如 0/1），就轉用 logistic regression。如果是，就估計回歸模型，然後分析 residuals。假設不成立就走左邊「Adjust the model」回到估計那一步。假設成立後，再看 goodness of fit：整體擬合不顯著、或者不是可選模型中最好的

一個，都要回頭調整。全部通過，最後才「Use the model for analysis and prediction」。考試常考的是：某個情況應該採取甚麼行動（用 logistic regression／調整模型再估計／可以使用模型）。

4.2 散點圖矩陣 Scatterplot matrix / pairs plot（書中 Exhibit 3，p11）

Exhibit 3: Scatterplot Matrix of ABC Returns and Fama–French Factors




解說：這是 ABC 股票 10 年月度超額回報（ABC_RETRF）和三個因子的兩兩散點圖，對角線是每個變數的 histogram。它有三個用途：

1. **看 Y 和每個 X 是否直線關係（linearity）：**最底一行是 ABC_RETRF 對三個 X。ABC_RETRF 與 MKTRF 是正關係；與 HML 是負關係；與 SMB 看起來幾乎沒有關係（線差不多是平的）。
2. **看 X 之間是否相關（independence of independent variables）：**書中指出 SMB 和 HML 那一格的線很平，即兩者差不多不相關，這是好事。
3. **找極端值和 outliers：**因為全部數據點都畫出來了。

陷阱：SMB 在散點圖裏看似「平」，但在回歸中卻是顯著的（ $t = -2.19$ ， $p = 0.0304$ ）。原因是散點圖只把兩個變數單獨比較，看不到回歸裏「其他因素不變」的 **partial** 關係。所以「散點圖平 $\neq$ 回歸不顯著」。

4.3 殘差對預測值 Residuals vs predicted (書中 Exhibit 5, p13)


Exhibit 5: Residuals vs. Predicted Value of Dependent Variable



Potential outliers indicated with square markers

解說：橫軸是模型的預測值，縱軸是 residual。好的圖應該是一團隨機的點，圍繞 0 上下散開，沒有方向、沒有漏斗形。書中這幅圖沒有明顯的方向關係，代表 residuals 的 variance 大致不變 (**homoskedasticity** 成立)，而且 residuals 之間看不出相關 (**independence of errors** 成立)。方形標記的三個點是 **potential outliers**：**第 7、25、95 個月**。書建議利用這些資料，查看當時有沒有模型以外的因素 (shocks) 發生，而不是直接刪走。

4.4 殘差對每個 X（書中 Exhibit 6，p15）




解說：這裏把 residual 分別對 MKTRF（Panel A）、SMB（Panel B）、HML（Panel C）作圖。用途有兩個：

1. **檢查 misspecification（模型設定錯誤）：**如果 residual 和某個 X 有關係（例如一條彎線或斜線），代表模型漏了某些東西，例如那個 X 應該用非直線形式。
2. **找極端的 X 值：**某個 X 特別大或特別小的點，可能會過度影響估計出來的係數。

書中三幅圖都看不出方向關係，所以沒有違反假設。之前那三個 potential outliers（方形點）在這三幅圖中同樣出現。

4.5 常態 Q-Q 圖 Normal Q-Q plot（書中 Exhibit 7，p17）


Exhibit 7: Normal Q-Q Plot of Regression Residuals



解說：Q-Q 圖把 residuals（標準化後）和理論上的 standard normal distribution 對比。如果 residuals 是 normal，點會貼住那條斜線。書中的提示：normal 分佈中有 5% 的觀察值會低過 -1.65 個標準差，所以第 5 百分位的 residual 應該出現在 -1.65 附近。

書中這幅圖大部分點貼住直線；但在 -2 個標準差以下，第 25 和 95 個觀察值明顯低於直線，第 7 個觀察值在約 $+2.5$ 個標準差處略高於直線。結論：這三點是 potential outliers，但撇除它們，**residuals 整體接近 normal**。如果兩端很多點都彎離直線，就是 **fat tails**，即違反 normality。

4.6 好圖與問題圖對照（模擬示意圖，不是書中數據）



解說：這幅是老師用模擬數據畫的示意圖，只用來幫助分辨，**不是書中的圖，亦不是真實數據**。左圖：residual 隨機圍繞 0，是理想情況。中圖：預測值愈大，residual 散得愈闊，形成漏斗，這就是 **heteroskedasticity**（違反 homoskedasticity，「錯得平均」不成立）。右圖：Q-Q 圖中間貼線，但兩端彎離直線，這就是 **fat tails**（違反 normality，「小錯為主」不成立）。

4.7 圖表用途速查

圖	主要檢查	另外可以看到
Scatterplot matrix	Linearity (Y 對 X)、X 之間的相關	Outliers / 極端值
Residuals vs predicted	Homoskedasticity (漏斗)、independence of errors	Outliers (第 7、25、95 月)
Residuals vs 每個 X	Misspecification (residual 與 X 有關係)	極端的 X 值
Normal Q-Q plot	Normality (兩端彎 = fat tails)	Outliers

5. 公式

多元回歸方程式：

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + \cdots + b_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

估計式（預測用）：

$$\hat{Y}_i = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 X_{1i} + \hat{b}_2 X_{2i} + \cdots + \hat{b}_k X_{ki}$$

Partial slope 的意思（其他 X 不變）：

$$\Delta \hat{Y} = \hat{b}_j \times \Delta X_j$$

Y 的變化量 (SST)：

$$\text{Variation of } Y = \text{SST} = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

Residual（殘差）：

$$\hat{\varepsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

係數的 t 檢定公式 (t = 係數 ÷ 標準誤) 放在 [補底：假設檢定、p 值、t 值、標準誤](#)。

6. 口訣

- **五個假設：LINE + I**，口訣「**每次一樣、錯得平均、互不影響、小錯為主、各有各講**」。
- 每次一樣 = Linearity；錯得平均 = Equal variance (Homoskedasticity)；互不影響 = Independence of errors；小錯為主 = Normality；各有各講 = Independence of independent variables。
- 前四個講 residuals，最後一個講 X。
- **漏斗睇平均，Q-Q 睇鐘形**：漏斗形 → homoskedasticity；Q-Q 兩頭彎 → normality (fat tails)。
- 係數要加「**其他不變**」：每個 slope 都是「其他 X 不變時」的影響。
- **負負得正**：負係數 × 負的 X = 加。

7. 考試陷阱

1. **HML 的負負得正**： $-0.0560 \times (-2) = +0.112$ 。做錯會得 -1.478 而不是 -1.254。
2. **忘記「其他不變」**：解讀 slope coefficient 時，一定要加 holding other variables constant。只寫「MKTRF 升 1%，回報升 0.5892%」不夠完整。
3. **Intercept 的意思**：是所有 X 都等於 0 時 Y 的預期值，不是「平均回報」。
4. **SMB 散點圖平但回歸顯著**：散點圖只看單獨關係，回歸看 partial 關係，兩者可以不同。
5. **Homoskedasticity vs normality**：漏斗形是 homoskedasticity 的問題，不是 normality 的問題；normality 要看 Q-Q 圖。
6. **Outliers 不是自動刪除**：書的做法是標記出來，查看當時有沒有模型以外的衝擊。
7. **Y 是 0/1 時不用普通回歸**，要用 **logistic regression**。
8. **第 5 個假設講的是 X**：「X 之間高度相關」違反的是 independence of independent variables，不是 independence of errors。
9. **表中 t 值很大（例如 MKTRF 8.38）只證明係數 ≠ 0**，不代表係數 > 1。詳見補底筆記。

8. 自測題（答案放最後）

以下 1–7 題是 2026-09-26 晚間小測（結果 7/7；第 4 題是猜中的）。**題目字眼按當晚小測的主題重新整理（原題字眼沒有存檔），答案字母與當晚紀錄一致。**用的是書中 Fama–French 例子：RET_{RF} = 1.5324 + 0.5892 MKTRF – 0.8719 SMB – 0.0560 HML。

Q1. 係數 0.5892 應該怎樣解讀？

- A. 市場超額回報升 1%，組合回報就升 0.5892%，不論 SMB 和 HML 怎樣變。
- B. 組合回報升 1%，市場超額回報就升 0.5892%。
- C. 在 SMB 和 HML 不變的情況下，市場超額回報升 1%，組合回報預期升 0.5892%。

Q2. 如果 MKTRF = 1，SMB = 4，HML = -2，預測的組合回報是多少？

- A. -1.254%

B. -1.478%

C. +1.254%

Q3. Intercept 1.5324 代表甚麼？

A. 組合的長期平均回報是 1.5324%。

B. 市場超額回報升 1%，組合回報升 1.5324%。

C. 當 MKTRF、SMB、HML 全部等於 0 時，組合的預期回報是 1.5324%。

Q4. 根據 ABC 股票的回歸結果表（Intercept：t = 0.8435，p = 0.4007；MKTRF：t = 8.3791，p = 0.0000；SMB：t = -2.1922，p = 0.0304；HML：t = -3.0523，p = 0.0028），在 5% 水平下哪個結論正確？

A. 三個 slope（MKTRF、SMB、HML）都顯著，intercept 不顯著。

B. 只有 MKTRF 顯著，因為 SMB 和 HML 的 t 值是負數。

C. 四個係數全部顯著。

Q5. Residuals vs predicted 圖出現漏斗形（預測值愈大，residual 散得愈闊），最可能違反哪個假設？

A. Normality

B. Homoskedasticity

C. Independence of independent variables

Q6. Scatterplot matrix（pairs plot）的主要用途是甚麼？

A. 檢查 residuals 是否 normal。

B. 計算模型的 R^2 。

C. 看 Y 與每個 X 的關係、X 之間是否相關，以及找出極端值。

Q7. Residual 圖中有三個 potential outliers（第 7、25、95 月），但 Q-Q 圖其餘的點都貼住直線。最合適的結論是？

A. Residuals 整體接近 normal；把三個點標記為 potential outliers，並查看當時有沒有模型以外的衝擊。

B. 立即刪除三個點，然後不用再理。

C. Residuals 完全不是 normal，模型必須放棄。

Q8（Segment 1 類型，書中 Knowledge Check p7）. 以下每個情況應採取甚麼行動？(a) Y 是 1/0（是否收購目標）；(b) 五個 X 全部不顯著；(c) residuals 不是 homoskedastic；(d) 假設成立、整體擬合顯著、而且是最好的模型。

答案

- **Q1：C。** Slope 一定要加「其他 X 不變」。A 漏了這個條件；B 把因果倒轉了。
- **Q2：A。** $1.5324 + 0.5892 - 3.4876 + 0.112 = -1.254$ 。B 是把 HML 那項當成 -0.112 的錯誤答案。（當晚答對，計出 -1.254。）
- **Q3：C。** Intercept 是所有 X 等於 0 時的預期 Y。
- **Q4：A。** 三個 slope 的 p 都 < 0.05（|t| 都 > 1.98），intercept 的 p = 0.4007 > 0.05。負號不影響是否顯著。（誠實紀錄：當晚這題是猜中的，所以之後重教了假設檢定，見補底筆記。）
- **Q5：B。** 漏斗形 = 錯誤大小不平均 = heteroskedasticity。Normality 要看 Q-Q 圖。（當晚答對，這個混淆已解決。）
- **Q6：C。** Scatterplot matrix 用來看關係和 outliers；normality 用 Q-Q 圖。

- **Q7：A**。書的結論正是：三點是 potential outliers，撇除它們 residuals 整體接近 normal；要查當時的衝擊，而不是自動刪除。
- **Q8：**(a) 用 logistic regression；(b) 調整模型再估計；(c) 調整模型再估計；(d) 可以用模型作分析和預測。

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [補底：假設檢定、p 值、t 值、標準誤](#)（Q4 的底子）
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)
- 下一課：Day 2 | LM2 Goodness of fit、adjusted R^2 、AIC/BIC、F-test、forecasting（未上）

補底 | 假設檢定、p 值、t 值、標準誤 (Level I 基礎)

教學日期：2026-09-26 晚 (22:36-22:51) | 原因：Day 1 小測第 4 題是猜中的，學生未掌握係數的 t 檢定和 p 值 | 狀態：p 值、t 值、標準誤基本掌握；1% 水平和非零假設值只是初步介紹，之後再正式教 | Day 2 的 F-test 之前要先溫習本筆記

1. 一句總結

假設檢定只問一件事：這個結果是「真的」，還是「巧合」？p 值細過 0.05、或者 t 值（不理負號）大過約 2，就當它「算數」(statistically significant, 顯著)。

2. 日常例子

2.1 擲硬幣：是真的還是巧合？

朋友給你一個硬幣，你擲了幾次，公字出現得比較多。問題是：這個硬幣真的偏向公字，還是只是碰巧？

- 如果「碰巧會擲出這個結果」的機會很大，你就不能說硬幣有問題。
- 如果「碰巧會擲出這個結果」的機會很細（例如少過 5%），你就會說：這不太像巧合，硬幣應該真的有偏向。

這個「碰巧的機會」就是 **p 值**。

2.2 開支例子：標準誤是甚麼？

回到 Day 1 的開支式子：每多出外吃飯一次，開支多 **150** 元。但這個 150 是用某一段時間的紀錄計出來的。如果換另一段時間的紀錄，可能計出 140、160……這個數字自然會「搖擺」。

- **標準誤 (standard error, SE)** 就是：換一批數據，這個係數正常會搖擺多少。
- 如果 $SE = 15$ ： $150 \div 15 = 10$ ，即 150 離 0 有 10 個「正常搖擺」那麼遠 → 很難是巧合 → **算數**。
- 如果 $SE = 100$ ： $150 \div 100 = 1.5$ ，即 150 只離 0 有 1.5 個「正常搖擺」→ 可能只是巧合 → **不算數**。

同一個係數 150，SE 細就算數，SE 大就不算數。

(以上數字是上課用的示範例子，不是真實數據。)

3. 正式概念 (CFA 詞彙)

3.1 我們在測試甚麼

- **Null hypothesis (H_0 , 虛無假設)**：係數其實是 0，即這個 X 對 Y 沒有影響（「一切只是巧合」）。
- **Alternative hypothesis (H_a)**：係數不是 0。

- 如果證據夠強，我們就 **reject H_0** （推翻 H_0 ），說這個係數 **statistically significant**（顯著，即「算數」）。
- 如果證據不夠，我們只能說 **fail to reject H_0** （不能推翻 H_0 ），即不能排除它只是巧合。

3.2 p 值 (p-value) = 巧合的機會

- p 值 = 假如係數真的是 0，仍然會碰巧得出這麼極端結果的機會。
- $p < 0.05 \rightarrow$ 算數（在 5% 水平顯著）； $p \geq 0.05 \rightarrow$ 不算數。
- 例子： $p = 0.30$ ，即有 30% 機會是巧合，太大 $\rightarrow$ 不算數。

3.3 t 值 (t-statistic) = 離 0 有幾個「正常搖擺」

- $t = \text{係數} \div \text{標準誤}$ 。
- $|t| > \text{約 } 2 \rightarrow$ 算數。負號不用理，它只代表方向（係數是負數），不影響是否顯著。
- 例子： $t = -1.5 \rightarrow |t| = 1.5 < 2 \rightarrow$ 不算數。

3.4 標準誤 (standard error) = 係數的正常搖擺

- SE 愈細，係數愈「穩定」， t 愈大，愈容易算數。
- 因為 $t = \text{係數} \div \text{SE}$ ，所以反過來 **SE = 係數 $\div t$** 。例如 MKTRF： $1.2889 \div 8.3791 \approx 0.1538$ ，正好是書中表格的 standard error。

3.5 t 大 p 細

t 和 p 是同一件事的兩種講法： **t （絕對值）愈大， p 愈細**。例如 $t = 5$ ，離 0 很遠，巧合機會很細，所以 p 很細。

3.6 書中的真實例子：ABC 股票回歸 (Exhibit 4, p12)

這是 ABC 股票 120 個月超額回報對 Fama–French 三因子的回歸結果：

係數	Coefficient	Standard error	t-Stat.	P-value	5% 水平算不算數？
Intercept	0.0052	0.0061	0.8435	0.4007	不算數 (p 大過 0.05, $ t < 2$)
MKTRF	1.2889	0.1538	8.3791	0.0000	算數
SMB	-0.5841	0.2664	-2.1922	0.0304	算數 (負號不理)
HML	-0.6810	0.2231	-3.0523	0.0028	算數 (負號不理)

結論：三個 slope (MKTRF、SMB、HML) 都算數，intercept 不算數。

3.7 進階 (已初步介紹，之後再正式教)

以下內容在 22:36 講過一次，但學生覺得太難，所以之後會再正式教。現在知道有這回事就可以。

(a) 臨界值 1.98 從哪裏來？

「約 2」的準確數字要看 **degrees of freedom (df, 自由度)**： $df = n - k - 1$ 。ABC 例子有 $n = 120$ 個月、 $k = 3$

個 X，所以 $df = 120 - 3 - 1 = 116$ 。在 5% 水平（雙尾）下， $df = 116$ 的 **critical value（臨界值）** 約為 **1.98**。若 $|t| > 1.98$ 就推翻 H_0 。

(b) 1% 水平會怎樣？

如果要求更嚴格，用 1% 水平（ $p < 0.01$ 才算數）：SMB 的 $p = 0.0304$ 大過 0.01，所以在 **1% 水平下 SMB 變成不算數**；MKTRF（ $p = 0.0000$ ）和 HML（ $p = 0.0028$ ）仍然算數。（ $df = 116$ 時，1% 雙尾的臨界值約 2.62，SMB 的 $|t| = 2.19$ 未夠。）

(c) 測試「係數是否等於某個非零數字」


表中的 t 值只是測試「係數是否等於 0」。如果題目問「係數是否等於某個數字 B」，就要自己計：

$$t = (\text{係數} - \text{題目數字}) \div \text{標準誤}$$

- **朋友說是 200 的例子**：朋友說每出外吃飯一次開支多 200 元，但你計出 150， $SE = 15$ 。 $t = (150 - 200) \div 15 = -3.33$ ， $|3.33| > 2 \rightarrow$ **算數**，即可以推翻朋友的「200」。
- **MKTRF 的 beta 是否等於 1**？（即這隻股票是否比市場更「進取」）： $t = (1.2889 - 1) \div 0.1538 \approx 1.88$ ， $1.88 < 1.98 \rightarrow$ **不算數**，所以 **不能說 ABC 比市場更進取**，雖然係數 1.2889 看起來大過 1。

4. 圖表

4.1 t 分佈與四個係數的 t 值



解說：這幅是老師畫的示意圖（曲線是理論 t 分佈，綠線和灰線是書中 Exhibit 4 表格的真實 t 值）。鐘形曲線表示：假如係數其實是 0， t 值通常會落在哪裏。中間灰色部分（-1.98 至 +1.98）是「可能只是巧合」的範圍；兩邊紅色尾部各佔 2.5%，合共 5%，落在那裏就「算數」。

- **Intercept 0.84**（灰色虛線）落在中間灰色區 $\rightarrow$ 不算數。
- **SMB -2.19** 和 **HML -3.05** 落在左邊紅色區 $\rightarrow$ 算數（在左邊只因為係數是負數）。
- **MKTRF 8.38** 遠遠在右邊 $\rightarrow$ 非常算數。

5. 公式

t 值（測試係數是否等於 0）：

$$t = \frac{\hat{b}_j}{s_{\hat{b}_j}} = \frac{\text{係數}}{\text{標準誤}}$$

反推標準誤：

$$s_{\hat{b}_j} = \frac{\hat{b}_j}{t} = \frac{\text{係數}}{t}$$

測試係數是否等於某個數字 B_j ：

$$t = \frac{\hat{b}_j - B_j}{s_{\hat{b}_j}} = \frac{\text{係數} - \text{題目數字}}{\text{標準誤}}$$

自由度：

$$df = n - k - 1 \quad (\text{ABC 例子：} 120 - 3 - 1 = 116)$$

判斷規則（5% 水平）：

$$|t| > t_{\text{critical}} \approx 1.98 \text{ (約 2)} \quad \text{或} \quad p < 0.05 \Rightarrow \text{reject } H_0 \text{ (算數)}$$

6. 口訣

- 「t 大過 2，p 細過 0.05，都係算數（負號唔使理）」
- 「p 值 = 巧合的機會」：機會細（ < 0.05 ）就不是巧合。
- 「t = 離 0 有幾個正常搖擺」；「t = 係數 ÷ 標準誤」，所以「SE = 係數 ÷ t」。
- 「t 大 p 細」。
- 「非零要自己計：(係數 - 題目數字) ÷ 標準誤」（進階）。

7. 考試陷阱

1. 負號不影響顯著與否：t = -3.05 和 t = +3.05 一樣算數。
2. 表中 t 值只測試「是否等於 0」：MKTRF 的 t = 8.38 只表示 $\beta \neq 0$ ，**不表示 $\beta > 1$** 。要測試 $\beta = 1$ ，要自己計 $(1.2889 - 1) \div 0.1538 \approx 1.88 < 1.98 \rightarrow$ 不能說比市場進取。
3. 同一個係數，SE 不同，結論可以相反：係數 200、SE 50 $\rightarrow t = 4$ 算數；SE 400 $\rightarrow t = 0.5$ 不算數。
4. 5% 算數不等於 1% 也算數：SMB 在 5% 算數，但在 1% 不算數。
5. Fail to reject H_0 不等於證明係數是 0，只是證據不足。

8. 自測題（答案放最後）

- C1. 某個係數的 p 值是 0.30，算不算數？
C2. 某個係數的 t 值是 -1.5，算不算數？
C3. A 和 B 兩個係數都是 200。A 的標準誤是 50，B 的標準誤是 400。哪一個算數？
C4. 某個係數的 t 值是 5，它的 p 值會大還是細？
C5（未作答）。某個係數是 0.8，標準誤是 0.05。題目問：這個係數是否等於 1？算不算數？
C6（小測第 4 題）。根據 3.6 的表格，5% 水平下哪些係數算數？

答案

- **C1：不算數。** $p = 0.30$ 即有 30% 機會是巧合，大過 0.05。（22:42 答對）
- **C2：不算數。** $|-1.5| = 1.5$ ，小過 2；負號不理。（22:51 答對）
- **C3：A 算數。** $A: 200 \div 50 = 4 > 2 \rightarrow$ 算數； $B: 200 \div 400 = 0.5 < 2 \rightarrow$ 不算數。（22:51 答對）
- **C4： p 很細。** t 大 p 細。（22:51 答對）
- **C5：算數（可以推翻「等於 1」）。** $t = (0.8 - 1) \div 0.05 = -0.2 \div 0.05 = -4$ ， $|-4| = 4 > 2$ 。狀態：未作答，下次溫習時先做。
- **C6：MKTRF、SMB、HML 算數，intercept 不算數。**（小測時是猜中的，重教後已明白。）

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [Day 1 | LM1 多元回歸基礎](#)（ABC 回歸表和 Fama-French 例子）
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)
- 之後會用到：Day 2 的 F-test（整體模型是否算數）

口訣總表（累積）

每學完一課就在最底加一節。考前 10 分鐘由頭讀一次。

Day 1 | LM1 多元回歸基礎

口訣	意思	用在哪裏
LINE + I ：「每次一樣、錯得平均、互不影響、小錯為主、各有各講」	每次一樣 = Linearity；錯得平均 = Equal variance (Homoskedasticity)；互不影響 = Independence of errors；小錯為主 = Normality；各有各講 = Independence of independent variables	五個回歸假設；前四個透過 residuals 檢查，最後一個講 X
漏斗睇平均，Q-Q 睇鐘形	Residuals vs predicted 出現漏斗形 → homoskedasticity 有問題；Q-Q 圖兩頭彎 → normality 有問題 (fat tails)	分辨 homoskedasticity 與 normality
係數要加「其他不變」	每個 slope coefficient 都是 holding other variables constant 的影響	解讀係數
負負得正	負係數 × 負的 X = 加 (例如 $-0.0560 \times -2 = +0.112$)	計預測值
散點圖平 ≠ 唔算數	散點圖只看單獨關係；回歸看 partial 關係 (SMB 例子)	看 scatterplot matrix

補底 | 假設檢定

口訣	意思	用在哪裏
「t 大過 2，p 細過 0.05，都係算數（負號唔使理）」	$ t > \text{約 } 2$ (準確是 1.98，df = 116) 或 $p < 0.05 \rightarrow$ statistically significant	讀回歸結果表
p 值 = 巧合的機會	假如係數其實是 0，碰巧得出這個結果的機會	解讀 p-value
t = 離 0 有幾個正常搖擺	$t = \text{係數} \div \text{標準誤}$	解讀 t-statistic
SE = 係數 ÷ t	由 t 值反推 standard error	表格缺數時反推
t 大 p 細	兩者講同一件事	快速判斷
非零要自己計 (進階)	測試係數 = B： $t = (\text{係數} - B) \div \text{標準誤}$ ；表中 t 只測試 = 0	beta = 1 之類的題目

公式總表（累積）

每學完一課就在最底加一節。PDF 版本的公式已經排好版。

Day 1 | LM1 多元回歸基礎

1. 多元回歸方程式（k 個 X，n 個觀察值，n > k）

$$Y_i = b_0 + b_1X_{1i} + b_2X_{2i} + \cdots + b_kX_{ki} + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

2. 估計式（預測用）

$$\hat{Y}_i = \hat{b}_0 + \hat{b}_1X_{1i} + \hat{b}_2X_{2i} + \cdots + \hat{b}_kX_{ki}$$

3. Partial slope coefficient 的意思（其他 X 不變）

$$\Delta \hat{Y} = \hat{b}_j \times \Delta X_j$$

4. Residual（殘差）

$$\hat{\varepsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

5. Y 的變化量（Variation of Y，sum of squares total）

$$SST = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

6. Fama-French 預測例子（書中 Knowledge Check）

$$1.5324 + 0.5892(1) - 0.8719(4) - 0.0560(-2) = -1.254$$

7. Q-Q 圖參考點：normal 分佈中 5% 的觀察值低於 -1.65 個標準差。

$$P(Z < -1.65) \approx 5\%$$

補底 | 假設檢定

8. t 值（測試 H_0 ：係數 = 0）

$$t = \frac{\hat{b}_j}{s_{\hat{b}_j}} = \frac{\text{係數}}{\text{標準誤}}$$

9. 反推標準誤

$$s_{\hat{b}_j} = \frac{\hat{b}_j}{t}$$

10. 測試 H_0 ：係數 = B_j （非零數字，進階）

$$t = \frac{\hat{b}_j - B_j}{s_{\hat{b}_j}}$$

例子：beta = 1 ? $t = (1.2889 - 1)/0.1538 \approx 1.88 < 1.98 \rightarrow$ 不能推翻。

11. 自由度

$$df = n - k - 1 \quad (120 - 3 - 1 = 116)$$

12. 判斷規則

$$|t| > t_{\text{critical}} \quad \text{或} \quad p < \alpha \Rightarrow \text{reject } H_0$$

5% 水平、df = 116 : $t_{\text{critical}} \approx 1.98$; 1% 水平：約 2.62。

易錯點與弱項（累積）

狀態說明：**已解決** = 之後的題目答對；**進行中** = 已教但仍要練；**待教** = 未正式教；**提醒** = 常見陷阱，本人未錯過。每次小測後更新。

弱項紀錄

日期	課	弱項	發生了甚麼	狀態	下一步
2026-09-26	LM1	Homoskedasticity 與 normality 混淆	上課時曾把兩者混淆	已解決 （晚間小測第 5 題答對）	溫習口訣「漏斗睇平均，Q-Q 睇鐘形」
2026-09-26	LM1	解讀 slope coefficient 和 SST	Segment 2 需要用開支例子重新解釋，SST 也要重講	已解決 （小測第 1、3 題答對）	—
2026-09-26	補底	假設檢定（t 檢定、p 值）底子弱	小測第 4 題是猜中的；之後重教	進行中 ：p 值、t 值、標準誤基本掌握（檢查 4/4 答對）	Day 2 F-test 之前先溫習 1-2 題；C5 未作答
2026-09-26	補底	1% 水平、檢定非零假設值（例如 $\beta = 1$ ）	講過一次，學生覺得太難，暫停	待教	之後再正式教

考試陷阱（提醒）

日期	陷阱	正確做法	狀態
2026-09-26	HML 項負負得正	$-0.0560 \times (-2) = +0.112$ ，答案 -1.254 （不是 -1.478 ）	提醒（小測第 2 題答對）
2026-09-26	解讀 slope 漏了「其他不變」	一定要加 holding other variables constant	提醒
2026-09-26	SMB 散點圖平但回歸顯著	散點圖看單獨關係，回歸看 partial 關係	提醒
2026-09-26	Outliers 直接刪除	先標記，查當時有沒有模型以外的衝擊	提醒
2026-09-26	表中 $t = 8.38$ 以為代表 $\beta > 1$	表中 t 只測試 $\neq 0$ ； $\beta = 1$ 要自己計（ $\approx 1.88 < 1.98$ ）	提醒
2026-09-26	t 值是負數以為不顯著	負號只是方向，看絕對值	提醒
2026-09-26	「X 之間高度相關」歸錯假設	屬 independence of independent variables（第 5 個），不是 independence of errors	提醒

學習習慣提醒

- 有時會說「我懂了」但沒有真正作答。每條檢查題都盡量寫一個簡短答案（一個字母或一句話都可以），這樣才知道是否真的明白。

練習題庫（累積）

標籤：#LM1-係數 #LM1-預測 #LM1-流程 #LM1-假設 #LM1-圖表 #假設檢定。狀態：☒ 答對 | ☐ 猜中 | ☐ 未作答。

用法：先遮住答案作答，再對答案。答錯或猜中的題目，要記入 [易錯點與弱項](#)。

小測 Q1-Q7 的題目字眼是按當晚小測主題重新整理的（原題字眼沒有存檔），答案字母與紀錄一致。

A. 題目

A1. Day 1 晚間小測（2026-09-26，7/7，精力／壓力 2）

Fama-French 估計式： $RETRF = 1.5324 + 0.5892 MKTRF - 0.8719 SMB - 0.0560 HML$ 。

Q1 #LM1-係數 係數 0.5892 應該怎樣解讀？

- A. 市場超額回報升 1%，組合回報就升 0.5892%，不論 SMB 和 HML 怎樣變。
- B. 組合回報升 1%，市場超額回報就升 0.5892%。
- C. 在 SMB 和 HML 不變的情況下，市場超額回報升 1%，組合回報預期升 0.5892%。

Q2 #LM1-預測 $MKTRF = 1$ ， $SMB = 4$ ， $HML = -2$ ，預測回報是多少？

- A. -1.254% B. -1.478% C. +1.254%

Q3 #LM1-係數 Intercept 1.5324 代表甚麼？

- A. 組合的長期平均回報是 1.5324%。
- B. 市場超額回報升 1%，組合回報升 1.5324%。
- C. 當 $MKTRF$ 、 SMB 、 HML 全部等於 0 時，組合的預期回報是 1.5324%。

Q4 #假設檢定 ABC 回歸表： $Intercept\ t = 0.8435$ 、 $p = 0.4007$ ； $MKTRF\ t = 8.3791$ 、 $p = 0.0000$ ； $SMB\ t = -2.1922$ 、 $p = 0.0304$ ； $HML\ t = -3.0523$ 、 $p = 0.0028$ 。5% 水平下哪個結論正確？

- A. 三個 slope 都顯著，intercept 不顯著。
- B. 只有 $MKTRF$ 顯著，因為 SMB 和 HML 的 t 值是負數。
- C. 四個係數全部顯著。

Q5 #LM1-假設 #LM1-圖表 Residuals vs predicted 圖出現漏斗形，最可能違反哪個假設？

- A. Normality B. Homoskedasticity C. Independence of independent variables

Q6 #LM1-圖表 Scatterplot matrix 的主要用途是？

- A. 檢查 residuals 是否 normal。
- B. 計算模型的 R^2 。
- C. 看 Y 與每個 X 的關係、 X 之間是否相關，以及找出極端值。

Q7 #LM1-圖表 有三個 potential outliers（第 7、25、95 月），但 Q-Q 圖其餘的點都貼住直線。最合適的結論是？

- A. Residuals 整體接近 normal；標記三點為 potential outliers，查看當時有沒有模型以外的衝擊。

- B. 立即刪除三個點，然後不用再理。
- C. Residuals 完全不是 normal，模型必須放棄。

A2. 假設檢定檢查題 (2026-09-26 晚，重教後)

- C1 #假設檢定 $p = 0.30$ ，算不算數？
- C2 #假設檢定 $t = -1.5$ ，算不算數？
- C3 #假設檢定 兩個係數都是 200：A 的標準誤 50，B 的標準誤 400。哪個算數？
- C4 #假設檢定 $t = 5$ ， p 值大還是細？
- C5 #假設檢定 係數 0.8，標準誤 0.05，題目問係數是否等於 1。算不算數？

A3. 書中練習 (Day 1 範圍，可用作溫習)

- B1 #LM1-流程 (書 p7) 以下情況應採取甚麼行動？(a) Y 是 1/0；(b) 五個 X 全部不顯著；(c) residuals 不是 homoskedastic；(d) 假設成立、整體擬合顯著、是最好的模型。
- B2 #LM1-假設 (書 p17) 用 GOLD 和 TECH 解釋 CRYPTO，發現 GOLD 和 TECH 之間有顯著的 pairwise correlation，可能違反哪個假設？
- B3 #LM1-圖表 (書 p18) Residuals 對 CRYPTO 預測值的圖有甚麼用途？
- B4 #LM1-圖表 (書 p18) Residuals 對 GOLD 的圖有甚麼用途？
- B5 #LM1-圖表 (書 p18) Normal Q-Q plot 有甚麼用途？

A4. 延伸題 (22:36 出過，後來因太難取消；留待之後正式教 1% 水平和非零假設值時再做)

- E1 #假設檢定 $t = -2.50$ ， $p = 0.014$ 。5% 和 1% 水平下是否顯著？
- E2 #假設檢定 $t = 1.20$ ， $p = 0.23$ 。結論是甚麼？
- E3 #假設檢定 HML 係數 -0.681 ， $SE = 0.2231$ 。測試 $H_0: b = -1$ ，結論是甚麼？

B. 答案與簡短解釋

題	答案	簡短解釋	狀態
Q1	C	Slope 要加「其他不變」；A 漏了條件，B 因果倒轉	✓
Q2	A	$1.5324 + 0.5892 - 3.4876 + 0.112 = -1.254$ ；B 是 HML 項負負得正做錯	✓
Q3	C	Intercept = 所有 X 等於 0 時的預期 Y	✓
Q4	A	三個 slope 的 $p < 0.05$ ($ t > 1.98$)，intercept $p = 0.4007$ ；負號不影響	猜中，已重教
Q5	B	漏斗 = 錯誤大小不平均 = heteroskedasticity；normality 看 Q-Q 圖	✓
Q6	C	散點圖矩陣看關係和 outliers	✓

題	答案	簡短解釋	狀態
Q7	A	書的結論：potential outliers，撇除後整體接近 normal；不自動刪除	☒
C1	不算數	30% 巧合機會，大過 5%	☒
C2	不算數	$ t = 1.5 < 2$ ，負號不理	☒
C3	A 算數	A: $200 \div 50 = 4 > 2$; B: $200 \div 400 = 0.5 < 2$	☒
C4	p 細	t 大 p 細	☒
C5	算數	$t = (0.8 - 1) \div 0.05 = -4$ ， $ -4 > 2$ ，可推翻「等於 1」	☐ 未作答
B1	(a) logistic regression; (b)(c) 調整模型再估計; (d) 可用模型分析和預測	跟回歸流程圖走	—
B2	Independence of independent variables	X 之間有近似線性關係，要再研究	☐
B3	看 residuals 有沒有聚集或規律（不是 homoskedastic），以及有沒有 potential outliers	Residuals vs predicted	☐
B4	看有沒有極端的 X 值影響係數，以及 residual 與 X 是否有關係（misspecification）	Residuals vs X	☐
B5	看 residuals 是否 normally distributed	Q-Q 圖	☐
E1	5% 顯著，1% 不顯著	$p = 0.014 < 0.05$ 但 > 0.01	☐ 留待之後
E2	不顯著，不能推翻係數為 0	$p = 0.23 > 0.05$	☐ 留待之後
E3	不能推翻 $b = -1$	$t = (-0.681 + 1) \div 0.2231 \approx 1.43 < 1.98$	☐ 留待之後