CORSO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO
DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI
Massaggiatore Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici

IL PIEDE PIATTO E PRONATO NELLA DANZA CLASSICA

Candidato
Beatrice Bacci

ID CORSO
ID 28757

ANNO ACCADEMICO 2024/2026

INDICE

INTRODUZIONE....2
CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE TEORICA DELL'ARGOMENTO....3
1.1 Anatomia....3
1.1.1 Organizzazione generale e scheletro del piede....3
1.1.2 Le articolazioni del complesso piede-caviglia....4
1.1.3 Legamenti e aponeurosi plantare....5
1.1.4 Muscoli estrinseci e tendini....7
1.1.5 Muscoli intrinseci e il "nucleo" del piede....8
1.1.6 Innervazione e vascolarizzazione....9
1.1.7 Gli archi plantari....10
1.2 Biomeccanica del piede e catene cinetiche....10
1.2.1 Pronazione e supinazione: i movimenti triplanari....10
1.2.2 Il ciclo del passo e il comportamento del piede....11
1.2.3 Il meccanismo dell'argano, il blocco medio-tarsico e l'accoppiamento tibia-piede....12
1.2.4 Le catene cinetiche: dal piede al bacino e dal bacino al piede....13
1.2.5 Le catene muscolari e il piede....14
1.3 Eziologia: il piede piatto e il piede pronato....15
1.3.1 Definizioni e classificazione....15
1.3.2 Cause e fattori favorenti....16
1.3.3 Segni, sintomi e valutazione osservazionale....17
1.3.4 Ripercussioni posturali e funzionali lungo la catena....17
1.4 Il piede nella danza classica: richieste tecniche e problematiche....18
1.4.1 Le richieste biomeccaniche della danza classica....18
1.4.2 Problematiche anatomiche e lesioni da sovraccarico....19
1.4.3 Problematiche posturali....20
1.4.4 Problematiche funzionali....20
CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE PRATICA DELL'ARGOMENTO....21
2.1 Descrizione del protocollo/trattamento massoterapico: il massaggio miofasciale plantare....21
2.1.1 Che cos'è il massaggio miofasciale e perché sulla pianta del piede....21
2.1.2 Preparazione: trattamento classico di gamba e piede....22
2.1.3 Sequenza del massaggio miofasciale plantare....23
2.2 Descrizione delle tecniche complementari....24
2.2.1 Mobilizzazioni articolari....24
2.2.2 Esercizio attivo e rieducazione dell'appoggio....25
2.2.3 Integrazione con il gesto tecnico ed educazione al carico....25
CONCLUSIONI....26
BIBLIOGRAFIA....27

INTRODUZIONE

Il piede è il segmento terminale dell'arto inferiore e la sola struttura del corpo che, nella stazione eretta e nel movimento, entra in contatto con il suolo. In una superficie di appoggio relativamente piccola convivono esigenze opposte: deve essere abbastanza mobile da adattarsi al terreno e da assorbire gli urti, e abbastanza rigido da trasmettere al suolo la forza prodotta dai muscoli e sostenere il peso del corpo. Questa doppia natura dipende da un'architettura complessa di ossa, articolazioni, legamenti, tendini e muscoli, governata dal sistema nervoso e inserita in una catena cinetica che risale fino al bacino.

Nella danza classica le richieste imposte al piede raggiungono il limite delle possibilità anatomiche. l'*en dehors*, il *plié*, il *relevé*, il lavoro sulle mezze punte e sulle punte, i salti ripetuti per ore di lezione concentrano sul complesso piede-caviglia carichi che possono superare di molte volte il peso corporeo. Un piede piatto o pronato non è quindi solo una caratteristica morfologica, ma un elemento che modifica la distribuzione dei carichi lungo tutto l'arto inferiore, la postura e la qualità del gesto.

La scelta del tema nasce dall'osservazione di quanto spesso le tensioni e i sovraccarichi riferiti dai danzatori a polpaccio, regione retromalleolare mediale, pianta del piede e alluce si accompagnino a un appoggio pronato e a un arco mediale che cede sotto carico. Per l'operatore Massaggiatore Capo Bagnino (MCB) capire perché queste strutture si affaticano e come un'alterazione del piede si ripercuote su ginocchio, anca e bacino è la premessa di un trattamento sensato e sicuro.

L'elaborato è organizzato in due capitoli. Il primo, teorico, è dedicato alla parte scientifica: anatomia descrittiva e funzionale del piede e della caviglia (ossa, articolazioni, legamenti, tendini, muscoli, innervazione), biomeccanica dell'appoggio e del passo, catene cinetiche e muscolari, eziologia del piede piatto e pronato e problematiche anatomiche, posturali e funzionali che ne derivano nel danzatore classico. Il secondo, pratico, descrive un protocollo massoterapico rivolto a una giovane danzatrice con piede piatto flessibile e pronazione in carico e le tecniche complementari che lo integrano; gli esercizi riportati hanno solo valore illustrativo, perché il Massaggiatore Capo Bagnino non attua esercizi riabilitativi. L'obiettivo non è proporre la massoterapia come cura del piede piatto, condizione strutturale, ma mostrare come la conoscenza dell'anatomia e della biomeccanica consenta all'operatore MCB di lavorare in modo mirato sulle strutture che compensano e si sovraccaricano, nel rispetto dei propri confini professionali e in collaborazione con le figure sanitarie.

CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE TEORICA DELL'ARGOMENTO

1.1 Anatomia

1.1.1 Organizzazione generale e scheletro del piede

Il piede è formato da 26 ossa, più i due piccoli sesamoidi sotto l'alluce. Per studiarlo lo si divide in tre parti (Tavola 1):[1]




Tavola 1 – Scheletro del piede: veduta laterale (a) e veduta mediale (b), con l'arco longitudinale. Da H. Gray, Anatomy of the Human Body, 1918, tavv. 290 e 291, pubblico dominio; didascalie tradotte in italiano.

- retropiede: astragalo e calcagno;
- mesopiede: navicolare, cuboide e i tre cuneiformi;
- avampiede: i cinque metatarsi e le quattordici falangi.

L'astragalo è l'osso che collega la gamba al piede (Tavole 1 e 2). Bastano tre caratteristiche per ricordarlo. Sta in mezzo: sopra si incastra tra tibia e fibula formando la caviglia, sotto poggia sul calcagno, davanti si appoggia al navicolare. Non ha muscoli che si inseriscono su di esso: viene mosso e tenuto in posizione solo dalle ossa vicine e dai legamenti, per questo risente molto del modo in cui si scarica il peso. La sua testa poggia su una "amaca" di legamento, il legamento calcaneo-navicolare plantare: se questa cede, l'astragalo scivola in basso e verso l'interno e l'arco si abbassa. È quello che accade nel piede piatto.

Il calcagno è l'osso del tallone, il più grande del piede: dietro riceve il tendine d'Achille, sopra sostiene l'astragalo con una mensola ossea (il sustentaculum tali), davanti si articola con il cuboide. Il navicolare è la "chiave di volta" dell'arco interno e riceve il tendine del tibiale posteriore. Il cuboide sta sul lato esterno e fa passare sotto di sé il tendine del peroneo lungo. I tre cuneiformi hanno forma di cuneo e, con il cuboide, formano la volta trasversa. Dei cinque metatarsi, il primo è il più corto e robusto e porta circa un terzo del carico dell'avampiede; il secondo è il più lungo ed è incastrato tra i cuneiformi, per questo è il più esposto alle fratture da stress nei danzatori. L'alluce ha due falangi, le altre dita tre.

[1] Standring S. (a cura di), *Gray's Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice*, 42ª ed., Elsevier, London, 2021, sezione «Foot and ankle»; cfr. anche Netter F.H., *Atlante di anatomia umana*, 7ª ed., Edra, Milano, 2019.

Per capire come si scarica il peso basta ricordare due “colonne”: quella interna (astragalo, navicolare, cuneiformi e primi tre metatarsi), più alta e mobile, serve ad adattarsi al terreno e a spingere; quella esterna (calcagno, cuboide, quarto e quinto metatarso), più bassa e rigida, serve alla stabilità.

1.1.2 Le articolazioni del complesso piede-caviglia

Le articolazioni da conoscere sono quattro, dall’alto verso il basso e da dietro in avanti (Tavole 2 e 3).




Tavola 2 – L’articolazione talocrurale e la sottoastragalica in sezione frontale (a) e in sezione sagittale (b): il mortaio tibio-fibulare, l’astragalo, il calcagno e i legamenti che li uniscono. Da H. Gray, Anatomy of the Human Body, 1918, tavv. 357 e 360, pubblico dominio; didascalie tradotte.

La prima è la talocrurale, cioè la caviglia: unisce la “pinza” formata da tibia e fibula (il mortaio) all’astragalo. Permette solo due movimenti: la flessione dorsale, con la punta verso l’alto (circa 20-30°), e la flessione plantare, con la punta verso il basso (circa 40-50°). La regola da ricordare è questa: in flessione dorsale l’astragalo è incastrato nel mortaio e la caviglia è stabile; in flessione plantare l’astragalo ha gioco e la stabilità dipende solo da legamenti e muscoli.[2] Per questo le distorsioni avvengono quasi sempre con la punta in basso, e per questo le punte, che richiedono 90-100° di flessione plantare complessiva, sono così impegnative.

La seconda è la sottoastragalica, tra astragalo e calcagno. Il suo asse è obliquo,[3] quindi non produce movimenti “puri” ma combinati: la pronazione, in cui il calcagno ruota verso l’esterno e il piede si abbassa e si apre, e la supinazione, che è il contrario. È lo snodo tra gamba e piede: quando il piede è a terra e prona, la tibia ruota verso l’interno; quando

[2]Kapandji I.A., *Fisiologia articolare. Vol. 2: Arto inferiore*, 6ª ed., Monduzzi Editore, Bologna, 2011, capitolo «La caviglia».
[3]Inman V.T., *The Joints of the Ankle*, Williams & Wilkins, Baltimore, 1976.

supina, la tibia ruota verso l'esterno. Da qui parte il collegamento con ginocchio, anca e bacino.




Tavola 3 – Le articolazioni collegate alla talocrurale: l'articolazione talo-calcaneo-navicolare vista dall'alto dopo rimozione dell'astragalo (a) e i legamenti plantari del piede (b). Legenda: 1 legamento calcaneo-navicolare plantare; 2 legamento talo-navicolare dorsale sezionato. Da H. Gray, Anatomy of the Human Body, 1918, tavv. 359 e 358, pubblico dominio; didascalie tradotte.

La terza è la medio-tarsica di Chopart, formata dalla talo-navicolare e dalla calcaneo-cuboidea. Quando il retropiede è pronato il mesopiede è "sbloccato" e mobile; quando è supinato il mesopiede si "blocca" e il piede diventa una leva rigida.[4] Questo passaggio da piede morbido a piede rigido serve nel passo, nel salto e nel *relevé*.

La quarta è l'insieme delle articolazioni dell'avampiede: le tarso-metatarsali di Lisfranc, che permettono piccoli adattamenti, e le metatarso-falangee. La prima metatarso-falangea deve estendersi di almeno 65-70° per il passo e di circa 90° per la mezza punta.[5] Completa il quadro la sindesmosi tibio-fibulare, che tiene unite tibia e fibula e lascia allargare leggermente la pinza in flessione dorsale.

1.1.3 Legamenti e aponeurosi plantare

I legamenti sono le "cinghie" passive che tengono unite le ossa e, grazie ai loro recettori, informano il sistema nervoso sulla posizione del piede (Tavole 2, 3 e 4). I principali da ricordare sono cinque.

[4]Neumann D.A., *Kinesiology of the Musculoskeletal System. Foundations for Rehabilitation*, 3ª ed., Elsevier, St. Louis, 2017, capitolo «Ankle and foot».
[5]Howse J., *Dance Technique and Injury Prevention*, 3ª ed., A&C Black, London, 2000.




Tavola 4 – Legamenti della caviglia e del piede: lato mediale, con il legamento deltoideo e i legamenti plantari (a); lato laterale, con i legamenti peroneo-astragalici e peroneo-calcaneare (b). Da H. Gray, Anatomy of the Human Body, 1918, tavv. 354 e 356, pubblico dominio; didascalie tradotte.

- Legamento deltoideo (lato interno): un ventaglio che parte dal malleolo mediale e si fissa su astragalo, calcagno e navicolare. Impedisce al retropiede di cedere verso l'interno; nel piede pronato è sempre in tensione.
- Legamenti laterali (lato esterno): peroneo-astragalico anteriore, peroneo-calcaneare e peroneo-astragalico posteriore. Impediscono la "storta" verso l'esterno; il primo è il più debole ed è quello che si lesiona nelle distorsioni, tipicamente atterrando da un salto con la punta in basso.[6]
- Legamento interosseo talo-calcaneare: sta nel seno del tarso, tra astragalo e calcagno; frena la pronazione e fornisce molte informazioni propriocettive.
- Legamento calcaneo-navicolare plantare, detto «a molla»: è l'amaca che sostiene la testa dell'astragalo, tesa dal sustentaculum tali al navicolare. È il legamento più importante per l'arco interno; il suo cedimento, insieme alla debolezza del tibiale posteriore, è alla base del piede piatto acquisito dell'adulto.[7]
- Legamenti plantari lunghi (legamento lungo plantare e calcaneo-cuboideo plantare): sostengono l'arco esterno. Il legamento bifurcato, il legamento di Lisfranc e i piccoli legamenti tra le ossa del tarso completano il sistema.

L'aponeurosi plantare è una lamina fibrosa che va dal calcagno alla base delle dita e lavora come il tirante di una capriata: tiene vicine le due estremità dell'arco e gli impedisce di allargarsi sotto il peso. Quando le dita si estendono, come nella mezza punta o nella spinta del passo, l'aponeurosi si avvolge sulle teste dei metatarsi, si accorcia e solleva l'arco: è il meccanismo dell'argano descritto da Hicks.[8] Nel piede piatto questo meccanismo funziona meno.

[6]Kapandji I.A., *Fisiologia articolare*, cit.
[7]Kohls-Gatzoulis J., Angel J.C., Singh D., Haddad F., Livingstone J., Berry G., «Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot», *BMJ*, 329(7478), 2004, pp. 1328-1333.

1.1.4 Muscoli estrinseci e tendini

I muscoli estrinseci hanno il ventre nella gamba e arrivano al piede con lunghi tendini, tenuti aderenti alle ossa dai retinacoli (Tavole 5 e 6). Sono i motori del piede e i suoi stabilizzatori attivi. Si studiano in quattro gruppi, ciascuno con una funzione principale.[9]




Tavola 5 – Tendini estrinseci: lato laterale, con peronei, tibiale anteriore ed estensori (a); lato mediale, con tibiale posteriore, flessore lungo delle dita e flessore lungo dell'alluce (b). Legenda: 1 e 3 retinacolo superiore degli estensori; 2 e 5 retinacolo inferiore degli estensori; 4 retinacolo dei flessori. Da H. Gray, Anatomy of the Human Body, 1918, tavv. 441 e 442, pubblico dominio; didascalie tradotte.

- Gruppo posteriore superficiale: gastrocnemio e soleo (tricipite surale), che terminano nel tendine d'Achille sul calcagno. Spingono la punta verso il basso e sono il motore del *relevé*, del salto e della spinta. Se sono accorciati limitano la flessione dorsale e il piede "cerca" il movimento che manca pronando nel mesopiede.[10]
- Gruppo posteriore profondo: tibiale posteriore, flessore lungo delle dita e flessore lungo dell'alluce, che passano dietro il malleolo interno. Il tibiale posteriore si inserisce sul navicolare ed è il principale sostegno attivo dell'arco interno: frena la pronazione durante l'appoggio e poi "serra" il mesopiede per la spinta; la sua sofferenza è la prima causa di piede piatto acquisito.[11] Il flessore lungo dell'alluce passa dietro l'astragalo e sotto il sustentaculum tali e spinge l'alluce a terra sulle punte: nella danza è così sollecitato che la sua infiammazione è chiamata «tendinite del danzatore».[12]
- Gruppo laterale: peroneo lungo e peroneo breve, dietro il malleolo esterno. Portano il piede verso l'esterno (eversione). Il peroneo lungo passa sotto il cuboide e arriva alla base del primo metatarso: tiene il primo raggio a terra e sostiene la volta trasversa. Con il tibiale posteriore forma una "staffa" sotto il piede che ne regola

[8]Hicks J.H., «The mechanics of the foot. II. The plantar aponeurosis and the arch», *Journal of Anatomy*, 88(1), 1954, pp. 25-30.
[9]Standring S., *Gray's Anatomy*, cit.
[10]Kadel N.J., «Foot and ankle injuries in dance», *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, 17(4), 2006, pp. 813-826.
[11]Kohls-Gatzoulis J. et al., «Tibialis posterior dysfunction», cit.
[12]Hamilton W.G., «Foot and ankle injuries in dancers», *Clinics in Sports Medicine*, 7(1), 1988, pp. 143-173.

l’orientamento; nel piede pronato la staffa è squilibrata, con peronei accorciati e tibiale posteriore allungato e affaticato.

- Gruppo anteriore: tibiale anteriore, estensore lungo dell’alluce, estensore lungo delle dita e peroneo terzo. Sollevano la punta (flessione dorsale) e controllano il piede in aria e nell’appoggio del tallone. I retinacoli che li tengono in sede si irritano facilmente nei danzatori per il grande numero di scorrimenti ripetuti.

1.1.5 Muscoli intrinseci e il “nucleo” del piede

I muscoli intrinseci nascono e finiscono dentro il piede (Tavola 6). Sul dorso ci sono gli estensori brevi delle dita e dell’alluce. Sulla pianta sono disposti in quattro strati, dal più superficiale al più profondo:[13]




Tavola 6 – Compartimento posteriore profondo della gamba (a); muscoli plantari del primo strato (b) e del secondo strato (c). Legenda: 1 condilo mediale; 2 condilo laterale; 3 popliteo; 4 soleo (sezionato); 5 peroneo lungo; 6 tibiale posteriore; 7 flessore lungo delle dita; 8 flessore lungo dell’alluce; 9 peroneo breve; 10 aponeurosi plantare (porzione centrale, sezionata); 11 abduttore dell’alluce; 12 flessore breve delle dita; 13 abduttore del quinto dito; 14 guaina fibrosa aperta; 15 tendine del flessore breve delle dita; 16 tendine del flessore lungo delle dita; 17 tendine del flessore lungo delle dita; 18 quadrato della pianta; 19 tendine del flessore lungo dell’alluce; 20 lombricali. Da H. Gray, Anatomy of the Human Body, 1918, tavv. 439, 443 e 444, pubblico dominio; didascalie tradotte.

- primo strato: abduttore dell’alluce, flessore breve delle dita, abduttore del quinto dito;
- secondo strato: quadrato della pianta e lombricali, che lavorano sul tendine del flessore lungo delle dita;
- terzo strato: flessore breve dell’alluce (con i sesamoidi), adduttore dell’alluce, flessore breve del quinto dito;

[13]Standring S., *Gray’s Anatomy*, cit.

- quarto strato: interossei plantari e dorsali.

Il concetto di «nucleo del piede» è semplice: come i muscoli profondi dell'addome stabilizzano la colonna, così gli intrinseci stabilizzano l'arco.[14] Il sistema ha tre parti: una passiva (ossa, legamenti, aponeurosi), una attiva (muscoli intrinseci ed estrinseci) e una nervosa (i recettori di pelle, capsule, legamenti e muscoli). Quando il peso aumenta gli intrinseci si contraggono, avvicinano calcagno e teste dei metatarsi e sostengono l'arco. Se sono deboli, come spesso accade nel piede piatto e nella fascite plantare, il lavoro passa al tibiale posteriore e ai flessori lunghi, che si sovraccaricano. Per il danzatore saper "cupolare" il piede (esercizio del piede corto) è una base della tecnica.

1.1.6 Innervazione e vascolarizzazione

I nervi del piede (Tavola 7) vengono dal nervo sciatico, che dietro il ginocchio si divide in due rami. Il nervo tibiale scende dietro il polpaccio, passa dietro il malleolo interno nel tunnel tarsale, insieme ai tendini del tibiale posteriore e dei flessori lunghi, e si divide nel nervo plantare mediale e nel nervo plantare laterale, che muovono i muscoli della pianta e ne raccolgono la sensibilità. Il nervo peroneo comune gira attorno alla testa della fibula e si divide nel peroneo superficiale (peronei e sensibilità del dorso del piede) e nel peroneo profondo (muscoli anteriori). La pelle del bordo interno è innervata dal nervo safeno, quella del bordo esterno e del tallone dal nervo surale.[15]




Tavola 7 – Nervi plantari mediale e laterale e ramo profondo del nervo plantare laterale. Legenda: 1 quadrato della pianta; 2 tendine del flessore lungo delle dita; 3 tendine del flessore lungo dell'alluce. Da H. Gray, Anatomy of the Human Body, 1918, tav. 833, pubblico dominio; didascalie tradotte.

[14]McKeon P.O., Hertel J., Bramble D., Davis I., «The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function», *British Journal of Sports Medicine*, 49(5), 2015, p. 290.
[15]Standring S., *Gray's Anatomy*, cit.

I nervi non servono solo a muovere. I recettori della pelle plantare, delle capsule e dei legamenti, soprattutto nel seno del tarso, dicono al cervello dove e quanto il piede sta premendo: è la propriocezione, che permette di correggere l'equilibrio in una frazione di secondo. Nel piede pronato e dopo distorsioni ripetute questa informazione è meno precisa. Il sangue arriva dall'arteria tibiale posteriore, con le arterie plantari, e dall'arteria dorsale del piede; il ritorno venoso è aiutato dalla compressione della pianta a ogni passo.

1.1.7 Gli archi plantari

Le ossa del piede formano una volta che poggia su tre punti: il tallone, la testa del primo metatarso e la testa del quinto metatarso.[16] Tra questi punti si tendono tre archi. L'arco interno (longitudinale mediale) è il più alto: va dal calcagno all'alluce passando per astragalo, navicolare e cuneiformi; la sua chiave di volta è la testa dell'astragalo, sostenuta dal legamento calcaneo-navicolare plantare. È retto passivamente dai legamenti e dall'aponeurosi e attivamente dal tibiale posteriore, dai flessori lunghi, dal peroneo lungo e dagli intrinseci. È l'arco che ammortizza e spinge, ed è quello che cede nel piede piatto.

L'arco esterno (calcagno, cuboide, quarto e quinto metatarso) è basso e rigido e serve alla stabilità. L'arco trasverso, a livello di cuneiformi e cuboide, è tenuto dalla forma a cuneo delle ossa e dal tendine del peroneo lungo. Gli archi non sono fissi: sotto carico il navicolare si abbassa di qualche millimetro (caduta del navicolare) e questo è normale.[17] Quello che conta non è quanto è alto l'arco, ma come si comporta sotto il peso e se la persona riesce a sollevarlo attivamente.

In sintesi. Il piede è una volta a tre archi retta da ossa, legamenti e muscoli. La caviglia è stabile con la punta in alto e instabile con la punta in basso; la sottoastragalica è lo snodo tra gamba e piede. Il legamento calcaneo-navicolare plantare, l'aponeurosi e il tibiale posteriore sono i tre sostegni dell'arco interno; gli intrinseci ne sono il nucleo stabilizzatore.

1.2 Biomeccanica del piede e catene cinetiche

1.2.1 Pronazione e supinazione: i movimenti triplanari

I movimenti del piede avvengono attorno ad assi obliqui e si descrivono quindi come combinazioni triplanari. La pronazione è la combinazione di eversione (piano frontale), abduzione (piano trasverso) e dorsiflessione (piano sagittale); la supinazione è la combinazione opposta di inversione, adduzione e flessione plantare.[18] In catena cinetica chiusa, con il piede fissato al suolo dal peso del corpo, il calcagno può solo evertirsi o

[16]Kapandji I.A., *Fisiologia articolare*, cit.
[17]Kapandji I.A., *Fisiologia articolare*, cit.
[18]Inman V.T., *The Joints of the Ankle*, cit.

invertirsi, e le componenti di abduzione-adduzione e di flessione si realizzano attraverso il movimento dell'astragalo e della gamba sopra il calcagno: nella pronazione in carico l'astragalo si adduce e si flette plantarmente, la testa dell'astragalo scivola medialmente e in basso sulil legamento calcaneo-navicolare plantare, l'arco si abbassa e la tibia ruota internamente; nella supinazione in carico avviene il contrario.[19]

Pronazione e supinazione sono entrambe fisiologiche: la prima rende il piede un adattatore mobile e un ammortizzatore, la seconda una leva rigida per la spinta. Il problema non è il movimento, ma la sua quantità, la sua durata e il momento in cui avviene: un piede che prona troppo, troppo a lungo o che non risupina in tempo per la propulsione affatica i propri stabilizzatori e modifica le richieste dei segmenti sovrastanti.

1.2.2 Il ciclo del passo e il comportamento del piede

Il ciclo del passo, dal contatto iniziale di un piede al contatto successivo dello stesso piede, si divide in una fase di appoggio (circa il 60%) e in una fase di oscillazione (circa il 40%). Perry e Burnfield suddividono l'appoggio in contatto iniziale, risposta al carico, appoggio intermedio, appoggio terminale e pre-oscillazione.[20] Al contatto iniziale il tallone tocca il suolo con il retropiede in lieve supinazione e la tibia ruotata esternamente. Nella risposta al carico il peso del corpo cade sul piede: la sottoastragalica prona, la tibia ruota internamente, l'articolazione di Chopart si sblocca, l'arco si abbassa e il piede si adatta al terreno; il tibiale anteriore frena eccentricamente la discesa dell'avampiede e il tibiale posteriore frena eccentricamente la pronazione. Nell'appoggio intermedio la tibia avanza sull'astragalo (dorsiflessione talocrurale) e il piede raggiunge la massima pronazione, poi inizia a risupinare grazie alla rotazione esterna della gamba e all'azione concentrica del tibiale posteriore.

[19]Neumann D.A., *Kinesiology of the Musculoskeletal System*, cit.
[20]Perry J., Burnfield J.M., *Gait Analysis. Normal and Pathological Function*, 2ª ed., Slack, Thorofare, 2010, capitoli 2-4.




Figura 1 – Le fasi del ciclo del passo e il comportamento del piede: pronazione nelle fasi di carico, supinazione nella spinta.

Nell'appoggio terminale il tallone si solleva, le dita si estendono e il meccanismo dell'argano tende l'aponeurosi: l'arco si innalza, il retropiede supina, Chopart si blocca e il piede diventa una leva rigida per il tricipite surale; nella pre-oscillazione la spinta è completata dal flessore lungo dell'alluce e dal peroneo lungo, che stabilizza il primo raggio a terra. Nel piede piatto-pronato la pronazione è eccessiva o prolungata oltre l'appoggio intermedio, la risupinazione è incompleta e la spinta avviene su un piede ancora "sbloccato", con ipersollecitazione del tibiale posteriore e degli intrinseci, sovraccarico del primo raggio e dell'alluce e minore efficienza propulsiva.[21]

1.2.3 Il meccanismo dell'argano, il blocco medio-tarsico e l'accoppiamento tibia-piede

Tre meccanismi collegano retropiede, mesopiede, avampiede e gamba in un unico sistema. Il primo è il meccanismo dell'argano: l'estensione delle metatarso-falangee, soprattutto della prima, avvolge l'aponeurosi attorno alle teste metatarsali, accorcia la distanza calcagno-avampiede, innalza l'arco e supina il retropiede.[22] Il test di Jack (estensione passiva dell'alluce in carico) valuta l'integrità di questo meccanismo: nel piede piatto flessibile l'arco si innalza, nel piede piatto rigido no. Il secondo è il blocco medio-tarsico: la supinazione del retropiede rende divergenti gli assi di talo-navicolare e calcaneo-cuboidea e blocca il mesopiede, la pronazione li rende paralleli e lo sblocca; tibiale posteriore e peroneo lungo, serrando le colonne mediale e laterale, consolidano il blocco. Il terzo è l'accoppiamento tra sottoastragalica e tibia: poiché il mortaio talocrurale non consente rotazioni, ogni pronazione in carico impone alla tibia una rotazione interna e

[21]Root M.L., Orien W.P., Weed J.H., *Normal and Abnormal Function of the Foot*, Clinical Biomechanics Corporation, Los Angeles, 1977.
[22]Hicks J.H., «The mechanics of the foot. II», cit.

ogni supinazione una rotazione esterna. È per questa via che il piede “parla” con ginocchio e anca, e viceversa.

1.2.4 Le catene cinetiche: dal piede al bacino e dal bacino al piede

Il concetto di catena cinetica, introdotto da Steindler, descrive l’arto come una serie di segmenti articolati nei quali il movimento di uno influenza gli altri; in catena chiusa, con il piede fissato, questa influenza è obbligata.[23] Si distinguono una catena ascendente, in cui l’alterazione parte dal piede, e una discendente, in cui parte dal bacino o dall’anca.

Nella catena ascendente la pronazione eccessiva produce una rotazione interna della tibia maggiore e più prolungata; il ginocchio tende al valgo dinamico e la rotula viene compressa contro la faccetta laterale della troclea femorale. Secondo il modello di Tiberio, per estendere il ginocchio nelle fasi intermedie dell’appoggio con una tibia ancora intraruotata, il femore deve ruotare internamente in modo compensatorio, aumentando lo stress femoro-rotuleo.[24] La rotazione interna e l’adduzione del femore aumentano il lavoro di gluteo medio ed extrarotatori e si ripercuotono sul bacino, che tende all’anteversione e all’iperlordosi; Khamis e Yizhar hanno dimostrato che un’iperpronazione bilaterale indotta con cunei modifica in stazione eretta la rotazione interna di gamba e coscia e l’inclinazione anteriore del bacino.[25] Un’iperpronazione asimmetrica, inoltre, accorcia funzionalmente l’arto più pronato e crea un’obliquità pelvica.

[23]Steindler A., *Kinesiology of the Human Body under Normal and Pathological Conditions*, Charles C. Thomas, Springfield, 1955. Il termine «catena cinetica» è ripreso dalla meccanica, dove indica una serie di segmenti rigidi uniti da giunti.
[24]Tiberio D., «The effect of excessive subtalar joint pronation on patellofemoral mechanics: a theoretical model», *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 9(4), 1987, pp. 160-165.
[25]Khamis S., Yizhar Z., «Effect of feet hyperpronation on pelvic alignment in a standing position», *Gait & Posture*, 25(1), 2007, pp. 127-134.




Figura 2 – Catena cinetica ascendente e discendente nel piede pronato e loro interazione nel danzatore.

Nella catena discendente il punto di partenza è prossimale: anteversione del bacino con scarso controllo lombo-pelvico, debolezza di glutei ed extrarotatori dell'anca o anteversione femorale accentuata portano il femore in rotazione interna e il ginocchio in valgo; la tibia segue e il piede, costretto a terra, cede in pronazione. Nel danzatore la catena discendente ha una forma caratteristica: quando l'*en dehors* non è disponibile all'anca, il danzatore lo "ricava" forzando la rotazione esterna della tibia sul piede fisso e lasciando cedere il retropiede in valgo e l'arco in pronazione (il cosiddetto *rolling in*, «cedimento verso l'interno»); un piede piatto-pronato è a sua volta una base poco stabile per l'*en dehors*, e le due catene si alimentano a vicenda.[26] Questi modelli vanno applicati con prudenza: le relazioni tra pronazione e sintomi a distanza sono reali ma variabili e individuali, e non è corretto attribuire con certezza un dolore al ginocchio o alla schiena a un piede pronato; è corretto considerare il piede come uno dei fattori da osservare e trattare.

1.2.5 Le catene muscolari e il piede

I modelli delle catene muscolari e miofasciali descrivono la continuità funzionale tra muscoli e fasce di segmenti diversi. Secondo Myers, la linea superficiale posteriore collega l'aponeurosi plantare e i flessori brevi delle dita al tricipite surale, agli ischiocrurali, ai legamenti sacro-tuberosi e agli erettori spinali: una tensione eccessiva di questa linea, frequente nel danzatore, si traduce in tricipite accorciato, dorsiflessione limitata e sovraccarico dell'aponeurosi.[27] La linea spirale è formata, nell'arto inferiore, da

[26]Howse J., *Dance Technique and Injury Prevention*, cit.
[27]Myers T.W., *Meridiani miofasciali. Percorsi anatomici per i terapisti del corpo e del movimento*, 4ª ed., Tecniche Nuove, Milano, 2021, capitoli 3, 6 e 9.

tibiale anteriore e peroneo lungo, la "staffa" che controlla l'altezza dell'arco, e risale per il tratto ileo-tibiale fino agli obliqui dell'addome. La linea profonda frontale comprende tibiale posteriore, flessori lunghi, adduttori e ileopsoas, collegando direttamente il sostegno dell'arco mediale al controllo dell'anca e del bacino.

Nel modello di Busquet la catena di chiusura (adduttori, rotatori interni, muscoli mediali della gamba) porta l'arto in rotazione interna e il piede in pronazione, la catena di apertura (glutei, rotatori esterni, peronei) in rotazione esterna e supinazione.[28] Per l'operatore MCB il valore di questi modelli è duplice: un lavoro sul polpaccio o sulla pianta ha effetti a distanza, e una tensione nel piede può essere l'espressione distale di uno squilibrio prossimale.

In sintesi. Pronazione e supinazione sono entrambe fisiologiche: la prima adatta e ammortizza, la seconda rende il piede una leva rigida per la spinta. L'argano e il blocco medio-tarsico trasformano il piede da mobile a rigido; l'accoppiamento con la rotazione della tibia collega il piede a ginocchio, anca e bacino nelle due direzioni.

1.3 Eziologia: il piede piatto e il piede pronato

1.3.1 Definizioni e classificazione

Il piede piatto (*pes planus*) è definito dalla riduzione o scomparsa dell'arco longitudinale mediale in carico, associata di solito a valgismo del retropiede, abduzione dell'avampiede e relativa supinazione dell'avampiede rispetto al retropiede.[29] Il piede pronato indica invece un atteggiamento funzionale, cioè un piede che in stazione eretta o nel passo si porta in pronazione oltre la norma, indipendentemente dall'altezza dell'arco a riposo. I due concetti si sovrappongono ma non coincidono: esistono piedi con arco basso che non pronano eccessivamente e piedi con arco normale a riposo che collassano sotto carico; conta soprattutto il comportamento dell'arco e del retropiede in carico e in movimento.



Figura 3 – Valgismo del retropiede e cedimento dell'arco mediale in carico.

[28]Busquet L., *Le catene muscolari. Vol. 4: Arto inferiore*, Marrapese Editore, Roma, 2001.
[29]Mosca V.S., «Flexible flatfoot in children and adolescents», *Journal of Children's Orthopaedics*, 4(2), 2010, pp. 107-121.

La classificazione più utile dal punto di vista pratico distingue il piede piatto flessibile dal piede piatto rigido. Nel piede piatto flessibile l'arco è presente in scarico e sulle punte e scompare in carico; il test di Jack e il sollevamento sul tallone lo fanno ricomparire; è la forma di gran lunga più frequente e per lo più asintomatica. Nel piede piatto rigido l'arco è assente in ogni condizione, la mobilità sottoastragalica e medio-tarsica è ridotta e la causa è strutturale (coalizione tarsale, astragalo verticale, esiti traumatici o artritici). Si distinguono inoltre il piede piatto dell'età evolutiva, quello idiopatico dell'adulto e quello acquisito dell'adulto, legato alla disfunzione del tibiale posteriore.

1.3.2 Cause e fattori favorenti

Nel bambino l'arco è fisiologicamente basso fino ai 3-4 anni per il cuscinetto adiposo plantare e la lassità legamentosa, e si sviluppa fino ai 8-10 anni con la maturazione muscolare e nervosa; il piede piatto flessibile che persiste oltre questa età è nella maggior parte dei casi una variante della norma, spesso familiare.[30] I fattori eziologici possono essere raggruppati in quattro categorie. I fattori strutturali comprendono la lassità legamentosa costituzionale e le sindromi di ipermobilità (Ehlers-Danlos, Marfan, ipermobilità generalizzata valutata con il punteggio di Beighton),[31] le coalizioni tarsali, l'astragalo verticale congenito, il navicolare accessorio, che riduce l'efficacia del tibiale posteriore, e la brevità del tricipite surale (equino), che obbliga il mesopiede a "prendere in prestito" la dorsiflessione mancante abbassando l'arco. I fattori muscolari comprendono debolezza o affaticamento del tibiale posteriore e degli intrinseci, squilibrio tra invertitori ed evertitori e strategie motorie apprese, come l'*en dehors* compensato. I fattori generali comprendono eccesso di peso, età, diabete, artropatie e malattie neuromuscolari; quelli traumatici le fratture di calcagno e astragalo e le lesioni di Lisfranc e dello *legamento calcaneo-navicolare plantare*.

Il piede piatto acquisito dell'adulto illustra il ruolo degli stabilizzatori dinamici: il tibiale posteriore, sovraccaricato nella zona retromalleolare, poco vascolarizzata, va incontro a tendinopatia degenerativa; il suo cedimento priva l'arco del sostegno attivo, lo *legamento calcaneo-navicolare plantare* e il deltoideo si allungano, l'astragalo scivola medialmente e in basso, il calcagno si porta in valgo. Johnson e Strom hanno descritto quattro stadi: tendine infiammato ma funzionante; tendine allungato con deformità flessibile; deformità rigida; coinvolgimento della caviglia con valgismo dell'astragalo.[32] Il segno più

[30]Mosca V.S., «Flexible flatfoot in children and adolescents», cit.
[31]Beighton P., Solomon L., Soskolne C.L., «Articular mobility in an African population», *Annals of the Rheumatic Diseases*, 32(5), 1973, pp. 413-418. Il punteggio di Beighton valuta su nove punti l'iperestensione di gomiti, ginocchia, quinto dito, l'opposizione del pollice all'avambraccio e la flessione del tronco a mani piatte.
[32]Johnson K.A., Strom D.E., «Tibialis posterior tendon dysfunction», *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 239, 1989, pp. 196-206.

caratteristico è l'incapacità di sollevare il tallone su una sola gamba o di invertire il calcagno nel sollevamento. È una condizione frequente, spesso misconosciuta e trattabile se riconosciuta precocemente:[33] per l'operatore MCB un dolore retromalleolare mediale persistente, soprattutto con difficoltà nel sollevamento monopodalico, è un segnale di invio al medico.

1.3.3 Segni, sintomi e valutazione osservazionale

Molti piedi piatti sono asintomatici. Quando i sintomi compaiono sono tipicamente da sovraccarico: affaticamento di pianta e polpaccio dopo attività prolungata, dolore lungo il tibiale posteriore (margine postero-mediale della tibia, regione retromalleolare, navicolare), dolore plantare mediale al calcagno (fascite plantare), dolore laterale nel seno del tarso, crampi degli intrinseci, callosità sotto le teste metatarsali centrali, usura mediale delle suole; nel danzatore, sovraccarico di alluce e sesamoidi e difficoltà di controllo del *relevé*.

L'osservazione in stazione eretta comprende l'altezza dell'arco e la sua variazione da seduto a eretto, l'orientamento del calcagno rispetto alla gamba (un valgismo fino a circa 5° è fisiologico), la sporgenza mediale del navicolare e della testa dell'astragalo, il segno delle "troppe dita" (da dietro si vedono più dita del normale sul lato laterale del piede abdotto), l'allineamento di rotule e ginocchi, l'asimmetria tra i lati e l'inclinazione del bacino. Strumenti codificati sono la caduta del navicolare (abbassamento in carico oltre circa 10 mm) e l'indice di postura del piede (*Foot Posture Index*).[34] L'osservazione dinamica comprende il cammino, il sollevamento bipodalico e monopodalico sul tallone con attenzione all'inversione del calcagno, il test di Jack, l'accosciata, l'equilibrio monopodalico e, nel danzatore, *plié* e *relevé* senza forzare l'*en dehors*. Tali osservazioni orientano il lavoro dell'operatore MCB, ma diagnosi e stadiazione restano di competenza medica e fisioterapica.

1.3.4 Ripercussioni posturali e funzionali lungo la catena

Le conseguenze del piede piatto-pronato non restano confinate al piede. Nel piede la pronazione prolungata sovraccarica l'aponeurosi plantare (fascite, sperone calcaneare), gli intrinseci e il tibiale posteriore, favorisce l'alluce valgo per la spinta mediale sul primo raggio, trasferisce il carico sulle teste metatarsali centrali (metatarsalgia, neuroma di Morton) e crea conflitto laterale nel seno del tarso. Al tendine d'Achille l'eversione del calcagno impone una trazione obliqua che favorisce la tendinopatia; alla gamba il lavoro

[33] Kohls-Gatzoulis J. et al., «Tibialis posterior dysfunction», cit.
[34] Redmond A.C., Crosbie J., Ouvrier R.A., «Development and validation of a novel rating system for scoring standing foot posture: the Foot Posture Index», *Clinical Biomechanics*, 21(1), 2006, pp. 89-98.

eccentrico eccessivo di tibiale posteriore e soleo è tra i fattori della sindrome da stress tibiale mediale.

Al ginocchio il valgo dinamico e la rotazione interna della tibia aumentano lo stress femoro-rotuleo e la tensione su collaterale mediale, zampa d'oca e tratto ileo-tibiale; all'anca l'adduzione e la rotazione interna del femore sovraccaricano gluteo medio e rotatori esterni. Al bacino e al rachide l'anteversione, l'iperlordosi e la pseudo-dismetria da pronazione asimmetrica sono fattori di sovraccarico lombare. Sul piano funzionale un piede che non diventa rigido in tempo spinge male: l'efficienza del salto diminuisce, la fatica aumenta e l'equilibrio peggiora; nel danzatore queste ripercussioni si sommano alle richieste della tecnica.

In sintesi. Il piede piatto flessibile è frequente e spesso asintomatico; diventa un problema quando la pronazione è eccessiva e prolungata e le strutture che compensano (tibiale posteriore, aponeurosi, intrinseci) si affaticano, con ripercussioni che risalgono fino a ginocchio, anca e rachide.

1.4 Il piede nella danza classica: richieste tecniche e problematiche

1.4.1 Le richieste biomeccaniche della danza classica

La danza classica è costruita sull'*en dehors* (in inglese *en dehors*), la rotazione esterna degli arti inferiori che idealmente porta i piedi a 180°. Poiché la rotazione esterna dell'anca è in media di 60-70° per lato, i gradi restanti vengono ricavati da torsione tibiale, rotazione del ginocchio e pronazione del piede: una quota rilevante dell'*en dehors* visibile a terra non proviene dall'anca.[35] Il *plié* richiede un'ampia dorsiflessione a ginocchio flesso con il ginocchio allineato sul secondo dito; il *relevé* richiede circa 90° di estensione della prima metatarso-falangea e un controllo attivo del retropiede in neutro; le punte richiedono una flessione plantare complessiva di 90-100°, con il carico trasmesso attraverso l'alluce e il secondo dito. I salti, ripetuti decine di volte per lezione, impongono a piede e caviglia forze fino a quattro-cinque volte il peso corporeo e sollecitano eccentricamente tricipite surale e tibiale posteriore.[36] Piede e caviglia sono la sede più frequente degli infortuni dei danzatori, per lo più da sovraccarico; tra i fattori di rischio figurano volume di allenamento, fatica, punte precoci, scarpette, *en dehors* compensato e

[35]Hamilton W.G., Hamilton L.H., Marshall P., Molnar M., «A profile of the musculoskeletal characteristics of elite professional ballet dancers», *American Journal of Sports Medicine*, 20(3), 1992, pp. 267-273; Coplan J.A., «Ballet dancer's turnout and its relationship to self-reported injury», *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 32(11), 2002, pp. 579-584.
[36]Kadel N.J., «Foot and ankle injuries in dance», cit.

piede pronato.[37] Un piede piatto-pronato non impedisce la danza, ma rende più difficile il controllo del *relevé* e aumenta il lavoro degli stabilizzatori a ogni lezione.

1.4.2 Problematiche anatomiche e lesioni da sovraccarico

Le problematiche anatomiche più frequenti nel danzatore con piede piatto-pronato riguardano la colonna mediale e le strutture che la sostengono.

- Tendinopatia del tibiale posteriore: il muscolo lavora eccentricamente a ogni ricezione e concentricamente a ogni *relevé*, e nel piede pronato la richiesta è maggiore. Il dolore è retromalleolare mediale e sul navicolare, aumenta nel *relevé* monopodalico e può evolvere verso la disfunzione del paragrafo 1.3.2.
- Tendinopatia del flessore lungo dell'alluce ("tendinite del danzatore"): il tendine scorre in un tunnel osteofibroso dietro l'astragalo; la flessione plantare estrema e la pronazione, che lo angola, provocano attrito e infiammazione della guaina. Il dolore è postero-mediale, provocato dalla flessione dell'alluce contro resistenza.[38]
- Conflitto posteriore della caviglia e *os trigonum*: la flessione plantare estrema schiaccia i tessuti posteriori tra tibia e calcagno; un *os trigonum* (presente in circa il 10% della popolazione) provoca dolore posteriore sulle punte, mentre il conflitto anteriore rende doloroso il *plié*.[39]
- Alluce valgo, alluce rigido e sesamoiditi: la pronazione sposta il carico sul margine mediale dell'avampiede; punte e mezza punta sovraccaricano i sesamoidi e la prima metatarso-falangea, limitando l'estensione necessaria al *relevé*.
- Fratture da stress: il secondo metatarso, soprattutto alla base, è la sede classica nel danzatore sulle punte, perché il piede pronato con primo raggio ipermobile trasferisce il carico sul secondo raggio; sono descritte anche fratture del navicolare. Il dolore che persiste a riposo richiede un invio immediato.[40]
- Distorsioni laterali e instabilità cronica della caviglia: frequenti nelle ricezioni in flessione plantare, coinvolgono il legamento peroneo-astragalico anteriore e, ripetendosi, peggiorano la propriocezione e il controllo del retropiede.

[37]Russell J.A., «Preventing dance injuries: current perspectives», *Open Access Journal of Sports Medicine*, 4, 2013, pp. 199-210; Rietveld A.B.M., «Dancers' and musicians' injuries», *Clinical Rheumatology*, 32(4), 2013, pp. 425-434.
[38]Hamilton W.G., «Foot and ankle injuries in dancers», cit.
[39]Hodgkins C.W., Kennedy J.G., O'Loughlin P.F., «Tendon injuries in dance», *Clinics in Sports Medicine*, 27(2), 2008, pp. 257-268.
[40]Kadel N.J., «Foot and ankle injuries in dance», cit.

1.4.3 Problematiche posturali

Sul piano posturale il quadro più caratteristico è il cedimento mediale del piede (*rolling in*): il danzatore, per raggiungere l'*en dehors* richiesto, ruota esternamente la tibia sul piede fisso e lascia cedere il retropiede in valgo e l'arco in pronazione. Lo si riconosce dal calcagno evertito, dal navicolare sporgente, dal peso sul margine mediale e dalle dita che si aggrappano al pavimento. Il compenso al ginocchio è l'avvitamento del ginocchio (*screwing the knee*): il danzatore apre i piedi in *plié* e poi estende le ginocchia a piedi fermi, con una rotazione in carico che sollecita legamenti e menischi. Più in alto, l'insufficienza degli extrarotatori dell'anca si accompagna ad anteversione del bacino e iperlordosi, o al compenso opposto della retroversione forzata del bacino.[41] Altri atteggiamenti frequenti sono il piede «a falce» in supinazione-adduzione, il piede «ad ala» opposto in pronazione-abduzione e il *relevé* con retropiede in valgo.

1.4.4 Problematiche funzionali

Sul piano funzionale la limitazione più rilevante è la ridotta dorsiflessione della caviglia, per retrazione del tricipite o conflitto anteriore: il *plié* diventa poco profondo e il danzatore ricava l'ampiezza mancante pronando il piede e avvicinando le ginocchia. La seconda è la debolezza degli intrinseci e del tibiale posteriore, con *relevé* instabile, fatica precoce del polpaccio e crampi plantari; nel piede pronato, inoltre, il meccanismo dell'argano è meno efficiente in spinta e in mezza punta. La terza è il deficit di controllo neuromuscolare e di equilibrio monopodalico, che compromette *pirouette* e ricezioni. Si aggiungono il carico, le scarpette, il pavimento e la fatica.[42] Va ricordato il versante positivo: la danza, con tecnica corretta e progressione adeguata, allena proprio le qualità di cui il piede pronato ha bisogno.

In sintesi. En dehors, relevé, punte e salti portano il piede al limite: nel danzatore pronato i problemi tipici sono le tendinopatie del tibiale posteriore e del flessore lungo dell'alluce, le sesamoiditi, le fratture da stress, il cedimento mediale e il relevé instabile.

[41] Howse J., *Dance Technique and Injury Prevention*, cit.
[42] Steinberg N., Hershkovitz I., Peleg S., Dar G., Masharawi Y., Heim M., Siev-Ner I., «Range of joint movement in female dancers and nondancers aged 8 to 16 years: anatomical and clinical implications», *American Journal of Sports Medicine*, 34(5), 2006, pp. 814-823.

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE PRATICA DELL'ARGOMENTO

Il capitolo descrive un caso didattico. Il soggetto è una studentessa di danza classica di 19 anni, con dodici anni di pratica, cinque lezioni settimanali di un'ora e mezza, due delle quali sulle punte. Presenta un piede piatto flessibile bilaterale, con arco visibile da seduta e in sollevamento sul tallone e scomparsa in carico, valgismo del calcagno più marcato a destra (arto di appoggio abituale), navicolare sporgente, segno delle "troppe dita" positivo a destra, cedimento mediale in prima posizione e dorsiflessione limitata a ginocchio esteso. Riferisce tensione del polpaccio e della regione retromalleolare mediale destra dopo le lezioni e nei giorni di punte, crampi plantari serali e tensione dell'alluce destro; nessun dolore notturno, trauma o gonfiore. Il sollevamento monopodalico del tallone è possibile con buona inversione del calcagno; il test di Jack innalza l'arco.

Il quadro è compatibile con un sovraccarico funzionale delle strutture che compensano la pronazione (tibiale posteriore, tricipite surale, flessore lungo dell'alluce, intrinseci) in un piede piatto flessibile. In assenza di segni di allarme (dolore a riposo, gonfiore, trauma, incapacità di carico, deficit del sollevamento monopodalico) la situazione rientra nelle competenze dell'operatore MCB; è stato comunque consigliato un controllo del medico sportivo e del fisioterapista della scuola. Gli obiettivi concordati sono la riduzione di tensioni e affaticamento, il miglioramento della mobilità di caviglia e mesopiede, il recupero tra le lezioni e il supporto a un programma di esercizio attivo per il controllo dell'appoggio e dell'*en dehors*.

2.1 Descrizione del protocollo/trattamento massoterapico: il massaggio miofasciale plantare

2.1.1 Che cos'è il massaggio miofasciale e perché sulla pianta del piede

La fascia è il tessuto connettivo continuo che avvolge e collega muscoli, tendini e ossa: la fascia superficiale sottocutanea, la fascia profonda (nella gamba la fascia crurale, che si continua nei retinacoli e nell'aponeurosi plantare) e le guaine di ogni muscolo. È ricca di meccanocettori e risponde al carico ripetuto e all'infiammazione con una "densificazione" della matrice tra gli strati, perdita di scorrimento e aumento della rigidità.[43] Il massaggio miofasciale (o rilascio miofasciale) è la tecnica manuale che si rivolge a questo tessuto: si esegue senza olio, per non scivolare sulla pelle, con una pressione lenta, sostenuta e di intensità moderata che "aggancia" il tessuto, lo porta in tensione fino alla barriera di resistenza e la mantiene per 90-120 secondi, finché il

[43]Stecco C., *Functional Atlas of the Human Fascial System*, Churchill Livingstone Elsevier, Edinburgh, 2015; Schleip R., «Fascial plasticity – a new neurobiological explanation», *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 7(1), 2003, pp. 11-19.

terapista percepisce un cedimento (il «rilascio») e segue il tessuto nella nuova direzione. Si distingue dal massaggio classico per l'assenza di scorrimento rapido, per i tempi lunghi e per la direzione guidata dalla restrizione.[44] L'effetto non è un allungamento meccanico permanente ma una modulazione del tono attraverso i meccanocettori fasciali e il sistema nervoso autonomo, con miglioramento dello scorrimento e della percezione della zona trattata.

Nel piede piatto-pronato la pianta è il bersaglio ideale di questa tecnica, perché le strutture che cedono o compensano sono in gran parte fasciali: l'aponeurosi plantare, tesa dalla pronazione prolungata e sede di densificazioni e dolore inserzionale; i setti e le guaine dei muscoli intrinseci, affaticati dal lavoro di sostegno dell'arco; il retinacolo dei flessori e il tunnel tarsale, attraversati dai tendini del tibiale posteriore e dei flessori lunghi; l'inserzione calcaneare, dove aponeurosi e tendine d'Achille formano un sistema continuo. La cute plantare è inoltre ricchissima di recettori: lavorare lentamente sulla pianta significa anche "risvegliare" l'afferenza che guida l'equilibrio. Una revisione sistematica indica effetti favorevoli del rilascio miofasciale su dolore e funzione in diverse condizioni muscoloscheletriche, inclusa la fascite plantare, pur con qualità variabile degli studi;[45] uno studio pilota ha mostrato che l'auto-rilascio della sola pianta con una pallina migliora subito la flessibilità di ischiocrurali e rachide lombare, segno che il lavoro plantare si riflette a distanza.[46] Gli obiettivi sono restituire scorrimento ai tessuti plantari, ridurre la tensione, favorire la dorsiflessione e riattivare la propriocezione.

2.1.2 Preparazione: trattamento classico di gamba e piede

Il trattamento è programmato con cadenza settimanale per sei settimane, della durata di circa 45 minuti, nel giorno più leggero della settimana o dopo il lavoro sulle punte. Ogni seduta inizia con un breve colloquio e con l'osservazione dell'appoggio e del sollevamento sul tallone. I primi dieci minuti sono dedicati a un massaggio classico di preparazione, con olio neutro, che scalda i tessuti e favorisce il ritorno venoso: in decubito prono il terapista esegue sfioramenti e impastamenti del tricipite surale, scorrimenti lenti con il pollice lungo il margine postero-mediale della tibia, dove il tibiale posteriore è raggiungibile, e una mobilizzazione delicata del tendine d'Achille; la regione retromalleolare mediale viene trattata solo con scorrimenti leggeri, per la presenza del

[44]Barnes J.F., *Myofascial Release: The Search for Excellence*, Rehabilitation Services, Paoli, 1990; Manheim C.J., *The Myofascial Release Manual*, 4ª ed., Slack, Thorofare, 2008.
[45]Ajimsha M.S., Al-Mudahka N.R., Al-Madzhar J.A., «Effectiveness of myofascial release: systematic review of randomized controlled trials», *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 19(1), 2015, pp. 102-112.
[46]Grieve R., Goodwin F., Alfaki M., Bourton A.J., Jeffries C., Scott H., «The immediate effect of bilateral self myofascial release on the plantar surface of the feet on hamstring and lumbar spine flexibility: a pilot randomised controlled trial», *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 19(3), 2015, pp. 544-552.

fascio vascolo-nervoso tibiale. In decubito supino tratta brevemente i peronei e il tibiale anteriore, quindi rimuove l'olio dalla pianta del piede, che deve essere asciutta per il lavoro miofasciale.



Figura 4 – Trattamento manuale della pianta del piede.

2.1.3 Sequenza del massaggio miofasciale plantare

Il lavoro miofasciale occupa i successivi 20-25 minuti, con la persona prona e il ginocchio flesso a 90°, oppure supina con il piede oltre il bordo del lettino. Il terapista procede in una sequenza fissa, che la rende facile da ripetere e da rivalutare.

- Contatto e ascolto (1 minuto): mani appoggiate sulla pianta senza pressione, per percepire densità e zone di resistenza e confrontare i due piedi.
- Rilascio dell'aponeurosi a mani incrociate (3-4 minuti): una mano sul tubercolo mediale del calcagno e l'altra sulle teste metatarsali, porta i tessuti in leggera tensione in direzioni opposte e mantiene 90-120 secondi, seguendo il cedimento; ripete per la banda mediale, centrale e laterale.
- Rilascio in posizione di argano (dita estese) (3 minuti): con le dita estese passivamente dall'altra mano l'aponeurosi è tesa; esegue pressioni lente e scorrimenti lentissimi con il pollice o le nocche dal calcagno verso le dita, fermandosi 20-30 secondi sulle aree più dense, senza superare un fastidio sopportabile (4-5 su 10).
- Setti e muscoli intrinseci (4 minuti): pressioni mantenute nel solco tra abduttore dell'alluce e flessore breve delle dita, lungo il margine mediale dell'arco, e sul margine laterale (abduttore del quinto dito); pressioni puntiformi negli spazi intermetatarsali per interossei e lombricali.
- Fascia superficiale (2 minuti): pinzamento-rotolamento della cute del margine mediale dell'arco e del tallone.
- Inserzione calcaneare e retinacolo dei flessori (3 minuti): pressione statica sul tubercolo mediale del calcagno, poi tensione trasversale delicata sul retinacolo dei flessori dietro il malleolo mediale e sulla giunzione tra tendine d'Achille e calcagno, porta d'ingresso della continuità fasciale con la gamba.

- Rilascio con movimento attivo (3 minuti): mantiene la pressione su un punto denso mentre la persona flette ed estende lentamente le dita e la caviglia (pressione mantenuta con movimento attivo), integrando subito lo scorrimento ottenuto con il movimento.
- Chiusura (2 minuti): sfioramenti lenti di tutta la pianta, poi in piedi percezione dell'appoggio sui tre punti del piede e alcune ripetizioni di piede corto, per trasferire la nuova sensazione al controllo attivo.

La seduta si conclude con le mobilizzazioni articolari del paragrafo 2.2.1. Alla studentessa viene insegnato l'auto-rilascio quotidiano: 2-3 minuti per piede con una pallina sotto la pianta, dal tallone alle teste metatarsali, prima della lezione. Le precauzioni sono quelle del massaggio profondo: nessun rilascio diretto su un'inserzione in fase acuta (si lavora a distanza), su sospetta frattura da stress, flebite o cute lesa; nell'ipermobile la tecnica mira allo scorrimento, non all'allungamento. Nel corso delle sei settimane la studentessa ha riferito una progressiva riduzione della tensione del polpaccio e della regione retromalleolare dopo le lezioni e la scomparsa dei crampi serali; la morfologia dell'arco, come atteso, non è cambiata, mentre sono migliorate la tolleranza del carico e la qualità percepita del *relevé*: un miglioramento funzionale, non strutturale.

In sintesi. Il protocollo è semplice da esporre: dieci minuti di preparazione classica, venti di massaggio miofasciale plantare in otto passaggi (aponeurosi, argano, intrinseci, cute, inserzione calcaneare, retinacolo, movimento attivo, chiusura), auto-rilascio quotidiano. Obiettivo: scorrimento, percezione e tolleranza del carico, non la forma dell'arco.

2.2 Descrizione delle tecniche complementari

2.2.1 Mobilizzazioni articolari

Le mobilizzazioni articolari seguono il lavoro sui tessuti molli, con tecniche a bassa velocità e di piccola ampiezza, oscillatorie o mantenute, senza manipolazioni ad alta velocità.[47] Alla caviglia il terapista esegue la trazione della talocrurale e lo scivolamento posteriore dell'astragalo (una mano stabilizza la tibia, l'altra spinge il collo dell'astragalo all'indietro mentre il piede va in flessione dorsale), utile per il *plié*. Alla sottoastragalica esegue, con il calcagno nel palmo, oscillazioni in inversione ed eversione; a Chopart mobilizza navicolare e cuboide in senso dorso-plantare. Alle articolazioni di Lisfranc esegue scivolamenti dorso-plantari e alla prima metatarso-falangea trazione e mobilizzazione in estensione, per l'ampiezza richiesta dal *relevé*. All'anca esegue

[47]Maitland G.D., Hengeveld E., Banks K., *Maitland's Peripheral Manipulation*, 4ª ed., Butterworth-Heinemann, Edinburgh, 2005; Kaltenborn F.M., *Manual Mobilization of the Joints. Vol. I: The Extremities*, 8ª ed., Norli, Oslo, 2014.

trazione e mobilizzazioni oscillatorie in flessione, abduzione e rotazione esterna, per favorire l'uso del range disponibile senza forzare l'*en dehors*. La mobilizzazione migliora la dorsiflessione nel breve periodo e va integrata subito con l'esercizio attivo.

2.2.2 Esercizio attivo e rieducazione dell'appoggio

Va precisato che il Massaggiatore Capo Bagnino non può prescrivere né attuare esercizi riabilitativi: gli esercizi che seguono, propri della preparazione del danzatore, sono riportati solo per illustrare la tematica, non con finalità curative, e spettano al fisioterapista e all'insegnante. Il programma è quotidiano, di 10-15 minuti.[48]

- Piede corto: da seduta e poi in piedi, la persona avvicina la testa del primo metatarso al calcagno senza flettere le dita, per 5-10 secondi; 10-15 ripetizioni. Attiva gli intrinseci.
- Sollevamento sul tallone con controllo del retropiede: con una pallina tra i malleoli, la persona sale lentamente sulle mezze punte con il peso tra primo e secondo dito e scende in 4 secondi; 3 serie da 12-15, poi monopodalico.
- Equilibrio monopodalico su superficie stabile e poi instabile, con piede neutro e ginocchio sul secondo dito; 3 ripetizioni da 30 secondi per lato, poi in *relevé*.
- Controllo dell'en dehors dall'anca: apertura dell'anca in decubito laterale con elastico, ponte gluteo con rotazione esterna, rotazioni esterne attive in piedi; 3 serie da 12-15.

2.2.3 Integrazione con il gesto tecnico ed educazione al carico

Il passaggio al gesto tecnico segue una progressione semplice: appoggio bipodalico sui tre punti del piede; *demi-plié* in prima con *en dehors* ridotto al range dell'anca, ginocchio sul secondo dito e tallone a terra; *relevé* a due gambe e poi monopodalico con retropiede neutro; *en dehors* aumentato solo se il retropiede resta controllato; infine piccoli salti, mentre l'insegnante corregge il cedimento mediale.

Per l'educazione al carico sono stati concordati un giorno di riposo settimanale, l'alternanza dei giorni di punte con giorni più leggeri, il riscaldamento con auto-rilascio ed esercizi e il riconoscimento dei segnali di allarme (dolore a riposo, gonfiore, dolore osseo, deficit del sollevamento monopodalico) che impongono di fermarsi e chiedere una valutazione. La rivalutazione finale considera comfort, *relevé*, *plié*, equilibrio e tolleranza del carico. *In sintesi.* Le mobilizzazioni restituiscono gioco articolare, l'esercizio, di competenza del fisioterapista e dell'insegnante, lo trasforma in controllo; la progressione tecnica lo riporta nel gesto.

[48]Haas J.G., *Dance Anatomy*, Calzetti Mariucci, Perugia, 2013, capitolo «Piedi e caviglie».

CONCLUSIONI

Lo studio dell'anatomia e della biomeccanica mostra che piede piatto e pronazione non sono semplici difetti di forma. L'arco longitudinale mediale è il risultato dell'equilibrio tra una struttura ossea, un sistema legamentoso passivo (calcaneo-navicolare plantare, deltoideo, legamenti plantari, aponeurosi) e un sistema muscolare attivo, estrinseco (tibiale posteriore, peroneo lungo, flessori lunghi, tricipite surale) e intrinseco, coordinato da un'afferenza propriocettiva finissima. La pronazione è una funzione, non un errore, e diventa un problema quando è eccessiva, prolungata o non seguita dalla risupinazione che prepara la spinta. Quando ciò avviene, le strutture che compensano si affaticano e si sovraccaricano, e le conseguenze risalgono, attraverso l'accoppiamento tra sottoastragalica e tibia, lungo tutta la catena cinetica fino al ginocchio, all'anca, al bacino e al rachide; nello stesso tempo un controllo prossimale insufficiente scende verso il piede e lo costringe a cedere.

Nella danza classica queste relazioni assumono un peso particolare, perché l'*en dehors*, il *relevé*, le punte e i salti portano il piede al limite delle sue possibilità. Il danzatore con piede piatto-pronato non è impossibilitato, ma deve costruire con maggiore attenzione la stabilità del retropiede, la forza degli intrinseci e del tibiale posteriore, la dorsiflessione della caviglia e, soprattutto, un *en dehors* che nasca dall'anca e non dal cedimento del piede. Le problematiche descritte, dalle tendinopatie del tibiale posteriore e del flessore lungo dell'alluce alle sesamoiditi, alle fratture da stress e al cedimento mediale del piede, sono in gran parte espressione del conflitto tra richiesta tecnica e disponibilità anatomica.

Per l'operatore MCB la conseguenza pratica è chiara. Il massaggio non modifica la forma dell'arco, ma, se guidato da una conoscenza precisa delle strutture coinvolte, agisce con efficacia sulle tensioni e sui sovraccarichi che il piede pronato produce: la catena posteriore della gamba, il compartimento profondo, la pianta del piede, i peronei e la muscolatura dell'anca che governa l'*en dehors*. Il massaggio miofasciale plantare, le mobilizzazioni articolari, l'esercizio attivo, la rieducazione del gesto e l'educazione al carico trasformano il beneficio del lavoro manuale in una capacità funzionale. Il risultato da ricercare non è un arco visivamente più alto, ma un danzatore che tollera meglio il carico, controlla meglio l'appoggio e riconosce per tempo i segnali che richiedono il medico o il fisioterapista. In questa prospettiva il massaggiatore capo bagnino è una figura di supporto preziosa, a condizione che conosca l'anatomia su cui lavora e i confini entro i quali lavora: non prescrive né attua esercizi riabilitativi, e gli esercizi citati in questa tesi servono solo a illustrare la tematica, non a curare.

BIBLIOGRAFIA

Biel A., *Guida ai sentieri del corpo. Manuale pratico per riconoscere muscoli, ossa e altro ancora*, 3ª ed. italiana, Piccin Nuova Libraria, Padova, 2024.

Ajimsha M.S., Al-Mudahka N.R., Al-Madzhar J.A., «Effectiveness of myofascial release: systematic review of randomized controlled trials», *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 19(1), 2015, pp. 102-112.

Barnes J.F., *Myofascial Release: The Search for Excellence*, Rehabilitation Services, Paoli, 1990.

Beighton P., Solomon L., Soskolne C.L., «Articular mobility in an African population», *Annals of the Rheumatic Diseases*, 32(5), 1973, pp. 413-418.

Busquet L., *Le catene muscolari. Vol. 4: Arto inferiore*, Marrapese Editore, Roma, 2001.

Coplan J.A., «Ballet dancer's en dehors and its relationship to self-reported injury», *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 32(11), 2002, pp. 579-584.

Gray H., *Anatomy of the Human Body*, 20ª ed. a cura di W.H. Lewis, Lea & Febiger, Philadelphia, 1918 (edizione digitale Bartleby.com, 2000), tavole 290, 291, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 439, 441, 442, 443, 444 e 833.

Grieve R., Goodwin F., Alfaki M., Bourton A.J., Jeffries C., Scott H., «The immediate effect of bilateral self myofascial release on the plantar surface of the feet on hamstring and lumbar spine flexibility: a pilot randomised controlled trial», *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 19(3), 2015, pp. 544-552.

Haas J.G., *Dance Anatomy. 82 esercizi per migliorare flessibilità, forza e tono muscolare con descrizione anatomica*, Calzetti Mariucci, Perugia, 2013.

Hamilton W.G., «Foot and ankle injuries in dancers», *Clinics in Sports Medicine*, 7(1), 1988, pp. 143-173.

Hamilton W.G., Hamilton L.H., Marshall P., Molnar M., «A profile of the musculoskeletal characteristics of elite professional ballet dancers», *American Journal of Sports Medicine*, 20(3), 1992, pp. 267-273.

Hicks J.H., «The mechanics of the foot. II. The plantar aponeurosis and the arch», *Journal of Anatomy*, 88(1), 1954, pp. 25-30.

Hodgkins C.W., Kennedy J.G., O'Loughlin P.F., «Tendon injuries in dance», *Clinics in Sports Medicine*, 27(2), 2008, pp. 257-268.

Howse J., *Dance Technique and Injury Prevention*, 3ª ed., A&C Black, London, 2000.

Inman V.T., *The Joints of the Ankle*, Williams & Wilkins, Baltimore, 1976.

Johnson K.A., Strom D.E., «Tibialis posterior tendon dysfunction», *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 239, 1989, pp. 196-206.

Kadel N.J., «Foot and ankle injuries in dance», *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, 17(4), 2006, pp. 813-826.

Kaltenborn F.M., *Manual Mobilization of the Joints. Vol. I: The Extremities*, 8ª ed., Norli, Oslo, 2014.

Kapandji I.A., *Fisiologia articolare. Vol. 2: Arto inferiore*, 6ª ed., Monduzzi Editore, Bologna, 2011.

Khamis S., Yizhar Z., «Effect of feet hyperpronation on pelvic alignment in a standing position», *Gait & Posture*, 25(1), 2007, pp. 127-134.

Kohls-Gatzoulis J., Angel J.C., Singh D., Haddad F., Livingstone J., Berry G., «Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot», *BMJ*, 329(7478), 2004, pp. 1328-1333.

Maitland G.D., Hengeveld E., Banks K., *Maitland's Peripheral Manipulation*, 4ª ed., Butterworth-Heinemann, Edinburgh, 2005.

McKeon P.O., Hertel J., Bramble D., Davis I., «The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function», *British Journal of Sports Medicine*, 49(5), 2015, p. 290.

Manheim C.J., *The Myofascial Release Manual*, 4ª ed., Slack, Thorofare, 2008.

Mosca V.S., «Flexible flatfoot in children and adolescents», *Journal of Children's Orthopaedics*, 4(2), 2010, pp. 107-121.

Myers T.W., *Meridiani miofasciali. Percorsi anatomici per i terapisti del corpo e del movimento*, 4ª ed., Tecniche Nuove, Milano, 2021.

Netter F.H., *Atlante di anatomia umana*, 7ª ed., Edra, Milano, 2019.

Neumann D.A., *Kinesiology of the Musculoskeletal System. Foundations for Rehabilitation*, 3ª ed., Elsevier, St. Louis, 2017.

Perry J., Burnfield J.M., *Gait Analysis. Normal and Pathological Function*, 2ª ed., Slack, Thorofare, 2010.

Redmond A.C., Crosbie J., Ouvrier R.A., «Development and validation of a novel rating system for scoring standing foot posture: the Foot Posture Index», *Clinical Biomechanics*, 21(1), 2006, pp. 89-98.

Rietveld A.B.M., «Dancers' and musicians' injuries», *Clinical Rheumatology*, 32(4), 2013, pp. 425-434.

Root M.L., Orien W.P., Weed J.H., *Normal and Abnormal Function of the Foot*, Clinical Biomechanics Corporation, Los Angeles, 1977.

Russell J.A., «Preventing dance injuries: current perspectives», *Open Access Journal of Sports Medicine*, 4, 2013, pp. 199-210.

Schleip R., «Fascial plasticity – a new neurobiological explanation», *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 7(1), 2003, pp. 11-19.

Standring S. (a cura di), *Gray's Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice*, 42ª ed., Elsevier, London, 2021.

Stecco C., *Functional Atlas of the Human Fascial System*, Churchill Livingstone Elsevier, Edinburgh, 2015.

Steinberg N., Hershkovitz I., Peleg S., Dar G., Masharawi Y., Heim M., Siev-Ner I., «Range of joint movement in female dancers and nondancers aged 8 to 16 years: anatomical and clinical implications», *American Journal of Sports Medicine*, 34(5), 2006, pp. 814-823.

Steindler A., *Kinesiology of the Human Body under Normal and Pathological Conditions*, Charles C. Thomas, Springfield, 1955.

Tiberio D., «The effect of excessive subtalar joint pronation on patellofemoral mechanics: a theoretical model», *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 9(4), 1987, pp. 160-165.

Iconografia. Le Tavole 1-7 sono tratte da H. Gray, *Anatomy of the Human Body*, 20ª ed., 1918, opera di pubblico dominio; le didascalie originali in inglese e latino sono state sostituite dalla nomenclatura italiana e le strutture indicate da numeri sono elencate nelle legende; gli schemi delle Figure 1 e 2 sono elaborazioni originali dell'autrice sulla base delle fonti citate nelle didascalie; le Figure 3 e 4 sono immagini illustrative realizzate per questa tesina e non documentano il soggetto descritto.