KINESIOLOGIA STUDIO · DOTT. DAVIDE SCUDERI · MODENA

Scheda per Laura

Dolore fra le scapole, sul lato dei romboidi e del trapezio medio: cosa sta succedendo, cosa fare nelle prossime settimane e come capire se va nella direzione giusta.

Fase: ripresa del carico | 6 novembre 2026 | Controllo fra 3 settimane

1

Il problema

Il punto che fa male non è il punto che ha creato il problema. È il muscolo che sta facendo il lavoro di un altro.


Fra la colonna e la scapola ci sono i **romboidi** e il **trapezio medio**: sono due muscoli piatti che tengono la scapola vicina alla schiena, come due tiranti. Il tuo dolore è lì, e alla pressione quella zona è dolente e tesa.

Questi muscoli però non si fanno male da soli. Si stancano quando devono **tenere** la scapola per ore, invece di muoverla. Succede quando la postura di lavoro porta la testa in avanti e le spalle chiuse: le scapole scivolano in fuori, e romboidi e trapezio medio restano in tiro tutto il giorno per frenarle. Un muscolo che tira sempre, anche piano, a un certo punto si infiamma e fa male.

Il muscolo che dovrebbe aiutarli è il **trapezio inferiore**: la parte bassa del trapezio, quella che tira la scapola giù e dentro, verso la colonna. Se lavora bene, la scapola sta al suo posto senza sforzo e i romboidi possono riposare. Se lavora poco, come succede a quasi tutti dopo anni di scrivania e telefono, il carico passa tutto ai tiranti di sopra. Da qui la regola di questa scheda: **il dolore sta in mezzo, ma il lavoro si fa in basso**.

Questa è la spiegazione più probabile dato quello che ho visto in studio. Non è una diagnosi: se ci sono dubbi, la conferma spetta al medico.

Il percorso del problema, visto da dietro



tratteggio arancio = muscolo poco attivo

1 Testa in avanti
Ogni centimetro in avanti aumenta il peso che il collo deve reggere. I muscoli dietro al collo restano accesi.

2 Spalle chiuse
I muscoli del petto si accorciano e tirano le spalle in avanti. Le scapole scivolano in fuori, lontano dalla colonna.

3 Trapezio superiore che tira su
È il muscolo delle spalle "alzate". Lavora troppo e di solito è quello che senti duro quando ti massaggi il collo.

4 Trapezio inferiore poco attivo
Dovrebbe tenere la scapola giù e dentro. Lavora poco, quindi nessuno fa il suo lavoro al posto suo. Qui si rinforza.

5 Romboidi e trapezio medio in tensione continua
Frenano la scapola che scappa in fuori, tutto il giorno. È il punto che fa male. Qui si calma, non si forza.

2

Le tue domande

Le risposte alle cose che chiedono quasi tutti con questo problema. Se ne hai altre, scrivimele e le aggiungo.

«Perché mi fa male lì se non ho fatto niente di strano?»

Perché non è stato un gesto, è stata una somma. Un muscolo che tiene una posizione per otto ore fa più fatica di uno che solleva un peso per dieci secondi. Pensa a tenere una borsa della spesa con il braccio teso: il peso è piccolo, ma dopo due minuti il braccio trema. I romboidi fanno quel lavoro ogni giorno, con le scapole che scappano in avanti.

«Se il dolore è in mezzo alla schiena, perché devo rinforzare un muscolo più in basso?»

Perché il muscolo in basso, il trapezio inferiore, è quello che dovrebbe tenere la scapola al suo posto. Se lui lavora, i romboidi possono smettere di tirare. È come un tavolo con una gamba corta: puoi mettere spessori sotto le altre tre, ma la soluzione è sistemare la gamba che manca. Rinforzare i romboidi, che sono già stanchi, peggiorerebbe la situazione.

«Mi faccio massaggiare la zona? Metto il calore?»

Il calore va bene, 15 minuti la sera, e il massaggio leggero dà sollievo. Ma sono un sollievo, non una cura: la mattina dopo il muscolo ricomincia a tenere e il dolore torna. Usali per stare meglio nel frattempo, mentre gli esercizi cambiano il motivo per cui fa male.

«Devo stare dritta tutto il giorno?»

No, e non ci riusciresti. Nessuna postura è giusta se tenuta a lungo: la postura migliore è la prossima. Quello che conta è cambiare posizione spesso, e avere i muscoli giusti svegli quando serve. Per questo nella scheda c'è una pausa ogni 45 minuti, non un ordine di stare dritta.

«Quanto ci vuole?»

Il dolore di solito si calma in due o tre settimane, se smetti di sovraccaricare la zona. La forza del trapezio inferiore ha bisogno di sei o otto settimane per cambiare davvero: i muscoli imparano prima a "accendersi" e solo dopo diventano più forti. Per questo la scheda è il primo passo, non l'ultimo.

3

Indicazioni

> **Togli lavoro ai muscoli stanchi, dallo a quelli che dormono.**

Da fare

- ✓ Gli esercizi della scheda, con le dosi scritte. Pochi, fatti bene, ogni giorno.
- ✓ Una pausa ogni 45 minuti di scrivania: alzati, mento indietro, spalle giù, cinque respiri.
- ✓ Schermo all'altezza degli occhi. Se usi il portatile, mettilo su un rialzo con tastiera esterna.
- ✓ Telefono portato all'altezza del viso, non la testa portata al telefono.
- ✓ Calore 15 minuti la sera sulla zona dolente, se dà sollievo.
- ✓ Camminare tutti i giorni, almeno 20 minuti, con le braccia libere.
- ✓ Segnare il dolore sul diario in fondo, mattina e sera.

Da evitare

- ✗ Allungare o "stirare" con forza la zona fra le scapole: è già in tiro, tirarla ancora la irrita.
- ✗ Esercizi di remata pesante o aperture con elastico a spalle alte. Rinforzano proprio i muscoli stanchi.
- ✗ Alzate di spalle, zaino pesante su una spalla sola, borsa a tracolla per ore.
- ✗ Massaggi profondi o "scrocchi" sulla zona dolente fatti da soli con palline o attrezzi.
- ✗ Restare più di un'ora nella stessa posizione, anche se comoda.
- ✗ Dormire a pancia in giù con la testa girata.
- ✗ Smettere gli esercizi appena il dolore passa: è il momento in cui iniziano a servire.

4

Esercizi

Sei esercizi, in ordine. I primi tre sbloccano, il quarto rinforza, il quinto apre, il sesto cambia l'abitudine. In tutto 12 minuti al giorno, più il quarto a giorni alterni.

ESERCIZIO	QUANTE VOLTE	QUANDO
1 · Mento indietro con respiro	10 ripetizioni × 3 al giorno	Mattina, metà giornata, sera
2 · Apertura del dorso sull'asciugamano	2 minuti × 1 al giorno	La sera, prima degli altri
3 · Scivolata al muro con spalle giù	2 serie × 10	Ogni giorno, dopo il 2
4 · La "Y" a pancia in giù	3 serie × 8, tieni 3 secondi	A giorni alterni (lun, mer, ven, dom)
5 · Apertura del petto sulla porta	30 secondi × 3	Ogni giorno, dopo il 4 o il 3
6 · Pausa dei 45 minuti	1 minuto, ogni 45 minuti seduta	Al lavoro e davanti allo schermo

1 · Mento indietro con respiro

10 ripetizioni, 3 volte al giorno

Riporta la testa sopra le spalle e spegne i muscoli dietro al collo. È il primo anello della catena.

1. Seduta o in piedi, schiena appoggiata, sguardo dritto davanti.
2. Porta il mento indietro, come per fare il "doppio mento", senza abbassare la testa.
3. Tieni 3 secondi, respirando dal naso, poi lascia andare piano.
4. Il movimento è piccolo: due centimetri bastano.

Va bene se
senti un allungamento dietro al collo, in alto, e la zona fra le scapole si rilassa.

Fermati se
compare dolore in gola, vertigine, o formicolio alle braccia. Non è l'esercizio giusto per oggi: scrivimelo.

2 · Apertura del dorso sull'asciugamano

2 minuti, 1 volta al giorno

La parte alta della schiena, fra le scapole, tende a chiudersi in avanti. Aprirla toglie tiro ai romboidi e dà spazio alla scapola per scendere.

1. Arrotola un asciugamano da bagno stretto, spessore di una bottiglia.
2. Sdraiati a terra sulla schiena, con il rotolo di traverso all'altezza della zona dolente, ginocchia piegate, piedi a terra.
3. Braccia aperte a terra, palmi in su. Lascia il peso del corpo sul rotolo.
4. Respira lento dal naso, lasciando che il petto si apra a ogni espirazione. Resta 2 minuti.
5. Per alzarti, gira su un fianco. Mai di scatto.

Va bene se
senti pressione e apertura, e dopo il dolore è uguale o più leggero.

Fermati se
il dolore sale sopra 4 su 10, o senti formicolio o il fiato corto. Sposta il rotolo di due dita più in basso; se non cambia, togli l'esercizio.

3 · Scivolata al muro con spalle giù

2 serie da 10, ogni giorno

Insegna al trapezio inferiore ad accendersi mentre le braccia salgono, senza che il trapezio superiore alzi le spalle. È l'esercizio che prepara il quarto.

1. Schiena al muro, piedi a 15 centimetri dal muro, ginocchia morbide. Testa, dorso e sedere appoggiati.
2. Braccia al muro a "candelabro": gomiti piegati a 90°, dorso delle mani al muro se riesci, altrimenti più vicine che puoi.
3. Prima di muovere, porta le spalle giù e lontane dalle orecchie. Questo è il punto che conta.
4. Fai scivolare le braccia verso l'alto, lentamente, tenendo gomiti e polsi vicini al muro, fino a dove le spalle restano giù.
5. Torna giù piano. 10 volte, pausa di 30 secondi, altre 10.

Va bene se
senti lavorare la zona sotto la scapola, verso il centro della schiena, e le spalle non salgono.

Fermati se
le spalle salgono o il dolore fra le scapole aumenta: accorcia il movimento, sali meno. Se c'è dolore davanti alla spalla o pizzicore, fermati.

4 · La "Y" a pancia in giù

3 serie da 8, tieni 3 secondi, a giorni alterni

È l'esercizio principale della scheda: rinforza il trapezio inferiore nella direzione in cui lavora davvero, giù e dentro. A giorni alterni perché il muscolo cresce nel giorno di riposo.

1. A pancia in giù su un tappetino, fronte appoggiata su un asciugamano piegato, braccia distese in avanti a formare una "Y" con il corpo, pollici verso il soffitto.
2. Mento leggermente indietro, pancia morbida. Non inarcare la schiena bassa.
3. Porta le spalle giù, lontane dalle orecchie, e solleva le braccia di pochi centimetri, come se le allungassi verso l'angolo della stanza.
4. Tieni 3 secondi. Senti lavorare sotto la scapola, verso il centro della schiena.
5. Appoggia piano. 8 volte, 45 secondi di pausa, 3 serie.
6. Senza pesi per le prime tre settimane. Poi decidiamo insieme.

Va bene se
la fatica è sotto la scapola e nel centro basso della schiena, e il giorno dopo c'è al massimo un indolenzimento leggero.

Fermati se
senti il lavoro tutto in cima alle spalle o nel collo, o se il dolore fra le scapole sale sopra 4 su 10 o è peggiore il mattino dopo. Riduci a 2 serie da 6 e scrivimelo.

5 · Apertura del petto sulla porta

30 secondi, 3 volte, ogni giorno

Allunga i muscoli del petto che tirano le spalle in avanti. Senza questo, il trapezio inferiore lavora contro un freno.

1. In piedi nel vano di una porta, avambracci appoggiati agli stipiti, gomiti poco sotto l'altezza delle spalle.
2. Fai un passo avanti con un piede, tenendo il corpo dritto, finché senti tirare davanti al petto.
3. Spalle giù, mento indietro. Respira lento per 30 secondi.
4. Torna indietro, cambia piede, ripeti. In tutto 3 volte.

Va bene se
senti tirare davanti, sul petto, e dopo le spalle sembrano più "larghe".

Fermati se
senti formicolio nelle mani o dolore dentro la spalla: abbassa i gomiti e fai un passo più corto. Se resta, togli l'esercizio.

6 · La pausa dei 45 minuti

1 minuto ogni 45 minuti seduta

È l'esercizio che vale di più, perché cambia le ore in cui il problema si crea, non i dieci minuti in cui lo curi.

1. Metti un promemoria ogni 45 minuti sul telefono o sul computer.
2. Alzati. Fai 5 "mento indietro" (esercizio 1).
3. Porta le spalle giù e indietro, braccia lungo i fianchi, palmi in avanti. Tieni 5 respiri.
4. Cammina fino alla finestra o al corridoio e torna. Poi risiediti sistemando lo schermo.

Va bene se
a fine giornata il dolore è più basso di quando non facevi le pause. Vedrai la differenza sul diario.

Non va se
salti le pause "perché tanto sto bene". Vanno fatte proprio nei giorni in cui stai bene.

5

Attenzione

Il dolore fra le scapole è quasi sempre muscolare. Ma la stessa zona può ricevere dolore da organi vicini, e quei casi vanno riconosciuti subito.

Pronto soccorso, lo stesso giorno

- Dolore fra le scapole che compare insieme a peso o dolore al petto, sudore freddo, nausea o fiato corto.
- Dolore improvviso, fortissimo, "a strappo", mai sentito prima, soprattutto se ti senti mancare.
- Braccio o mano che perdono forza di colpo, o non riesci più a tenere un oggetto.
- Dolore dopo una caduta o un colpo forte alla schiena.
- Febbre alta con dolore alla schiena che non cambia con la posizione.

Chiama il medico entro un giorno

- Formicolio, "spilli" o pelle addormentata lungo il braccio o nelle dita, nuovi.
- Dolore che ti sveglia di notte e non cambia cambiando posizione.
- Dolore che aumenta con il respiro profondo o la tosse.
- Dolore che peggiora ogni giorno nonostante le indicazioni, per più di cinque giorni.
- Dimagrimento senza motivo, stanchezza insolita, o dolore in altre zone che compare insieme.

Perché in questi casi la visita non si rinvia

Il mio lavoro è sul muscolo e sul movimento. Se il dolore viene da un nervo, dal cuore, dai polmoni o dalla colonna, nessun esercizio lo risolve e il tempo perso conta. In quei casi la visita non è un'alternativa alla scheda: viene prima della scheda, e gli esercizi si sospendono finché il medico non ha escluso le cause che non sono muscolari.

Diario di controllo

Ogni giorno segna il dolore da 0 (nessuno) a 10 (il peggiore che immagini), la mattina appena alzata e la sera. Porta la scheda al controllo.

Misura presa in studio il 6 novembre:

Dolore alla pressione fra le scapole: _____ / 10

Tenuta della "Y" a terra prima che le spalle salgano: _____ secondi

Obiettivo al controllo: dolore sotto 3 / 10 e tenuta oltre i 20 secondi.

GIORNO	MATTINA 0-10	SERA 0-10	ESERCIZI FATTI	NOTE (LAVORO, SONNO, COSA HA AIUTATO)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

6

Cosa aspettarsi

Settimane 1–3 · calmare | Settimane 3–8 · rinforzare | Dopo · lavoro posturale guidato

Settimane 1–3: il dolore scende

Con le pause, il mento indietro e l'apertura del dorso i romboidi smettono di lavorare sempre. Il dolore di solito scende sotto 3 su 10 nelle prime due o tre settimane. Non è ancora la soluzione: è il segno che hai tolto il carico.

Settimane 3–8: il trapezio inferiore si sveglia

La "Y" e la scivolata al muro insegnano prima al muscolo ad accendersi, poi lo rendono più forte. In queste settimane il dolore può oscillare: giorni buoni e qualche giorno meno buono sono normali, finché la media sul diario scende. Al controllo aggiorno dosi e difficoltà.

Dopo: il lavoro che resta da fare

Questa scheda è il primo passo. Il trapezio inferiore debole e le spalle chiuse non sono un incidente: sono il modo in cui il tuo corpo ha imparato a stare in piedi e seduto in questi anni. Perché il dolore non torni, dopo questa fase serve un **lavoro posturale vero e proprio**: esercizi progressivi su tutta la catena, dalla testa al bacino, con qualcuno che controlli il gesto e lo faccia crescere nel tempo.

Non è qualcosa che si fa da soli con una scheda, e non è qualcosa che si fa per sempre: è un percorso di qualche mese, fatto bene, che ti lascia con un corpo che si regge da solo. Ne parliamo al controllo e ti dico come e con chi impostarlo.