KINESIOLOGIA STUDIO · DOTT. DAVIDE SCUDERI · MODENA

Il tuo ginocchio gonfio dopo la ginnastica

Cosa è successo, cosa fare nei prossimi giorni, quali esercizi e quando chiamare il medico.

Fase: acuta | Scheda del 5 novembre 2026 | Ginocchio con artrosi

1 · IL PROBLEMA

Un ginocchio che ha fatto troppo, troppo presto


Il tuo ginocchio ha l'artrosi, cioè la cartilagine che fa da cuscinetto tra le ossa è più sottile e più ruvida di una volta. Un ginocchio così funziona bene, ma sopporta una dose di lavoro più bassa. Alla ginnastica la dose è stata più alta di quella che oggi riesce a reggere, e la membrana interna ha reagito producendo liquido in più. Quel liquido è il gonfiore che senti.

Cosa è successo nel gesto

Squat, affondi, step e salti caricano la parte anteriore del ginocchio con un peso che può superare di tre o quattro volte quello del corpo. Se il corpo pesa qualche chilo in più e la cartilagine è consumata, la membrana interna (la sinovia) si irrita e nelle ore successive riempie l'articolazione di liquido. Non è una rottura e non è un danno nuovo alla cartilagine: è una reazione, e di solito rientra in una o due settimane se abbassi il carico.

Il gonfiore ha un secondo effetto che vale la pena conoscere: quando il ginocchio è pieno di liquido, il muscolo davanti alla coscia (il quadricipite) viene "spento" per riflesso. Per questo il ginocchio ti sembra più debole o ti cede. Il muscolo c'è, è solo frenato dal gonfiore.

Il percorso del sintomo, in quattro stazioni



1 Il cuscinetto è consumato: il ginocchio regge meno carico di prima.

2 La membrana interna si irrita per il troppo lavoro e produce liquido.

3 Il liquido riempie il ginocchio: gonfiore, rigidità, fatica a piegarlo.

4 Il gonfiore frena il muscolo della coscia: senso di debolezza e cedimento.

La conferma di questo meccanismo spetta al medico. Questa scheda descrive il percorso più probabile e come comportarti nel frattempo.

2 · LE TUE DOMANDE

Quello che mi hai chiesto in studio

“Devo smettere di fare ginnastica?”

No. Devi cambiare la dose, non smettere. Pensa a un dimmer, non a un interruttore: in questi giorni lo abbassi quasi al minimo, poi lo rialzi un poco alla volta. Fermarti del tutto, alla tua età, fa perdere muscolo in fretta, e un ginocchio con meno muscolo intorno si gonfia più facilmente la volta dopo.

“È l'artrosi che sta peggiorando?”

Quasi certamente no. L'artrosi è una condizione lenta, che cambia in anni. Quello che è successo in un giorno è una reazione della membrana interna, come una bolla sul piede dopo una scarpa nuova: la pelle non è "peggiorata", ha solo protestato per uno sfregamento in più. Quando il carico torna giusto, la reazione rientra.

“Ci metto il ghiaccio o il caldo?”

Ghiaccio, finché è gonfio. Il freddo restringe i vasi e rallenta la produzione di liquido. Il caldo fa il contrario e in questa fase può aumentare il gonfiore. Quando il ginocchio sarà tornato asciutto, il caldo potrà servire al mattino per sciogliere la rigidità.

“Posso prendere qualcosa per il dolore?”

Chiedilo al tuo medico prima di prendere un antinfiammatorio, anche da banco. Dopo i settant'anni questi farmaci vanno dosati con attenzione per stomaco, reni e pressione, e vanno controllati con le altre medicine che prendi. Il medico sa cosa va bene per te. Il ghiaccio e la gamba alzata, intanto, riducono il dolore senza controindicazioni.

“Devo mettere la ginocchiera?”

Non una rigida e non una stretta. Un ginocchio gonfio ha bisogno di muoversi un poco e di drenare: una fascia stretta blocca entrambe le cose e aumenta la rigidità. Se ti dà sicurezza nel camminare, una ginocchiera elastica morbida va bene, ma toglila quando sei a riposo.

“Il peso c'entra?”

Sì, ed è la leva più potente che hai. Ogni chilo in più sul corpo diventa circa quattro chili in più sul ginocchio a ogni passo, e molti di più sulle scale. Non serve dimagrire tanto: anche quattro o cinque chili in meno cambiano in modo netto quanto il ginocchio si gonfia e fa male. Ne parliamo con il tuo medico e, se vuoi, con un nutrizionista.

3 · INDICAZIONI

Cosa fare e cosa evitare nei prossimi giorni

Principio guida: muovi il ginocchio senza caricarlo, finché il gonfiore non cala.

Da fare

- Ghiaccio avvolto in un panno, 15 minuti, 3 o 4 volte al giorno, soprattutto la sera.
- Quando sei seduta o sdraiata, tieni la gamba sollevata su un cuscino, con il ginocchio appoggiato e non nel vuoto.
- Camminate brevi in piano, 10 minuti, due volte al giorno. Meglio spesso e poco che una volta e tanto.
- Gli esercizi della sezione 4, ogni giorno, anche nei giorni in cui il ginocchio sembra meglio.
- Alzati dalla sedia aiutandoti con le braccia e spingendo con la gamba sana.
- Compila il diario della sezione 5 ogni sera: misura, dolore, rigidità.
- Fissa la visita dal medico se entro 7 giorni il gonfiore non è calato in modo evidente.

Da evitare

- Scale in discesa, accovacciarsi, inginocchiarsi, stare in piedi ferma a lungo.
- Squat, affondi, step, salti e la lezione di ginnastica di gruppo finché il ginocchio non è asciutto.
- Caldo sul ginocchio, borsa dell'acqua calda, bagni molto caldi in questa fase.
- Fasciature strette o ginocchiere rigide.
- Antinfiammatori presi di testa tua, senza sentire il medico.
- Riposo assoluto a letto o in poltrona: la gamba ferma si indebolisce e il sangue circola peggio.
- "Forzare" il ginocchio per piegarlo di più: il gonfiore limita il movimento e va rispettato.

4 · ESERCIZI

Il programma di questi giorni

Quattro esercizi da fare a casa, tutti in scarico. Il quinto si aggiunge solo quando il gonfiore è calato. Regola generale: durante l'esercizio il dolore può arrivare a 3 su 10, ma il giorno dopo il ginocchio deve essere uguale o meglio di prima.

ESERCIZIO	QUANTE VOLTE	QUANDO
Pompa delle caviglie	20 movimenti	Ogni ora, a gamba sollevata
Spinta del ginocchio sul rotolo	10 tenute da 5 secondi, 2 giri	3 volte al giorno
Scivolamento del tallone	10 ripetizioni lente, 2 giri	Mattina e sera
Camminata in piano	10 minuti	2 volte al giorno
Cyclette senza resistenza	5 minuti, poi 10	Solo da quando il gonfiore cala, 1 volta al giorno

Pompa delle caviglie

1. Sdraiata o seduta con la gamba sollevata su un cuscino.
2. Porta la punta del piede verso di te, poi spingila lontano, come per premere un pedale.
3. Movimento ampio e lento, 20 volte. Il polpaccio lavora e aiuta a drenare il ginocchio.

Va bene se
senti il polpaccio che lavora e il ginocchio non cambia.

Fermati se
il polpaccio fa male, è duro o si gonfia: questo non c'entra con il ginocchio e va riferito al medico lo stesso giorno.

Spinta del ginocchio sul rotolo

1. Sdraiata sulla schiena, un asciugamano arrotolato sotto il ginocchio gonfio.
2. Schiaccia il rotolo verso il basso tirando su la rotula: la coscia davanti si indurisce, il tallone tende a sollevarsi.
3. Tieni 5 secondi, respirando. Rilascia piano. 10 volte, poi una pausa di un minuto, poi altre 10.

È l'esercizio più importante della scheda: riaccende il muscolo che il gonfiore ha spento, senza caricare l'articolazione.

Va bene se
senti la coscia che si contrae e il ginocchio resta tranquillo o diventa più sciolto.

Fermati se
il dolore nel ginocchio sale oltre 3 su 10 o se dopo il ginocchio è più gonfio: riduci a 5 tenute e riprova il giorno dopo.

Scivolamento del tallone

1. Sdraiata sulla schiena, gambe distese, un calzino o un telo sotto il tallone perché scivoli.
2. Trascina il tallone verso il sedere, piegando il ginocchio fino a dove arriva senza dolore. Non forzare oltre.
3. Torna giù lentamente. 10 volte, pausa, altre 10. Segna ogni giorno fin dove arriva il tallone.

Va bene se
senti tensione o "pienezza" davanti al ginocchio e ogni giorno arrivi un poco più in là.

Fermati se
senti un dolore acuto, uno scatto, o il ginocchio si blocca e non si distende più: chiama il medico in giornata.

Camminata in piano

1. Scarpe con suola morbida, percorso piatto, passo normale. Non serve andare veloce.
2. 10 minuti. Se hai un bastone o puoi appoggiarti a un carrello, usali: tolgono carico al ginocchio.
3. Due uscite al giorno, non una sola lunga. Al rientro, gamba su e ghiaccio.

Va bene se
a fine passeggiata il ginocchio è uguale a prima e la sera non è più gonfio.

Fermati se
il ginocchio si gonfia di più la sera o se devi zoppicare: dimezza il tempo per due giorni.

Cyclette senza resistenza (solo quando il gonfiore cala)

1. Sella alta: a pedale in basso il ginocchio resta quasi dritto, così non si piega troppo.
2. Resistenza al minimo. Se all'inizio non riesci a fare il giro completo, dondola avanti e indietro.
3. 5 minuti i primi tre giorni, poi 10. Vale come riscaldamento prima degli altri esercizi.

Va bene se
il ginocchio dopo è più sciolto e il giorno dopo è uguale o meglio.

Fermati se
il giorno dopo c'è più gonfiore: torna agli altri quattro esercizi per tre giorni e riprova.

5 · ATTENZIONE

Quando non aspettare

Pronto soccorso lo stesso giorno

- Ginocchio caldo e rosso, con febbre, brividi o senso di malessere generale.
- Polpaccio gonfio, duro e dolente, oppure fiato corto o dolore al petto.
- Gonfiore comparso in pochi minuti dopo una caduta o un cedimento, con impossibilità ad appoggiare il peso.
- Ginocchio bloccato che non si distende più, o piede freddo, pallido, senza sensibilità.

Chiama il medico entro un giorno

- Il gonfiore aumenta per due o tre giorni nonostante riposo e ghiaccio.
- Dolore che ti sveglia di notte o che non cala con la gamba sollevata.
- Prendi anticoagulanti o fluidificanti e il ginocchio si è gonfiato.
- Febbre leggera, formicolii alla gamba, o un secondo episodio di gonfiore in poche settimane.
- Dopo 7 giorni il ginocchio è ancora gonfio come il primo giorno.

Perché la visita medica non è rinviabile, se serve

Un ginocchio gonfio in una persona con artrosi di solito è una reazione al carico. Ma lo stesso gonfiore può essere prodotto da un'infezione, da cristalli (gotta o pseudogotta) o da un piccolo sanguinamento, e questi casi si distinguono solo con una visita e, a volte, con un prelievo del liquido. Il medico può anche prescrivere il farmaco giusto per te e, se il liquido è tanto, toglierlo con un ago, cosa che dà sollievo immediato. Nessuno di questi passaggi può farlo lo studio di kinesiologia.

Misura di riferimento presa in studio

Circonferenza del ginocchio al centro della rotula, a gamba distesa e rilassata, con metro da sarta. Usa lo stesso punto ogni sera.

GINOCCHIO GONFIO	GINOCCHIO SANO	DIFFERENZA	TALLONE DAL SEDERE
_____ cm	_____ cm	_____ cm	_____ cm

Obiettivo della prima settimana: differenza ridotta almeno della metà.

Diario di controllo

Ogni sera, prima del ghiaccio. Dolore da 0 (nessuno) a 10 (il peggiore immaginabile). Rigidità: minuti che servono al mattino per sciogliere il ginocchio.

GIORNO	CIRCONFERENZA	DOLORE A RIPOSO	DOLORE SCALE	RIGIDITÀ MATTINO	NOTE
Giorno 1					
Giorno 2					
Giorno 3					
Giorno 4					
Giorno 5					
Giorno 6					
Giorno 7					

Porta il diario al prossimo appuntamento, o al medico se lo vedi prima.

6 · COSA ASPETTARSI

I tempi, senza fretta

Settimana 1 e 2

Sgonfiare

Ghiaccio, gamba su, esercizi in scarico. Il gonfiore cala di solito in modo visibile entro 7-10 giorni. Il ginocchio può restare un poco rigido al mattino: è normale.

Settimana 3 a 6

Riprendere il carico

Cyclette, esercizi da seduta con elastico, scale in salita. In studio rimettiamo il carico un gradino alla volta: metà di prima, poi un poco di più ogni settimana se il giorno dopo il ginocchio è tranquillo.

Dal secondo mese

Rinforzo e peso

Programma di forza per coscia e glutei, due o tre volte a settimana, e rientro in palestra con esercizi scelti insieme. Il lavoro sul peso corporeo va avanti in parallelo: è la cosa che protegge di più il ginocchio negli anni.

Un ginocchio con artrosi può gonfiarsi ancora in futuro, soprattutto dopo una giornata pesante. Non è un fallimento: è il segnale che la dose è stata troppa, e ora sai come rispondere. Con il muscolo più forte e qualche chilo in meno, gli episodi diventano più rari e più brevi.

Kinesiologia Studio · Dott. Davide Scuderi · Modena

Telefono e WhatsApp +39 348 151 4382 · infokinesiologia@gmail.com

Questa scheda non sostituisce la visita medica.