REGENERON – 2256 (Carpeta de color azul muy claro)

En este ensayo hay 4 pacientes:

1./ CARMEN GUTIERREZ GARCIA Hª 317013.

2./ IÑIGO NORIEGA GOMEZ Hª 513003.

3./ FRANCISCO JAVIER BUERGO PARADA Hª 112349.

Tiene PICC, cuando llega a las 8 horas sube primero a revisar el PICC, al bajar le hacemos todo.

Los tubos de PK, tanto pre-dosis como post-dosis no pueden sacarse del PICC, hay que pincharlos.

4./ AMERICA PLAZA CASTILLA Hª 778675 .

- Estan con **LINVOSELTAMAB 200 mg iv**. Las 4 primeras dosis de escalada lo realizan ingresados (en UCI y planta), a partir del Ciclo1 Día 8 ya es ambulatorio. La infusión dura 60 minutos, y posteriormente ya pasa a 30 minutos.

- Anotar peso y constantes en la plantilla y en el selene.

- Pinchar la analítica.

- Analítica orina 24 horas: (ver anexo 1) **sólo** si le toca orina de 24h para enviar muestras fuera, a laboratorio central.

Si hay que recoger muestras de orina de 24 h para enviar a **Laboratorio Central**, antes de sacar la orina, **anotar el volumen total en un post-it**. Una vez anotado el volumen total se extrae la orina (mezclar primero meneando el bote y luego extraer la orina mediante unos tubos de vacio blancos), después pasar esa orina a los tubos que hay que enviar fuera, (dejando unos 2 cm sin llenar ya que se van a congelar), y luego enviar el contenedor de orina-24 horas a **Laboratorio Local** para su análisis.

- Si pone tto pasar **post-it al H. Día**.(hoja para que nos anoten horas de inicio y fin de la infusión de LINVOSELTAMAB, y para que nos avisen para tomar ctes antes de empezar la infusión y al terminar. En los días que dura 60 minutos también hay que tomar ctes a los 30 min de inicio infusión.

- Si le toca sacar **Pk post-dosis** (los coordinadores nos avisan si hay tubos), hay que pincharla inmediatamente que termina la infusión y en el brazo contrio al brazo de infusión.