MONUMENTAL-6 (Carpeta de color verde oscuro)

En este ensayo hay 2 pacientes:

1./ CLAUDIO PONCE ALONSO Hª 690463.

A Claudio le tocó el brazo (Talquetamab + Teclistamab), pero el Talquetamab no lo tolera así que no lo pone, está suspendido, sólo recibe Teclistamab en el H. Día. Como el Teclistamab sólo se pone en el día 1 de cada ciclo, entonces viene a tratamiento cada 4 semanas.

- Le toca **Cx D1**. En el H. Día pone Teclistamab sc.

- Anotar peso y **constantes en la plantilla** y en el selene.

- Pinchar la analítica.

- Analítica orina 24 horas: (ver anexo 1), **sólo** si le toca orina de 24h para enviar muestras fuera, a laboratorio central.

Si hay que recoger muestras de orina de 24 h para enviar a **Laboratorio Central**, antes de sacar la orina, **anotar el volumen total en un post-it**. Una vez anotado el volumen total se extrae la orina (mezclar primero meneando el bote y luego extraer la orina mediante unos tubos de vacio blancos), después pasar esa orina a los tubos que hay que enviar fuera, (dejando unos 2 cm sin llenar ya que se van a congelar), y luego enviar el contenedor de orina-24 horas a **Laboratorio Local** para su análisis.

- Si pone tto pasar **post-it al H. Día** para que nos avisen antes de poner el tratamiento para que le tomemos ctes y de paso decirles lugar de inyección.

- En el H. Día tiene:

  - **premedicación.**

  - **esperar 1 hora**: después se pone el Teclistamab sc (tomar ctes previas y anotar en el selene, nos avisan del hospital de Día antes de pincharlo.

  - **esperar 30 minutos**: después de poner el Teclistamab, tiene que **esperar 30 minutos**, tomarle **las ctes** y si todo está bien es cuando puede marcharse para casa.

2/ ROSA MARIA FERNANDEZ BLANCO Hª 349667

A Rosa le tocó el brazo (Talquetamab + Teclistamab). Las visitas son cada 15 días.

  - En el **día 1** de cada ciclo le tocaría poner Talquetamab + Teclistamab.

  - En el **día 15** de cada ciclo le tocaría poner sólo Talquetamab.

- Anotar peso y constantes en la plantilla y en el selene.

- Sacar analítica: Tiene reservorio en lado izquierdo. Se puede pinchar analítica en flexura derecha si es preciso, el reservorio en ocasiones no refluye.

- Analítica orina 24 horas: (ver anexo 1), **sólo** si le toca orina de 24h para enviar muestras fuera, a laboratorio central.

Si hay que recoger muestras de orina de 24 h para enviar a **Laboratorio Central**, antes de sacar la orina, **anotar el volumen total en un post-it**. Una vez anotado el volumen total se extrae la orina (mezclar primero meneando el bote y luego extraer la orina mediante unos tubos de vacio blancos), después pasar esa orina a los tubos que hay que enviar fuera, (dejando unos 2 cm sin llenar ya que se van a congelar), y luego enviar el contenedor de orina-24 horas a **Laboratorio Local** para su análisis.

- Si pone tto pasar **post-it al H. Día** para que nos avisen antes de poner el tratamiento para que le tomemos ctes y de paso decirles lugar de inyección.

- En el H. Día tiene:

1. / Si le toca poner Talquetamab + Teclistamab:

- **premedicación:** habitualmente ya no la recibe.

- **esperar 1 hora**: si no recibe la premedicación entonces no es necesario esperar 1 hora. Se pone siempre primero el **Talquetamab sc** (tomar ctes previas y anotar en el selene, nos avisan del hospital de Día antes de pincharlo. El Talquetamab se pincha en el abdomen mejor.

- **esperar 30 minutos** y luego poner el **Teclistamab sc**. (tomar ctes previas y anotar en el selene, (nos avisan del hospital de día cuando van a pincharlo). El Teclistamab se pincha en los brazos mejor..

- **esperar 30 minutos**: después de poner el Teclistamab (o si sólo le tocase el Talquetamab), tiene que esperar 30 minutos , tomarle las **ctes** y si todo está bien es cuando puede marcharse para casa.

2. / Si le toca poner sólo Talquetamab:

- **premedicación:** habitualmente ya no la recibe.

- **esperar 1 hora**: si no recibe la premedicación entonces no es necesario esperar 1 hora. Se pone el **Talquetamab sc** (tomar ctes previas y anotar en el selene, nos avisan del hospital de Día antes de pincharlo. El Talquetamab se pincha en el abdomen mejor.

- **esperar 30 minutos**: después de poner el Talquetamab, tiene que esperar 30 minutos , tomarle las **ctes** y si todo está bien es cuando puede marcharse para casa.