

Probabilidad

David García Curbelo

Problema P16 Propuesto

El vector aleatorio (X, Y) se distribuye según una uniforme sobre el recinto:

$$R = \{(x, y); 0 < x < y < 1\}$$

Calcular:

- Su función generatriz de momentos conjunta.
- Las distribuciones generatrices de momentos marginales.
- La covarianza de X e Y .

Función generatriz de momentos conjunta Calculemos primero su función de densidad, la cual viene dada por

$$f_{(X,Y)}(x, y) = 2 \cdot 1_{[R]}(x, y) = 2; \quad 0 < x < y < 1$$

Sabemos que la función generatriz de momentos conjuntos se calcula mediante

$$M_{X,Y}(t_1, t_2) = E[\exp(t_1 X + t_2 Y)]$$

Como se trata de vector aleatorio continuo, el calculo de la esperanza se calcula de la siguiente forma

$$\begin{aligned} E[\exp(t_1 X + t_2 Y)] &= 2 \int_0^1 \int_x^1 \exp(t_1 x + t_2 y) dy dx = 2 \int_0^1 e^{t_1 x} \int_x^1 e^{t_2 y} dy dx = \\ &= \frac{2}{t_2} \int_0^1 e^{t_1 x} [e^{t_2} - e^{t_2 x}] dx = \frac{2}{t_2} \int_0^1 e^{t_1 x + t_2} - e^{x(t_1 + t_2)} dx \\ \Rightarrow M_{X,Y}(t_1, t_2) &= 2 \frac{(t_1 + t_2)e^{t_2}[e^{t_1} - 1] + t_1[1 - e^{t_1 + t_2}]}{t_1 t_2 (t_1 + t_2)}, \quad \forall (t_1, t_2) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

Usando el desarrollo de Taylor visto en clase, llegamos a la expresión

$$M_{(X,Y)}(t_1, t_2) = 2 \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t_1^{k-1}}{k!} + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{t_1^{l-1} t_2^k}{(k+1)l!} - \sum_{u=1}^{k-1} \frac{\binom{k-1}{u} t_1^{k-1-u} t_2^{u-1}}{k!} \right]$$

Distribuciones generatrices de momentos marginales

Calculamos primero la marginal de X . Dicha marginal viene dada por

$$M_X(t_1) = M_{X,Y}(t_1, 0), \forall t_1 \in \mathbb{R}.$$

Notemos que la sustitución $t_2 = 0$ en $M_{X,Y}(t_1, t_2)$ puede producir una indeterminación, por ello tengamos en cuenta que la función generatriz de momentos es derivable y, por tanto, continua. Así, obtenemos

$$\begin{aligned} M_X(t_1) &= \lim_{t_2 \rightarrow 0} M_{X,Y}(t_1, t_2) = \lim_{t_2 \rightarrow 0} 2 \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t_1^{k-1}}{k!} + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{t_1^{l-1} t_2^k}{(k+1)! l!} - \sum_{u=1}^{k-1} \frac{\binom{k-1}{u} t_1^{k-1-u} t_2^{u-1}}{k!} \right] = \\ &= 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t_1^{k-1}}{k!} = \frac{2}{t_1} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t_1^k}{k!} - 1 \right] = \frac{2}{t_1} [e^{t_1} - 1] \quad \forall t_1 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Procedemos al cálculo de la marginal de Y mediante el mismo proceso. Dicha marginal viene dada por

$$M_Y(t_2) = M_{X,Y}(0, t_2), \forall t_2 \in \mathbb{R}.$$

Observamos que en todos los términos de la función $M_{X,Y}(t_1, t_2)$ aparece el término t_1 , por tanto es fácil ver que

$$\begin{aligned} M_Y(t_2) &= \lim_{t_1 \rightarrow 0} M_{X,Y}(t_1, t_2) = \\ &= \lim_{t_1 \rightarrow 0} 2 \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t_1^{k-1}}{k!} + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{t_1^{l-1} t_2^k}{(k+1)! l!} - \sum_{u=1}^{k-1} \frac{\binom{k-1}{u} t_1^{k-1-u} t_2^{u-1}}{k!} \right] = 0, \quad \forall t_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Covarianza de X e Y

La covarianza de dos variables aleatorias viene dado por

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Recordamos que la esperanza se define como

$$E[g(x, y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{(X, Y)}(x, y) dy dx$$

$$\Rightarrow E[XY] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} 2xy dy dx = \int_0^1 \int_x^1 2xy dy dx = \int_0^1 x - x^3 dx = \frac{1}{4}$$

$$E[X] = \int_0^1 \int_x^1 2x dy dx = \int_0^1 2x - 2x^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$E[Y] = \int_0^1 \int_x^1 2y dy dx = \int_0^1 1 - x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow Cov(X, Y) = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36}$$