

41. Senyalar la resposta incorrecta respecte al plexe braquial

Señalar la respuesta incorrecta respecto al plexo braquial

a) El nervi supraescapular neix del tronc inferior

El nervio supraescapular nace del tronco inferior

b) El nervi subescapular superior neix del fascicle posterior

El nervio subescapular superior nace del fascículo posterior

c) El nervi toràcic llarg innerva el múscul serrat anterior

El nervio torácico largo inerva el músculo serrato anterior

d) El tronc inferior es forma de la fusió dels nervis espinals C8 i T1

El tronco inferior se forma de la fusión de los nervios espinales C8 i T1

42. Quin dels següents lligaments NO forma part dels lligaments de reforç del turmell?

¿Cuál de los siguientes ligamentos NO forma parte de los ligamentos de refuerzo del tobillo?

a) Tibionavicular

b) Tibiocalcani

c) Peroneoastragalí anterior

d) Bifurcat

43. Dels següents lligaments, quin es troba més a prop del canal vertebral?

De los siguientes ligamentos, ¿cuál se encuentra más cerca del canal vertebral?

a) Lligament cruciforme

Ligamento cruciforme

b) Lligament alar

Ligamento alar

c) Lligament transvers de l'atles

Ligamento transverso del atlas

d) Membrana tectòria

Membrana tectoria

10. Un tall axial es refereix a una secció en el pla

Un corte axial se refiere a una sección en el plano

a) Perpendicular al terra

Perpendicular al suelo

b) Perpendicular a l'eix llarg del segment anatòmic en qüestió

Perpendicular al eje largo del segmento anatómico en cuestión

c) Depèn de la posició de l'extremitat al moment de seccionar-la

Depende de la posición de la extremidad en el momento de seccionarla

d) Frontal

11. Quin dels següents músculs està innervat pel plexe cervical?

¿Cuál de los siguientes músculos está innervado por el plexo cervical?

a) M. Estilohioidial

M. Estilohioideo

b) M. Milohioidial

M. Milohioideo

c) M. Digàstic

M. Digástrico

d) M. Esternotiroidal

M. Esternotiroideo

12. Quina de les següents regions està innervada pel N.safè?

¿Cuál de las siguientes regiones está innervada por el N.safeno?

a) Cara posterolateral de la cama

Cara posterolateral de la pierna

b) Cara posteromedial de la cama

Cara posteromedial de la pierna

c) Cara anterior de la cuixa

Cara anterior del muslo

d) Vora medial del dit gros del peu

Borde medial del dedo gordo del pie

34. Senyalar la resposta incorrecta

Señalar la respuesta incorrecta

a) Les escàpules es classifiquen com a ossos plans

Las escápulas se clasifican como huesos planos

b) El teixit ossi esponjós o trabecular és molt abundant en la diàfisi dels ossos llargs

El tejido óseo esponjoso o trabecular es muy abundante en la diáfisis de los huesos largos

c) El parietal és un os amb ossificació intramembranosa

El parietal es un hueso con osificación intramembranosa

d) Les fisis fèrtils de l'extremitat inferior es localitzen a prop del genoll

Las fisis fértiles de la extremidad inferior se localizan cerca de la rodilla

35. Quina de les següents artèries NO és branca de l'A.iliaca interna?

¿Cuál de las siguientes arterias NO es rama de la A.iliaca interna?

a) Glútia superior

b) Obturadora

c) Iliolumbar

d) Circumflexa iliaca profunda

36. Quin dels músculs següents és rotador medial o intern de l'articulació glenohumeral?

¿Cuál de los músculos siguientes es rotador medial o interno de la articulación glenohumeral?

a) Pectoral major

Pectoral mayor

b) Serrat anterior

Serrato anterior

c) Rodó menor

Redondo menor

d) Infraespinós

Infraespinoso

39. Senyalar la resposta incorrecta

Señalar la respuesta incorrecta

- a) En el colze, l'artèria braquial es situa lateralment al nervi medià

En el codo, la arteria braquial se sitúa lateralmente al nervio mediano

- b) En el canal del pols l'artèria radial es localitza entre els tendons dels músculs braquioradial i extensor radial llarg del carp

En el canal del pulso la arteria radial se localiza entre los tendones de los músculos braquiorradial y extensor radial largo del carpo

- c) L'artèria cubital passa per l'arc fibrós del múscul flexor superficial dels dits junt amb el nervi medià

La arteria cubital pasa por el arco fibroso del músculo flexor superficial de los dedos junto con el nervio mediano

- d) L'arc palmar superficial de la mà està format per la branca palmar superficial de l'artèria radial i per l'artèria cubital

El arco palmar superficial de la mano está formado por la rama palmar superficial de la arteria radial y por la arteria cubital

40. Quin moviment és conseqüència de la contracció simultània dels músculs oblic intern i extern drets?

¿Qué movimiento es consecuencia de la contracción simultánea de los músculos oblicuo interno y externo derechos?

- a) Rotació del tronc cap a la dreta.

Rotación del tronco hacia la derecha.

- b) Rotació del tronc cap a l'esquerra.

Rotación del tronco hacia la izquierda.

- c) Flexió lateral del tronc cap a l'esquerra.

Flexión lateral del tronco hacia la izquierda.

- d) Flexió lateral del tronc cap a la dreta.

Flexión lateral del tronco hacia la derecha.

26. El túnel del carp

El túnel del carpo

a) És un espai únic que conté els tendons flexors dels dits i nervi mediana únicament

Es un espacio único conteniendo a los tendones flexores de los dedos y nervio mediano únicamente

b) El seu contingut inclou el nervi cubital en un subcompartiment junt als tendons flexors superficials dels dits

Su contenido incluye al nervio cubital en un subcompartimento junto a los tendones flexores superficiales de los dedos

c) Està subdividit en dos subcompartiments i inclou al nervi mediana, tendons flexors superficials i profunds i tendó del flexor llarg del polze en un subcompartiment i el tendó del flexor radial del carp en un altre subcompartiment

Está subdividido en dos subcompartimentos e incluye al nervio mediano, tendones flexores superficiales y profundos y el tendón del flexor largo del pulgar en un subcompartimento y el tendón del flexor radial del carpo en otro subcompartimento

d) El seu contingut inclou únicament els tendons del múscul flexor superficial, flexor profund i flexor llarg del polze

Su contenido incluye únicamente a los tendones del músculo flexor superficial, flexor profundo y flexor largo del pulgar

27. Quina de les següents estructures travessa el diafragma per un orifici muscular contràctil?

¿Cuál de las siguientes estructuras atraviesa el diafragma por un orificio muscular contráctil?

a) V. Cava inferior

V. Cava inferior

b) Conducte Toràcic

Conducto Torácico

c) N. Vague

N. Vago

d) A. Aorta descendent

A. Aorta descendente

7. L'acció del múscul dorsal ample és

La acción del músculo dorsal ancho es

a) Antagonista del múscul rodó major

Antagonista del músculo redondo mayor

b) Potent adductor del braç, rotador intern del braç i extensor del braç

Potente adductor del brazo, rotador interno del brazo y extensor del brazo

c) Amb el braç aixecat ajuda de forma específica a sostenir pesos sobre ell

Con el brazo elevado ayuda de forma específica a sostener pesos sobre él

d) Adductor feble del braç, rotació interna i flexió

Adductor débil del brazo, rotación interna y flexión

8. Quin dels músculs següents presenta una posició més profunda a l'avantbraç?

¿Cuál de los músculos siguientes presenta una posición más profunda en el antebrazo?

a) Palmar llarg

Palmar largo

b) Flexor llarg del polze

Flexor largo del pulgar

c) Pronador quadrat

Pronador cuadrado

d) Extensor del dit petit

Extensor del quinto dedo

9. On s'origina el cap llarg del múscul bíceps braquial?

¿Dónde se origina la cabeza larga del músculo bíceps braquial?

a) Apòfisi coracoide de l'escàpula

Apófisis coracoides de la escápula

b) Tubercle supraglenoïdal de l'escàpula

Tubérculo supraglenoideo de la escápula

c) Tubercle infraglenoïdal de l'escàpula

Tubérculo infraglenoideo de la escápula

d) Acromi

Acromion

24. El foramen oval de la càpsula anterior de l'espatlla es troba entre

El foramen oval de la càpsula anterior del hombro se localiza entre

a) Lligament glenohumeral superior i tendó de la porció llarga del bíceps

Ligamento glenohumeral superior y tendón de la porción larga del bíceps

b) Entre el lligament glenohumeral mitjà i l'inferior

Entre el ligamento glenohumeral medio y el inferior

c) Entre les porcions del lligament glenohumeral inferior

Entre las porciones del ligamento glenohumeral inferior

d) Entre el lligament glenohumeral superior i mitjà

Entre el ligamento glenohumeral superior y medio

25. Senyalar la resposta incorrecta respecte a l'articulació del colze

Señalar la respuesta incorrecta respecto a la articulación del codo

a) El lligament anul·lar serveix per estabilitzar el cap del radi

El ligamento anular sirve para estabilizar la cabeza del radio

b) El lligament quadrat s'inserta en l'epicòndil lateral de l'húmer

El ligamento cuadrado se inserta en el epicóndilo lateral del húmero

c) El principal reforç anterior és el múscul braquial

El principal refuerzo anterior es el músculo braquial

d) L'articulació humeroradial participa en els moviments de flexió-extensió del colze

La articulación humerorradial participa en los movimientos de flexión-extensión del codo

19. Senyalar la resposta incorrecta

Señalar la respuesta incorrecta

a) Els tendons es caracteritzen per la seva elevada elasticitat

Los tendones se caracterizan por su elevada elasticidad

b) Les bosses sinovials serveixen per reduir el fregament entre un ventre muscular o un tendó i una superfície dura

Las bolsas sinoviales sirven para reducir el roce entre un vientre muscular o un tendón y una superficie dura

c) El ventre o cos muscular és la porció contràctil del múscul

El vientre o cuerpo muscular es la porción contráctil del músculo

d) Els músculs digàstrics es caracteritzen per presentar dos ventres separats per un tendó intermig

Los músculos digástricos se caracterizan por presentar dos vientres separados por un tendón intermedio

20. Senyala l'estructura que NO es troba dins la beina del múscul recte de l'abdomen.

Señala la estructura que NO se encuentra dentro de la vaina del músculo recto del abdomen.

a) Artèria epigàstrica inferior

Arteria epigástrica inferior

b) Múscul piramidal

Músculo piramidal

c) Artèria circumflexa ilíaca profunda.

Arteria circunfleja ilíaca profunda.

d) Artèria epigàstrica superior

Arteria epigástrica superior

21. Quin dels següents nervis innerva la cara dorsal medial del 3er dit del peu?

¿Cuál de los siguientes nervios inerva la cara dorsal medial del 3er dedo del pie?

a) Peroneal superficial

Peroneo superficial

b) Safè

Safeno

c) Sural

d) Peroneal profund

Peroneo profundo

47. Quina de les següents artèries travessa la membrana vastoadductora?

¿Cuál de las siguientes arterias atraviesa la membrana vastoadductora?

a) Descendent del genoll

Descendente de la rodilla

b) Sural

c) Recurrent tibial anterior

d) Superomedial del genoll

Superomedial de la rodilla

48. Quin nervi innerva el M.gluti menor?

¿Qué nervio inerva el M.glúteo menor?

a) Gluti superior

b) Obturador

c) Gluti inferior

d) Ciàtic

49. Quin dels següents músculs NO està innervat pel N.plantar lateral?

¿Cuál de los siguientes músculos NO está innervado por el N.plantar lateral?

a) Abductor del dit petit

Abductor del 5º dedo

b) Adductor del dit gros

Adductor del dedo gordo

c) Flexor curt dels dits

Flexor corto de los dedos

d) Flexor curt del dit gros

Flexor corto del dedo gordo

28. De les següents estructures, quina és un dels límits del triangle lumbar?

De las siguientes estructuras, ¿cuál es uno de los límites del triángulo lumbar?

a) M. Oblic extern de l'abdomen

M. Oblicuo externo del abdomen

b) M. Serrat posteroinferior

M. Serrato posteroinferior

c) M. Transvers de l'abdomen

M. Transverso del abdomen

d) Costella XII

Costilla XII

29. Quin dels següents elements NO surt pel forat infrapiriforme?

¿Cuál de los siguientes elementos NO sale por el agujero infrapiriforme?

a) N.gluti superior

b) A.glútia inferior

c) N.ciàtic

d) N.cutani femoral posterior

30. Senyalar la resposta incorrecta

Señalar la respuesta incorrecta

a) La base del segon metacarpí s'articula amb l'os trapezoide

La base del segundo metacarpiano se articula con el hueso trapezoide

b) Les articulacions interfalàngiques presenten un sol eix de moviment

Las articulaciones interfalángicas presentan un solo eje de movimiento

c) El lligament metacarpí transvers profund uneix les bases dels quatre últims metacarpians

El ligamento metacarpiano transvers profundo une las bases de los cuatro últimos metacarpianos

d) L'articulació carpometacarpiana del polze o trapezimetacarpiana és del tipus sella de muntar

La articulación carpometacarpiana del pulgar o trapeziometacarpiana es de tipo silla de montar

37. Senyala la resposta incorrecta.

Señala la respuesta incorrecta.

a) Les artèries intercostals anteriors deriven de l'artèria toràcica interna.

Las arterias intercostales anteriores derivan de la arteria torácica interna.

b) Les artèries intercostals discorren pels espais intercostals entre els músculs intercostals interns i íntims.

Las arterias intercostales discurren por los espacios intercostales entre los músculos intercostales internos e íntimos.

c) Les artèries intercostals posteriors deriven de l'aorta ascendent i l'artèria intercostal suprema.

Las arterias intercostales posteriores derivan de la aorta ascendente y la arteria intercostal suprema.

d) Les artèries intercostals posteriors irriguen, juntament amb altres artèries, al múscul erector de la columna.

Las arterias intercostales posteriores irrigan, junto con otras arterias, al músculo erector de la columna.

38. Quin múscul NO està innervat pel nervi cubital?

¿Qué músculo NO está innervado por el nervio cubital?

a) Palmar curt

Palmar corto

b) Segon lumbrical

Segundo lumbrical

c) Flexor profund dels dits

Flexor profundo de los dedos

d) Primer interossi dorsal

Primer interóseo dorsal

50. Quin dels següents nervis discorre anterior al múscul escalè anterior?

¿Cuál de los siguientes nervios discurre anterior al músculo escaleno anterior?

a) Toràcic llarg

Torácico largo

b) Accessori

Accesorio

c) Frènic

Frénico

d) Dorsal de la escàpula

Dorsal de l'escápula

51. Quin pla divideix l'avantbraç en una porció radial i una porció cubital?

¿Qué plano divide el antebrazo en una porción radial y una porción cubital?

a) Coronal

b) Sagital

c) Axial

d) Transversal

4. Quin dels següents nervis porta fibres d'L2, L3 i L4?

¿Cuál de los siguientes nervios lleva fibras de L2, L3 y L4?

- a) Cutani femoral lateral
- b) Genitofemoral
- c) Iliohipogàstric
- d) Obturador

5. Quina artèria NO és branca de l'A. Caròtida externa?

¿Qué arteria NO es rama de la A. Carótida externa?

- a) A. Faringica ascendent
- A. Faringea ascendente
- b) A. Tiroidal inferior
- A. Tiroidea inferior
- c) A. Auricular posterior
- A. auricular posterior
- d) A. Occipital
- A. Occipital

6. El nervi radial innerva tots els següents músculs excepte

El nervio radial inerva a todos los siguientes músculos excepto

- a) Dorsal ample
- Dorsal ancho
- b) Tríceps braquial
- c) Extensor radial curt del carp
- Extensor radial corto del carpo
- d) Extensor llarg del polze
- Extensor largo del pulgar

31. (d)

32. (c)

33. (c)

34. (b)

35. (d)

36. (a)

37. (c)

38. (b)

39. (b)

40. (d)

41. (a)

42. (d)

43. (d)

44. (c)

45. (a)

46. (c)

47. (a)

48. (a)

49. (c)

50. (c)

51. (b)

16. Senyala la resposta correcta sobre les articulacions de la columna vertebral.

Señala la respuesta correcta sobre las articulaciones de la columna vertebral.

a) El lligament longitudinal posterior es situa a nivell dels arcs vertebrals.

El ligamento longitudinal posterior se sitúa a nivel de los arcos vertebrales.

b) Les articulacions zigapofisàries són del tipus sínfisi.

Las articulaciones cigapofisarias son del tipo sínfisis.

c) Els lligaments interespinosos s'extenen des del lligament groc fins al lligament supraespinós.

Los ligamentos interespinosos se extienden desde el ligamento amarillo hasta el ligamento supraespinoso.

d) El disc intervertebral està format per un anell extern gelatinós i un nucli fibrós resistent.

El disco intervertebral está formado por un anillo externo gelatinoso y un núcleo fibroso resistente.

17. De quina estructura embrionària deriva l'esquelet de l'extremitat superior?

¿De qué estructura embrionaria deriva el esqueleto de la extremidad superior?

a) Mesoderm paraaxial

Mesodermo paraaxial

b) Esclerotom

Esclerotomo

c) Somatopleura

d) Esplacnopleura

18. Quin tipus d'articulació sinovial presenta un sol eix de moviment?

¿Qué tipo de articulación sinovial presenta un solo eje de movimiento?

a) Condília

Condílea

b) Trocoide

c) Enartrosi

Enartrosis

d) Sella de muntar

En silla de montar

ANATOMIA APARELL LOCOMOTOR

NOM i COGNOMS:

TIPUS 2

1. Marca la respota A

Marca la respuesta A

2. Els límits del canal bicipital intern són

Los límites del canal bicipital interno son

a) Tendó del bíceps, flexor radial del carp i braquioradial

Tendón del bíceps, flexor radial del carpo y braquiorradial

b) Tendó del bíceps, braquioradial i pronador rodó

Tendón del bíceps, braquiorradial y pronador redondo

c) Tendó del bíceps, pronador rodó i al fons el múscul braquial

Tendón del bíceps, pronador redondo y en el fondo el músculo braquial

d) Tendó del bíceps, flexor cubital del carp i en el fons el múscul braquioradial

Tendón del bíceps, flexor cubital del carpo y en el fondo el músculo braquiorradial

3. El límit entre l'artèria axil·lar i braquial ve determinat per

El límite entre la arteria axilar y braquial viene determinado por

a) La seva relació amb la vora inferior del múscul pectoral major

Su relación con el borde inferior del músculo pectoral mayor

b) La seva relació amb el múscul coracobraquial

Su relación con el músculo coracobraquial

c) La seva relació amb l'artèria braquial profunda

Su relación con la arteria braquial profunda

d) La seva relació amb el tendó del pectoral menor

Su relación con el tendón del pectoral menor

31. Quin múscul mastegador s'insereix en el coll de la mandíbula?
¿Qué músculo masticador se inserta en el cuello de la mandíbula?

a) Temporal

b) Masseter

Masetero

c) Pterigoïdal medial

Pterigoideo medial

d) Pterigoïdal lateral

Pterigoideo lateral

32. Quin múscul no es troba afectat en una compressió del nervi medià en el hiat del pronador rodó?

¿Qué músculo no se encuentra afectado en una compresión del nervio mediano en el hiato del pronador redondo?

a) Flexor superficial dels dits

Flexor superficial de los dedos

b) Oponent del polze

Oponente del pulgar

c) Braquioradial

Braquiorradial

d) Flexor llarg del polze

Flexor largo del pulgar

33. Quin múscul interossi s'insereix en el costat radial de la base de la falange proximal del tercer dit?

¿Qué músculo interóseo se inserta en el lado radial de la base de la falange proximal del tercer dedo?

a) Segon palmar

Segundo palmar

b) Primer palmar

c) Segon dorsal

Segundo dorsal

d) Tercer dorsal

44. Quin nervi acompanya la V.safena menor en el seu trajecte?

¿Qué nervio acompaña a la V.safena menor en su trayecto?

a) Peroneal superficial

b) Safè

Safeno

c) Sural

d) Femoral

45. Quin dels següents músculs NO està innervat pels nervis intercostals?

¿Cuál de los siguientes músculos NO está innervado por los nervios intercostales?

a) M. Elevador de les costelles

M. Elevador de las costillas

b) M. Transvers del tòrax

M. Transverso del tórax

c) M. Serrat posterosuperior

M. Serrato posterosuperior

d) M. Subcostal

M. Subcostal

46. Senyala la resposta incorrecta sobre el conducte inguinal.

Señala la respuesta incorrecta sobre el conducto inguinal.

a) El lligament interfoveolar és un reforç de la paret posterior del conducte inguinal.

El ligamento interfoveolar es un refuerzo de la pared posterior del conducto inguinal.

b) El nervi ilioinguinal discorre per l'interior del conducte inguinal.

El nervio ilioinguinal discurre por el interior del conducto inguinal.

c) El lligament reflex es troba en l'anell inguinal profund.

El ligamento reflejo se encuentra en el anillo inguinal profundo.

d) La porció lliure dels músculs oblic intern i transvers de l'abdomen constitueix el sostre del conducte inguinal.

La porción libre de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen constituye el techo del conducto inguinal.

22. Senyalar la resposta incorrecta

Señalar la respuesta incorrecta

a) Els lligaments trapezoide i conoide estableixen l'articulació acromioclavicular

Los ligamentos trapezoide y conoide estabilizan la articulación acromioclavicular

b) L'articulació esternoclavicular presenta un fibrocartílag de tipus disc articular

La articulación esternoclavicular presenta un fibrocartilago de tipo disco articular

c) El foramen oval (de Weitbrecht) permet comunicar la cavitat de l'articulació glenohumeral amb la bossa subtendinosa del múscul subescapular

El foramen oval (de Weitbrecht) permite comunicar la cavidad de la articulación glenohumeral con la bolsa subtendinosa del músculo subescapular

d) Els principals elements estabilitzadors de l'articulació glenohumeral es localitzen en la regió posterior de la càpsula articular

Los principales elementos estabilizadores de la articulación glenohumeral se localizan en la región posterior de la cápsula articular

23. Quina de les següents estructures és la responsable de la formació del plec umbilical lateral?

¿Cuál de las siguientes estructuras es la responsable de la formación del pliegue umbilical lateral?

a) Vasos epigàstic inferiors

Vasos epigástricos inferiores

b) Artèria umbilical

Arteria umbilical

c) Artèria vesical superior

Arteria vesical superior

d) Uraco

Uraco

13. Quina branca de l'artèria axil·lar neix per darrere del múscul pectoral menor?

¿Qué rama de la arteria axilar nace por detrás del músculo pectoral menor?

a) A. toràtica lateral

A. torácica lateral

b) A. toràtica superior

A. torácica superior

c) A. subescapular

d) A. circumflexa humeral anterior

A. circunfleja humeral anterior

14. Quin dels següents músculs NO participa en la constitució de la pota d'oca superficial?

¿Cuál de los siguientes músculos NO participa en la constitución de la pata de ganso superficial?

a) Gràcil

b) Semimembranós

c) Semitendinos

d) Sartori

15. Quan ens referim a la corba supinadora, de quin element ossi estem parlant?

Quando nos referimos a la curva supinadora, ¿de qué elemento óseo estamos hablando?

a) Epífisi distal de l'húmer

Epíffisis distal del húmero

b) Diàfisi del cúbit

Diáfisis del cúbito

c) Diàfisi del radi

Diáfisis del radio

d) Radi distal

Radio distal