

PROVA DE SÍNTESI ANATOMIA FUNCIONAL I EMBRIOLOGIA DE L'APARELL LOCOMOTOR

1. Los discos intervertebrales son articulaciones:
 - a. Sinoviales
 - b. Fibrosas
 - c. Sin movimiento alguno
 - d. Sínfisis
2. La articulación carpometacarpiana del dedo pulgar es un ejemplo de:
 - a. Gínglimo o tróclea
 - b. Elipsoidea o cóndilo
 - c. Silla de montar
 - d. Articulación esférica o enatrosis
3. Cuál es la estructura que une las láminas de las vértebras
 - a. Ligamento intertransverso
 - b. Ligamento amarillo
 - c. Ligamento longitudinal posterior
 - d. Ligamento longitudinal anterior
4. Cual de las siguientes aseveraciones es cierta:
 - a. El ligamento del vértice del diente conecta el diente del axis al arca anterior del atlas
 - b. El ligamento cruciforme se sitúa anterior al ligamento del vértice del diente
 - c. El ligamento transversal del atlas constituye por si mismo el ligamento cruciforme
 - d. Los ligamentos alares conectan el diente del axis con el agujero magno
5. Respecto al diafragma, que elemento discurre posterior al ligamento arqueado medial:
 - a. Músculo psoas mayor
 - b. Vena cava inferior
 - c. Músculo cuadrado lumbar
 - d. Arteria aorta
6. Cuál de las siguientes aseveraciones NO es cierta:
 - a. El conducto torácico pasa por el hiato aórtico del diafragma
 - b. Por el hiato esofágico pasan los nervios vagos
 - c. El ligamento arqueado medial cubre el psoas mayor
 - d. El pilar izquierdo del diafragma da lugar al orificio esofágico
7. La disposición de los diferentes planos aponeuróticos que forman la vaina del músculo recto del abdomen en su tercio superior es la siguiente:
 - a. Anterior: oblicuo externo; posterior: oblicuo interno, transversal, fascia transversal y peritoneo
 - b. Anterior: oblicuo externo y oblicuo interno; posterior: oblicuo interno, transversal, fascia transversal y peritoneo
 - c. Anterior: oblicuo externo, oblicuo interno y transversal; posterior: fascia transversal y peritoneo

- d. Anterior: oblicuo externo, oblicuo interno, transverso y fascia transversal; posterior: peritoneo
8. Respecto al conducto inguinal cual de las siguientes aseveraciones NO es cierta:
- Contiene ramas del nervio ilioinguinal
 - Contiene ramas del nervio genitofemoral
 - Contiene la arteria epigástrica inferior
 - Contiene el ligamento redondo del útero
9. Respecto al ligamento inguinal cuál de las siguientes aseveraciones NO es cierta:
- Esta formado por la aponeurosis del músculo oblicuo externo
 - Se encuentra entre la espina iliaca anteroinferior y la sínfisis púbica.
 - Es el limite entre el abdomen y el muslo
 - Inferiormente está fijado a la pelvis por la cintilla iliopectinia
10. El límite superior del conducto inguinal corresponde a:
- Ligamento lacunar (Gimbernat)
 - Tendón del músculo oblicuo externo e interno
 - Tendón del músculo oblicuo interno y transverso
 - Ligamento pectíneo (Cooper)
11. Cual de las siguientes ordenaciones de elementos que pasan inferiores al ligamento inguinal, es correcta en sentido MEDIOLATERAL
- Nervio cutáneo femoral lateral, nervio femoral, vena femoral, arteria femoral
 - Vena femoral, arteria femoral, nervio femoral, nervio cutáneo femoral lateral
 - Nervio femoral, vena femoral, arteria femoral, nervio cutáneo femoral lateral
 - Nervio cutáneo femoral lateral, arteria femoral, nervio femoral, vena femoral.
12. Cual de las siguientes aseveraciones ES cierta:
- El nervio ciático sale de la pelvis por el orificio infrapiriforme
 - El musculo obturador interno abandona la pelvis por la escotadura ciática mayor
 - El nervio pudendo sale de la pelvis por la escotadura ciática menor
 - El nervio glúteo inferior abandona la pelvis por la escotadura ciática menor
13. La parálisis del nervio obturador produce la pérdida importante de sensibilidad cutánea en:
- Cara anterior del muslo y cara lateral de la pierna
 - Cara anterior del muslo y cara medial de la pierna
 - Cara medial del muslo y cara medial de la pierna
 - Solo cara medial del muslo.
14. Cual de las siguientes aseveraciones NO es cierta:
- El nervio safeno es un ramo sensitivo del nervio femoral
 - El nervio obturador inerva el músculo obturador interno
 - El músculo iliopsoas es el principal flexor de la articulación de la cadera.
 - El músculo pectíneo está inervado por el nervio femoral.
15. Una de las siguientes afirmaciones NO es cierta:

- a. El músculo glúteo mayor es un importante extensor de la cadera
- b. El músculo glúteo medio es un importante abductor de la cadera
- c. El músculo glúteo menor está inervado por el nervio glúteo inferior
- d. El músculo tensor de la fascia lata tiene la misma inervación que el glúteo medio.

16. El músculo bíceps femoral es un potente:

- a. Flexor de la cadera
- b. Abductor de la cadera
- c. Rotador interno de la rodilla
- d. Rotador externo de la rodilla

17. Cual de los siguientes músculos NO es extensor de la cadera

- a. Semimembranoso
- b. Bíceps femoral
- c. Glúteo mayor
- d. Tensor de la fascia lata

18. Respecto al menisco lateral de la rodilla cual de las siguientes aseveraciones NO es cierta:

- a. Esta separado del ligamento colateral peroneo
- b. El tendón del musculo poplíteo discurre lateralmente a él
- c. Presenta una forma de C cerrada
- d. Esta unido a la cápsula articular

19. Cual de las siguientes estructuras no forma parte o no se halla en el suelo del triangulo femoral

- a. Músculo pectíneo
- b. Nervio femoral
- c. Musculo ilipsoas
- d. Nervio obturador

20. Cual de las siguientes aseveraciones es cierta:

- a. El ramo genital del nervio genitofemoral y el nervio ilioinguinal se introducen en el conducto inguinal por el anillo inguinal superficial
- b. La pared anterior del conducto inguinal está delimitada por la hoz inguinal
- c. El ramo genital del nervio genitofemoral se introduce en el conducto inguinal por el anillo inguinal profundo y emerge por el anillo inguinal superficial
- d. La aponeurosis del músculo transverso del abdomen da lugar a la fascia transversal.

21. Una aficionada al ballet clásico refiere que durante los ejercicios de calentamiento ha notado un fuerte dolor en la pantorrilla y ahora no puede ponerse puntillo, qué puede haber sucedido:

- a. Lesión del nervio peroneo suoerficial
- b. Lesión de los músculos laterales de la pierna
- c. Rotura del tendón calcáneo (Aquiles)
- d. Rotura del tendón del extensor largo del dedo gordo

22. Una paciente acude a la consulta con dolor en la región del tobillo, indica que iba caminando y se le quedó el tacón del zapato atrapado en un agujero y al mover el pie para sacarlo, se le dobló el pie hacia fuera (EVERSIÓN CON PRONACIÓN). Qué ligamento puede haberse lesionado:
- Ligamento calcaneoperoneo
 - Ligamento bifurcado
 - Ligamento deltoideo
 - Ligamento calcaneonavicular plantar
23. Un paciente muestra, entre otras afectaciones, debilidad muscular a nivel de la cara anterior de la pierna, aunque mantiene la sensibilidad de la cara posterolateral de la pierna. Qué nervio puede haberse lesionado:
- Nervio tibial
 - Nervio peroneo común
 - Nervio peroneo superficial
 - Nervio peroneo profundo
24. Un futbolista muestra una fractura a nivel de cuello del peroné con afectación nerviosa que se demuestra por entre cosas:
- Parálisis del tríceps sural y pérdida de sensibilidad de la región anterolateral de la pierna y dorsal del pie
 - Incapacidad de flexionar plantearme el tobillo e invertir o supinar el pie
 - Incapacidad de flexionar dorsalmente el tobillo y evertir o pronar el pie
 - Parálisis del músculo tibial posterior y pérdida de sensibilidad de la región posterolateral de la pierna.
25. Tras una caída, un motorista ha sufrido un traumatismo que ha afectado la piel de la cara posterolateral de la pantorrilla. Qué nervio puede haberse lesionado:
- Safeno
 - Sural
 - Tibial
 - Peroneo común
26. Tras un parto muy laborioso, una paciente refiere que ha notado pérdida de sensibilidad en la cara interna del muslo. Qué nervio que puede haberse lesionado
- Femoral
 - Ramo genital del genitofemoral
 - Safeno
 - Obturador
- 27.Cuál de las siguientes aseveraciones NO es cierta:
- Los principales músculos aductores del muslo están inervados por el nervio obturador
 - Los principales músculos flexores de la rodilla están inervados por el nervio ciático
 - Los principales músculos extensores de la rodilla están inervados por el nervio femoral
 - Los principales músculos abductores del muslo están inervados por el nervio glúteo inferior

28. Una paciente indica que nota un fuerte dolor al intentar levantar el brazo y que le impide coger las cosas de los armarios altos de la cocina. Qué puede haberse lesionado:
- Pectoral mayor
 - Serrato anterior
 - Supraespinoso
 - Redondo mayor
29. Un jugador de tenis ha sido diagnosticado de epicondritis (inflamación y dolor a nivel del epicóndilo lateral del humero) relacionada con la tracción provocada por la extensión continua y forzada del carpo. Cual de estos es el músculo más afectado:
- Extensor de los dedos
 - Extensor cubital del carpo
 - Extensor radial corto del carpo
 - Braquiorradial
30. Un paciente fumador, refiere, que mientras estaba mirando la televisión y sujetando el cigarrillo entre los dedos índice y medio, ha sufrido una quemadura importante al consumirse el cigarrillo en su mano, el paciente no es consciente del hecho y aparentemente no sufre dolor, y fuñe un familiar quien le avisó. Que puede haber sucedido:
- Parálisis del nervio musculocutáneo
 - Parálisis del nervio mediano
 - Parálisis del nervio cubital
 - Parálisis del nervio radial
31. Una paciente, tras una caída, refiere dolor en la zona de la tabaquera anatómica, cuál es el hueso que probablemente se encuentre afectado:
- Trapezio
 - Piramidal
 - Pisiforme
 - Escafoides
32. Un síndrome del túnel carpiano que afecta al nervio mediano puede limitar la acción del:
- Aductor del pulgar
 - 1er interóseo dorsal
 - Oponente del pulgar
 - 3er lumbrical
33. Un paciente ha sufrido un fuerte golpe en la cara lateral del tórax y presenta una elevación importante del borde medial de la escápula (escápula alada), que nervio puede estar afectado:
- Supraescapular
 - Toracodorsal
 - Dorsal de la escápula
 - Torácico largo
34. Un trabajador de una fabrica de ensamblajes, que por su trabajo realiza muchas acciones de atornillamiento y desatornillamiento, indica que hace un tiempo que cuando vuelve a casa,

nota que ha perdido movilidad en los dedos, a la exploración la flexión de estos es normal pero la extensión está alterada, qué puede estar sucediendo:

- a. Compresión del nervio cubital
- b. Compresión del nervio radial
- c. Compresión del nervio musculocutáneo
- d. Compresión del nervio mediano

35. Una lesión del nervio mediano a nivel axilar NO comporta la parálisis de:

- a. Pronador redondo
- b. Oponente del pulgar
- c. Braquiorradial
- d. Flexor radial del carpo

36. Un paciente ha sufrido un corte importante a nivel de la cara anteromedial del carpo. Cuál de los siguientes déficits NO debería presentar:

- a. Incapacidad para aproximar el dedo pulgar
- b. Pérdida de sensibilidad en la yema del dedo índice
- c. Pérdida de sensibilidad en la yema del dedo meñique
- d. Incapacidad para separar el dedo índice

37. Una sección del nervio cubital a nivel del brazo provoca parálisis de todos los músculos que se citan, excepto uno:

- a. Primer interóseo dorsal
- b. Flexor cubital del carpo
- c. Extensor cubital del carpo
- d. Cuarto músculo lumbrical

38. Cuál de las siguientes relaciones de los músculos escalenos es FALSA:

- a. El plexo braquial se sitúa entre el escaleno anterior y el medio
- b. La arteria subclavia se sitúa anterior al escaleno medio
- c. La vena subclavia se sitúa anterior al escaleno medio
- d. El nervio frénico se sitúa sobre la cara anterior del escaleno anterior

39. Un estudiante de Medicina, ha estado estudiando toda la semana el examen de Anatomía, pero la noche pasada se quedo dormido sobre la mesa con la cabeza apoyada entre el antebrazo, al despertar nota hormigueo y pérdida de sensibilidad en la cara anterolateral del antebrazo. Se pregunta que puede haberle sucedido:

- a. Compresión del nervio mediano
- b. Compresión del nervio musculocutáneo
- c. Compresión del nervio radial
- d. Compresión del nervio cubital

40. Un paciente acude a urgencias por presentar, entre otras, una importante pérdida de capacidad de presión en los dedos de la mano, al realizar la historia clínica, el paciente indica que la noche anterior estuvo en una fiesta y abusó del alcohol, al despertar una amiga tenía apoyada su cabeza sobre la parte interna de su brazo. ¿Que ha podido suceder?

- a. Compresión del nervio mediano

- b. Compresión del nervio musculo cutáneo
- c. Compresión del nervio radial
- d. Compresión del nervio cubital
- e. Que se lo pasaron muy bien (esta respuesta no es válida)