

ETS d'Enginyeria de Telecomunicació
Probabilitat i Processos Estocàstics

6 de novembre de 2006

Control grup 20

Temps: 1h 45m

- 1.** Un sistema de comunicació transmet un a un i de forma independent símbols de l'alfabet $\{a, b, c\}$ amb probabilitats p_a, p_b i p_c respectivament.
- (a) Calculeu la probabilitat que en les n primeres transmissions encara no s'hagi transmès el símbol a .
 - (b) Calculeu la probabilitat que el primer símbol transmès hagi estat a si han calgut n transmissions fins que el símbol c ha estat transmès per primer cop.
 - (c) En aquest apartat suposeu els tres símbols equiprobables. Sigui N la variable aleatòria que dona el nombre de transmissions que han calgut fins que cada un dels tres símbols ha estat transmès almenys una vegada. Calculeu $P(N > n)$ i $P(N = n)$ (Indicació: Podeu calcular $P(N > n)$ considerant la unió d'esdeveniments com el considerat al primer apartat.)

Resolució:

(a)

$$\begin{aligned} &P(\text{en les } n \text{ primeres transmissions encara no s'hagi transmès } a) \\ &= P(\text{en les } n \text{ primeres transmissions s'ha transmès } b \text{ o } c) = (p_b + p_c)^n. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} &P(a|n \text{ transmissions fins que es transmet } c) \\ &= \frac{P(a, n \text{ transmissions fins que es transmet } c)}{P(n \text{ transmissions fins que es transmet } c)} = \frac{p_a (p_a + p_b)^{n-2} p_c}{(p_a + p_b)^{n-1} p_c} = \frac{p_a}{p_a + p_b} \end{aligned}$$

(c) Sigui S_x l'esdeveniment "en les n primeres transmissions encara no s'ha transmès el símbol x ", $x \in \{a, b, c\}$. Aleshores,

$$\begin{aligned} P(N > n) &= P(S_a \cup S_b \cup S_c) \\ &= P(S_a) + P(S_b) + P(S_c) - P(S_a \cap S_b) - P(S_a \cap S_c) - P(S_b \cap S_c) + P(S_a \cap S_b \cap S_c) \\ &= 3 \left(\frac{2}{3}\right)^n - 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{2^n - 1}{3^{n-1}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

$$P(N = n) = P(N > n - 1) - P(N > n) = \frac{2^{n-1} - 1}{3^{n-2}} - \frac{2^n - 1}{3^{n-1}} = \frac{2^{n-1} - 2}{3^{n-1}}, \quad n = 2, 3, \dots$$

- 2.** La sortida d'un quantificador de tres nivells quan l'entrada és x ve donada per la funció

$$g(x) = \begin{cases} -1, & x < -a \\ 0, & -a \leq x \leq a \\ 1, & x > a \end{cases}$$

- (a) Si l'entrada del quantificador és una variable aleatòria X amb funció de distribució de probabilitat F_X , doneu la funció de probabilitat de la variable aleatòria Y corresponent a la sortida del quantificador.
- (b) Determineu l'esperança i la variància de la sortida Y si l'entrada X és una variable aleatòria uniforme en $[-2a, 3a]$.

Resolució:

(a) Hem de calcular $P(Y = -1)$, $P(Y = 0)$ i $P(Y = 1)$.

$$P(Y = -1) = P(X < -a) = F_X(-a) - P(X = -a)$$

$$P(Y = 0) = P(-a \leq X \leq a) = F_X(a) - F_X(-a) + P(X = -a)$$

$$P(Y = 1) = P(X > a) = 1 - F_X(a)$$

(b) Podem usar el teorema de l'esperança:

$$E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx = \int_{-2a}^{-a} (-1) \frac{1}{5a} dx + \int_a^{3a} \frac{1}{5a} dx = \frac{1}{5}$$

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - m_Y^2 = E(Y^2) - \frac{1}{25}$$

$$E(Y^2) = E((g(X))^2) = \int_{-\infty}^{\infty} (g(x))^2 f_X(x) dx = \int_{-2a}^{-a} \frac{1}{5a} dx + \int_a^{3a} \frac{1}{5a} dx = \frac{3}{5}$$

Per tant,

$$\text{Var}(Y) = \frac{3}{5} - \frac{1}{25} = \frac{14}{25}$$

També podem obtenir aquests resultats usant els de l'apartat anterior, i que

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -2a \\ (x + 2a)/(5a), & -2a < x \leq 3a \\ 1, & x > 3a \end{cases}$$

Així (tenim en compte que $P(X = -a) = 0$):

$$P(Y = -1) = F_X(-a) = \frac{1}{5}$$

$$P(Y = 0) = F_X(a) - F_X(-a) = \frac{2}{5}$$

$$P(Y = 1) = 1 - F_X(a) = \frac{2}{5}$$

d'on

$$E(Y) = \sum_k k P(Y = k) = \frac{1}{5}, \quad E(Y^2) = \sum_k k^2 P(Y = k) = \frac{3}{5}$$

3. Enuncieu i discutiu les propietats que coneguem de les funcions de distribució de probabilitat.