

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Matemática - Razões e Funções Trigonométricas. Ciclo Trigonométrico.

197) O menor arco positivo x , em radianos, que satisfaz a equação $2\sqrt{3} \cdot \text{sen}x \cdot \text{cos}x = \text{sen}^2x - \text{cos}^2x$ pertence ao intervalo

- a) $\left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$
 - b) $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right]$
 - c) $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$
 - d) $\left[\frac{\pi}{9}, \frac{\pi}{4}\right]$
 - e) $\left[0, \frac{\pi}{9}\right]$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Matemática - Números Complexos

199) Considere a exponencial complexa $e^{i\omega t}$, onde "e" é a base do logaritmo natural, "i" é a unidade imaginária ($i^2 = -1$), e " ω " e "t" são números reais.

A parte real de $e^{i\omega t}$ é

- a) $\cos(\omega t) + \sin(\omega t)$
 - b) $\cos(\omega t)$
 - c) $\sin(\omega t)$
 - d) 1
 - e) e
-

Gabarito

Matemática

Trigonometria e números complexos

197) C

199) B