

Beräkningar inlämningsuppgift 1

Erik Ödmann, David Carlsson

Exponentialfördelningen

Täthetsfunktionen för exponentialfunktionen är

$$p_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Likelihood funktionen för en observation blir då

$$L(\lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$$

Vi applicerar den naturliga logaritmen på likelihood funktionen vilket ger oss log-likelihood funktionen för en observation

$$\begin{aligned} l(\lambda) &= \ln(\lambda e^{-\lambda x}) \\ &= \ln(\lambda) + \ln(e^{-\lambda x}) \\ &= \ln(\lambda) - \lambda x \ln(e) \\ &= \ln(\lambda) - \lambda x \end{aligned}$$

Log-likelihood funktionen för hela urvalet får vi genom att ta summan över log-likelihood funktionen för en observation

$$\begin{aligned} l_n(\lambda) &= \sum_{i=1}^n (\ln(\lambda) - \lambda x_i) \\ &= n \ln(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n x_i \end{aligned}$$

Nästa steg är att derivera likelihood funktionen för urvalet

$$\begin{aligned} l'_n(\lambda) &= \frac{d}{d\lambda} (n \ln(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n x_i) \\ &= n\lambda^{-1} - \sum_{i=1}^n x_i \end{aligned}$$

ML skattningen ges utav att lösa ekvationen

$$\begin{aligned}
l'_n(\lambda) &= n\lambda^{-1} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \\
&\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i = \frac{n}{\lambda} \\
&\Leftrightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}
\end{aligned}$$

För att beräkna fisherinformationen behöver vi andraderivatan utav log-likelihood funktionen som ges utav

$$\begin{aligned}
l''_n(\lambda) &= \frac{d}{d\lambda}(n\lambda^{-1} - \sum_{i=1}^n x_i) \\
&= -n\lambda^{-2}
\end{aligned}$$

Fisherinformationen för urvalet blir då

$$\begin{aligned}
I_n(\lambda) &= -E[l''_n(\lambda)] \\
&= -E[-n\lambda^{-2}] \\
&= n\lambda^{-2}
\end{aligned}$$

Vi kan nu beräkna medelfelet för ML-skattningen som

$$\begin{aligned}
Sd(\hat{\lambda}) &= I_n(\hat{\lambda})^{-1/2} \\
&= (n\hat{\lambda}^{-2})^{-1/2} \\
&= \hat{\lambda}n^{-1/2}
\end{aligned}$$

Binomialfördelningen

Täthetsfunktionen för binomialfördelninge är

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = \text{Antal utfall}$$

Likelihood funktionen för hela urvalet ges utav

$$L_n(p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Log-likelihood för hela urvalet kan vi då beräkna till

$$\begin{aligned} l_n(p) &= \ln\left(\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}\right) \\ &= \ln\left(\binom{n}{k}\right) + \ln(p^k) + \ln((1-p)^{n-k}) \\ &= \ln\left(\binom{n}{k}\right) + k \ln(p) + (n-k) \ln(1-p) \end{aligned}$$

Första derivatan utav log-likelihood funktionen för hela urvalet. Vi vet att $k = \sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}$ vilket ger oss

$$\begin{aligned} l'_n(p) &= \frac{d}{dp} \left(\ln\left(\binom{n}{k}\right) + k \ln(p) + (n-k) \ln(1-p) \right) \\ &= kp^{-1} - (n-k)(1-p)^{-1} \\ &= \frac{k(1-p) - p(n-k)}{p(1-p)} \\ &= \frac{k - pn}{p(1-p)} \\ &= \frac{n}{p(1-p)} (\bar{x} - p) \end{aligned}$$

ML-skattninges ges utav att lösa ekvationen för p

$$\begin{aligned} l'_n(p) &= kp^{-1} - (n-k)(1-p)^{-1} = 0 \\ \Leftrightarrow kp^{-1} &= (n-k)(1-p)^{-1} \\ \Leftrightarrow (1-p)k &= p(n-k) \\ \Leftrightarrow k - pk &= pn - pk \\ \Leftrightarrow k &= pn \\ \Leftrightarrow \hat{p} &= \frac{k}{n} = \bar{x} \end{aligned}$$

För att beräkna fisherinformationen behöver vi andraderivatan utav log-likelihood funktionen

$$\begin{aligned} l''_n(p) &= \frac{d}{dp} (kp^{-1} - (n-k)(1-p)^{-1}) \\ &= -kp^{-2} - (n-k)(1-p)^{-2} \end{aligned}$$

Fisherinformationen för hela urvalet blir då

$$\begin{aligned}
I_n(p) &= -E[l_n''(p)] \\
&= -E[-kp^{-2} - (n-k)(1-p)^{-2}] \\
&= -E\left[\frac{-k + 2kp - np^2}{p^2(1-p)^2}\right]
\end{aligned}$$

Eftersom $E[k] = np$ får vi

$$\begin{aligned}
I_n(p) &= \frac{np + np^2}{p^2(1-p)^2} \\
&= \frac{n}{p(1-p)}
\end{aligned}$$

Medelfelet för ML-skattningen ges då utav

$$\begin{aligned}
Sd(\hat{p}) &= I_n(\hat{p})^{-1/2} \\
&= \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}
\end{aligned}$$

Wald testet

Exponentialfördelningen

Vi utgår från teststatistikan

$$T_{\text{score}} = \frac{|l'_n(\lambda_0)|}{\sqrt{I_n(\lambda_0)}} \approx N(0, 1)$$

Binomialfördelningen

Vi utgår från teststatistikan

$$T_{\text{score}} = \frac{|l'_n(p_0)|}{\sqrt{I_n(p_0)}} \approx N(0, 1)$$

Första derivatan av likelihood funktionen samt fisherinformationen beräknade vi tidigare vilket ger oss

$$\begin{aligned}
T_{\text{score}} &= \frac{|l'_n(p_0)|}{\sqrt{I_n(p_0)}} \\
&= \frac{\left| \frac{n}{p_0(1-p_0)} (\bar{x} - p_0) \right|}{\sqrt{\frac{n}{p_0(1-p_0)}}} \\
&= \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} \times \frac{n}{p_0(1-p_0)} |\bar{x} - p_0| \\
&= \sqrt{\frac{n}{p_0(1-p_0)}} |\bar{x} - p_0| \\
&= \frac{|\bar{x} - p_0|}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \approx N(0, 1)
\end{aligned}$$