

Atorvastatina

De la diana molecular al paciente



ATORVASTATINA · LÁMINA 3 DE 6 · MECANISMO DE ACCIÓN

Cómo actúa atorvastatina

Inhibidor selectivo y competitivo de la HMG-CoA reductasa, la enzima limitante de la síntesis de colesterol.

En el sitio activo de la HMG-CoA reductasa



SUSTRATO NATURAL



Estructura real: PDB 1DQ9

El HMG-CoA entra al sitio activo y se convierte en mevalonato

CON ATORVASTATINA



Estructura real: PDB 1HWK


Ocupa el mismo sitio: inhibidor selectivo y competitivo
no se forma mevalonato

Para observar

Ocupa parte del sitio del HMG-CoA y bloquea su acceso (PMID 11349148). El sitio activo se forma entre dos subunidades (verde y azul).

Potencia: IC₅₀ = 6–13 nM (ChEMBL, BindingDB). Para inhibir OATP1B1 o CYP3A4 hacen falta concentraciones unas 100 a 600 veces mayores: es selectiva.

En el hepatocito: la respuesta que baja la LDL



Resultado: ↓ colesterol LDL en sangre

Fuentes: fichas técnicas de atorvastatina (CIMA, FDA), UniProt P04035, Reactome R-HSA-1655829, PMID 20566875. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDCitPubChem. PDB 1DQ9, 1HWK; PMID 11349148; ChEMBL; BindingDB.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DATOS VERIFICADOS EN

Ficha técnica AEMPS (CIMA)

Ficha técnica FDA

EMA

ChEMBL

UniProt

NCBI Gene

Reactome

PubMed / Europe PMC

LiverTox

RCSB PDB

PubChem

BindingDB

CPIC

LactMed

openFDA

DIRIGIDO A

Estudiantes de farmacia

CONTENIDO

6 láminas · ficha del mecanismo

FECHA

1 de octubre de 2026

Contenido

Láminas para proyectar o imprimir y ficha del mecanismo con la fuente de cada dato.

LÁMINAS

1	¿De dónde viene el colesterol LDL y dónde actúa cada fármaco?	3
2	Cómo regula el hepatocito su colesterol	4
3	Cómo actúa atorvastatina	5
4	Farmacocinética: el hígado es diana y filtro	6
5	Del mecanismo al paciente	7
6	Del ensayo a la práctica: valor y vida real	8

FICHA DEL MECANISMO

01	Puntos clave	9
02	Recorrido de las láminas	9
03	Farmacocinética e interacciones	10
04	Farmacogenética	11
05	Farmacoeconomía (prioridad: Costa Rica y Latinoamérica)	11
06	Estudios de vida real	12
07	Efectos adversos y contraindicaciones	12
08	Indicaciones aprobadas por la FDA	13
09	Clase farmacológica	13
10	Error frecuente	13
11	Pregunta de autoevaluación	13
12	Simplificaciones de las láminas	13
13	Fuentes	14
14	No verificado	14

FUENTES CONSULTADAS

Ficha técnica AEMPS (CIMA)

Ficha técnica FDA

EMA

ChEMBL

UniProt

NCBI Gene

Reactome

PubMed / Europe PMC

LiverTox

RCSB PDB

PubChem

BindingDB

CPIC


LactMed

openFDA

ATORVASTATINA · LÁMINA 1 DE 6 · CONTEXTO

¿De dónde viene el colesterol LDL y dónde actúa cada fármaco?

El hígado fabrica colesterol y retira la LDL de la sangre mediante sus receptores de LDL.



Idea clave

Las estatinas no «sacan» el colesterol de la sangre: el hígado fabrica menos colesterol y, para compensar, capta más LDL de la sangre.


Fuentes: fichas técnicas de atorvastatina (CIMA, FDA), UniProt P04035, Reactome R-HSA-1655829, PMID 20566875. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

ATORVASTATINA · LÁMINA 2 DE 6 · FISIOLÓGÍA NORMAL

Cómo regula el hepatocito su colesterol

Sin fármaco: la célula fabrica colesterol y, si tiene suficiente, mantiene pocos receptores de LDL.



Fuentes: fichas técnicas de atorvastatina (CIMA, FDA), UniProt P04035, Reactome R-HSA-1655829, PMID 20566875. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica



ATORVASTATINA · LÁMINA 3 DE 6 · MECANISMO DE ACCIÓN

Cómo actúa atorvastatina

Inhibidor selectivo y competitivo de la HMG-CoA reductasa, la enzima limitante de la síntesis de colesterol.

En el sitio activo de la HMG-CoA reductasa



SUSTRATO NATURAL



Estructura real: PDB 1DQ9

El HMG-CoA entra al sitio activo y se convierte en mevalonato

CON ATORVASTATINA



Estructura real: PDB 1HWK


Ocupa el mismo sitio: inhibidor selectivo y competitivo
no se forma mevalonato

Para observar

Ocupa parte del sitio del HMG-CoA y bloquea su acceso (PMID 11349148). El sitio activo se forma entre dos subunidades (verde y azul).

Potencia: IC₅₀ ≈ 6–13 nM (ChEMBL, BindingDB). Para inhibir OATP1B1 o CYP3A4 hacen falta concentraciones unas 100 a 600 veces mayores: es selectiva.

En el hepatocito: la respuesta que baja la LDL



1 Inhibe la enzima
↓ síntesis de colesterol en el hígado

2 Activa SREBP-2
la célula detecta el déficit

3 ↑ Receptores de LDL
más captación de LDL de la sangre (4)

Resultado: ↓ colesterol LDL en sangre


Fuentes: fichas técnicas de atorvastatina (CIMA, FDA), UniProt P04035, Reactome R-HSA-1655829, PMID 20566875. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem. PDB 1DQ9, 1HWK; PMID 11349148; ChEMBL; BindingDB.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

ATORVASTATINA · LÁMINA 4 DE 6 · FARMACOCINÉTICA

Farmacocinética: el hígado es diana y filtro

Atorvastatina entra al hepatocito por OATP1B1, actúa allí, se metaboliza por CYP3A4 y sale por la bilis.



Circulación sistémica

5 Llega poco fármaco a la sangre

- Biodisponibilidad ~12–14 %; actividad inhibitoria sistémica ~30 %.
- Unión a proteínas ≥ 98 %.
- Vida media ~14 h; la actividad dura 20–30 h por los metabolitos.
- Eliminación sobre todo biliar; < 2 % en la orina.

Interacciones

- Inhibidores de CYP3A4 (claritromicina, itraconazol) u OATP1B1 (ciclosporina): ↑ concentración y riesgo de miopatía.
- Rifampicina induce CYP3A4 e inhibe OATP1B1: dar ambos a la vez.

Farmacogenética: SLCO1B1

- CPIC, nivel A. Con OATP1B1 de función disminuida entra menos fármaco al hígado: ↑ exposición en sangre y riesgo de miopatía.
- Función disminuida: iniciar con ≤ 40 mg.
 - Función pobre: ≤ 20 mg o rosuvastatina.

Dato clave

El hígado es el lugar de acción: la dosis predice mejor la bajada de LDL que la concentración en sangre. El primer paso hepático no es una pérdida: lleva el fármaco a donde actúa.

Fuentes: fichas técnicas de atorvastatina (CIMA, FDA), UniProt P04035, Reactome R-HSA-1655829, PMID 20566875. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem. CPIC (PMID 35152405); NCBI Gene SLCO1B1.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica


ATORVASTATINA · LÁMINA 5 DE 6 · APLICACIÓN CLÍNICA

Del mecanismo al paciente

Qué significa inhibir la HMG-CoA reductasa para el tratamiento y la seguridad.

Efecto terapéutico

- ↓ colesterol LDL entre 41 % y 61 % según la dosis; también ↓ colesterol total, apo B y triglicéridos.
- Prevención de eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo.
- Siempre junto con dieta y cambios de estilo de vida.



Error frecuente

«La estatina saca el colesterol de la sangre.»
Falso: inhibe su síntesis en el hígado. La LDL baja porque el hepatocito, con menos colesterol, fabrica más receptores de LDL y la capta.

Para pensar: ¿por qué funciona peor en quien no tiene receptores de LDL funcionales?



Hígado, embarazo y lactancia

- Transaminasas: elevaciones leves, asintomáticas y pasajeras; la lesión hepática clínica es rara (LiverTox). Control de la función hepática.
- Contraindicada en el embarazo y la lactancia (ficha técnica). LactMed coincide: preferir otra opción, sobre todo con recién nacidos o prematuros.



Efectos adversos

- Frecuentes: nasofaringitis, cefalea, molestias digestivas, mialgia, hiperglucemia.
- Miopatía y, rara vez, rabdomiólisis: consultar ante dolor o debilidad muscular inexplicable.
- Más riesgo de miopatía con inhibidores de CYP3A4 u OATP1B1 y con SLCO1B1 de función disminuida (lámina 4).

Fuentes: fichas técnicas de atorvastatina (CIMA, FDA), UniProt P04035, Reactome R-HSA-1655829, PMID 20566875. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem. LiverTox PMID 31643561; LactMed PMID 30000420.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

ATORVASTATINA · LÁMINA 6 DE 6 · VALOR Y VIDA REAL

Del ensayo a la práctica: valor y vida real

Qué dicen las evaluaciones económicas y los estudios en la práctica clínica, con prioridad para Latinoamérica.

¿Vale lo que cuesta? · Farmacoeconomía

Medicamento esencial (OMS) y compra conjunta (OPS)

En la Lista de la OMS como equivalente de simvastatina y en polipíldoras; el Fondo Estratégico de la OPS incluye 40 y 80 mg.

OMS, Lista Modelo (eEML) · OPS, precios de referencia 2026

Brasil (SUS): ¿qué intensidad conviene?

Intensidad intermedia (p. ej., atorvastatina 10 mg): < Int\$ 10 000 por AVAC; alta frente a intermedia: > Int\$ 27 000 por AVAC.

Umbral: PIB per cápita (~Int\$ 11 770) · PMID 25409878, 2015

Brasil y Colombia: atorvastatina frente a rosuvastatina

En Colombia, pasar a rosuvastatina costaría > 200 000 \$ por AVAC ganado: resultados parecidos, precio mucho mayor.

Precios reales de cada país · PMID 29702787, 2014

Reino Unido (NICE) y precio de referencia

Estatinas de alta intensidad: coste-efectivas; atorvastatina 20 mg en prevención primaria. Genérico en EE. UU.: US\$ 0,02–0,07/comp.

NICE NG238, 2023 · NADAC (Medicaid), septiembre de 2026

¿Funciona igual fuera del ensayo? · Vida real

Costa Rica (CRELES): la brecha de control

En adultos mayores con diabetes, el 78 % tenía LDL $\geq$ 100 mg/dl: la eficacia del ensayo no garantiza el control en la población.

Muestra nacional de $\geq$ 60 años, n = 542 · PMID 18447930, 2008

Brasil: prescripción en un hospital público

9 594 pacientes con estatina: 18 % sin LDL reciente y 2,4 % con LDL $\geq$ 190 mg/dl. Solo simvastatina (77,6 %) y atorvastatina.

Estudio retrospectivo · PMID 33886720, 2021

Brasil (ELSA-Brasil MSK): ¿dolor muscular?

En 2 156 personas, el uso de estatinas no se asoció con dolor ni debilidad muscular en el análisis principal.

Estudio transversal de una cohorte · PMID 37261675, 2024

Cómo leer estos datos

- Precio, umbral y comparador cambian con el país y el año.
- Los estudios observacionales muestran asociaciones, no causas: confirman o matizan los ensayos, no los sustituyen.
- AVAC: año de vida ajustado por calidad; la razón de costo-efectividad compara el costo extra con los AVAC ganados.

Fuentes: fichas técnicas de atorvastatina (CIMA, FDA), UniProt P04035, Reactome R-HSA-1655829, PMID 20566875. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem. Lámina 6: fuentes en cada ficha.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

FICHA DEL MECANISMO

Atorvastatina

01 Puntos clave

- 1 Diana:** la HMG-CoA reductasa, enzima del retículo endoplásmico que cataliza el paso limitante de la síntesis de colesterol (HMG-CoA → mevalonato). [UniProt P04035](#); [CIMA 5.1](#)
- 2 Mecanismo:** atorvastatina es un inhibidor **selectivo y competitivo** de la enzima. Ocupa parte del sitio de unión del HMG-CoA y bloquea el acceso del sustrato. [CIMA 5.1](#); [PMID 11349148](#)
- 3 Por qué baja la LDL en sangre:** al disminuir el colesterol dentro del hepatocito, se activa SREBP-2. La célula aumenta la expresión del receptor de LDL y capta más LDL de la sangre. [CIMA 5.1](#); [Reactome R-HSA-1655829](#); [PMID 20566875](#)
- 4 Compensación:** SREBP-2 también activa el gen de la propia HMG-CoA reductasa; la célula intenta fabricar más enzima. [Reactome R-HSA-1655829](#)
- 5 Magnitud:** reduce el colesterol LDL entre 41 % y 61 % según la dosis. [CIMA 5.1](#)
- 6 Potencia y selectividad:** inhibe la enzima a concentraciones nanomolares, con IC₅₀ de 6–13 nM y K_i de 6,2 nM. Para inhibir OATP1B1 (IC₅₀ 0,6–1,6 µM) o CYP3A4 (IC₅₀ 5,1 µM) hacen falta concentraciones unas 100 a 600 veces mayores. [ChEMBL CHEMBL1487](#); [BindingDB](#), [PMID 15686906](#), [23570542](#), [31188592](#)
- 7 El hígado es diana y filtro:** entra al hepatocito por el transportador OATP1B1 y allí actúa. La dosis se correlaciona mejor con la reducción de LDL que la concentración en sangre. [FDA 12.2, 12.3](#); [CIMA 5.2](#)

02 Recorrido de las láminas

1. Contexto. El colesterol procede de la dieta (absorción intestinal) y de la síntesis hepática. El hígado libera lipoproteínas y retira la LDL de la sangre mediante sus receptores. Sitios de acción:

FÁRMACO	MECANISMO	FUENTE
Ezetimiba	Inhibe NPC1L1 en el intestino delgado: ↓ absorción de colesterol	FDA 12.1
Estatinas	Inhiben la HMG-CoA reductasa en el hígado	CIMA 5.1
Colesevelam	Secuestra ácidos biliares; el hígado usa más colesterol para fabricarlos	FDA 12.1
Evolocumab / inclisiran	Evitan la degradación del receptor de LDL mediada por PCSK9	FDA 12.1

2. Fisiología normal. Acetil-CoA → HMG-CoA → (HMG-CoA reductasa) → mevalonato → varios pasos → colesterol. Con colesterol suficiente, el complejo SREBP-2/SCAP queda retenido en el retículo endoplásmico, la transcripción de los genes LDLR y HMGCR es basal y la célula mantiene pocos receptores de LDL. [Reactome R-HSA-1655829](#)

3. Con atorvastatina.

1. Inhibe la enzima y baja el colesterol intracelular.
2. SREBP-2 viaja del retículo al Golgi, se activa y entra al núcleo.
3. Aumenta la transcripción del gen LDLR (y de HMGCR).
4. Hay más receptores de LDL en la membrana, que captan más LDL de la sangre.

Las estructuras reales del sitio activo provienen de PDB 1DQ9 (enzima humana con HMG-CoA) y PDB 1HWK (enzima humana con atorvastatina), superpuestas para verlas desde el mismo ángulo. La potencia (IC₅₀ de 6–13 nM) coincide en ChEMBL y BindingDB.

4. Farmacocinética. El recorrido de una dosis:

1. Se absorbe en el intestino (C_{max} en 1–2 h) y llega al hígado por la vena porta. [CIMA 5.2](#)
2. Entra al hepatocito por OATP1B1 y OATP1B3. Sus metabolitos también son sustratos de OATP1B1. [CIMA 5.2; FDA 12.3](#) OATP1B1 está codificado por el gen *SLCO1B1*, específico del hígado, cuyos polimorfismos reducen su función. [NCBI Gene 10599](#)
3. Dentro del hepatocito inhibe la HMG-CoA reductasa, y CYP3A4 lo transforma en metabolitos orto- y parahidroxilados. Estos son igual de activos y aportan ~70 % de la actividad circulante. [FDA 12.3](#)
4. Se elimina sobre todo por la bilis. Los transportadores de salida BCRP y P-gp limitan la absorción y el aclaramiento biliar. [CIMA 5.2](#)
5. A la sangre llega poco: biodisponibilidad ~12–14 % y actividad inhibitoria sistémica ~30 %. [CIMA 5.2; FDA 12.3](#)

Mensaje de la lámina: el primer paso hepático no es una pérdida, porque lleva el fármaco a donde actúa.

[FDA 12.2: «el hígado es el lugar principal de acción»](#)

03 Farmacocinética e interacciones

[CIMA 4.2, 4.5, 5.2; FDA 12.2, 12.3](#)

- Absorción rápida (C_{max} en 1–2 h). Biodisponibilidad absoluta ~12 % (CIMA) o ~14 % (FDA) por aclaramiento presistémico y primer paso hepático.
- Se puede tomar a cualquier hora del día, con o sin alimentos (FDA 2.1).
- Unión a proteínas ≥ 98 %. Metabolismo por CYP3A4 a derivados orto- y parahidroxilados activos, responsables de ~70 % de la actividad inhibitoria circulante.

- Semivida de ~14 h; la actividad inhibitoria dura de 20 a 30 h por los metabolitos.
- Eliminación principalmente biliar, sin recirculación enterohepática; menos del 2 % se recupera en la orina.
- Es sustrato de OATP1B1/1B3, P-gp y BCRP.
- **Inhibidores de CYP3A4** (claritromicina, itraconazol, ketoconazol, inhibidores de la proteasa del VIH) e **inhibidores de OATP1B1** (ciclosporina) aumentan su concentración y el riesgo de miopatía. No se recomienda el jugo de toronja (FDA 5.1). La ciclosporina y glecaprevir/pibrentasvir no se recomiendan o están contraindicados.

04 Farmacogenética

CPIC, PMID 35152405

CPIC clasifica el par *SLCO1B1*-atorvastatina en el nivel A, el que tiene recomendación de prescripción. Con un OATP1B1 menos funcional entra menos fármaco al hígado, aumenta la exposición en sangre y puede subir el riesgo de miopatía.

FENOTIPO DE <i>SLCO1B1</i>	RECOMENDACIÓN DE CPIC
Función normal o aumentada	Dosis inicial habitual
Función disminuida o posiblemente disminuida	Iniciar con ≤ 40 mg; vigilar la miopatía, sobre todo con 40 mg
Función pobre	Iniciar con ≤ 20 mg; si hace falta más, valorar rosuvastatina o una combinación

Otros genes (CYP3A4, CYP3A5, HMGCR y otros) tienen niveles C o D en CPIC: no hay recomendación de prescripción.

05 Farmacoeconomía (prioridad: Costa Rica y Latinoamérica)

Cada cifra depende del país, el año, la moneda, el comparador y el umbral de disposición a pagar. No es trasladable sin ajustes.

- **Medicamento esencial:** la Lista Modelo de la OMS incluye atorvastatina como equivalente terapéutico de simvastatina y en polipíldoras para prevención cardiovascular (con AAS y ramipril, o con perindopril y amlodipino). [OMS, eEML](#)
- **Compra conjunta en las Américas:** el Fondo Estratégico de la OPS incluye atorvastatina de 40 y 80 mg; en la lista de 2026 aún no tiene precio publicado. [OPS, precios de referencia del Fondo Estratégico, 2026](#)
- **Brasil (SUS), 2015:** modelo de Markov con datos de 136 000 pacientes y un umbral igual al PIB per cápita (~Int\$ 11 770).
 - Intensidad intermedia (p. ej., atorvastatina 10 mg): menos de Int\$ 10 000 por AVAC en todos los escenarios.
 - Alta intensidad frente a intermedia: más de Int\$ 27 000 por AVAC.

PMID 25409878

- **Brasil y Colombia, 2014:** con precios reales de cada país, rosuvastatina frente a atorvastatina costaría más de 700 000 \$ por AVAC en prevención primaria y más de 200 000 \$ en secundaria en Colombia, con resultados parecidos. En Brasil, los precios eran similares y las razones resultaron menores. [PMID 29702787](#)
- **Reino Unido (NICE NG238, 2023):** las estatinas de alta intensidad son clínicamente eficaces y coste-efectivas frente a no tratar o a intensidades menores. NICE recomienda atorvastatina 20 mg en prevención primaria con QRISK3 ≥ 10 %. [NICE NG238](#)
- **Precio de referencia de un genérico (EE. UU., septiembre de 2026):** entre 0,023 US\$ (10 mg) y 0,069 US\$ (80 mg) por comprimido. [NADAC, Medicaid](#)

06 Estudios de vida real

Los estudios observacionales muestran asociaciones, no causas; complementan los ensayos clínicos.

- **Costa Rica (CRELES):** en una muestra nacional de 542 personas de 60 años o más con diabetes, el 78 % tenía LDL ≥ 100 mg/dl. Los datos se publicaron en 2008. La eficacia demostrada en ensayos no garantiza el control en la población. [PMID 18447930](#)
- **Brasil, hospital público terciario:**
 - 9 594 pacientes con estatina en un año. El 18 % no tenía LDL reciente, el 17,1 % tenía LDL de 130–190 mg/dl y el 2,4 % ≥ 190 mg/dl.
 - Solo se usaban simvastatina (77,6 %) y atorvastatina.[PMID 33886720](#)
- **Brasil (ELSA-Brasil MSK):** en 2 156 personas no hubo asociación global entre el uso de estatinas y el dolor o la debilidad muscular. En un análisis secundario, atorvastatina se asoció con debilidad en una de las dos pruebas. [PMID 37261675](#)
- **Registros en marcha o terminados:** ClinicalTrials.gov lista un estudio observacional de vida real sobre el uso de estatinas en la atención primaria de Brasil (NCT05285085). El catálogo de la EMA tiene 5 estudios posautorización con atorvastatina, de Japón.

07 Efectos adversos y contraindicaciones

[CIMA 4.3, 4.8](#)

- **Frecuentes:** nasofaringitis, reacciones alérgicas, hiperglucemia, cefalea, molestias digestivas, mialgia, artralgia, dolor en extremidades.
- **Raras:** miopatía, miositis, rabdomiólisis. Consultar ante dolor o debilidad muscular inexplicable.
- **Hepáticos:** aumento de transaminasas; hepatitis poco frecuente. Según LiverTox, las elevaciones suelen ser leves, asintomáticas y autolimitadas, y la lesión hepática clínicamente evidente es rara. [LiverTox, PMID 31643561](#)
- **Lactancia:** LactMed recuerda que el consenso es no amamantar durante el tratamiento y preferir otra opción, sobre todo con recién nacidos o prematuros. [LactMed, PMID 30000420](#)
- **Contraindicada en:** enfermedad hepática activa, embarazo, lactancia, mujeres en edad fértil sin anticoncepción adecuada, y con glecaprevir/pibrentasvir.

08 Indicaciones aprobadas por la FDA

Drugs@FDA, NDA 020702 (Lipitor); ficha de la FDA del 15/04/2024

No hay indicaciones nuevas recientes. La última ampliación de indicación de la FDA fue en octubre de 2002: hipercolesterolemia familiar heterocigota en adolescentes de 10 a 17 años, con 10–20 mg al día (suplemento S-033). Los suplementos posteriores revisaron la ficha sin añadir indicaciones.

09 Clase farmacológica

Inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas), código ATC C10AA05. Otras estatinas: simvastatina, rosuvastatina, pravastatina, pitavastatina, fluvastatina, lovastatina.

10 Error frecuente

«La estatina saca el colesterol de la sangre». **Falso:** inhibe la síntesis de colesterol en el hígado. La LDL baja porque el hepatocito, con menos colesterol, fabrica más receptores de LDL y la capta de la sangre.

11 Pregunta de autoevaluación

¿Por qué una estatina reduce menos la LDL en un paciente sin receptores de LDL funcionales (hipercolesterolemia familiar homocigótica con mutaciones nulas del receptor)?

RESPUESTA

Porque buena parte del efecto depende de que el hepatocito aumente sus receptores de LDL en respuesta al déficit de colesterol intracelular. Si el receptor no es funcional, ese aumento no se traduce en mayor captación de LDL. Por eso estos pacientes necesitan tratamientos combinados u otras alternativas (CIMA 4.1 menciona la combinación con aféresis de LDL).

12 Simplificaciones de las láminas

- Sin escala; la vía de síntesis se resume (los pasos entre mevalonato y colesterol no se dibujan).
- El receptor de LDL y SREBP-2/SCAP se representan con ilustraciones genéricas de proteínas.
- Las estructuras químicas se dibujan sin estereoquímica.
- Las superficies de la enzima muestran solo la región del sitio activo (radio de 16 Å), cortada para ver el ligando.
- En la lámina 4, OATP1B1, BCRP/P-gp y CYP3A4 son ilustraciones genéricas de proteínas. Los valores de IC50 vienen de ensayos in vitro y no equivalen a concentraciones en el paciente.

13 Fuentes

- AEMPS, CIMA: ficha técnica de atorvastatina (secciones 4.1–4.8, 5.1, 5.2).
- FDA, DailyMed y openFDA: fichas técnicas de atorvastatina (12.2, 12.3), ezetimiba, colesevelam, evolocumab e inclisiran (sección 12).
- UniProt P04035 (HMGCR) y Q12772 (SREBF2).
- Reactome R-HSA-1655829, «Regulation of cholesterol biosynthesis by SREBP (SREBF)».
- NCBI Gene 10599 (*SLCO1B1*).
- ChEMBL CHEMBL1487, actividades frente a HMGCR, OATP1B1 y CYP3A4. BindingDB, afinidades frente a P04035 (PMID 15686906, 23570542, 31188592).
- CPIC: guía de *SLCO1B1*, *ABCG2*, *CYP2C9* y estatinas (PMID 35152405).
- LiverTox: atorvastatina (PMID 31643561). LactMed: atorvastatina (PMID 30000420).
- OMS, Lista Modelo de Medicamentos Esenciales (eEML). OPS, precios de referencia del Fondo Estratégico (2026). NICE NG238 (2023). NADAC, Medicaid (septiembre de 2026).
- Farmacoeconomía: PMID 25409878 (Brasil) y 29702787 (Brasil y Colombia). Vida real: PMID 18447930 (Costa Rica), 33886720 y 37261675 (Brasil). ClinicalTrials.gov NCT05285085. Catálogo de estudios de vida real de la EMA.
- Istvan ES, Deisenhofer J. Structural mechanism for statin inhibition of HMG-CoA reductase. *Science* 2001. PMID 11349148.
- Marquart TJ et al. miR-33 links SREBP-2 induction to repression of sterol transporters. *PNAS* 2010. PMID 20566875.
- RCSB PDB 1DQ9 y 1HWK (CC0). PubChem CID 60823, 445127, 449 y 5997.
- Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

14 No verificado

Nada. Todos los datos se comprobaron en las fuentes citadas. No se incluyeron informes de BRISA/RedETSA (el sitio rechaza las consultas automáticas). Atorvastatina no tiene informe de evaluación de la EMA (EPAR) porque se autorizó por procedimientos nacionales. Los datos de farmacocinética se tomaron de las fichas técnicas de CIMA y de la FDA.

Queda, como en todo prototipo, la revisión farmacológica del nivel y los mensajes para estudiantes de pregrado.

Generado el 1 de octubre de 2026. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RCSB PDB (CC0) y PubChem/RDKit. Prototipo pendiente de revisión farmacológica; no sustituye la ficha técnica vigente.