



იბუპროფენი ტაბლეტი 200მგ #50

2.85 ლ

ბორისოვო · ბელარუსი
ჯენერიკი: იბუპროფენი · ტაბლეტი

ურეცეპტო



დამატება

ყიდვა

პროდუქტის შესახებ

იბუპროფენი 200მგ ტაბლეტი — არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (აასს), რომელიც ამცირებს ტკივილს, სიცხესა და ანთებას. გამოიყენება ართრიტის, რევმატიული დაავადებებისა და ტრავმის შემდგომი ტკივილისას. ჩვეულებრივ მოზრდილებში — 1 ტაბლეტი ყოველ 6–8 საათში, ჭამის შემდეგ. ორსულობის III ტრიმესტრში უკუნაჩვენებია.

რა არის იბუპროფენი ტაბლეტი 200მგ #50 და რისთვის გამოიყენება?

იბუპროფენი ტაბლეტი 200მგ #50 არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებაა (აასს). ერთი ტაბლეტი შეიცავს 200 მგ მოქმედ ნივთიერებას — იბუპროფენს. ეს ჯგუფი ერთდროულად ებრძვის ტკივილს, სიცხესა და ანთებას.

პრეპარატის მოქმედების მექანიზმი მარტივად ასახსნელია. ორგანიზმში არსებობს ფერმენტი — ციკლოოქსიგენაზა (COX), რომელიც მონაწილეობს პროსტაგლანდინების წარმოქმნაში. სწორედ პროსტაგლანდინები იწვევენ ტკივილს, სიცხესა და ანთებას. იბუპროფენი თრგუნავს ციკლოოქსიგენაზას მუშაობას, რის გამოც ნაკლები პროსტაგლანდინი წარმოიქმნება. ამიტომ ტკივილი მცირდება, ტემპერატურა ქვეითდება და ანთება ცხრება.

მნიშვნელოვანია ერთი რამის გათვალისწინება: იბუპროფენი სიმპტომური მკურნალობის საშუალებაა. ეს ნიშნავს, რომ ის ხსნის უსიამოვნო სიმპტომებს — ტკივილს, სიცხესა და ანთებას — მაგრამ არ მკურნალობს თავად დაავადების მიზეზს. ამიტომ პრეპარატი ეხმარება ადამიანს, რომ თავი უკეთ იგრძნოს.

წამალი გამოიყენება სხვადასხვა ანთებითი რევმატიული დაავადების, სახსრებისა და ხერხემლის დეგენერაციული დაავადებების გამწვავებისა და ტრავმის შემდგომი ტკივილის დროს. ქვემოთ მოცემულია ძირითადი მდგომარეობები:

- მწვავე ართრიტი, მათ შორის პოდაგრა
- ქრონიკული (რევმატოიდული) ართრიტი
- ხერხემლის მაანკილოზებული ანთება და მსგავსი რევმატიული დაავადებები
- სახსრებისა და ხერხემლის ცვეთის (ართროზი, სპონდილოართროზი) გამწვავება
- შემაერთებული ქსოვილის ანთებითი რევმატოიდული დაავადება
- ტრავმის შემდგომი შეშუპება და ტკივილიანი ანთება

როგორ მივიღოთ იბუპროფენი 200მგ?

მოზრდილებში

1–2 ტაბლეტი (200–400 მგ) ყოველ 4–6 საათში, ჭამის შემდეგ, წყალთან ერთად.

ბავშვებში

12 წლამდე ბავშვებსა და მოზარდებში — მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით.

ხანდაზმულებში

მინიმალური ეფექტური დოზა, ექიმის კონსულტაციით.

⚠ არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურ დღიურ დოზას — 1200 მგ (6 ტაბლეტი) ექიმის რჩევის გარეშე.

როდის არ უნდა მიიღოთ იბუპროფენი 200მგ?

არ მიიღოთ, თუ:

- გაქვთ მგრძნობელობა იბუპროფენის ან სხვა აასს-ის მიმართ
- ასპირინის ან სხვა აასს-ის მიღების შემდეგ გქონიათ ასთმის შეტევა, ცხვირის შეშუპება ან კანის რეაქცია
- გაქვთ კუჭის ან თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული, ან კუჭ-ნაწლავის სისხლდენის რეციდივი (ორი ან მეტი ეპიზოდი)
- გადატანილი გაქვთ კუჭ-ნაწლავის სისხლდენა ან პერფორაცია, რომელიც აასს-ის მიღებას უკავშირდებოდა
- გაქვთ უცნობი მიზეზით გამოწვეული სისხლდენის დარღვევა
- გაქვთ ქალაშიდა (კრანიალური) ჰემორაგია ან სხვა აქტიური სისხლდენა
- გაქვთ ღვიძლის, თირკმლის ან გულის მძიმე უკმარისობა
- ხართ ორსულად **III ტრიმესტრში — ამ პერიოდში უკუნაჩვენებია**
- ხართ 12 წლამდე ბავშვი ან მოზარდი

რა უნდა ვიცოდეთ იბუპროფენი 200მგ-ის მიღებამდე?

- მიიღეთ მინიმალური ეფექტური დოზა, რაც შეიძლება ხანმოკლე დროით
- არ მიიღოთ სხვა აასს-თან (მათ შორის ასპირინთან) ერთად
- ალკოჰოლი ზრდის კუჭ-ნაწლავის გვერდითი მოვლენების რისკს — მიღების პერიოდში მოერიდეთ
- სიფრთხილით გამოიყენეთ ასთმის, მომატებული წნევისა და გულის დაავადებების დროს
- თუ ცხელება 3 დღეზე ან ტკივილი 5 დღეზე მეტხანს გრძელდება — მიმართეთ ექიმს

შეიძლება თუ არა იბუპროფენი 200მგ ორსულობისას?

ორსულობის I-II ტრიმესტრში გამოიყენება მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. **III ტრიმესტრში უკუნაჩვენებია.** ლაქტაციის (ძუძუთი კვების) დროს ხანმოკლე გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ექიმის კონსულტაციით.

რა გვერდითი მოვლენები აქვს იბუპროფენი 200მგ-ს?

ხშირი: გულძმარვა, გულისრევა, მუცლის ტკივილი.

იშვიათი: გამონაყარი, თავბრუსხვევა, შეშუპება.

⚠ **სასწრაფოდ მიმართეთ ექიმს ან გამოიძახეთ 112, თუ:**

- შავი ან სისხლიანი განავალი, სისხლიანი ღებინება
- სუნთქვის გაძნელება
- სახის ან ხახის შეშუპება

როგორ ინახება იბუპროფენი 200მგ?

ინახება 25°C-მდე ტემპერატურაზე, მშრალ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. ვადაგასული პრეპარატი არ გამოიყენოთ.

სჭირდება თუ არა რეცეპტი იბუპროფენი 200მგ-ს?

ურეცეპტოდ. (წყარო: სამკურნალო საშუალებების სახელმწიფო რეესტრი.)

ხშირად დასმული კითხვები იბუპროფენი 200მგ-ზე

კ: რისთვის გამოიყენება იბუპროფენი?

პ: ტკივილის, ცხელებისა და ანთების სამკურნალოდ.

კ: ჭამამდე თუ ჭამის შემდეგ მივიღო?

პ: საკვებთან ან საკვების შემდეგ, წყალთან ერთად.

კ: რა განსხვავებაა იბუპროფენსა და ნუროფენს შორის?

პ: ორივე იბუპროფენია; ნუროფენი სავაჭრო ბრენდია, ეს — ხელმისაწვდომი ჯენერიკი.

კ: რამდენ ხანში მოქმედებს?

პ: ჩვეულებრივ მიღებიდან დაახლოებით 30 წუთში.



ეს ინფორმაცია არ ანაცვლებს ექიმის კონსულტაციას. მიღებამდე წაიკითხეთ ჩანართი.

წყარო: მწარმოებლის ანოტაცია · იბუპროფენი 200მგ #50 · ბორისოვო (ბელარუსი)