



იბუპროფენი ტაბლეტი 200მგ #50

2.85 ლ

ბორისოვო · ბელარუსი
ჯენერიკი: იბუპროფენი · ტაბლეტი

ურეცეპტო



დამატება

ყიდვა

პროდუქტის შესახებ

იბუპროფენი 200მგ ტაბლეტი — არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (აასს), რომელიც ამცირებს ტკივილს, სიცხესა და ანთებას. გამოიყენება ართრიტის, რევმატიული დაავადებებისა და ტრავმის შემდგომი ტკივილისას. ჩვეულებრივ მოზრდილებში — 1 ტაბლეტი ყოველ 6–8 საათში, ჭამის შემდეგ. ორსულობის III ტრიმესტრში უკუნაჩვენებია.

რა არის იბუპროფენი ტაბლეტი 200მგ #50 და რისთვის გამოიყენება?

იბუპროფენი არის **არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (აასს)**. ის ბლოკავს ანთების გამომწვევ ნივთიერებებს (პროსტაგლანდინებს), რის გამოც მცირდება ტკივილი, სიცხე და შეშუპება.

გამოიყენება:

- მწვავე ართრიტი, მათ შორის პოდაგრა
- ქრონიკული (რევმატოიდული) ართრიტი
- ხერხემლის მანკილობებელი ანთება და მსგავსი რევმატიული დაავადებები
- სახსრებისა და ხერხემლის ცვეთის (ართროზი, სპონდილოართროზი) გამწვავება
- შემაერთებული ქსოვილის ანთებითი რევმატოიდული დაავადება
- ტრავმის შემდგომი შეშუპება და ტკივილიანი ანთება

როგორ მივიღოთ იბუპროფენი 200მგ?

მოზრდილებში

1–2 ტაბლეტი (200–400 მგ) ყოველ 4–6 საათში, ჭამის შემდეგ, წყალთან ერთად.

ბავშვებში

12 წლამდე ბავშვებსა და მოზარდებში — მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით.

ხანდაზმულებში

მინიმალური ეფექტური დოზა, ექიმის კონსულტაციით.

⚠ არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურ დღიურ დოზას — 1200 მგ (6 ტაბლეტი) ექიმის რჩევის გარეშე.

როდის არ უნდა მივიღოთ იბუპროფენი 200მგ?

არ მივიღოთ, თუ:

- გაქვთ მგრძნობელობა იბუპროფენის ან სხვა აასს-ის მიმართ
- ასპირინის ან სხვა აასს-ის მიღების შემდეგ გქონიათ ასთმის შეტევა, ცხვირის შეშუპება ან კანის რეაქცია
- გაქვთ კუჭის ან თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული, ან კუჭ-ნაწლავის სისხლდენის რეციდივი (ორი ან მეტი ეპიზოდი)
- გადატანილი გაქვთ კუჭ-ნაწლავის სისხლდენა ან პერფორაცია, რომელიც აასს-ის მიღებას უკავშირდებოდა
- გაქვთ უცნობი მიზეზით გამოწვეული სისხლდენის დარღვევა
- გაქვთ ქალაშიდა (კრანიალური) ჰემორაგია ან სხვა აქტიური სისხლდენა
- გაქვთ ღვიძლის, თირკმლის ან გულის მძიმე უკმარისობა
- ხართ ორსულად **III ტრიმესტრში — ამ პერიოდში უკუნაჩვენებია**
- ხართ 12 წლამდე ბავშვი ან მოზარდი

რა უნდა ვიცოდეთ იბუპროფენი 200მგ-ის მიღებამდე?

- მიიღეთ მინიმალური ეფექტური დოზა, რაც შეიძლება ხანმოკლე დროით
- არ მივიღოთ სხვა აასს-თან (მათ შორის ასპირინთან) ერთად
- ალკოჰოლი ზრდის კუჭ-ნაწლავის გვერდითი მოვლენების რისკს — მიღების პერიოდში მოერიდეთ
- სიფრთხილით გამოიყენეთ ასთმის, მომატებული წნევისა და გულის დაავადებების დროს
- თუ ცხელება 3 დღეზე ან ტკივილი 5 დღეზე მეტხანს გრძელდება — მიმართეთ ექიმს

შეიძლება თუ არა იბუპროფენი 200მგ ორსულობისას?

ორსულობის I-II ტრიმესტრში გამოიყენება მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. **III ტრიმესტრში უკუნაჩვენებია.** ლაქტაციის (ძუძუთი კვების) დროს ხანმოკლე გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ექიმის კონსულტაციით.

რა გვერდითი მოვლენები აქვს იბუპროფენი 200მგ-ს?

ხშირი: გულძმარვა, გულისრევა, მუცლის ტკივილი.

იშვიათი: გამონაყარი, თავბრუსხვევა, შეშუპება.

⚠ სასწრაფოდ მიმართეთ ექიმს ან გამოიძახეთ 112, თუ:

- შავი ან სისხლიანი განავალი, სისხლიანი ღებინება
- სუნთქვის გაძნელება
- სახის ან ხახის შეშუპება

როგორ ინახება იბუპროფენი 200მგ?

ინახება 25°C-მდე ტემპერატურაზე, მშრალ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. ვადაგასული პრეპარატი არ გამოიყენოთ.

სჭირდება თუ არა რეცეპტი იბუპროფენი 200მგ-ს?

ურეცეპტოდ. (წყარო: სამკურნალო საშუალებების სახელმწიფო რეესტრი.)

ხშირად დასმული კითხვები იბუპროფენი 200მგ-ზე

კ: რისთვის გამოიყენება იბუპროფენი?

პ: ტკივილის, ცხელებისა და ანთების სამკურნალოდ.

კ: ჭამამდე თუ ჭამის შემდეგ მივიღო?

პ: საკვებთან ან საკვების შემდეგ, წყალთან ერთად.

კ: რა განსხვავებაა იბუპროფენსა და ნუროფენს შორის?

პ: ორივე იბუპროფენია; ნუროფენი სავაჭრო ბრენდია, ეს — ხელმისაწვდომი ჯენერიკი.

კ: რამდენ ხანში მოქმედებს?

პ: ჩვეულებრივ მიღებიდან დაახლოებით 30 წუთში.

⚠ ეს ინფორმაცია არ ანაცვლებს ექიმის კონსულტაციას. მიღებამდე წაიკითხეთ ჩანართი.

წყარო: მწარმოებლის ანოტაცია · იბუპროფენი 200მგ #50 · ბორისოვო (ბელარუსი)