

Variables cuantitativas

Nombre: dayana romero

Fecha: 26/05/2026

```
In [1]: # Creación aleatoria de datos
import numpy as np
X = np.array([0.5, 23, 0.3, 4.5, 0.3, 0.5, -28, -50, 60, -100, -10, -11, 13, 19, 1, 9])
print(X)
```

```
[  0.5  23.   0.3  4.5  0.3  0.5 -28.  -50.  60. -100.
 -10.  -11.  13.  19.   1.   9. ]
```


```
In [2]: # Medidas de tendencia central
from scipy import stats
media = np.mean(X)
mediana = np.median(X)
moda , _ = stats.mode(X)
print('media: ', media)
print('mediana: ', mediana)
print('moda :', moda)
```

```
media: -4.24375
mediana: 0.5
moda : 0.3
```

```
In [3]: # Medidas de posición
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
Q1 = np.percentile(X, 25)
Q3 = np.percentile(X, 75)
RIC = Q3 - Q1
lim_inf = Q1 - 1.5*RIC
lim_sup = Q3 + 1.5*RIC
print('RIC :', RIC)
print('limite inferior :', lim_inf)
print('limite superior :', lim_sup)
```

```
RIC : 20.25
limite inferior : -40.625
limite superior : 40.375
```

```
In [4]: # Dibuja el diagrama de box and whiskers y determina visualmente el número de ou
plt.boxplot(X)
plt.grid()
plt.title("Diagrama de caja y bigotes")
plt.show()
```



```
In [5]: # Medidas de dispersión
desvest = np.std(X)
print('Desviación típica: ', desvest)
print('Varianza: ', desvest**2)
```

Desviación típica: 33.521242681880096
 Varianza: 1123.6737109375

```
In [6]: # Medidas de distribución
asimetria = stats.skew(X)
curtosis = stats.kurtosis(X, fisher=True) # https://docs.scipy.org/doc/scipy/ref
print('Asimetría ', np.round(asimetria, 4))
print('Curtosis ', np.round(curtosis, 4))
if curtosis>0:
    print('Distribución Leptocúrtica')
elif curtosis<0:
    print('Distribución Platicúrtica')
else:
    print('Distribución Mesocúrtica')
```

Asimetría -1.1302
 Curtosis 2.2858
 Distribución Leptocúrtica

```
In [7]: # Cargar el set de datos de Iris
from sklearn import datasets
from pprint import pprint
from scipy.stats import skew, kurtosis
iris = datasets.load_iris()
#pprint(iris)
X = iris.data
y = iris.target
# ¿Qué tipo de asimetría se observa en la variable "longitud del pétalo"? #???
longitud_petalos = X[:, 2]
```

```

asimetria = skew(longitud_petal)
print("Asimetría:", asimetria)
if asimetria > 0:
    print("La variable presenta asimetría positiva (sesgo hacia la derecha).")
elif asimetria < 0:
    print("La variable presenta asimetría negativa (sesgo hacia la izquierda).")
else:
    print("La variable tiene una distribución simétrica.")

    # ¿A qué tipo de distribución se ajusta la variable "ancho del sépalo", según
    #??
ancho_sepalo = X[:, 1]
curt = kurtosis(ancho_sepalo)
print("Curtosis:", curt)
if curt > 0:
    print("La distribución es leptocúrtica.")
elif curt < 0:
    print("La distribución es platicúrtica.")
else:
    print("La distribución es mesocúrtica.")

```

Asimetría: -0.2721276664567214

La variable presenta asimetría negativa (sesgo hacia la izquierda).

Curtosis: 0.18097631752246768

La distribución es leptocúrtica.

```

In [8]: # EJERCICIO EXTRA SOBRE EL DATASET DE IRIS
# Extraer la media y la desviación típica de cada variable en función de la clase
# Nombres de variables
variables = iris.feature_names
# Clases
clases = np.unique(y)
# Crear figura
plt.figure(figsize=(10,6))
# Recorrer cada clase
for clase in clases:
    # Filtrar datos por clase
    datos_clase = X[y == clase]

    # Calcular media
    media = np.mean(datos_clase, axis=0)

    # Calcular desviación típica
    desviacion = np.std(datos_clase, axis=0)

    # Graficar con barras de error
    plt.errorbar(
        range(len(variables)),
        media,
        yerr=desviacion,
        marker='o',
        capsize=5,
        label=iris.target_names[clase]
    )
# Configuración del gráfico
plt.xticks(range(len(variables)), variables, rotation=15)
plt.ylabel("Valores")
plt.title("Media y desviación típica por clase- Dataset Iris")
plt.legend()
plt.show()

```

