

sol95a.pdf



Anónimo



Computabilidad y complejidad



3º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática  
Universidad Politécnica de Valencia

**WUOLAH + BBVA**

Hazte **cliente de BBVA y...**  
**ahórrate 6 meses**  
**de suscripción**

**BOOM**

**1/6**

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada es de 100.000 euros por la totalidad de los depósitos constituidos en BBVA por persona.

Ahora, si te abres una Cuenta Online en BBVA, te reembolsamos una de estas suscripciones durante 6 meses (hasta 9,99€/mes) al pagarla con tu tarjeta Aqua Débito

**NETFLIX**

**Spotify**

**HBOmax**

**Disney+**

**PlayStation Plus**

**DAZN**

Promoción solo para nuevos clientes de BBVA. Válida hasta el 30/06/2023. Estas empresas no colaboran en la promoción.

**Abre tu cuenta**



# Hazte cliente de BBVA y ... ahórrate 6 meses de suscripción

WUOLAH  
+ BBVA

NETFLIX

Spotify

HBOmax

Disney+

PlayStation.Plus

DAZN

Ahora, si te abres una Cuenta Online en BBVA, te reembolsamos una de estas suscripciones durante 6 meses (hasta 9,99€/mes) al pagarla con tu tarjeta Aqua Débito

Promoción solo para nuevos clientes de BBVA. Válida hasta el 30/06/2023. Estas empresas no colaboran en la promoción.

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada es de 100.000 euros por la totalidad de los depósitos constituidos en BBVA por persona.

## Examen de Computabilidad y Complejidad

(CMC)

7 de julio de 1995

### (I) CUESTIONES (justifique formalmente las respuestas)

1. Sea  $\mathcal{L}$  la clase de los lenguajes recursivamente enumerables que no son recursivos. ¿Es  $\mathcal{L}$  cerrada bajo complementación?

(1 punto)

#### Solución


La clase  $\mathcal{L}$  no es cerrada bajo complementación. Por contradicción, supongamos que  $L$  y  $\bar{L}$  son recursivamente enumerables, entonces, tal y como se ha visto en clase,  $L$  y  $\bar{L}$  son recursivos y, por lo tanto, no pertenecen a la clase enunciada, lo cual es contradictorio.

2. Sea  $L \subseteq \Sigma^*$  un lenguaje recursivo. ¿Es recursivo el lenguaje definido como  $L' = \{v \in \Sigma^* \mid \exists w \in L \wedge v \text{ es una permutación de } w\}$ .

(1 punto)

#### Solución

$L'$  es recursivo. Actuaremos construyendo una máquina de Turing que acepte  $L'$  y que pare ante cualquier entrada. Para ello, partiremos de dos módulos:  $L$  que es una máquina de Turing que acepta a  $L$  y siempre para (obsérvese que  $L$  es recursivo) y  $Perm$  que calcula todas las permutaciones de una cadena de entrada. Obviamente, el módulo  $Perm$  obedece a un algoritmo que finaliza en tiempo finito. Con los dos anteriores módulos, construimos la máquina que se muestra a continuación



El funcionamiento de la máquina es como sigue: Inicialmente se pasa la cadena de entrada  $w$  al módulo  $Perm$  que calcula las permutaciones de la cadena. De forma iterativa, se le pasa cada permutación calculada  $w'$  al módulo  $L$  que establece si la permutación pertenece o no al lenguaje  $L$ . En caso de aceptación, se acepta la cadena  $w$  ya que se cumplen los requisitos del lenguaje. Si ninguna permutación pertenece a  $L$  entonces se rechaza la cadena de entrada y la máquina para. La condición de parada queda garantizada por las limitaciones temporales de los anteriores módulos.

3. Sea la operación  $\mathcal{P}$  definida sobre cadenas como  $\mathcal{P}(x) = xx^{-1}$ . Se extiende la operación a lenguajes como  $\mathcal{P}(L) = \{\mathcal{P}(x) \mid x \in L\}$ . ¿Es la familia de los lenguajes incontextuales cerrada bajo la operación  $\mathcal{P}$ ? ( $x^{-1}$  denota el reverso o inverso de la cadena  $x$ ).

(1.5 puntos)

#### Solución

La operación  $\mathcal{P}$  no es de cierre. Para ello, tomemos el lenguaje  $L = \{a^n b^n : n \geq 1\}$  que es incontextual al ser generado por la gramática  $S \rightarrow aSb \mid ab$ . Al aplicar la operación  $\mathcal{P}$  al lenguaje  $L$  obtenemos el lenguaje  $L' = \{a^n b^n b^n a^n : n \geq 1\}$ . El lenguaje  $L'$  no es incontextual. Esto lo podemos demostrar por propiedades de cierre: Definamos en primer lugar el homomorfismo  $h$  de forma que  $h(a) = a$ ,  $h(b) = bb$  y  $h(c) = a$ . Entonces,  $h^{-1}(L') = \{\{a, c\}^n b^n \{a, c\}^n : n \geq 1\}$ . Haciendo la intersección del anterior lenguaje con la expresión regular  $aa^*bb^*cc^*$  obtenemos el lenguaje  $\{a^n b^n c^n : n \geq 1\}$  que, como se ha visto en repetidas ocasiones, no es incontextual. Por lo tanto,  $\mathcal{P}$  no es de cierre.

4. Sea  $L = \bigcup_{n \geq 0} (1^n 0^n)^*$ . ¿Es  $L$  un lenguaje incontextual?

(1 punto)

#### Solución


$L$  no es incontextual. Lo demostraremos por propiedades de cierre. Tomemos  $L$  y hagamos la intersección con la expresión regular  $11^*00^*11^*00^*$ . Obtenemos el lenguaje  $L' = \{1^n 0^n 1^n 0^n : n \geq 1\}$ . Podemos demostrar que  $L'$  no es incontextual: Definamos el homomorfismo  $h$  de forma que  $h(a) = 1$ ,  $h(b) = 0$ ,  $h(c) = 1$  y  $h(d) = 0$ . Aplicamos  $h^{-1}$  a  $L'$  y obtenemos  $\{\{a, c\}^n \{b, d\}^n \{a, c\}^n \{b, d\}^n : n \geq 1\}$ . Haciendo la intersección con la expresión regular  $aa^*bb^*cc^*dd^*$  obtenemos el lenguaje  $\{a^n b^n c^n d^n : n \geq 1\}$ . Por último, definimos el homomorfismo  $g$  como  $g(a) = a$ ,  $g(b) = b$ ,  $g(c) = c$  y  $g(d) = \lambda$  y, aplicándolo sobre el último lenguaje, obtenemos  $\{a^n b^n c^n : n \geq 1\}$  que, como se ha visto, no es incontextual. Por lo tanto, si al aplicarle a  $L$  propiedades de cierre obtenemos un lenguaje no incontextual, la conclusión a la que llegamos es que  $L$  tampoco lo es.

5. Sea  $M$  una máquina de Turing y se define  $L_5(M) = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L(M) \wedge M \text{ pasa más de 5 veces por el estado inicial al computar } x\}$ . Pronúnciese sobre la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: Si  $L(M)$  es recursivo entonces  $L_5(M)$  también lo es.

(1.5 puntos)

#### Solución

La afirmación es cierta. Definamos  $M'$  como una máquina de Turing que acepta  $L(M)$  y para ante cualquier entrada (obsérvese que  $L(M)$  es recursivo). Podemos construir una máquina  $M''$  que simule a  $M$  y que lleve un contador  $c$  inicializado a cero y que se incremente cada vez que  $M$  pasa desde un estado cualquiera al estado inicial. A partir de  $M'$  y  $M''$  podemos construir la siguiente máquina:





# Hazte cliente de BBVA y ... **ahórrate 6 meses** **de suscripción**

Ahora, si te abres una Cuenta Online en BBVA, te reembolsamos una de estas suscripciones durante 6 meses (hasta 9,99€/mes) al pagarla con tu tarjeta Aqua Débito

**NETFLIX****HBOmax**[Abre tu cuenta](#)

La anterior máquina funciona como sigue: Inicialmente se establece si la cadena de entrada  $w$  pertenece o no a  $L(M)$  (esto lo hacemos con  $M'$ ). Si la cadena es rechazada entonces rechazamos la entrada. Si la cadena  $w$  pertenece a  $L(M)$  entonces se la pasamos a  $M''$  que establece cuantas veces pasa  $M$  por su estado inicial. Si el contador  $c$  supera el valor 4 entonces aceptamos la entrada, en caso contrario la rechazamos. La condición de parada queda garantizada en cualquier caso. Por lo tanto  $L_5(M)$  es recursivo.

## (II) PROBLEMAS:

6. Dada la gramática incontextual  $G$  definida por las producciones

$$S \rightarrow SaS \mid bS \mid \lambda$$

y la sustitución  $f : \{a, b\} \rightarrow \mathcal{P}(\{a, b\}^*)$  con  $f(a) = (L(G))^*$  y  $f(b) = (L(G))(L(G) - \{\lambda\})$ . Obtener una gramática incontextual que genere  $L(G) \cup f(L(G))$ .

(2 puntos)

### Solución

En primer lugar obtendremos las gramáticas para la sustitución  $f$ . Para  $f(a)$  definimos la gramática  $G_a$  mediante las producciones

$$S_a \rightarrow S' S_a \mid \lambda$$

$$S' \rightarrow S' a S' \mid b S' \mid \lambda$$

Para  $f(b)$  definimos la gramática  $G_b$  mediante las producciones

$$S_b \rightarrow S'' S'''$$

$$S'' \rightarrow S'' a S'' \mid b S'' \mid \lambda$$

$$S''' \rightarrow S''' a S''' \mid a S''' \mid S''' a \mid a \mid b S''' \mid b$$

La gramática para  $f(L(G))$  es la siguiente

$$S_f \rightarrow S_f S_a S_f \mid S_b S_f \mid \lambda$$

$$S_a \rightarrow S' S_a \mid \lambda$$

$$S' \rightarrow S' a S' \mid b S' \mid \lambda$$

$$S_b \rightarrow S'' S'''$$

$$S'' \rightarrow S'' a S'' \mid b S'' \mid \lambda$$

$$S''' \rightarrow S''' a S''' \mid a S''' \mid S''' a \mid a \mid b S''' \mid b$$

Por último, la gramática para  $L(G) \cup f(L(G))$  se define mediante las producciones

$$S_{\cup} \rightarrow S \mid S_f$$

$$S \rightarrow SaS \mid bS \mid \lambda$$

$$S_f \rightarrow S_f S_a S_f \mid S_b S_f \mid \lambda$$

$$S_a \rightarrow S' S_a \mid \lambda$$

$$S' \rightarrow S' a S' \mid b S' \mid \lambda$$

$$S_b \rightarrow S'' S'''$$

$$S'' \rightarrow S'' a S'' \mid b S'' \mid \lambda$$

$$S''' \rightarrow S''' a S''' \mid a S''' \mid S''' a \mid a \mid b S''' \mid b$$

7. Dada la gramática  $G$ :

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow Sa \mid ASB \mid a \mid \lambda & B \rightarrow ABA \mid a \\ A \rightarrow Ab \mid Aa \mid b \mid C & C \rightarrow Ca \mid Cb \mid D \\ D \rightarrow aDa \mid DC & E \rightarrow aEb \mid \lambda \end{array}$$

# Hazte cliente de BBVA y ... ahórrate 6 meses de suscripción

WUOLAH  
+ BBVA

NETFLIX

Spotify

HBOmax

Disney+

PlayStation.Plus

DAZN

Ahora, si te abres una Cuenta Online en BBVA, te reembolsamos una de estas suscripciones durante 6 meses (hasta 9,99€/mes) al pagarla con tu tarjeta Aqua Débito

Promoción solo para nuevos clientes de BBVA. Válida hasta el 30/06/2023. Estas empresas no colaboran en la promoción.

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada es de 100.000 euros por la totalidad de los depósitos constituidos en BBVA por persona.

Abre tu cuenta



WUOLAH  
+ BBVA

Obtener una gramática incontextual  $G'$  en Forma Normal de Greibach de modo que  $L(G') = (L(G) - \{\lambda\})$ .

(2 puntos)

## Solución

En primer lugar, procederemos a simplificar la gramática  $G$

Símbolos no generativos:  $\{C, D\}$

Gramática sin símbolos no generativos:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow Sa \mid ASB \mid a \mid \lambda & B &\rightarrow ABA \mid a \\ A &\rightarrow Ab \mid Aa \mid b & E &\rightarrow aEb \mid \lambda \end{aligned}$$

Símbolos no alcanzables:  $\{E\}$

Gramática sin símbolos no alcanzables:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow Sa \mid ASB \mid a \mid \lambda \\ A &\rightarrow Ab \mid Aa \mid b \\ B &\rightarrow ABA \mid a \end{aligned}$$

Símbolos anulables:  $\{S\}$

Gramática sin producciones vacías:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow Sa \mid a \mid ASB \mid AB \\ A &\rightarrow Ab \mid Aa \mid b \\ B &\rightarrow ABA \mid a \end{aligned}$$

La anterior gramática ya está totalmente simplificada ya que se puede comprobar que no contiene ni producciones unitarias ni símbolos inútiles.

Procedemos ahora a transformar la anterior gramática de forma que no hayan auxiliares y terminales juntos o más de un terminal en cada parte derecha

$$\begin{aligned} S &\rightarrow SS_a \mid a \mid ASB \mid AB \\ A &\rightarrow AS_b \mid AS_a \mid b \\ B &\rightarrow ABA \mid a \\ S_a &\rightarrow a \\ S_b &\rightarrow b \end{aligned}$$

Pasamos ahora a obtener la gramática en Forma Normal de Greibach eliminando en primer lugar las recursividades por la izquierda que aparecen en las producciones

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a \mid ASB \mid AB \mid aS' \mid ASBS' \mid ABS' \\ S' &\rightarrow S_a \mid S_a S' \\ A &\rightarrow b \mid bA' \\ A' &\rightarrow S_b \mid S_b A' \mid S_a \mid S_a A' \\ B &\rightarrow ABA \mid a \\ S_a &\rightarrow a \\ S_b &\rightarrow b \end{aligned}$$

Por último, hacemos las transformaciones finales y obtenemos la gramática en Forma Normal de Greibach

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a \mid bSB \mid bA'SB \mid bB \mid bA'B \mid aS' \mid bSBS' \mid bA'SBS' \mid bBS' \mid bA'BS' \\ S' &\rightarrow a \mid aS' \\ A &\rightarrow b \mid bA' \\ A' &\rightarrow b \mid bA' \mid a \mid aA' \\ B &\rightarrow bBA \mid bA'BA \mid a \end{aligned}$$