

ESTIMATION EN TERMINALE S

I - INTERVALLE DE FLUCTUATION ASYMPTOTIQUE

Pour étudier un caractère présent dans une population, on prélève de façon aléatoire un échantillon dans cette population.

On suppose connues :

- la proportion p du caractère **dans la population**
- la taille n de l'échantillon

On cherche à évaluer :

- la fréquence f du caractère **dans l'échantillon**

EXEMPLE

On sait que 48% des élèves d'un lycée sont des garçons (et donc 52% sont des filles...).

Si l'on sélectionne au hasard 100 élèves dans l'établissement, on devrait obtenir **environ** 52 filles et 48 garçons mais il n'est pas du tout certain que l'on obtienne **exactement** ces chiffres.

Par contre, on pourra rechercher un intervalle dans lequel se situera "*probablement*" la proportion de garçons dans cet échantillon.

Si n est élevé, on peut assimiler la sélection de l'échantillon à un tirage avec remise. Le nombre d'individus présentant le caractère étudié suit alors une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. Pour n élevé, on peut approximer cette loi binomiale par une loi normale. On obtient alors le résultat suivant :

DÉFINITION ET PROPRIÉTÉ

Soit un réel $\alpha \in]0 ; 1[$.

Un **intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de $1 - \alpha$** est :

$$I = \left[p - u_{\alpha} \times \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} ; p + u_{\alpha} \times \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} \right]$$

Si on note f_n la fréquence du caractère étudié dans l'échantillon de taille n :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p(f_n \in I) = 1 - \alpha.$$

REMARQUES

- **Rappel :** La définition de u_{α} est donné dans le chapitre « **loi normale** » ☞.
- On a en particulier $u_{0,05} = 1,96$ et $u_{0,01} = 2,58$
- Cette propriété est démontrée en exercice
- On considèrera que, lorsque n est suffisamment élevé ($n \geq 30$, $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$), $p(f \in I) \approx 1 - \alpha$

CAS PARTICULIER (INTERVALLE DE FLUCTUATION AU SEUIL DE 95%)

L'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% est l'intervalle :

$$I = \left[p - 1,96 \times \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} ; p + 1,96 \times \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} \right]$$

EXEMPLE

Si l'on reprend l'exemple donné en introduction, on a $n = 100$ et $p = \frac{48}{100}$.

On trouve $I = [0,38 ; 0,58]$.

La proportion de garçons dans l'échantillon devrait être comprise entre 38% et 58% (avec une probabilité de 0,95)

REMARQUES

- L'intervalle de fluctuation peut être utilisé pour valider ou rejeter une hypothèse. On procède de la façon suivante :
 - On suppose que la proportion du caractère étudié est p .
 - On prélève un échantillon de taille n
 - On regarde si la fréquence f du caractère dans l'échantillon appartient à I . Si oui, l'hypothèse est validée, si non, elle est rejetée.
- Une étude de fonction montre que pour tout $p \in [0 ; 1]$, $1,96 \times \sqrt{p(1-p)} < 1$. On en déduit que :

$$\left[p - 1,96 \times \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} ; p + 1,96 \times \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} \right] \text{ est inclus dans } \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

qui est l'intervalle vu en Seconde.

II - INTERVALLE DE CONFIANCE

Dans cette partie (contrairement à la première partie), on suppose que l'on connaît la fréquence f du caractère dans l'échantillon mais que l'on ne connaît pas la proportion p du caractère dans la population.

On cherche alors à évaluer p .

DÉFINITION ET PROPRIÉTÉ

On appelle **intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 95%** l'intervalle :

$$I = \left[f - \frac{1}{\sqrt{n}} ; f + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

Pour n élevé, la proportion p du caractère dans la population appartiendra à I dans 95% des cas.

EXEMPLE

On recherche le pourcentage de truites femelles dans un élevage de truites.

Pour cela, on a prélevé un échantillon de 50 truites et on a comptabilisé 28 femelles dans cet échantillon.

Le pourcentage de truites femelles dans l'ensemble de l'élevage appartient donc à l'intervalle :

$$I = \left[\frac{28}{50} - \frac{1}{\sqrt{50}} ; \frac{28}{50} + \frac{1}{\sqrt{50}} \right] \approx [0,42 ; 0,70]$$

avec un risque d'erreur inférieur à 5%.

REMARQUE

La longueur de l'intervalle I est $\frac{2}{\sqrt{n}}$.

Si l'on souhaite obtenir un intervalle d'amplitude maximale a , il faut choisir n tel que

$$\frac{2}{\sqrt{n}} \leq a \text{ c'est à dire } n \geq \frac{4}{a^2}$$