## SUITES – BAC S AMÉRIQUE DU NORD 2013

 $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \sqrt{2u_n}$ .

1)

**Variables :** *n* est un entier naturel

*u* est un réel positif

**Initialisation :** Demander la valeur de *n* 

Affecter à *u* la valeur 1

**Traitement :** Pour i variant de 1 à n :

...Affecter à u la valeur  $\sqrt{(2u)}$ 

Fin de Pour

**Sortie:** Afficher u

1.a) Résultat à  $10^{-4}$  près affiché par l'algorithme ci-dessus pour n = 3: 1,8340.

1.b) L'algorithme permet de calculer  $u_n$ .

1.c) Valeurs de  $u_n$  calculées par l'algorithme :

ĺ	n	1	5	10	15	20
ı	п	1	J	10	10	20
	Valeur affichée	1,4142	1,9571	1,9986	1,9999	1,9999

On peut conjecturer que  $(u_n)$  est croissante et convergente quand  $n \to +\infty$ .

2)

2.a) 
$$u_0 = 1$$
 et  $u_{n+1} = \sqrt{2u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N} \implies u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Démontrons par récurrence que  $u_n \le 2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ :

La proposition est vraie pour  $u_0 = 1$ . Si elle vraie pour  $u_n$ , démontrons qu'elle est aussi vraie pour  $u_{n+1}$ :

$$u_{n+1} = \sqrt{2u_n} = \sqrt{2}\sqrt{u_n}.$$

$$u_n \le 2 \Rightarrow \sqrt{u_n} \le \sqrt{2}$$
 et  $u_{n+1} \le \sqrt{2}\sqrt{2} \Rightarrow u_{n+1} \le 2$ .

Alors, par récurrence,  $u_n \le 2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

2.b) On a 
$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2u_n} - u_n = u_n \left( \sqrt{\frac{2}{u_n}} - 1 \right)$$
.

$$u_n \le 2 \Rightarrow \frac{2}{u_n} \ge 1 \Rightarrow \sqrt{\frac{2}{u_n}} \ge 1 \Rightarrow \sqrt{\frac{2}{u_n}} - 1 \ge 0$$

Comme 
$$u_n > 0$$
, alors  $u_{n+1} - u_n = u_n \left( \sqrt{\frac{2}{u_n}} - 1 \right) \ge 0$ , et  $u_{n+1} \ge u_n$ .

Ceci implique que  $(u_n)$  est croissante.

2.c)  $(u_n)$  est croissante et  $0 < u_n \le 2$  impliquent que la suite est convergente et tend vers une limite I telle que  $0 < I \le 2$ .