Caracterización espacio-temporal de la clorofila en el mar argentino mediante herramientas de Python

Daniela B. Risaro^{1 2}

dbrisaro@gmail.com Twitter: @dbrisaro Github: Repositorio Github

¹Departamento de Oceanografía Servicio de Hidrografía Naval (SHN)

²Facultad de Cs Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires (UBA)

13 de noviembre de 2019

Esquema

- Motivación
- Datos de clorofila
- 3 Python workflow
- Resultados del mar Argentino

Motivación

Area de estudio - El mar argentino




Figura: a) Distribucion climatológica de TSM en el Atlántico Sudoccidental junto principales corrientes oceánicas. b) Clorofila superficial media durante la primavera en la plataforma patagónica.


Datos de clorofila

Mediciones in-situ


 $\bullet \ \ \mathsf{Mediciones} \ \mathsf{in}\text{-}\mathsf{situ} \to \mathsf{muy} \ \mathsf{escasas}$

- ullet Mediciones in-situ o muy escasas
- Satelitales → sensores de color


- Mediciones in-situ → muy escasas
- Satelitales → sensores de color




- Mediciones in-situ → muy escasas
- Satelitales → sensores de color



- Mediciones in-situ → muy escasas
- Satelitales → sensores de color



- Mediciones in-situ → muy escasas
- Satelitales → sensores de color




• ¿Dónde encuentro esta información? o Ocean color $oldsymbol{ ink}$


- ¿Dónde encuentro esta información? → Ocean color ►Link
- Niveles de procesamiento:
 - L1 y L2
 - $\bullet \ \ L3 \to grillados$

- ¿Dónde encuentro esta información? → Ocean color ►Link
- Niveles de procesamiento:
 - L1 y L2
 - $\bullet \ \ L3 \to grillados$


- ¿Dónde encuentro esta información? → Ocean color ○Link
- Niveles de procesamiento:
 - L1 y L2
 - L3 \rightarrow grillados




- ¿Dónde encuentro esta información? → Ocean color ►Link
- Niveles de procesamiento:
 - L1 y L2
 - L3 \rightarrow grillados




- ¿Dónde encuentro esta información? → Ocean color ►Link
- Niveles de procesamiento:
 - L1 y L2
 - L3 \rightarrow grillados




- ¿Dónde encuentro esta información? → Ocean color ○Link
- Niveles de procesamiento:
 - L1 y L2
 - L3 \rightarrow grillados




- ¿Dónde encuentro esta información? → Ocean color ►Link
- Niveles de procesamiento:
 - L1 y L2
 - L3 \rightarrow grillados



- ¿Dónde encuentro esta información? → Ocean color ►Link
- Niveles de procesamiento:
 - L1 y L2
 - L3 \rightarrow grillados



- ¿Dónde encuentro esta información? → Ocean color ►Link
- Niveles de procesamiento:
 - L1 y L2
 - L3 \rightarrow grillados



 Luego de seleccionar la opcion 'Mapped' uno obtiene una lista de links de archivos netCDF (.nc)

- Luego de seleccionar la opcion 'Mapped' uno obtiene una lista de links de archivos netCDF (.nc)
- https://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/cgi/getfile/ A20022132002243.L3m_MO_CHL.x_chlor_a.nc

- Luego de seleccionar la opcion 'Mapped' uno obtiene una lista de links de archivos netCDF (.nc)

Si son varios archivos:

- Luego de seleccionar la opcion 'Mapped' uno obtiene una lista de links de archivos netCDF (.nc)
- https://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/cgi/getfile/ A20022132002243.L3m_MO_CHL.x_chlor_a.nc • Link

Si son varios archivos:

- generar un archivo datos.txt
- ejecutar en la terminal el comando

```
\begin{array}{lll} \textbf{cd} & / \texttt{home} / \, \texttt{daniu} / \, \texttt{Documentos} / \, \texttt{charla\_gis} \, / \\ \textbf{wget} & -i & \texttt{datos.txt} \end{array}
```

 Un archivo netCDF (Network Common Data Form) es un formato que guarda datos multidimensionales para variables climáticas, por ejemplo:

- Un archivo netCDF (Network Common Data Form) es un formato que guarda datos multidimensionales para variables climáticas, por ejemplo:
 - TSM (tiempo, latitud, longitud)
 - Taire (tiempo, latitud, longitud, presion)
 - clorofila-a (tiempo, latitud, longitud)

- Un archivo netCDF (Network Common Data Form) es un formato que guarda datos multidimensionales para variables climáticas, por ejemplo:
 - TSM (tiempo, latitud, longitud)
 - Taire (tiempo, latitud, longitud, presion)
 - clorofila-a (tiempo, latitud, longitud)
- El archivo .nc tiene un *header* que contiene toda la información sobre las dimensiones y atributos de las variables, pero no los valores en si. Los datos están comprimidos en la *data-part* del archivo.

Para visualizar la información del header podemos ejecutar en la terminal:

```
 \begin{array}{lll} \textbf{cd} & /home/\,daniu\,/\,charla\_gis\,/\\ ncdump & -h & A20022132002243.L3m\_MO\_CHL\,.\,x\_chlor\_a\,.\,nc \end{array}
```

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
ianiu@daniu:-$ cd /home/daniu/Documentos/charla_GIS/
ianiu@daniu:-/Documentos/charla_GIS$ ncdusp -h A20022132002243.L3m_MO_CHL.x_chlor_a.nc
etcdf /A2002/32002243.13m_MO_CHL.x_chlor_a {
imensions:
lat = 624
                         chlor a:long name = "Chlorophyll Concentration, OCI Algorithm" ;
chlor_a:units = 'mg m^-3" ;
                         chlor a:standard name = "mass concentration of chlorophyll in sea water" ;
                         chlor a:display max = 20.f;
                         lat:long name = "Latitude" :
                        lat:units = "degrees north";
lat:standard_name = "latitude"
lat: FillValue = -999.f;
lat:valid_min = -90.f;
                         lon:standard name = "longitude" ;
          lon:valid_min = -180.f;
lon:valid_max = 180.f;
ubyte palette(rgb, eightbitcolor);
                         :instrument = "MODIS"
                        :instrument = TMOLDS ;
:title = "MODISA Level-1" Standard Happed Image";
:project = "Ocean Biology Processing Group (MASA/GSFC/OBPG)";
:platform = "Aqua";
:temporal range = "25 day";
:processing version = "Unspecified";
                          :date created = "2019-05-05T06:04:15.0007" :
```

Para visualizar la información del header podemos ejecutar en la terminal:

```
 \begin{array}{lll} \textbf{cd} & /home/daniu/charla\_gis/\\ ncdump & -h & A20022132002243.L3m\_MO\_CHL.x\_chlor\_a.nc \end{array}
```

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
ianiu@daniu:-$ cd /home/daniu/Documentos/charla_GIS/
ianiu@daniu:-/Documentos/charla_GIS$ ncdusp -h A20022132002243.L3m_MO_CHL.x_chlor_a.nc
etcdf /A2002/32002243.13m_MO_CHL.x_chlor_a {
imensions:
lat = 624
                         chlor a:long name = "Chlorophyll Concentration, OCI Algorithm" ;
chlor_a:units = 'mg m^-3" ;
                         chlor a:standard name = "mass concentration of chlorophyll in sea water" ;
                         chlor a:display max = 20.f;
                         lat:long name = "Latitude" :
                        lat:units = "degrees north";
lat:standard_name = "latitude"
lat: FillValue = -999.f;
lat:valid_min = -90.f;
                         lon:standard name = "longitude" ;
          lon:valid_min = -180.f;
lon:valid_max = 180.f;
ubyte palette(rgb, eightbitcolor);
                         :instrument = "MODIS"
                        :instrument = TMOLDS ;
:title = "MODISA Level-1" Standard Happed Image";
:project = "Ocean Biology Processing Group (MASA/GSFC/OBPG)";
:platform = "Aqua";
:temporal range = "25 day";
:processing version = "Unspecified";
                          :date created = "2019-05-05T06:04:15.0007" :
```

Para visualizar la información del header podemos ejecutar en la terminal:

```
daniu@daniu: ~/Documentos/charla GIS
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
chlor a:long name = "Chlorophyll Concentration, OCI Algorithm";
chlor a:units = "mg m"-3";
chlor a:standard name = "mass concentration of chlorophyll in sea water";
                         chlor a: FillValue = -32767.f :
                         chlor a:valid max = 100.f :
chlor arreference = "My. C., Lee Z., and Franz, B.A. (2012), Chlorophyll-a algorithms for olipotrophic oceans: A n clapproach based on three-band reflectance difference, J. Geophys. Res., 117, C01011, doi:10.1029/201120097395."; chlor axisiplay scale = "logs" (chlor axisiplay scale = "logs" (chlor axisiplay scale = "logs").
                         lat:units = "calitude";
lat:units = "degrees north";
lat:standard_name = "latitude";
lat: FillValue = 999.f;
lat:valid_max = 90.f;
lat:valid_max = 90.f;
           lon:valid_min = -180.f;
lon:valid_max = 180.f;
ubvte palette(rgb, eightbitcolor);
   olobal attributes:
                          :product name = "A20022132002243.L3m MO CHL.x chlor a.nc" ;
                           :instrument = "MODIS"
                          :Instrument = "MUDIS";

:title = "MUDISA Level-3 Standard Mapped Image";

:project = "Ocean Biology Processing Group (MASA/GSFC/OBPG)";

:platfore = "Aqua";

:temporal_range = "25-day";

:processing version = "Umspecified";
                            date created = "2019-05-05T06:04:15.0007"
```

Para visualizar la información del header podemos ejecutar en la terminal:

```
 \begin{array}{lll} \textbf{cd} & /home/daniu/charla\_gis/\\ ncdump & -h & A20022132002243.L3m\_MO\_CHL.x\_chlor\_a.nc \end{array}
```

```
daniu@daniu: ~/Documentos/charla GIS
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
chlor a:long name = "Chlorophyll Concentration, OCI Algorithm";
chlor a:units = "mg m"-3";
chlor a:standard name = "mass concentration of chlorophyll in sea water";
                        chlor a: FillValue = -32767.f :
                         chlor a:valid max = 100.f :
  chlor areference = "Ms, C., Lee Z., and Franz, B.A. (2012). Chlorophyll-a algorithms for olipotrophic oceans: A n
l approach based on three-band reflectance difference, J. Geophys. Res., 117, C01011, doi:10.1029/2011/0007395.";
chlor ardisplay scale = 'log':
chlor-ardisplay in = 0.01f;
                        lat:units = "calitude";
lat:units = "degrees north";
lat:standard_name = "latitude";
lat: FillValue = 999.f;
lat:valid_max = 90.f;
lat:valid_max = 90.f;
           lon:valid_min = -180.f;
lon:valid_max = 180.f;
ubvte palette(rgb, eightbitcolor);
   olobal attributes:
                         :product name = "A20022132002243.L3m MO CHL.x chlor a.nc" ;
                          :instrument = "MODIS"
                         :Instrument = "MUDIS";

:title = "MUDISA Level-3 Standard Mapped Image";

:project = "Ocean Biology Processing Group (MASA/GSFC/OBPG)";

:platfore = "Aqua";

:temporal_range = "25-day";

:processing version = "Umspecified";
                           date created = "2019-05-05T06:04:15.0007"
```

Para visualizar la información del header podemos ejecutar en la terminal:

```
daniu@daniu: ~/Documentos/charla GIS
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
chlor a:long name = "Chlorophyll Concentration, OCI Algorithm";
chlor a:units = "mg m"-3";
chlor a:standard name = "mass concentration of chlorophyll in sea water";
                         chlor a: FillValue = -32767.f :
                          chlor a:valid max = 100.f :
    chlor areference = 196, C., Lee Z., and Franz, B.A. (2012). Chlorophyll-a algorithms for oligotrophic oceans: A n approach based on three boar effectance difference, J. Geophys. Res., 117, C01011, doi:10.1029/2011/C007395."; chlor ardisplay scale = "log: "doi:10.1029/2011/C007395."; chlor ardisplay are 0.01f;
                         lat:units = "calitude";
lat:units = "degrees north";
lat:standard_name = "latitude";
lat: FillValue = 999.f;
lat:valid_max = 90.f;
lat:valid_max = 90.f;
           lon:valid_min = -180.f;
lon:valid_max = 180.f;
ubvte palette(rgb, eightbitcolor);
                           :product name = "A28022132002243.L3m MO CHL.x chlor a.nc" ;
                           :instrument = "MODIS"
                          :Instrument = "MUDIS";

:title = "MUDISA Level-3 Standard Mapped Image";

:project = "Ocean Biology Processing Group (MASA/GSFC/OBPG)";

:platfore = "Aqua";

:temporal_range = "25-day";

:processing version = "Umspecified";
                            date created = "2019-05-05T06:04:15.0007"
```

Python workflow

Manipulación .nc en python


• En Python hay una libreria especializada en la manipulación de archivos netCDF llamada xarray (más info en: Link)

Manipulación .nc en python

• En Python hay una libreria especializada en la manipulación de archivos netCDF llamada xarray (más info en: Link)


Manipulación .nc en python

 En Python hay una libreria especializada en la manipulación de archivos netCDF llamada xarray (más info en: Link)



Manipulación .nc en python

 En Python hay una libreria especializada en la manipulación de archivos netCDF llamada xarray (más info en: Link)



print(data_chl)

Operaciones con xarray

```
import xarray as xr

dire = '/home/daniu/Documentos/charla_gis/'
filename = 'A20022132002243.L3m_MO_CHL.x_chlor_a.nc'
data_chl = xr.open_dataset(dire + filename)

print(data_chl)
```

Operaciones con xarray

```
import xarray as xr
dire = '/home/daniu/Documentos/charla_gis/'
filename = 'A20022132002243.L3m_MO_CHL.x_chlor_a.nc'
data_chl = xr.open_dataset(dire + filename)
print(data_chl)
```

```
IPython: Documentos/charla GIS
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
      data chl = xr.open dataset(dire + filename)
            (data chl)
xarrav.Dataset>
Dimensions: (eightbitcolor: 256, lat: 624, lon: 809, rgb: 3)
Coordinates:
            (lat) float32 -37.87085 -37.912548 ... -63.807453 -63.84915
          (lon) float32 -79.42914 -79.38742 -79.3457 ... -45.762577 -45.72086
Dimensions without coordinates: eightbitcolor, rgb
Data variables:
   chlor a (lat. lon) float32 ...
   palette (rgb, eightbitcolor) uint8 ...
Attributes:
                                     A20022132002243.L3m MO CHL.x chlor a.nc
   product name:
   instrument:
                                     MODISA Level-3 Standard Mapped Image
                                     Ocean Biology Processing Group (NASA/GS...
                                     Aqua
   temporal range:
                                     25-day
                                                                    4 D > 4 A > 4 B > 4 B >
```

Operaciones con xarray - Mapas

```
import xarray as xr

dire = '/home/daniu/Documentos/charla_gis/'
filename = 'A20022132002243.L3m_MO_CHL.x_chlor_a.nc'
data_chl = xr.open_dataset(dire + filename)
```

Operaciones con xarray - Mapas

```
import xarray as xr

dire = '/home/daniu/Documentos/charla_gis/'
filename = 'A20022132002243.L3m_MO_CHL.x_chlor_a.nc'
data_chl = xr.open_dataset(dire + filename)


data_chl_pp = data_chl.sel(lat=slice(-40,-55), lon=slice(-70,-46))
levels = np.linspace(0,3.5,15)
data_chl_pp.chlor_a.plot(levels=levels)
```

Operaciones con xarray - Mapas

```
import xarray as xr
```

```
\label{eq:direction} \begin{array}{lll} \mbox{dire} &= \mbox{'home/daniu/Documentos/charla_gis/'} \\ \mbox{filename} &= \mbox{'A20022132002243.L3m\_MO\_CHL.x\_chlor\_a.nc'} \\ \mbox{data\_chl} &= \mbox{xr.open\_dataset(dire} + \mbox{filename)} \end{array}
```

 $\begin{array}{ll} data_chl_pp = data_chl.sel(lat=slice(-40,-55), lon=slice(-70,-46) \\ levels = np.linspace(0,3.5,15) \\ data_chl_pp.chlor_a.plot(levels=levels) \\ \end{array}$



Operaciones con xarray - Promedios espaciales

```
# zonal and meridional mean
mean_chl_zonal = data_chl_pp.mean(dim=('lon'))
mean_chl_meridional = data_chl_pp.mean(dim=('lat'))
```

Operaciones con xarray - Promedios espaciales


```
# zonal and meridional mean
mean_chl_zonal = data_chl_pp.mean(dim=('lon'))
mean_chl_meridional = data_chl_pp.mean(dim=('lat'))


# plot of two panels
fig , ax = plt.subplots(1, 2)
mean_chl_zonal.chlor_a.plot(ax=ax[0])
mean_chl_meridional.chlor_a.plot(ax=ax[1])
```


Operaciones con xarray - Promedios espaciales

```
# zonal and meridional mean
mean_chl_zonal = data_chl_pp.mean(dim=('lon'))
mean_chl_meridional = data_chl_pp.mean(dim=('lat'))

# plot of two panels
fig , ax = plt.subplots(1, 2)
mean_chl_zonal.chlor_a.plot(ax=ax[0])
mean_chl_meridional.chlor_a.plot(ax=ax[1])
```







Resultados del mar Argentino

 Se realizo una serie que unifica a SWFs y MODIS en cada punto de grilla segun la metodología de Marrari et al 2015

- Se realizo una serie que unifica a SWFs y MODIS en cada punto de grilla segun la metodología de Marrari et al 2015
- SWF 1997-2010

- Se realizo una serie que unifica a SWFs y MODIS en cada punto de grilla segun la metodología de Marrari et al 2015
- SWF 1997-2010
- MODIS 2002-presente

- Se realizo una serie que unifica a SWFs y MODIS en cada punto de grilla segun la metodología de Marrari et al 2015
- SWF 1997-2010
- MODIS 2002-presente
 - ightarrow serie unica de clorofila desde 1997 hasta la actualidad con una resolucion espacial de 9km y datos diarios/semanales/mensuales




Figura: Distribucion climatológica de clorofila-a media durante los meses de primavera para el periodo 1998-2017




Figura: Distribucion del desvio estandar de clorofila-a durante los meses de primavera para el periodo 1998-2017




Figura: Distribucion de tendencias lineales de anomalias de clorofila-a durante el periodo 1998-2017




Figura: Evolucion del ciclo climatologico de clorofila-a para los periodos 1998-2007 y 2008-2017

gracias!