RITA GUADELOUPE
Réseau d'innovation et de transfert agricole

# INRAAL56

Edition : Mai 2019

Plateforme d'Evaluation Variétale : Ignames

## CARTE D'IDENTITE

| | |
|---|---|
| Espèce | ***Dioscorea alata*** |
| Origine | **Guadeloupe** |
| Sélectionneur | **INRA** |
| Mainteneur | **CRB - Plantes Tropicales** |
| Année d'obtention | **ND** |
| Période d'évaluation | **2007-2013** |

**Points forts de la variété :**

- ✓ **Homogénéité des tubercules**
- ✓ **Rendement**

## DESCRIPTION

### PARTIE AERIENNE

| | | |
|---|---|---|
| Tige | Epines | **Absence** |
| | Bulbilles | **Présence** |
| Feuille | Aspect | **Non cireux** |
| | Texture | **ND** |
| Pétiole | Couleur | **Vert** |





### PARTIE SOUTERRAINE

| | | |
|---|---|---|
| Tubercule | Conformité | **87 %** |
| | Surface | **Lisse** |
| | Racines | **Présence** |
| Peau | Epaisseur | **Epaisse** |
| Racines | Epines | **Présence** |

## QUALITE

| | |
|---|---|
| Durée du cycle<br>*Levée à la senescence* | **> 6 mois** |
| Récolte | **Senescence feuillage** |
| Conservation | **> 1 mois** |
| Couleur chair | **orangé** |
| Oxydation à la cuisson | **Moyenne** |
| Fermeté après cuisson | **Ferme** |



Evaluation Variétale **GUADELOUPE**

# PERFORMANCES

**NOTE** : A l'exception du rendement, les données présentées ci-après ont été obtenues en stations expérimentales (Duclos, Godet, Roujol). Elles traduisent les performances de la variété dans les conditions de culture des stations. Si vous constatez un comportement différent, vous pouvez le communiquer sur notre forum : **https://forumannou.cirad.fr/**

## MALADIES

| | |
|---|---|
| Anthracnose : | **Tolérante Observé/Non** |
| Autre : | **Non observé** |

*Toutes les variétés de l'espèce alata ont été sélectionnées pour leur tolérance à l'anthracnose.*

*Etant donné l'évolution continue des pathogènes, les informations relatives aux maladies ne sont pertinentes que pour la période de sélection.*

## GESTION DE L'ENHERBEMENT

| | |
|---|---|
| Taux de levée 1 mois après émergence : | **45 %** |
| Vitesse d'émergence : | **Moyenne** |
| Recouvrement à 3 mois : | **32 %** |
| Recouvrement maximal : | **68 %** |

*Le pourcentage et l'homogénéité de levée traduisent la capacité d'installation de la culture. Plus l'émergence est rapide, meilleure est l'installation de la culture.*


*La vitesse de recouvrement du sol après 3 mois de culture et le recouvrement maximal traduisent la capacité de la variété à gérer l'enherbement.*

## RENDEMENT


| | |
|---|---|
| Rendement potentiel : | **35 t/Ha** |
| Nombre moyen de tubercules par plante : | **1,2** |

*Le rendement potentiel a été calculé à partir du poids moyen par plante récoltée et de la densité de plantation. La valeur indiquée est la valeur obtenue en station expérimentale.*

**Rendements potentiels dans les différentes parcelles expérimentales :**




*Lorsque les données sont absentes la variété n'a pas été testée sur le site considéré*




## CALIBRE

*Le calibre est exprimé en pourcentage de tubercules récoltés par classe de poids.*

Poids moyen par tubercule : **0,8 Kg**

**Pour en savoir plus :** https://ziyanmannou.cirad.fr