



Bibliografía:

Paraconica ®. Ficha técnica del medicamento. Acino Pharma AG. Paraconica 1000mg IV. Solución para infusión. Suiza 2016.

Comité de medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pdiamecum. Edición 2015. ISSN 2531-2664. Disponible en <https://www.aeped.es/comite-medicamento/s/piamecum/paracetamol-acetaminofen>. Consultado 18/12/2021

Realizado por:
MSc. Alejandra Muñoz.

Revisado por:
Departamento de Farmacia - HNN.



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
"Dr. Carlos Sáenz Herrera"
Centro de Ciencias Médicas de la CCSS





Qué es el paracetamol?

Analgésico y antipirético actúa mediante la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y la inhibición del efecto de los pirógenos endógenos en el centro de regulación térmica en el hipotálamo.



Indicaciones:

Tratamiento a corto plazo del dolor leve o moderado, cuando no es posible la administración oral.
Tratamiento a corto plazo de estados febriles.



¿Cómo se administra?

Presentación: 10mg/ ml
Perfusión intravenosa en 15 minutos.

La solución viene lista para usar.

En niños con un peso inferior a 10 kg, diluir con solución fisiológica o glucosado al 5 % a una razón 1/1.



Por ejemplo:

Si tiene indicado 20mg de paracetamol lo que sería igual a 2cc, agregar 2cc de solución y así obtener un total de 4cc.



En niños con un peso mayor a 10 kg se puede aplicar sin diluir o diluida con solución fisiológica o glucosado al 5%.



Una vez diluido el paracetamol se debe utilizar inmediatamente y como tiempo máximo hasta una hora después de diluido.

Metabolismo:

→ Hepático

Excreción renal:

→ Renal

Consideraciones:

→ No refrigerar

La solución no contiene preservantes por lo que idealmente debe utilizarse inmediatamente al abrirla.



El frasco sin diluir se puede mantener después de abierto por 24 horas.

Tomar en consideración los 10 correctos en la preparación y administración de medicamentos.

