

第三节

格林公式及其应用

一、格林公式


二、平面上曲线积分与路径无关的
等价条件

*三、全微分方程



一、格林公式

区域 D 分类 $\begin{cases} \text{单连通区域 (无“洞”区域)} \\ \text{多连通区域 (有“洞”区域)} \end{cases}$



域 D 边界 L 的**正向**: **域的内部靠左**

定理1. 设区域 D 是由分段光滑正向曲线 L 围成, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上具有连续一阶偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad (\text{格林公式})$$

或

$$\iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$



目录



上页



下页



返回




结束

证明: 1) 若 D 既是 X -型区域, 又是 Y -型区域, 且

$$D: \begin{cases} \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases}$$

$$D: \begin{cases} \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) \\ c \leq y \leq d \end{cases}$$



则
$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy &= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \\ &= \int_c^d Q(\psi_2(y), y) dy - \int_c^d Q(\psi_1(y), y) dy \\ &= \int_{\widehat{CBE}} Q(x, y) dy - \int_{\widehat{CAE}} Q(x, y) dy \\ &= \int_{\widehat{CBE}} Q(x, y) dy + \int_{\widehat{EAC}} Q(x, y) dy \end{aligned}$$

即
$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \int_L Q(x, y) dy \quad (1)$$

同理可证

$$-\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_L P(x, y) dx \quad (2)$$

①、②两式相加得:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$



定理1



目录



上页



下页




返回



结束

2) 若 D 不满足以上条件, 则可通过加辅助线将其分割为有限个上述形式的区域, 如图

$$\begin{aligned} & \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \sum_{k=1}^n \iint_{D_k} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$



$$= \sum_{k=1}^n \int_{\partial D_k} P dx + Q dy \quad (\partial D_k \text{ 表示 } D_k \text{ 的正向边界})$$

$$= \oint_L P dx + Q dy$$

证毕

格林公式
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

推论: 正向闭曲线 L 所围区域 D 的面积

$$A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$$

例如, 椭圆 $L: \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$ 所围面积

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 \theta + ab \sin^2 \theta) d\theta = \pi ab \end{aligned}$$



定理1



目录



上页



下页



返回



结束

例1. 设 L 是一条分段光滑的闭曲线, 证明

$$\oint_L 2xy \, dx + x^2 \, dy = 0$$

证: 令 $P = 2xy$, $Q = x^2$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2x = 0$$

利用格林公式, 得

$$\oint_L 2xy \, dx + x^2 \, dy = \iint_D 0 \, dx \, dy = 0$$



目录



上页



下页



返回



结束


例2. 计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(1,1)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形闭域.

解: 令 $P = 0$, $Q = x e^{-y^2}$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^{-y^2}$$

利用格林公式, 有

$$\begin{aligned}\iint_D e^{-y^2} dx dy &= \oint_{\partial D} x e^{-y^2} dy \\ &= \int_{\overline{OA}} x e^{-y^2} dy = \int_0^1 y e^{-y^2} dy \\ &= \frac{1}{2}(1 - e^{-1})\end{aligned}$$




例3. 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为一无重点且不过原点的分段光滑正向闭曲线.

解: 令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$

则当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$

设 L 所围区域为 D , 当 $(0,0) \notin D$ 时, 由格林公式知

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$$



目录



上页



下页




返回



结束

当 $(0,0) \in D$ 时, 在 D 内作圆周 $l: x^2 + y^2 = r^2$, 取逆时针方向, 记 L 和 l^- 所围的区域为 D_1 , 对区域 D_1 应用格林公式, 得

$$\begin{aligned} & \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} - \oint_{l^-} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \oint_{L \cup l^-} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \iint_{D_1} 0 dx dy = 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \therefore \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} &= \oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}{r^2} d\theta = 2\pi \end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束

二、平面上曲线积分与路径无关的等价条件

定理2. 设 D 是单连通域, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数, 则以下四个条件等价:

(1) 沿 D 中任意光滑闭曲线 L , 有 $\oint_L Pdx + Qdy = 0$.

(2) 对 D 中任一分段光滑曲线 L , 曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关, 只与起止点有关.

(3) $Pdx + Qdy$ 在 D 内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分,

即 $du(x, y) = Pdx + Qdy$

(4) 在 D 内每一点都有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.



目录



上页



下页



返回




结束

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)

设 L_1, L_2 为 D 内任意两条由 A 到 B 的有向分段光滑曲线, 则

$$\begin{aligned} & \int_{L_1} Pdx + Qdy - \int_{L_2} Pdx + Qdy \\ &= \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2^-} Pdx + Qdy \\ &= \int_{L_1 \cup L_2^-} Pdx + Qdy = 0 \end{aligned} \quad (\text{根据条件(1)})$$



$$\therefore \int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy$$

说明: 积分与路径无关时, 曲线积分可记为

$$\int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy = \int_A^B Pdx + Qdy$$



定理2



目录



上页



下页



返回



结束

证明 (2) $\Rightarrow$ (3)

在 D 内取定点 $A(x_0, y_0)$ 和任一点 $B(x, y)$, 因曲线积分与路径无关, 有函数

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy$$


则 $\Delta_x u = u(x + \Delta x, y) - u(x, y)$

$$= \int_{(x, y)}^{(x+\Delta x, y)} Pdx + Qdy = \int_{(x, y)}^{(x+\Delta x, y)} Pdx$$

$$= P(x + \theta \Delta x, y) \Delta x$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(x + \theta \Delta x, y) = P(x, y)$$

同理可证 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$, 因此有 $du = Pdx + Qdy$



定理2



目录



上页



下页



返回



结束

证明 (3) $\Rightarrow$ (4)

设存在函数 $u(x, y)$ 使得

$$du = P dx + Q dy$$

则
$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$$

$$\therefore \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

P, Q 在 D 内具有连续的偏导数, 所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$

从而在 D 内每一点都有
$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$



定理2



目录



上页



下页



返回




结束

证明 (4) $\Rightarrow$ (1)

设 L 为 D 中任一分段光滑闭曲线, 所围区域为 $D' \subset D$ (如图), 因此在 D' 上

$$\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$$



利用**格林公式**, 得

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_{D'} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0 \quad \text{证毕}$$

(4) 在 D 内每一点都有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

(1) 沿 D 中任意光滑闭曲线 L , 有 $\oint_L P dx + Q dy = 0$.



定理2



目录



上页



下页



返回




结束

说明: 根据定理2, 若在某区域 D 内 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则

- 1) 计算曲线积分时, 可选择方便的积分路径;
- 2) 求曲线积分时, 可利用格林公式简化计算,
若积分路径不是闭曲线, 可添加辅助线;
- 3) 可用积分法求 $\mathbf{d}u = P \mathbf{d}x + Q \mathbf{d}y$ 在域 D 内的原函数:

取定点 $(x_0, y_0) \in D$ 及动点 $(x, y) \in D$, 则原函数为

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) \mathbf{d}x + Q(x, y) \mathbf{d}y \\ &= \int_{x_0}^x P(x, y_0) \mathbf{d}x + \int_{y_0}^y Q(x, y) \mathbf{d}y \end{aligned}$$



或
$$u(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y) \mathbf{d}y + \int_{x_0}^x P(x, y) \mathbf{d}x$$



定理2



目录



上页



下页




返回



结束

4) 若已知 $\mathrm{d}u = P \mathrm{d}x + Q \mathrm{d}y$, 则对 D 内任一分段光滑曲线 $\widehat{AB}$, 有

$$\begin{aligned} & \int_{\widehat{AB}} P(x, y) \mathrm{d}x + Q(x, y) \mathrm{d}y \\ &= \int_A^B P(x, y) \mathrm{d}x + Q(x, y) \mathrm{d}y \\ &= \int_A^B \mathrm{d}u = u \Big|_A^B = u(B) - u(A) \end{aligned}$$



注: 此式称为**曲线积分的基本公式**(P211定理4).

它类似于微积分基本公式:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \mathrm{d}x &= \int_a^b \mathrm{d}F(x) && (\text{其中 } F'(x) = f(x)) \\ &= F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \end{aligned}$$



定理2



目录



上页



下页



返回




结束

例4. 计算 $\int_L (x^2 + 3y) dx + (y^2 - x) dy$, 其中 L 为上半圆周 $y = \sqrt{4x - x^2}$ 从 $O(0, 0)$ 到 $A(4, 0)$.

解: 为了使用格林公式, 添加辅助线段 $\overline{AO}$, 它与 L 所围区域为 D , 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \oint_{L \cup \overline{AO}} (x^2 + 3y) dx + (y^2 - x) dy \\ &\quad + \int_{\overline{OA}} (x^2 + 3y) dx + (y^2 - x) dy \\ &= 4 \iint_D dx dy + \int_0^4 x^2 dx \\ &= 8\pi + \frac{64}{3} \end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束

例5. 验证 $xy^2 dx + x^2 y dy$ 是某个函数的全微分, 并求出这个函数.

证: 设 $P = xy^2$, $Q = x^2 y$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy = \frac{\partial Q}{\partial x}$


由定理2 可知, 存在函数 $u(x, y)$ 使

$$du = xy^2 dx + x^2 y dy$$

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} xy^2 dx + x^2 y dy$$

$$= 0 + \int_0^y x^2 y dy$$

$$= \int_0^y x^2 y dy = \frac{1}{2} x^2 y^2$$



目录



上页



下页



返回




结束

例6. 验证 $\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 在右半平面 ($x > 0$) 内存在原函数, 并求出它.

证: 令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$

则 $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial y} \quad (x > 0)$



由**定理 2** 可知存在原函数

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= 0 + x \int_0^y \frac{dy}{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x} \quad (x > 0) \end{aligned}$$



目录



上页



下页




返回



结束

或

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^y \frac{dy}{1+y^2} - y \int_1^x \frac{dx}{x^2 + y^2} \\ &= \arctan y + \arctan \frac{1}{y} - \arctan \frac{x}{y} \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x}{y} \\ &= \arctan \frac{y}{x} \quad (x > 0) \end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束

*三、全微分方程

若存在 $u(x, y)$ 使 $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$
则称 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ ③

为全微分方程.

判别: P, Q 在某单连通域 D 内有连续一阶偏导数, 则

$$\text{③为全微分方程} \iff \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, (x, y) \in D$$

求解步骤:

1. 求原函数 $u(x, y)$

方法1 凑微分法;

方法2 利用积分与路径无关的条件.

2. 由 $du = 0$ 知通解为 $u(x, y) = C$.



目录



上页



下页



返回



结束

例8. 求解

$$(5x^4 + 3xy^2 - y^3)dx + (3x^2y - 3xy^2 + y^2)dy = 0$$


解: 因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy - 3y^2 = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故这是全微分方程.

法1 取 $x_0 = 0, y_0 = 0$, 则有

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^x 5x^4 dx + \int_0^y (3x^2y - 3xy^2 + y^2) dy \\ &= x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3 \end{aligned}$$

因此方程的通解为

$$x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3 = C$$



目录



上页



下页



返回



结束

法2 此全微分方程的通解为 $u(x, y) = C$, 则有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 5x^4 + 3xy^2 - y^3 \quad \textcircled{4}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2y - 3xy^2 + y^2 \quad \textcircled{5}$$

由④得 $u(x, y) = \int (5x^4 + 3xy^2 - y^3) dx + \varphi(y)$

$$= x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \varphi(y), \quad \varphi(y) \text{ 待定}$$

两边对 y 求导得 $\frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2y - 3xy^2 + \varphi'(y)$

与⑤比较得 $\varphi'(y) = y^2$, 取 $\varphi(y) = \frac{1}{3}y^3$

因此方程的通解为 $x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3 = C$



目录



上页



下页



返回



结束

例9. 求解 $(x + \frac{y}{x^2})dx - \frac{1}{x}dy = 0$

解: $\because \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{x^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, $\therefore$ 这是一个全微分方程.

用凑微分法求通解. 将方程改写为

$$x dx - \frac{x dy - y dx}{x^2} = 0$$

即 $d(\frac{1}{2}x^2) - d(\frac{y}{x}) = 0$, 或 $d(\frac{1}{2}x^2 - \frac{y}{x}) = 0$

故原方程的通解为 $\frac{1}{2}x^2 - \frac{y}{x} = C$



目录



上页



下页



返回



结束

思考: 如何解方程 $(x^3 + y)dx - xdy = 0$?

这不是一个全微分方程, 但若在方程两边同乘 $\frac{1}{x^2}$,
就化成例9 的方程.

注: 若存在连续可微函数 $\mu = \mu(x, y) \neq 0$, 使

$$\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0$$

为全微分方程, 则称 $\mu(x, y)$ 为原方程的**积分因子**.

在简单情况下, 可凭观察和经验根据微分倒推式得到积分因子.



目录



上页



下页



返回



结束

内容小结

1. 格林公式 $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

2. 等价条件

设 P, Q 在 D 内具有一阶连续偏导数, 则有

$\int_L P dx + Q dy$ 在 D 内与路径无关.

$\iff$ 对 D 内任意闭曲线 L 有 $\oint_L P dx + Q dy = 0$

$\iff$ 在 D 内有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

$\iff$ 在 D 内有 $du = P dx + Q dy$

$\iff P dx + Q dy = 0$ 为全微分方程



目录



上页



下页




返回



结束

思考与练习

1. 设 $L: x^2 + \frac{1}{4}y^2 = 1$, $l: x^2 + y^2 = 4$,
且都取正向, 问下列计算是否正确?



$$(1) \oint_L \frac{x dy - 4y dx}{x^2 + y^2} \neq \oint_l \frac{x dy - 4y dx}{x^2 + y^2}$$

$$= \frac{1}{4} \oint_l x dy - 4y dx = \frac{1}{4} \iint_D 5 d\sigma = 5\pi$$

$$(2) \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

$$= \frac{1}{4} \oint_l x dy - y dx = \frac{1}{4} \iint_D 2 d\sigma$$

$$= 2\pi$$

提示: $x^2 + y^2 \neq 0$ 时

$$(1) \frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$$

$$(2) \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$



目录



上页



下页



返回




结束

2. 设 $\text{grad } u(x, y) = (x^4 + 4xy^3, 6x^2y^2 - 5y^4)$, 求 $u(x, y)$.

提示: $du(x, y) = (x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy + C \\ &= \int_0^x x^4 dx + \int_0^y (6x^2y^2 - 5y^4) dy + C \\ &= \frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 - y^5 + C \end{aligned}$$




备用题 1. 设 C 为沿 $x^2 + y^2 = a^2$ 从点 $(0, a)$ 依逆时针到点 $(0, -a)$ 的半圆, 计算

$$\int_C \frac{y^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx + \left[ax + 2y \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) \right] dy$$

解: 添加辅助线如图, 利用格林公式.


$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{C \cup C'} - \int_{C'} \\ &= \iint_D \left[a + \frac{2y}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{2y}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right] dx dy \\ &\quad - \int_{-a}^a (2y \ln a) dy \\ &= \frac{1}{2} \pi a^3 \end{aligned}$$



2. 质点 M 沿着以 AB 为直径的半圆, 从 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$, 在此过程中受力 $\vec{F}$ 作用, $\vec{F}$ 的大小等于点 M 到原点的距离, 其方向垂直于 OM , 且与 y 轴正向夹角为锐角, 求变力 $\vec{F}$ 对质点 M 所作的功. (1990 考研)

解: 由图知 $\vec{F} = (-y, x)$, 故所求功为

$$\begin{aligned} W &= \int_{\widehat{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\widehat{AB}} -y dx + x dy \\ &= \left(\int_{\widehat{AB} \cup \overline{BA}} + \int_{\overline{AB}} \right) (-y dx + x dy) \\ &= 2 \iint_D dx dy + \int_1^3 [-(x+1) + x] dx \\ &= 2\pi - 2 \end{aligned}$$



$\overline{AB}$ 的方程

$$y = 2 + \frac{4-2}{3-1}(x-1)$$



目录



上页



下页



返回



结束

3. 已知曲线积分 $\int_L F(x, y) [y \sin x dx - \cos x dy]$ 与路径无关, 其中 $F \in C^1$, $F(0, 1) = 0$, 求由 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = f(x)$.

解: 因积分与路径无关, 故有

$$\frac{\partial}{\partial x} [-F(x, y) \cos x] = \frac{\partial}{\partial y} [F(x, y) y \sin x]$$

即 $-F_x \cos x + \cancel{F \sin x} = F_y y \sin x + \cancel{F \sin x}$

y' $\Rightarrow -\frac{F_x}{F_y} = y \tan x$

因此有 $\begin{cases} y' = y \tan x \\ y|_{x=0} = 1 \end{cases} \Rightarrow y = \frac{1}{\cos x} = \sec x$