

(미적분 I)과 서답형 답안지

2학년 (3)반 (13)번 이름 (우창원)

※ 초검 재검관은 해당자 전용 (학생 기재 금지)

단답형 1	[10점]	초검	재검
(1) 1	[3점]	3	
(2) $\frac{1}{b}$	[3점]	3	
(3) 8	[4점]	4	
소 계		10	

서술형 1	[10점]	초검	재검
(1) $a \neq 0$ 일 때라면 $\uparrow a$ 도 a^2+1 , $\lambda = -1$ 도 a^2+1 이므로 $f(a+1)$ 의 값이 0이라면 모두 불연속(2개)로 모든, 0이 아니라고 모든 (0)개 때라면 $a=0$ 이고 $f(0^2+1)=0$ 이므로 $f(1)=0$. ✓	[2점]	2	
(2) $f(x) = (x-1)(x-r)$ 이라 하자. $[h(x)의 불연속점] = [f(x^2)=0인 x]$ 이므로 $b=-1, c=1$ 이고 $f(x) \neq 0$ 이라면 $x=b, c$ 이외의 점에서 <u>불연속이므로 $r \neq 0$이다.</u> $r=1$ (중근)이면 $x^2=1$ 의 근이 ± 1 뿐이라 불연속점이 b, c 두 개: 이 경우 누락 -1	[4점]	3	
(3) $h(x) = \frac{(x-1)(x-1-r)}{(x-1)(x-1)(x^2-r)}$ 이 $x=-1$ 에서 극한값이 존재하네 $\rightarrow$ $-1-r = -1$ 이어야 한다. $r=2$ $\rightarrow f(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x^2-2)}$ 이고 $r \neq 0$ 이므로 $(x-1)(x^2-2)$ $\frac{x-1}{(x-1)(x^2+2)} \Big _{x=-1}$ 이 $\lim_{x \rightarrow -1} h(x)$ 와 같으니 $2 \times \frac{18}{3} = \frac{3}{1}$ $f(1) = 4 \times 3$ 공하면 8 불자 $(x-4)(x-3-r)$ 가 $x=-1$ 에서 0: $-4-r=0, r=-4$ (착안 1점) 정답 18 $\frac{3}{1}$ 공하면 8	[4점]	1	
소 계		6	

서답형 총점 (20점)	16	
채점자 확인		